Supplemento straordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 240 del 15 ottobre 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 ottobre 1986 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

MINISTERO DELLA SANITÀ

Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° gennaio 1985 - 30 giugno 1985 indicati nell'elenco n. 33 (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 1986).

IV Elenco di etichette allegate ai presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441) in aggiornamento al I Elenco pubblicato in Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale *n. 215 del 6 agosto 1984, al II Elenco pubblicato in Supplemento straordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 89 del 15 aprile 1985 e al III Elenco pubblicato in Supplemento straordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 203 del 29 agosto 1985.*

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

Numero e data registrazione		*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagin*
2770	19- 4-1978	CARAGARD COMBI LIQUIDO	CIBA GEIGY	25
2774	29- 4-1978	SPINTOX	RAVIT	25
2778	18- 1-1978	ZOLONE P.B. 25	SODIRODIA	25
2779	18- 1-1978	ZOLONE LIQUIDO 25	SODIRODIA	25
2780	29- 4-1978	KILVAL SODIRODIA	RAVIT	25
2806	29- 4-1978	SEVISOL 50	ICI SOLPLANT	25
2810	10- 8-1978	BIETONET	RAVIT	26
2821	30- 5-1978	CEPONE 70	RAVIT	26
2834	27-11-1979	AGROCIDE INODORO GRANULARE	ICI SOLPLANT	26
2843	9- 8-1978	SANDOCAR	SANDOZ	26
2862	8- 6-1978	MICOTOX SANDOZ	SANDOZ	26
2865	4-10-1978	OLICRON	CIBA GEIGY	26
2881	1- 8-1978	COPRANTOL	CIBA GEIGY	26
2885	5- 8-1978	BLAGAL	SHELL ITALIA	26
2888	5- 8-1978	DIQUAZIN	ICI SOLPLANT	26
2942	4-12-1979	FLORBARIO ESSE	SARIAF	26
2943	10-11-1978	FLORBARIO	SARIAF	27
2961	23- 4-1979	KELTHANE W 35	RAVIT	27
2962	16- 6-1979	MITEX E 50	INTERNAZIONALE B.P.D.	27
2965	4- 1-1979	OVICIDA ESTIVO	RAVIT	27
2968	4- 4-1980	HERBIDAL RISO S	INTERNAZIONALE B.P.D.	27
2969	2- 2-1979	MALITAL	ITAL AGRO	27
2970	25- 5-1979	KELTHANE MF	RAVIT	27
2971	2-12-1978	SUTAN 6 E	RAVIT	27
2974	2-12-1978	KELTHANE W	INTERNAZIONALE B.P.D.	27
2982	8-11-1978	A 11 ANTICTRITTOGAMICO	CIBA GEIGY	27
2983	13-11-1978	NIMROD OIDIUMSTOP	ICI SOLPLANT	28
2993	11-11-1978	TIOVIT	SANDOZ	28
3041	23- 4-1979	NAFTIL 50 MICRONIZZATO	RAVIT	28
3042	6- 4-1979	ALLISAN 50 P.B.	RAVIT	28
3060	23- 4-1979	BARIOVIT	RAVIT	28
3083	19- 4-1979	ANTHIO	SANDOZ	28
3104	25- 5-1979	ARACIDE	RAVIT	28
3107	25- 5-1979	NAFTIL MICRONIZZATO	RAVIT	28
3110	25- 5-1979	METILON	RAVIT	28
3111	25- 5-1979	KOLLOVIT	RAVIT	28
3113	25- 5-1979	SOFRIL 80	RAVIT	29
3120	25- 5-1979	OSSICLORURO DI RAME B.P.D. 35	INTERNAZIONALE B.P.D.	29
3121	25- 5-1979	OSSICLORURO DI RAME B.P.D. 16	INTERNAZIONALE B.P.D.	29
3140	25- 5-1979	WETTION	RAVIT	29
3147	5- 6-1979	FITIOS B/77 E 40	INTERNAZIONALE B.P.D.	29
3148	5- 6-1979	DATHIOS P.B.	RAVIT	29
3149	4- 4-1980	ORDRAM GRANULARE	RAVIT	29
3154	15- 6-1979	PI 63	ICI SOLPLANT	29
3195	6- 7-1979	SUV 50	SARIAF	29
3225	1- 8-1979	AEROVAL	BIMEX	29
3233	1- 8-1979	SANDOVIT A	SANDOZ	30
3235	1- 8-1979	ANTIDERIVA RAVIT	RAVIT	30
3238	1- 8-1979	ANTIDERIVA B.P.D.	INTERNAZIONALE B.P.D.	30
3240	25- 9-1979	ENDOFENE P.B.	RAVIT	30
3241	20-11-1979	DITHANE Z 78 POLVERE	RAVIT	30
3243	21- 5-1982	R 6 ERRESEI - M	RAVIT	30
3244	21- 5-1982	R6 ERRESEI SB - M 10	RAVIT	30
3254	19- 6-1980	DITHANE Z 78 BLU	RAVIT	30
3267	21- 6-1982	R6 ERRESEI P.B.	RAVIT	30
3268	25-10-1979	MISAN 50	FARMOPLANT	30
3272	25-10-1979	MILTENE	SANDOZ	3
3280	26-10-1979	MILTENE 80	SANDOZ	3
3281	10-10-1979	CAPTANO CIBA	CIBA GEIGY	3
3283	15- 9-1980	CUPROZEB	INTERNAZIONALE B.P.D.	3
3284	28-11-1979	CUPROTHEX S BLU	RAVIT	3
3295	20-10-1979	EFISAN	SANDOZ	3
3303	25-10-1979	CUMAN L	CIBA GEIGY	3
3317	23- 1-1982	R6 ERRESEI DAC 30-15	RAVIT	3
3324	25-10-1979	M 65 MICRONIZZATO	RAVIT	3
3327	25-10-1979	MANESAN	RAVIT	3
3328	10-10-1979	MANEVIT	RAVIT	3
3354	21- 5-1982	R6 ERRESEI POLVERE	RAVIT	3
3357	16-10-1980	CARBOFURAN SIPCAM CARBOSIP	SIPCAM	3

Numero e data registrazione		*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagina*
3911	9-12-1980	PIRETRAN	BIMEX	392
3918	16- 9-1980	Z 72	SANDOZ	393
3929	13-10-1980	METILSAN	RAVIT	394
3969	28-12-1981	ROTHON 101	RAVIT	395
3970	16-10-1980	HYVAR - X	RAVIT	396
3971	20-12-1980	SULFOSOL COLLOIDALE	INTERNAZIONALE B.P.D.	397
3980	11- 9-1981	FITIOS B/77 P	INTERNAZIONALE B.P.D.	398
3983	20-12-1980	DELFITHEX BLU	INTERNAZIONALE B.P.D.	399
3984	13- 1-1981	MITEX 50	INTERNAZIONALE B.P.D.	400
3985	13- 1-1981	SULFOSOL 60	INTERNAZIONALE B.P.D.	401
3986	16-10-1980	HYVAR - X	INTERNAZIONALE B.P.D.	402
3987	13- 1-1981	SULFOSOL	INTERNAZIONALE B.P.D.	403
3988	20-12-1980	DELFITHEX POLVERE	INTERNAZIONALE B.P.D.	404
4013	12-11-1980	SANDOZIR	SANDOZ	405
4038	12-11-1980	TIOTOX "50"	SANDOZ	406
4039	11-12-1980	ZIREX 90	RAVIT	407
4042	11-12-1980	ZIREX	INTERNAZIONALE B.P.D.	408
4045	12-11-1980	ANTIRUGGINE B.P.D.	INTERNAZIONALE B.P.D.	409
4049	11-12-1980	MAN 50	BIMEX	410
4072	29-11-1980	SELEZIR L	SCAM	411
4073	29-11-1980	BI - ZETA 40	BIMEX	412
4075	11-11-1980	"AMBUSH"	ICI SOLPLANT	413
4080	9-12-1980	REMILATE BIANCO	SANDOZ	414
4081	9-12-1980	REMILATE	SANDOZ	415
4082	9-12-1980	KALIRAM P BIANCO	SANDOZ	416
4101	29-11-1980	AESSE L	SIPCAM	417
4102	11-12-1980	MANEB 80	INTERNAZIONALE B.P.D.	418
4123	20-12-1980	REMILTINE	SANDOZ	419
4124	15-12-1980	TRI-MILTOX P BIANCO	SANDOZ	420
4135	2-12-1980	MANEB P 8	INTERNAZIONALE B.P.D.	421
4136	20-12-1980	DITHEX POLVERE P 25	INTERNAZIONALE B.P.D.	422
4137	20-12-1980	DELFITHEX RAMATO	INTERNAZIONALE B.P.D.	423
4138	20-12-1980	DELFITHEX	INTERNAZIONALE B.P.D.	424
4165	20-12-1980	DITHIOVIT	SANDOZ	425
4175	17- 2-1981	UTAZINEB S CAFFARO	CAFFARO	426
4186	17- 2-1981	ZIMANEB 60	BIMEX	427
4213	17- 2-1981	RAME BLEU "50"	SANDOZ	428
4216	27- 1-1981	SUMICIDIN	SHELL ITALIA	429
4226	27- 3-1981	SELEVIT C	BIMEX	430
4246	27- 3-1981	DITHANE Z - 78	INTERNAZIONALE B.P.D.	431
4249	27- 3-1981	BENFRUT B	RAVIT	432
4276	27- 3-1981	SUMITHION GRANULARE	RAVIT	433
4279	20- 3-1981	FITOIL BIANCO	INTERNAZIONALE B.P.D.	434
4280	1-10-1981	HERBIDAL 80	INTERNAZIONALE B.P.D.	435
4295	1- 4-1981	EFISAN F.P.	SANDOZ	436
4297	18- 5-1981	TELONE II	DOW CHEMICAL	437
4298	1- 4-1981	CHIMICLOR	CHIMIBERG	438
4304	1- 4-1981	OSSICLORURO DI RAME CREMA 25	INTERNAZIONALE B.P.D.	439
4322	16- 4-1981	ATRASAN	SANDOZ	440
4330	18- 5-1981	IRPODIAL M	INTERNAZIONALE B.P.D.	441
4331	18- 5-1981	GRANUREX	INTERNAZIONALE B.P.D.	442
4335	25- 5-1981	ROVRAL M	RAVIT	443
4367	25- 5-1981	KUPFERSOL	VERCHIM ASTERIAS	444
4373	25- 5-1981	AFILENE 50	SIPCAM	445
4400	25- 5-1981	LONTREL NUOVO	ICI SOLPLANT	446
4401	25- 5-1981	GLIFOSAN	VERCHIM ASTERIAS	447
4417	25- 7-1981	KARATHANE L.C.	RAVIT	448
4434	26- 9-1981	"ACARKIL"	ICI SOLPLANT	449
4462	8-10-1981	BAYLETON 25 P.B.	BAYER ITALIA	450
4479	8-10-1981	MILCOZEBZ BLU	SANDOZ	451
4486	1-10-1981	ACARTHANE EC	RAVIT	452
4499	22-10-1981	TRIMIFOL P BIANCO	SANDOZ	453
4566	3-12-1981	PURIVEL	SANDOZ	454
4593	28-12-1981	TRIMIFOL P	SANDOZ	455
4612	30-12-1981	AGERCAB 50	AGER CHEMICAL	456
4623	23- 1-1982	BRANDOL 2 P	SARIAF	457
4637	11- 2-1982	GRILLOVAL	BIMEX	458
4668	25- 2-1982	CUPROCLOR	BIMEX	459
4675	24- 2-1982	STIRYL P 5	STI - SOLFOTECNICA ITALIANA	460

Numero e data registrazione		*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagina*
4703	24- 2-1982	R6 ERRESEI STOP M	RAVIT	461
4704	24- 2-1982	COPERAL M	RAVIT	462
4705	24- 2-1982	RHODAX	RAVIT	463
4706	24- 2-1982	MIKAL M	RAVIT	464
4707	24- 2-1982	COPERAL R	RAVIT	465
4708	24- 2-1982	R6 ERRESEI STOP R	RAVIT	466
4709	24- 2-1982	ALIETTE B.P.D.	RAVIT	467
4710	24- 2-1982	ALIETTE RAVIT	RAVIT	468
4767	26- 4-1982	DITHIOVIT A	SANDOZ	469
4772	10- 5-1982	AGER ALCHLOR	AGER CHEMICAL	470
4779	10- 5-1982	SIMAQUAT PASTA	CAFFARO	471
4797	5- 6-1982	CODICAP	SANDOZ	472
4805	21- 5-1982	FANATE M	FITOCHIMICA GIULIANA	473
4819	7- 6-1982	GLIFOBEN	INTERNAZIONALE B.P.D.	474
4838	21- 6-1982	ZANTIR AZZURRO	ENICHEM AGRICOLTURA	475
4839	21- 6-1982	ZANTIR	ENICHEM AGRICOLTURA	476
4859	21- 6-1982	ORTHOZEB	INTERNAZIONALE B.P.D.	477
4860	21- 6-1982	ERISAN B	RAVIT	478
4879	7- 9-1982	ANTICASCOLA CIFO	CIFO	479
4895	8- 9-1982	STIRYL P.B. 50	SOLFOTECNICA ITALIANA	480
4897	7- 9-1982	RIGENAL L	CIFO	481
4916	25- 9-1982	STIURON P.B. 47,5	SOLFOTECNICA ITALIANA	482
4943	23- 9-1982	DELAN - K	J. & A. MARGESIN S.p.A.	483
4948	15-10-1982	TOTERBA	AGROZOOFARMA	484
4977	15-10-1982	ROM L 20	CHEMIA	485
4983	25-10-1982	ISOLIN	RAVIT	486
4995	5-11-1982	ORTHENE DIBROM F	SIPCAM	487
5000	25-10-1982	ZEACLON	INTERNAZIONALE B.P.D.	488
5008	25-10-1982	REDREX SN/L	INTERNAZIONALE B.P.D.	489
5013	25-10-1982	TORAM	ICI SOLPLANT	490
5101	29-10-1979	MARLATE 50	RAVIT	491
5106	29-11-1982	SANTAR SM	SANDOZ	492
5198	1- 2-1983	FOLTAPET L 27-7	ICI SOLPLANT	493
5199	10- 2-1983	ALASIP	SIPCAM	494
5210	23- 2-1983	MANTION	INTERNAZIONALE B.P.D.	495
5211	23- 2-1983	MANTION S	INTERNAZIONALE B.P.D.	496
5225	10- 2-1983	SIMAVIT L	RAVIT	497
5233	16- 3-1983	MANDEL	RAVIT	498
5234	16- 3-1983	MANDEL S	RAVIT	499
5244	16- 2-1983	TRIVIT	RAVIT	500
5246	23- 2-1983	BETAMYN	TERRANALISI	501
5261	23- 2-1983	TI KAPPA DI -S3	RAVIT	502
5264	3- 3-1983	FOLTA-FOL	BIMEX	503
5265	3- 3-1983	DAZOVAL P.S. 98	BIMEX	504
5271	16- 3-1983	BAVISTIN FL	BASF-AGRITALIA	505
5286	15- 4-1983	VIDDEN D-RAVIT	RAVIT	506
5329	9- 5-1983	TELONE II	INTERNAZIONALE B.P.D.	507
5354	11- 5-1983	ATRALAX	CAFFARO	508
5379	30- 6-1983	SILPRENE II	SILIA S.p.A.	509
5428	4- 7-1983	FENASIP COMBI	SIPCAM	510
5444	6-12-1983	SIMADAL P.B.	INTERNAZIONALE B.P.D.	511
5452	24- 7-1983	SANDOZOLFO	SANDOZ	512
5460	9-11-1983	RHODAX S	INTERNAZIONALE B.P.D.	513
5476	19- 4-1983	NEGRAN S	CIBA GEIGY	514
5482	3-10-1983	BORDOVIT	RAVIT	515
5484	3-10-1983	ERISAN	RAVIT	516
5512	10- 1-1983	MIKAL RAME	RAVIT	517
5525	23-11-1983	SHADOW	SILIA	518
5528	10-10-1983	MIKAL RAME BLU	RAVIT	519
5532	9-11-1983	ERREVIT	RAVIT	520
5534	9-11-1983	POMARGOL	INTERNAZIONALE B.P.D.	521
5538	23-11-1983	COPERAL MB	RAVIT	522
5539	23-11-1983	MIKAL F BLU	RAVIT	523
5540	23-11-1983	BENZEB 5-60	INTERNAZIONALE B.P.D.	524
5541	23-11-1983	BENZEB 10-40	INTERNAZIONALE B.P.D.	525
5562	23-11-1983	VITAL R	RAVIT	526
5563	23-11-1983	VITAL F	RAVIT	527
5577	15-11-1983	FENADOR MIX	SIPCAM	528
5583	15-11-1983	COPERAL F	INTERNAZIONALE B.P.D.	529

Numero e data registrazione		*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagina*
6316	10- 4-1985	FENADIN - S	SIPCAM	734
6317	3- 4-1985	SANDOFAN F12-60	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	735
6318	3- 4-1985	SANDOFAN M	SANDOZ PRODOTTI CHIMICI	736
6319	3- 4-1985	VITIRIL	BAYER ITALIA	737
6320	3- 4-1985	OXIFOL	VERCHIM ASTERIAS	738
6321	3- 4-1985	STIMOLANTE 66 F	L. GOBBI	739
6322	3- 4-1985	OBSTHORMON	L. GOBBI	740
6323	3- 4-1985	DI - TRAPEX	SCHERING	741
6324	3- 4-1985	PROMALIN	SCHERING	742
6325	18- 4-1985	LEFFEL	RAVIT	743
6326	18- 4-1985	EVADE	RAVIT	744
6327	18- 4-1985	SOLARAM - F	BASF AGRITALIA	745
6328	18- 4-1985	SOLARAM - CF	BASF AGRITALIA	746
6329	18- 4-1985	SOLARAM MS 10-56	BASF AGRITALIA	747
6330	18- 4-1985	SOLARAM MS 8-56	BASF AGRITALIA	748
6331	18- 4-1985	METABLOC	CIFO	749
6332	18- 4-1985	DECIS - mg	ROUSSEL-HOECHST-AGROVET	750
6333	24- 4-1985	METILAZ 25 P.B.	PAVONI	751
6334	24- 4-1985	FORATE PAVONI (GEOCID)	PAVONI	752
6335	24- 4-1985	PIRICAR	PAVONI	753
6336	24- 4-1985	FUNGICIDA ZR	PAVONI	754
6337	24- 4-1985	VITAPET P.B.	PAVONI	755
6338	24- 4-1985	ADIN	PAVONI	756
6339	24- 4-1985	FOSFORT	PAVONI	757
6340	24- 4-1985	LINURON 50	PAVONI	758
6341	24- 4-1985	ZINEB 80	PAVONI	759
6342	24- 4-1985	ZOLFO FLOWABLE	PAVONI	760
6343	24- 4-1985	OSSI - FLOWABLE	PAVONI	761
6344	24- 4-1985	GEOVAP	PAVONI	762
6345	24- 4-1985	DISEGRAN	PAVONI	763
6346	24- 4-1985	DIUR - 80	PAVONI	764
6347	24- 4-1985	CARB - 50	PAVONI	765
6348	24- 4-1985	AKARSTOP	PAVONI	766
6349	24- 4-1985	ESCALDEIDE	PAVONI	767
6350	16- 5-1985	GRAMINEX P.B.	TERRANALISI	768
6351	16- 5-1985	ERBIVORAX	ICI SOLPLANT	769
6352	16- 5-1985	IDRORAM PASTA	CAFFARO	770
6353	16- 5-1985	FERNASAN (TIPO 50)	ICI SOLPLANT	771
6354	6- 5-1985	LUMACARYL	SARIAF	772
6355	16- 5-1985	ISOFOS	TERRANALISI	773
6356	16- 5-1985	DAZAGRO	AGRONOVA	774
6357	16- 5-1985	SILBORD COMBI	SILIA	775
6358	16- 5-1985	AVENCARD	SIAPA	776
6359	16- 5-1985	SIAZINA PASTA	SIAPA	777
6360	23- 5-1985	FERNIDE	ICI SOLPLANT	778
6361	16- 5-1985	TOTERBA 50-7-10	AGROZOOFARMA	779
6362	16- 5-1985	SILBORD P.B.	SILIA	780
6363	16- 5-1985	MANEB 80	RAFFINERIE ALMAGIÀ S.p.A.	781
6364	16- 5-1985	GRANONET D.M.	SIPCAM	782
6365	16- 5-1985	FENTIN ACETATO ALMAGIÀ	RAFFINERIE ALMAGIÀ S.p.A.	783
6366	16- 5-1985	CAPTAN 50	RAFFINERIE ALMAGIÀ S.p.A.	784
6367	16- 5-1985	FONOFOS 5 AGRICO	AGRICO	785
6368	16- 5-1985	FOLPET 50	AGRICO	786
6369	6- 5-1985	BASTOP	BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE	787
6370	16- 5-1985	PERSICANE P.B. 50	J. & A. MARGESIN	788
6371	16- 5-1985	FUNGOKILL	ICI SOLPLANT	789
6372	16- 5-1985	MILGO COMBI	ICI SOLPLANT	790
6373	16- 5-1985	FUSACIDE	SIAPA	791
6374	6- 5-1985	EFFE ESSE	ANIC AGRICOLTURA	792
6375	6- 5-1985	PROTAL	RAVIT	793
6376	6- 5-1985	ANTISCHIUMA SCHAUM STOP	J. & A. MARGESIN	794
6377	6- 5-1985	R 6 ERRESEI SISTEM DAC 44-12 BLU	RAVIT	795
6378	6- 5-1985	RIZOLEX FIORI	SIAPA	796
6379	6- 5-1985	AVISO	BASF AGRITALIA	797
6380	6- 5-1985	ERBITOX T 95/G	SIAPA	798
6381	6- 5-1985	LUZIBEL	AMONN FITOCHIMICA	799
6382	6- 5-1985	SIMAZIN	TERRANALISI	800
6383	6- 5-1985	MONITOX	TERRANALISI	801
6384	6- 5-1985	ACARED	TERRANALISI	802

Numero e data registrazione		*Denominazione presidio sanitario*	*Impresa*	*Pagina*
6385	6- 5-1985	ZOLONE LIQUIDO 25	RAVIT	803
6386	6- 5-1985	TRAST	VISPLANT-CHIMIREN	804
6387	6- 5-1985	DISERMAIS AL	ICI SOLPLANT	805
6388	6- 5-1985	CORBEL TOP	BASF AGRITALIA	806
6389	6- 5-1985	DUECI RADICANTE IN POLVERE	DUECI	807
6390	6- 5-1985	DANITOL FIORI	SHELL ITALIA	808
6391	6- 5-1985	PROBEM M	ENOTRIA	809
6392	6- 5-1985	METOSIP COMBI	SIPCAM	810
6393	16- 5-1985	ANTISPORAL MICRONIZZATO	SIPCAM	811
6394	24- 4-1985	XEDAQUIN	XEDA INTERNATIONAL S.A.	812
6395	6- 5-1985	MANCONZIN RC	CAFFARO	813
6396	6- 5-1985	MANCOZIN R	CAFFARO	814
6397	6- 5-1985	POMETAL	RAVIT	815
6398	6- 5-1985	NACTRAN	RAVIT	816
6399	16- 5-1985	ZOLONE P.B. 25	RAVIT	817
6400	6- 5-1985	ANTIGERMOGLIO 85	VERCHIM ASTERIAS	818
6401	6- 5-1985	SIVEL 21 S	SILIA	819
6402	16- 5-1985	SILFOL P.B.	SILIA	820
6403	6- 5-1985	BORDOCRITT FB	SIAPA	821
6405	16- 5-1985	BAYFIDAN EC	BAYER ITALIA	822
6406	6- 5-1985	ENORIS M	ENOTRIA	823
6407	6- 5-1985	FENISTAR D	SIPCAM	824
6408	6- 5-1985	FENAMAN	SIPCAM	825
6409	6- 5-1985	GALBEN M 3-BLU	FARMOPLANT	826
6410	16- 5-1985	ARMONIL	J. & A. MARGESIN	827
6411	16- 5-1985	BAYTAN CONCIA CEREALI	BAYER ITALIA	828
6412	16- 5-1985	ZEPEX M	SIAPA	829
6413	16- 5-1985	DINOCAP AGRO	AGRONOVA	830
6414	16- 5-1985	FONOFOS - 5 ALMAGIÀ	RAFFINERIE ALMAGIÀ S.p.A.	831
6415	16- 5-1985	AZINFOS METILE ALMAGIÀ	RAFFINERIE ALMAGIÀ S.p.A.	832
6416	16- 5-1985	MANCOZ FA	CHEMIA	833
6417	6- 5-1985	DIPTEREX POLVERE	BAYER ITALIA	834
6418	6- 5-1985	ERBOTAN 5 G	CIBA GEIGY	835
6419	6- 5-1985	ERBOTAN 50 WP	CIBA GEIGY	836
6420	6- 5-1985	FRIGATE S D S	S D S - BIOTECH AGRICOLTURA	837
6421	16- 5-1985	DIGIL	RAVIT	838
6422	16- 5-1985	EDRIMET	SIAPA	839
6423	16- 5-1985	ETOSSICHINA	AGRICO	840
6424	23- 5-1985	MULTI - GOAL NC	ROHM AND HAAS ITALIA	841
6425	23- 5-1985	GOALAPON	ROHM AND HAAS ITALIA	842
6426	26- 5-1985	ETHREL MC	UNION CARBIDE ITALIA	843
6427	16- 5-1985	OXAMYL RAVIT VY DATE	RAVIT	844
6428	23- 5-1985	GOAL	ROHM AND HAAS ITALIA	845
6429	23- 5-1985	GOAL E	ROHM AND HAAS ITALIA	846
6430	23- 5-1985	MULTI GOAL	ROHM AND HAAS ITALIA	847
6431	29- 5-1985	GOAL GRANULARE	ROHM AND HAAS ITALIA	848
6432	23- 5-1985	SEPRAVAX P	SEPRAN	849
6433	23- 5-1985	MICRONOL	SIAPA	850
6434	29- 5-1985	PRODACAP 76	ROUSSEL HOECHST AGROVET	851
6435	29- 5-1985	DIFOLTANE 80	SARIAF	852
6436	23- 5-1985	TRATTASOL	VERCHIM ASTERIAS	853
6437	13- 6-1985	ETHREL	UION CARBIDE ITALIA	854
6438	13- 6-1985	BI-FEN	SARIAF	855
6439	13- 6-1985	ORTAL	SARIAF	856
6440	13- 6-1985	DACSAR	SARIAF	857
6441	13- 6-1985	BETASAR	SARIAF	858
6442	13- 6-1985	RISAN	SARIAF	859
6443	19- 6-1985	SWINGFOS 5 PM	SIAPA	860
6444	19- 6-1985	SWING 7 C	SIAPA	861
6445	13- 6-1985	FASTAC 10	SHELL ITALIA	862
6446	19- 6-1985	FLOREL 22	UNION CARBIDE ITALIA	863
6447	19- 6-1985	FLOREL 40	UNION CARBIDE ITALIA	864

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° gennaio 1985 - 30 giugno 1985 indicati nell'elenco n. 33 *(Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 204 del 3 settembre 1986).*

0040

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA

'AGRAL'

Bagnante adesivante tensioattivo additivo specifico per ogni trattamento agricolo

COMPOSIZIONE

Nonilfenolo condensato con 9 moli di ossido di etilene	g	12
Acqua	q.b.a g	100

CLASSE IV

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI SOLPLANT S.p.A. - Crespellano (Bologna)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0040 del 26-7-1971
'AGRAL' marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

IN AGRICOLTURA

Oltre a potenziare ogni soluzione acquosa grazie alla sua elevata tensioattività, è di giovamento in tutti i trattamenti antiparassitari, poichè il suo potere bagnante e adesivante preserva e p olunga l'azione dei composti.
Con 'AGRAL', quindi, si realizza una buona economia di antiparassitari e si conseguono migliori risultati.

Dosi: 30-50 g per 100 litri di acqua.

L'uso di 'AGRAL' con 'GRAMOX' R-10 e 'G.AMOXONE' è indispensabile per favorirne l'azione. Va aggiunto in ragione di g 800-1000 per ettolitro di soluzione.

Da non applicare con mezzi aerei

AVVERTENZE

Intervallo tra il trattamento e la raccolta: lo stesso dell'antiparassitario aggiunto.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

DA NON VENDERSI SFUSO g

0098

KERALON

Acaricida selettivo a lunga persistenza

COMPOSIZIONE

— Dicofol puro	g 42
— Solventi, emulsionanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE

Vomito diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini astenia intensa convulsioni

CONSIGLI TERAPEUTICI

Intossicazione acuta Lavanda gastrica abbondante Somministrazione di purganti salini (25 g di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questo insetticida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari

Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico

CONTROINDICATI la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, controindicate l'adrenalina e l'efedrina.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

KERALON è un acaricida emulsionabile che distrugge rapidamente e completamente gli Acari più dannosi alle colture frutticole, orticole ed industriali, specialmente quelli resistenti ai composti fosforganici ed agli altri acaricidi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

FRUTTICOLTURA

Melo - pero: 100-150 cc/hl

Durante l'estate per la lotta contro i Ragnetti rossi iniziare le applicazioni al primo apparire degli adulti (2-3 Ragnetti per foglia). Nel caso di forti attacchi e quindi con presenza di numerose uova, due trattamenti a distanza di 10-14 giorni saranno sufficienti a distruggere completamente anche gli adulti della schiusa successiva delle uova

AGRUMI: 100-150 cc/hl

Iniziare i trattamenti all'apparire degli Acari (Tetranychus citri). Contro l'Acaro rugginoso (Aculus) impiegare di preferenza prodotti a base di Zineb

VITE: 100-150 cc/hl

In primavera iniziare i trattamenti dopo il germogliamento quando compaiono i primi Acari svernanti. In estate intervenire all'inizio dell'infestazione dei Ragnetti gialli.

ORTAGGI VARI

Fagiolo, pisello, cetriolo, melone, cocomero, pomodoro: 60-120 cc/hl

Intervenire al primo apparire degli Acari. Non impiegare **KERALON** sulla melanzana: la coltura potrebbe essere danneggiata.

FRAGOLA: 100-125 cc/hl

Iniziare i trattamenti al primo apparire degli Acari e ripeterli se necessario 10-14 giorni dopo.

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI, in pieno campo: 120-125 cc/hl

Su rose, azalee, astri, ciclamini, crisantemi e varie altre piante ornamentali quando iniziano le infestazioni degli Acari.

Per ottenere i migliori risultati è necessario irrorare abbondantemente tutte le parti delle piante con **KERALON**, in modo da ottenere una perfetta copertura della vegetazione. Quando si devono trattare foglie difficilmente bagnabili, è consigliabile aggiungere un buon bagnante adesivo tipo BAGIR.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: KERALON è compatibile con tutti gli insetticidi ed anticrittogamici, fatta eccezione per i prodotti molto alcalini, le poltiglie solfocalciche, i polisolfuri. Occorre inoltre possibilmente evitare miscele con formulati a base di Dodina, con gli zolfi bagnabili e colloidali.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Si devono evitare le applicazioni sulla melanzana che potrebbe essere danneggiata.

RISCHI DI NOCIVITÀ: KERALON è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0098 del 2.12.1971

DA NON VENDERSI SFUSO VOLUME LITRI...

0118

N A B A M P.B. 90

Contro le alghe infestanti le risale

COMPOSIZIONE

– Nabam puro	g 92,35
– Disperdenti, bagnanti	q.b. a g 100

CLASSE II

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
– Conservare la confezione ben chiusa.
– Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
– Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
– Evitare di respirarne i vapori.
– Non operare contro vento.
– Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
– Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
– Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva.
– In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

– Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
– Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
– In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
– Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA: in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

CONTROINDICATI: alcool, olii, grassi.

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

NABAM P.B. 90 è un prodotto in polvere bagnabile al 90% di etilenbisditiocarbammato bisodico, di specifica azione contro le alghe verdi presenti in risaia: Vaucheria, Spirogyra, Hydrodiction, Cladophora. L'azione di **NABAM P.B. 90** è molto rapida; infatti a poche ore dal trattamento si manifesta la decolorazione delle alghe, che in seguito precipitano sul fondo della risaia, per poi sparire completamente.

EPOCHE, MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

NABAM P.B. 90 può essere applicato secondo tre diverse modalità:

– Trattamento al seme: mescolare il prodotto al seme, già inumidito ma non ancora pre-germinato, e procedere subito dopo alla semina: **1-2 kg/quintale di seme**

– Trattamento preventivo post-semina: è questa l'epoca migliore per la lotta alle alghe, 3-5 giorni dopo la semina, con le alghe nelle prime fasi di sviluppo, disporre in recipienti forati, all'imboccatura delle camere **1 kg/ha/giorno**

Ripetere il trattamento per 6-7 giorni, operando in modo che il deflusso dell'acqua sia modesto.

– Trattamento curativo, su alghe già formate: è questo un trattamento di emergenza da effettuarsi solo in casi eccezionali; abbassare il livello dell'acqua e distribuire uniformemente: **7-10 kg/ha**

A distanza di 1-2 giorni dal trattamento, che può anche effettuarsi "localizzato", ristabilire il livello normale dell'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione SILIA S.p.A.
Stabilimento di Aprilia - Latina

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0118 del 18/1/1973

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

0166

SARTION

CLASSE I

VELENO

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
Azinphos-metile puro 25 gr.
supporti, disperdenti e coadiuvanti q.b. a 100 gr.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Lavare con soda e interrare, dopo l'uso, le confezioni che contenevano il prodotto.
— In caso di malessere, ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il Medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego
Il SARTION è un insetticida particolarmente indicato in:
FRUTTICOLTURA:
— **melo**, contro: Baco delle mele e delle pere, Antonomo, Afidi, Cecidomia, Crisorrea, Cocciniglie, Minatrici delle foglie, Ricamatrici della frutta, Rinchite, Rodilegno;
— **pero**, contro: Baco delle mele e delle pere, Afidi, Cecidomia, Limacina, Cocciniglie, Fillobio ed altri Coleotteri, Ricamatrici della frutta, Rodilegno;
— **pesco**, contro: Afidi, Anarsia, Cocciniglie, Ricamatrici della frutta, Tignola orientale;
— **ciliegio**, contro: Cocciniglie, Falene;
— **mandorlo**, contro: Afidi, Anarsia, Cimbice, Cocciniglie, Monosteira.
VITICOLTURA, contro: Cicaline, Oziorrinchi, Tignole dell'uva, Tripidi, Zigena.
AGRUMICOLTURA, contro: Cocciniglie, Empoasca o Fetola, Mosca bianca fioccosa.
BIETICOLTURA, contro: Afidi, Altica, Atomaria, Cassida, Cleono, Mamestra, Punteruolo.
ORTICOLTURA:
— **patata e pomodoro**, contro: Dorifora;
— **cetriolo, cocomero, melone e zucchino**, contro: Nottua.
FLORICOLTURA in pieno campo, contro: Tentredini, Afidi, Tripidi, Minatrici delle foglie, Bega del garofano.
Il SARTION si usa alla dose di gr. 100-200 per 100 litri d'acqua.
Disperdere, in un quantitativo di acqua sufficientemente piccolo, la dose prescelta. Stemperare accuratamente, quindi, sotto forte agitazione, diluire fino al volume prestabilito.

Da non applicare con mezzi aerei.

Il SARTION è miscibile con moltissimi antiparassitari. E' tuttavia sconsigliabile miscelarlo con polisolfuri, poltiglia bordolese e prodotti basici in genere.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': In particolari condizioni climatiche, possono verificarsi sensibilità varietali.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, gli insetti utili, i pesci e le api, evitare quindi di trattare durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Reg. n.0166
del 31.1.85

ariaf S.p.A.
Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
VISPLANT CHIMIREN s.r.l.

0174

GEMAFOS 50

Insetticida liquido emulsionabile.

COMPOSIZIONE:

— PARATHION puro gr. 19,6
— Solventi ed emulsionanti q.b. a gr. 100
— Contiene Xilolo e Cicloesanone

VELENO

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente a personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255.

CLASSE TOSSICOLOGICA I

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione, o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
— conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— non contaminare altre colture, alimenti e bevade o corsi di acqua.
— evitare di respirarne i vapori.
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— rendere inutilizzabili, dopo l'uso, con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (mediante accurato interramento e dopo averli cosparsi di calce viva).
— in caso di malessere ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc., somministrato per iniezione endovenosa lenta
Non somministrare l'atropina, finchè è presente la cianosi, se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio
CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleno

S.C.A.M. s.r.l. MODENA
Officina di Produzione: S.C.A.M./Modena
Reg. Min. Sanità n. 0174 del 20-11-71

MODALITA' D'IMPIEGO: (dose per 100 litri di acqua).

POMACEE: in associazione con ALBENE per trattamenti al bruno contro uova di Afidi e forme svernanti di Microlepidotteri gr. 200-250, contro Antonomo del melo e pero, Afide verde o rosa del melo, Psilla del pero, Cecidonia delle pere, forme giovanili di Cocciniglie, Tentredine delle mele e pere, Tingide del pero, Carpocapsa del melo e pero e Rodilegno gr. 150-200.

VITICOLTURA: contro forme giovanili di cocciniglie, Tignola, Sigaraio, Erinosi, Oziorinco e Cicaline gr. 125-150.

DRUPACEE: contro afide brunastro del pesco, afide lanigero, tentredini delle susine, Cidia e Anarsia del pesco, mosca della frutta, stadi giovanili di cocciniglie gr. 150-200.

LIMONI: contro le neanidi di cocciniglie (cotonosa, cotonella, mezzograno di pepe, bianca, rossa, biancorossa, virgola) da metà luglio a settembre gr. 200-250, contro la formica nera ed argentina gr. 200-300 bagnando bene il tronco in primavera ed estate.

ARANCIO - MANDARINO - CLEMENTINO: contro il dialeurodide, afidi, neanidi di cocciniglie, formiche gr. 200-250.

OLIVICOLTURA: contro fleotripide, tignola, cocciniglia mezzo grano di pepe, fleotribo, rinchite gr. 200-250.

CAVOLI: contro la cavolaia e punteruolo del cavolo gr. 150-200.

PIOPPO: contro Stilpnozia, Crisomela, Saperda, Rodilegno gr. 300-500.

NOCCIOLO: contro Altica, Balanino, Cimicetta, Bostrico, Falena, gr. 200-250.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': è compatibile con tutti gli antiparassitari tranne quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': fitotossico per le cv. di mele: Rosa di Caldaro, Rosa Mantovana, Carla.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame, non contaminare corsi d'acqua, non immettere bestiame e pollame nel campo trattato prima di 20 giorni.

INTERVALLO AL CONSUMO: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Netto Kg.**

CONCIMI BIOCHIMICI
CONCIMI FOGLIARI
ANTIPARASSITARI

Stabilimento e uffici: S. MARIA DI MUGNANO - Tel. 30.91.31

0178

Insetticida - Fungicida - Diserbante liquido

COMPOSIZIONE:
— DNOC (dinitroortocresolo sale ammonico) puro gr. 50
— Diluenti ed emulsionanti q.b. a gr. 100

ATTENZIONE:
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE TOSSICOLOGICA 1ª

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— evitare di respirarne i vapori;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con gli occhi e la pelle;
— durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (trattare le stesse con soda caustica, interrarle in fosse profonde più di metri 1 cospargendole con calce viva);
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE: Sudorazione, sete, nausea, spossatezza, agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertemia, colorazione gialla delle sclere.
La morte consegue per edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.
INTOSSICAZIONE ACUTA: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%.
Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni all'esofago molto frequenti in caso di ingestione.
Combattere l'epetermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature di alcool, clisteri d'acqua fredda.
Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione.
Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale.
Ossigeno respirazione artificiale.
CONTROINDICAZIONI: Atropina.

S.C.A.M. s.r.l. MODENA
Officina di Produzione: S.C.A.M. s.r.l. - Modena
Reg. Ministero della Sanità n. 0178 dell'1-12-1971

MODALITA' D'IMPIEGO: (dose per 100 litri d'acqua)

— Frumento, avena, orzo, segale nei diserbi invernali, nel periodo che va dalla terza foglia sino alla fine dell'accestimento, alla dose di Kg. 6-8/Ha.

— Cipolla, aglio, porro, per diserbare queste colture occorre intervenire due volte: il primo tarttamento si effettua cinque giorni prima della fuoriuscita della plantola; il secondo trattamento si attua quando le cipolle si trovano nello stadio tra la seconda e la quarta foglia.
La dose d'impiego è di Kg. 4-8/Ha.

— Leguminose, il TRIFRISCAM è indicato per la distruzione della Cuscuta; in primavera dopo la fasciatura della zona infestata (con due metri di margine) trattare ogni 100 mq. con 30 litri di soluzione all'1%.

Il TRIFRISCAM è efficace contro numerose infestanti e particolarmente contro la Veronica, la Persicaria, il Crisantemo delle messi, la Camomilla selvatica, la Papaverina.

Oltre a queste malerbe resistenti al 2,4 D e MCPA, elimina anche il Papavero, la Veccia, il Chenopodio, la Senape, il Ranuncolo, la Fumaria.

Drupacee: 15 gg. dopo la caduta delle foglie 400 gr./hl. impiegando 30 hl. di soluzione ad Ha. contro Afidi, Anarsia, Cidia, Tripidi e Coccinigile.

Melo e pero: all'ingrossamento delle gemme gr. 400-600 Hl. impiegando 30 Hl. di soluzione ad Ha. contro Afidi, Psilla, Totricidi, uova di Ragno rosso, Cancro rameale e forme svernanti di Ticchiolatura.
Contro la Psilla pyri in primavera ed in estate gr. 60-80 Hl. trattando verso sera con 30 Hl. di soluzione.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': incompatibile con ogni formulazione anticrittogamica.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

EVENTUALI RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci, bestiame. Non immettere pollame e bestiame nel campo trattato prima di 30 gg.
E' velenoso per i pesci, evitare di contaminare i corsi d'acqua.

INTERVALLO AL CONSUMO: osservare un intervallo di 30 giorni dall'ultimo trattamento all'immissione al consumo.

INDICAZIONI DI IMPIEGO - ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti.

Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Netto Kg. 0

CONCIMI BIOCHIMICI
CONCIMI FOGLIARI
ANTIPARASSITARI

Stabilimento e uffici: S. MARIA DI MUGNANO - Tel. 30.91.31

0190

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 1 Karathane tecnico (purezza minima 78 %). Ingredienti inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON
PRUDENZA

POLVERE

FUNGICIDA AGRICOLO

* Marchio reg. ROHM & HAAS - U.S.A.

III Classe tossicologica

REG. N. 0190 MINISTERO SANITÀ DEL 2.12.1971

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

GENERALITÀ

Il **KARATHANE POLVERE** viene impiegato per combattere le diverse forme dell'Oidio. È stato sperimentato che possiede pure una certa azione nei riguardi di alcune specie di acari: quali ad esempio il Metatetranychus ulmi, il Tetranychus urticae, ecc. Per ottenere un controllo dell oidio e dei ragnetti rossi è necessario impiegare una quantità di prodotto da 20 a 35 kg. per ha. di coltura. Le dosi di impiego varieranno in funzione del tipo di coltura e dello stadio di sviluppo delle singole piante.
Effettuare una uniforme copertura col prodotto, polverizzando bene le foglie delle colture.

FIORI: Rose, Zinie, Crisantemi, Aster, Begonie, ecc. contro l'Oidio e gli Acari, sia in serra che in pieno campo. Effettuare su tutte le parti delle piante una uniforme copertura con la polvere. Iniziare i trattamenti al primo comparire della malattia, e ripeterli ad intervalli di 5-7 giorni o quando è necessario. Non impiegare il prodotto sulla rosa quando la temperatura supera i 32°C.

CUCURBITACEE: Cocomero, Cetriolo, Melone, Anguria, ecc. contro l'Oidio impiegare da 22 a 34 kg. per ha. di coltura. Iniziare le applicazioni al comparire della malattia e ripeterle ad intervalli di 7-10 giorni o più spesso. Lavare o sbucciare il raccolto prima del consumo.

VIVAI: Melo, Pero, Pesco, Ciliegio, Mandorlo, ecc. contro il Mal Bianco. Impiegare da 27 a 34 kg. per ha. di coltura. Iniziare le applicazioni al comparire della malattia e ripeterle ad intervalli di 7-10 giorni o quando è necessario.

VITE: contro l'Oidio. Iniziare i trattamenti al primo allungamento dei germogli e ripeterli in seguito con una cadenza di 10-14 giorni. Il **KARATHANE POLVERE** può essere applicato anche in fioritura.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è fitotossico alle dosi consigliate.
Non impiegarlo quando la temperatura ambiente è superiore al 32°.

NOCIVITÀ

Si consiglia tenere lontani dalle zone trattate, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto sulle cucurbitacee e 20 giorni prima sulle altre colture.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Cod. n.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

0191

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 1 Karathane tecnico (purezza minima 78 %). Ingredienti inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

KARATHANE* POLVERE

FUNGICIDA AGRICOLO

* Marchio reg. ROHM & HAAS - U.S.A.

III Classe tossicologica

REG. N. 0191 MINISTERO SANITÀ DEL 4.12.71

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

GENERALITÀ
Il **KARATHANE POLVERE** viene impiegato per combattere le diverse forme dell'Oidio. È stato sperimentato che possiede pure una certa azione nei riguardi di alcune specie di acari: quali ad esempio il Metatetranychus ulmi, il Tetranychus urticae, ecc. Per ottenere un controllo dell'oidio e dei ragnetti rossi è necessario impiegare una quantità di prodotto da 20 a 35 kg. per ha. di coltura. Le dosi di impiego varieranno in funzione del tipo di coltura e dello stadio di sviluppo delle singole piante.
Effettuare una uniforme copertura col prodotto, polverizzando bene le foglie delle colture.
FIORI: Rose, Zinie Crisantemi, Aster, Begonie, ecc. contro l'Oidio e gli Acari, sia in serra che in pieno campo. Effettuare su tutte le parti delle piante una uniforme copertura con la polvere. Iniziare i trattamenti al primo comparire della malattia, e ripeterli ad intervalli di 5-7 giorni o quando è necessario. Non impiegare il prodotto sulla rosa quando la temperatura supera i 32°C.
CUCURBITACEE: Cocomero, Cetriolo, Melone, Anguria, ecc. contro l'Oidio impiegare da 22 a 34 kg. per ha. di coltura. Iniziare le applicazioni al comparire della malattia e ripeterli ad intervalli di 7-10 giorni o più spesso. Lavare o sbucciare il raccolto prima del consumo.
VIVAI: Melo, Pero, Pesco, Ciliegio, Mandorlo, ecc. contro il Mal Bianco. Impiegare da kg. 27 a kg. 34 per ha. di coltura. Iniziare le applicazioni al comparire della malattia e ripeterli ad intervalli di 7-10 giorni o quando è necessario.
VITE: contro l'Oidio. Iniziare i trattamenti al primo allungamento dei germogli e ripeterli in seguito con una cadenza di 10-14 giorni. Il **KARATHANE POLVERE** può essere applicato anche in fioritura.
Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto non è fitotossico alle dosi consigliate.
Non impiegarlo quando la temperatura ambiente è superiore ai 32°.

NOCIVITÀ
Si consiglia tenere lontani dalle zone trattate, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto sulle cucurbitacee e 20 giorni prima sulle altre colture.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

0195

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

REDREX 35 PB

Acaricida agricolo ad attività residua anche nella stagione estiva.

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:

Gr. 35 di Kelthane puro (da prodotto tecnico - purezza minima 82%) pari a gr. 42,7 circa di prodotto tecnico.

Sostanze inerti, adesivanti e bagnanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
  Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
  Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
  Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

— Avvelenamento acuto per ingestione, inalazioni e contatto cutaneo.

— Sintomi d'intossicazione.

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

— Consigli Terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio). Per la liposulubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0.1 - 0.2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

— Controindicazioni

la morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, la efedrina, l'alcool.

ISTRUZIONI

Il REDREK 35 PB controlla vari acari che attaccano i fruttiferi e le colture agrarie in genere. Esso è dotato di potere abbattente ed effetto residuo.

Il REDREK 35 PB è un acaricida selettivo il quale rispetta la maggior parte dei predatori degli acari. Agisce contro ragnetti rossi, gialli, nonchè altri acari.

Trattare, bagnando accuratamente ed abbondantemente le piante quando appaiono i primi acari.

L'aggiunta di gr. 20-30 di Bagnante Adesivo Liquido 2 per ettolitro di poltiglia, aumentando la bagnabilità, potenzia l'azione del REDREK 35 PB stesso.

L'aggiunta di Bagnante Adesivo Liquido 2 è indispensabile dovendosi trattare piante o frutti ricchi di pruina o comunque difficilmente bagnabili.

Il REDREK 35 PB si può impiegare su tutte le colture: fruttifere, erbacee, ornamentali.

FRUTTIFERI: Per controllare gli acari, usare da 120 a 150 gr. di REDREK 35 PB per 100 litri di acqua.

VITE: Contro i ragnetti gialli e rossi, impiegare gr. 120-150 di REDREK 35 PB per 100 lt d'acqua, iniziando i trattamenti, se necessario, in primavera, quando i getti sono lunghi cm 2-5. In tale periodo avviene la fuoriuscita degli adulti. Nei trattamenti estivi, iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti sulle foglie.

FRAGOLE ED ORTAGGI VARI: Iniziare i trattamenti al primo comparire degli acari, impiegando gr. 120-150 di REDREX 35 PB per 100 litri d'acqua.

PIANTE ORNAMENTALI: Per il controllo degli acari sulle rose, azalee, astri, ciclamini, crisantemi e varie altre piante ornamentali, usare da 120 a 150 gr. di REDREK 35 PB per 100 litri d'acqua.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITA'

Il REDREK 35 PB è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.

Non è compatibile con i polisolfuri, la poltiglia bordolese ed altri materiali fortemente alcalini.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.

Non trattare su melanzana, tale coltura può essere danneggiata.

NOCIVITA'

Il prodotto non è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Peso netto Kg.

Reg. N. 0195 Ministero Sanità del 26.4.1973

0201

ZIRCAM PASTA

Anticrittogamico acuprico in emulsione

COMPOSIZIONE:

— ZIRAM puro		gr. 47,75
— Coadiuvanti e adesivanti	q.b. a	gr. 100

CLASSE TOSSICOLOGICA III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
- — conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- — conservare la confezione ben chiusa;
- — non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- — non contaminare alimenti, bevade o corsi d'acqua;
- — non operare contro vento;
- — evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- — dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acuqa e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

S.C.A.M. s.r.l. MODENA
Officina di Produzione: TERRANALISI s.n.c. in Renazzo di Cento (FE)
Reg. Ministero Sanità n. 0201 del 1-12-1971

MODALITA' D'IMPIEGO: (dose per 100 littri di acqua).

Lo ZIRCAM PASTA è un ditiocarbammato di zinco in pasta che presenta una elevata efficacia contro diverse crittogame.

FRUTTICOLTURA: indicato come fungicida per la lotta contro i parassiti del Pesco (Bolla e Corineo), del Ciliegio, dell'Albicocco e del Susino, gr. 400-600 per trattamenti autunno-invernali, gr. 200-300 per trattamenti primaverili-estivi.

Contro la Ticchiolatura del pero e del melo è indicato per le cultivar: Gentil Bianca, Spadone d'Estate, Butirra Estiva, Scipiona, Curato, Santa Maria, Precoce Morettini, Coscia, che sono sensibili allo Zineb gr. 200-300.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': il ZIRCAM PASTA non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri) e con oli minerali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': può arrecare danno alle seguenti cultivar di pesco: red-haven, cardinal, dixired; e di pero: cannellina, gentil bianca, gentilona, spadona d'estate.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni, è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO KG.**

0203

Polvere bagnabile al 50% di GS 14254
Erbicida selettivo contro le infestanti del medical

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
50 g di GS 14254 (purezza minima 90% pari a non meno di 45 g di 2-metossi-4-etilammino-6-sec.-butilammino-s-triazina e a non più di 5 g di triazine correlate biologicamente attive)
inerti e disperdenti q.b. a 100 g

Classe III

Attenzione:
manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., *ORIGGIO (VA)*

Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*
Registrazione Ministero della Sanità n. 0203 del 31.7.1971
® marchio registrato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di contaminazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità d'impiego
Ezitan controlla le malerbe annue da seme, sia dicotiledoni che graminacee, infestanti i medicai quali: Stellaria (Pavarina, Centocchio), Capsella, Veronica, Alopecurus. Sono invece resistenti le malerbe perennanti provenienti da organi di propagazione vegetativa (p.e. Romice, Artemisia).

Epoca di trattamento
I trattamenti vengono effettuati durante il periodo autunno-inverno, quando l'erba medica è già entrata in riposo e prima della ripresa vegetativa. I trattamenti non devono essere ripetuti prima di 7 mesi.

Dosi d'impiego: Kg 2-3 in 400-1000 litri di acqua per ettaro.

Avvertenze: risciacquare le irroratrici e i recipienti utilizzati, prima di destinarli ad altri trattamenti. Il prodotto non è infiammabile, nè corrosivo.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. « Avvertenza »: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità
In condizioni normali di ambiente e d'impiego e se utilizzato secondo le istruzioni, il prodotto non è fitotossico per l'erba medica.

Rischi di nocività
Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

0235

0235

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 90 di Dodina pura (da prodotto tecnico al 97-99 % di purezza). Sostanze inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CURITAN

ANTICRITTOGAMICO ORGANICO IN POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

III Classe tossicologica

REG. N. 0235 MINISTERO SANITÀ DEL 15.1.72

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **CURITAN** è un anticrittogamico organico dotato di efficacia contro la Ticchiolatura del melo e del pero.
Possiede non soltanto un'azione preventiva, ma anche un'azione curativa della malattia.
S'impiega altresì per la lotta contro crittogame che attaccano le colture di seguito descritte.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

IN FRUTTICOLTURA:
Contro la Ticchiolatura del melo, pero e nespolo:
— trattamenti preventivi: gr. 50-60 per hl. di acqua;
— trattamenti curativi (entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante): gr. 90 per hl. di acqua;
— trattamenti sradicanti (con macchie di Ticchiolatura già presenti): gr. 110 per hl. di acqua.
Contro la Cilindrosporiosi e l'Antracnosi del ciliegio, trattamenti preventivi a gr. 50 per hl. di acqua.

IN ORTICOLTURA:
Contro la Peronospora della cipolla:
— trattamenti preventivi: gr. 60 per hl. di acqua;
— trattamenti sradicanti: gr. 110 per hl. di acqua.
Contro la Botrytis della fragola, trattamenti preventivi a gr. 70-80 per hl. di acqua.

IN FLORICOLTURA:
Contro la Ticchiolatura della rosa:
— trattamenti preventivi: gr. 50-60 per hl. di acqua;
— trattamenti curativi: gr. 70-90 per hl. d'acqua.
Contro la Fusariosi del garofano:
— trattamenti preventivi: gr. 60-80 per hl. d'acqua;
— trattamenti curativi: gr. 110 per hl. d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Aggiungere alla dose occorrente di **CURITAN** poca acqua, agitando la miscela, fino ad ottenere una poltiglia omogenea.
Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

Il **CURITAN** non è compatibile con calce in genere e con sostanze a reazione alcalina.
La miscela con prodotti emulsionabili ed olii minerali è poco consigliabile, potendo risultare scarsa la sospendibilità dell'emulsione.
Il **CURITAN** pur essendo compatibile con la maggior parte degli antiparassitari della ns. gamma, è preferibile irrorarlo da solo poichè la diversa natura delle acque influisce sulla miscibilità del prodotto.
Qualora si voglia miscelarlo ad altri antiparassitari, si consiglia prima l'effettuazione di prove.

FITOTOSSICITÀ

Il **CURITAN** può causare, in certe condizioni, qualche rugginosità su mele Golden Delicious.

NOCIVITÀ

Si consiglia tenere lontani dalle zone trattate, animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

0257

0257

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 18,2 Kelthane puro (da prodotto tecnico purezza minima 82 %); gr. 9,1 Karathane puro (da prodotto tecnico purezza minima 78 %). Ingredienti inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ACARTHANE WP

Acaricida ad azione collaterale antioidica

III Classe tossicologica

REG. N. 0257 MINISTERO SANITÀ DEL 15.1.72

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

L'**ACARTHANE WP** è un acaricida efficace contro i più importanti acari delle colture frutticole ed agrarie. Esso ha una rapida azione, una lunga persistenza ed assicura un controllo degli acari, anche di ceppi resistenti ai composti fosfo-organici e ad altri acaricidi.

L'**ACARTHANE WP** è un ottimo rimedio per controllare all'inizio delle infestazioni le specie di acari quali il Metatetranychus ulmi (Koch) e il Tetranychus urticae. Dà altresì un prolungato controllo del Tetranychus telarius e delle specie estive simili. Un'accurata applicazione è efficace per diverse settimane e, sotto determinate condizioni, anche per qualche mese.

L'**ACARTHANE WP** esplica pure una collaterale azione antioidica.

L'**ACARTHANE WP**, essendo una polvere bagnabile, può essere impiegato anche quando le piante sono sensibili ai prodotti in emulsione e sui frutti che, come ad esempio quelli del melo Golden Delicious, arrugginiscono facilmente se trattati con antiparassitari in formulazione liquida.

Per ottenere i migliori risultati è necessario irrorare abbondantemente tutte le parti della pianta in modo da ottenere una perfetta copertura della vegetazione.

Nel caso si debba trattare foglie difficilmente bagnabili è consigliabile aggiungere un buon bagnante adesivo tipo Etaldyn.

FRUTTIFERI: All'inizio della stagione per controllare gli acari impiegare 200-300 gr di **ACARTHANE WP** per 100 litri d'acqua. In primavera effettuare il trattamento prima e dopo la fioritura alla schiusura della maggior parte delle uova invernali dei ragnetti rossi. Per controllare gli attacchi di ragnetti rossi durante l'estate iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti.

VITE: Contro i ragnetti gialli o rossi della vite impiegare 200 gr di **ACARTHANE WP** per 100 litri di acqua iniziando i trattamenti se necessario, in primavera quando i getti sono lunghi 2-5 cm. In tale periodo avviene la fuoriuscita degli adulti. Nei trattamenti estivi iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti sulle foglie.

FRAGOLA: Contro il Tetranychus telarius e simili nonchè contro lo Steneotarsonemus pallidus impiegare l'**ACARTHANE WP** alla dose di 200 gr per 100 litri di acqua.

Ripetere il trattamento ad intervalli di 10-20 giorni se necessario.

ORTAGGI VARI: Iniziare i trattamenti al primo comparire dei ragnetti rossi e gialli impiegando 150-200 gr di **ACARTHANE WP** per 100 litri d'acqua.

PIANTE ORNAMENTALI: Per il controllo degli acari delle rose, azalee, cactus, astri, crisantemi, ciclamini, dalie, gigli, gardenie, geranii, gladioli, edera, ortensie, petunie, oleandri, ecc. usare da 150 a 200 gr per 100 litri di acqua. Sulle piante sensibili usare la dose più bassa. Con forti attacchi si raccomanda di usare le dosi alte. Ripetere i trattamenti a seconda delle necessità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ

L'**ACARTHANE WP** è miscibile con diversi antiparassitari della nostra gamma, quali ad esempio Dithane M-45, M-555, Parafene, Metilon, Zitiol E e Naftil.

Tuttavia per ottenere i migliori risultati si consiglia di usarlo da solo con abbondante irrorazione.

FITOTOSSICITÀ

Non applicare l'**ACARTHANE WP** sulle melanzane: tale coltura può essere danneggiata.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per le api. Non trattare in fioritura.

Il prodotto può essere nocivo per gli animali domestici e per il bestiame.

Pertanto, si consiglia di tenere gli stessi lontani dalle zone trattate.

Sospendere i trattamenti sulle cucurbitacee 15 giorni prima del raccolto e 20 giorni prima sulle altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

0286

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

FUNGISAN 50

al 50% di Dicloran *

Fungicida organico per colture ortive e floreali.

POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Dicloran puro (purezza 90%) corrispondente a gr. 55,5 di tecnico.
Ingredienti quanto basta a 100.

* Brevetto Boots n. 600496

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il FUNGISAN 50 combatte, mediante trattamenti al terreno e alla coltura, tutte le forme di marciumi provocati da Botrytis o Sclerotinia su colture ortive, floreali, frutticole.
Ha dimostrato altresì una certa efficacia contro altre forme di marciumi pedali o radicali provocati da funghi del terreno, quali ad es. « mal del colletto del garofano » da Rizottonia.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

INSALATE, contro « marciumi del colletto » da Botrytis o Sclerotinia.

ORTAGGI (pomodori, melanzane, peperoni, agli, cipolle, basilico, carote) in serra o all'aperto, contro marciumi pedali o radicali.

Trattamenti al terreno (pre-semina o pre-trapianto): gr. 150-250 di FUNGISAN 50 sciolti in acqua e irrorati su mq. 100 di superficie. Dopo il trattamento, interrare a 1-2 cm. di profondità con un rastrello.

Trattamenti alla coltura (in semenza o a dimora): irrorare le piante al colletto con gr. 150-200 di FUNGISAN 50, sciolti in 100 litri di acqua. Effettuare 2-3 trattamenti, a seconda dell'andamento stagionale, a distanza di 2-3 settimane l'uno dall'altro.
Non trattare le piantine di insalata o altri ortaggi prima della comparsa delle prime due foglie vere (4 foglie totali) o prima che siano trascorsi almeno 14 giorni dal trapianto. Non trattare piantine appassite; non trattare in pieno sole o durante le ore calde della giornata.

AGLIO, contro Sclerozio: impolverare i bulbilli di semina con gr. 500 di FUNGISAN 50 per q.le di bulbilli.

PIANTE ORNAMENTALI (tulipani, giacinti, iris, ciclamini, begonie, rose, crisantemi) per prevenire attacchi da Botrytis o altre muffe.
Trattamenti alla coltura: 1 o 2 irrorazioni sulle foglie o al colletto delle piante, con FUNGISAN 50 alla dose di gr. 100-200 in 100 litri di acqua.

GLADIOLI, per controllare Botrytis o Sclerotinia.
Trattamenti al terreno: lungo il solco destinato a ricevere i bulbi, eseguire un trattamento, mediante irrorazione, con gr. 800 di FUNGISAN 50 sciolti in 100 litri di acqua. Usare 5 litri c.a. di tale soluzione per 20 metri di solco.

GAROFANI ED ALTRI FIORI, contro il « mal del colletto » da Rizottonia del garofano ed altri maciumi pedali di altri fiori.
Trattamenti al terreno: stesse dosi e modalità delle insalate.
Trattamenti alla coltura: stesse dosi e modalità delle insalate.
Effettuare più trattamenti, a seconda dell'andamento stagionale, a 4 settimane l'uno dall'altro.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ».

COMPATIBILITA'

Il FUNGISAN 50 è incompatibile con prodotti in formulazione oleosa o con il concime fogliare Azofol LB. E' compatibile con gli altri antiparassitari BPD. Si consiglia comunque di usarlo da solo.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il FUNGISAN 50 non deve essere irrorato su piantine ancora giovani quando la temperatura è molto elevata. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

NOCIVITA'

Il prodotto non è tossico per insetti utili, animali domestici, uccelli, pesci e bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. N. 0286 Ministero Sanità del 6.4.1973

Peso netto Kg.

0292

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

Acaricida ad azione collaterale antioidica

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 18,2 Kelthane puro (purezza minima 82%) pari a gr. 22,20 minimo di prodotto tecnico
Gr. 9,1 Karathane puro (purezza minima 78%) pari a gr. 11.67 minimo di prodotto tecnico
Solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed il caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

— *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

CARATTERISTICHE GENERALI

IL MINAR E è un prodotto efficace contro gli acari delle colture frutticole ed agrarie. Esso ha una rapida azione, una lunga persistenza ed assicura un controllo degli acari, anche di ceppi resistenti ai composti fosfo-organici e ad altri acaricidi.

IL MINAR E è un rimedio per controllare all'inizio delle infestazioni le specie di acari quali il Metatetranychus ulmi (Koch) e il Tetranychus orticae. Dà altresì un prolungato controllo del Tetranychus telarius e delle specie estive simili. Un'accurata applicazione è efficace per diverse settimane e, sotto determinate condizioni, anche per qualche mese.

IL MINAR E esplica pure una collaterale azione antioidica.

Per ottenere i migliori risultati è necessario irrorare abbondantemente tutte le parti della pianta in modo da ottenere una perfetta copertura della vegetazione.

Nel caso si debba trattare foglie difficilmente bagnabili è consigliabile aggiungere gr. 20-30 di Bagnante Adesivo Liquido 2.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

FRUTTIFERI: All'inizio della stagione per controllare gli acari impiegare 200-300 gr. di **MINAR E** per 100 litri d'acqua. In primavera effettuare il trattamento prima e dopo la fioritura alla schiusura della maggior parte delle uova invernali dei ragnetti rossi. Per controllare gli attacchi di ragnetti rossi durante l'estate iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti.

VITE. Contro i ragnetti gialli o rossi della vite impiegare 200 gr. di **MINAR E** per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti se necessario, in primavera quando i getti sono lunghi 2-5 cm. In tale periodo avviene la fuoriuscita degli adulti. Nei trattamenti estivi iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti sulle foglie.

FRAGOLA: Contro il Tetranychus telarius e simili nonchè contro lo Steneotarsonemus pallidus impiegare il **MINAR E** alla dose di 200 gr. per 100 litri d'acqua.

Ripetere il trattamento ad intervalli di 10-20 giorni se necessario.
ORTAGGI VARI: Iniziare i trattamenti al primo comparire dei ragnetti rossi e gialli impiegando 150-200 gr. di **MINAR E** per 100 litri d'acqua.

PIANTE ORNAMENTALI: Per il controllo degli acari delle rose, azalee, cactus astri crisantemi, ciclamini, dalie, gigli, gardenie, gerani, gladioli, edera, ortensie, petunie, oleandri usare da 150 a 200 gr. per 100 litri d'acqua. Sulle piante sensibili usare la dose più bassa. Con forti attacchi si raccomanda di usare le dosi alte

Ripetere i trattamenti a seconda delle necessità

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

IL MINAR E è miscibile con diversi antiparassitari della nostra gamma, quali ad esempio. Dithane M 45, Delfithex, Fitofos, Delfos M, Emmaton 50 e Tortrin.

Tuttavia per ottenere i migliori risultati si consiglia di usarlo da solo con abbondante irrorazione

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici »

FITOTOSSICITA'

Non applicare il **MINAR E** sulle melanzane: tale coltura può essere danneggiata.

NOCIVITA'

Il prodotto non è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 0292 Ministero Sanità del 24.1.1974

0299

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

R 6 - BLU POLVERE

Anticrittogamico cupro-organico per trattamenti polverulenti contro la peronospora

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 3 Rame metallico puro
(sottoforma di Ossicloruro tetramico)
Gr. 0,8 Zineb puro (da p.a. tecnico minimo 80%).
Sostanze coadiuvanti, coloranti ed inerti quanto basta a 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confeziono utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

a) in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 0299 Ministero Sanità del 4 - 12 - 1971
E/1

IMPIEGO E DOSI

Viticoltura: L'**R 6 BLU POLVERE** è indicato contro la Peronospora del grappolo e presenta un'azione frenante anche nei confronti della muffa grigia (Botrytis). Si impiegano Kg. 20-30 di prodotto ad ha. a seconda dello sviluppo della vegetazione.

Agricoltura: L'R 6 BLU POLVERE si utilizza ugualmente contro la Peronospora del pomodoro fino alla prima fioritura, nelle dosi di Kg. 20-30 per ettaro.

L'R 6 BLU POLVERE si sparge utilizzando i normali solforatori e l'eccezionale finezza lo rende particolarmente adesivo ed efficace.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Può essere mescolato agli zolfi per la lotta contemporanea contro l'oidio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

0326

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CUPROTHEX M-50

Antiperonosporico indicato nel periodo attorno alla fioritura della vite. Si impiega inoltre contro le malattie del pomodoro e del garofano di seguito indicate
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 Mancozeb puro
Coadiuvanti e coloranti q.b. a 100

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 0326 Ministero della Sanità del 20-11-1971

6/83

IMPIEGHI E DOSI

In Viticoltura: gr. 300-400/hl. contro Peronospora, come preventivo nel periodo attorno alla fioritura, contro Antracnosi e Marciume nero;

gr. 500/hl. contro Escoriosi. Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di « gemma mossa » (fase D Baggiolini) ed il secondo nella fase di « foglie formate » (fase E Baggiolini).

In Orticoltura: gr. 300-400/hl. contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi del pomodoro solo fino alla prima fioritura.

In Floricoltura (in pieno campo): gr. 250-300/hl. contro Ruggine del garofano.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua, indi versare nella irroratrice e portare a volume.

Dove è d'uso o si rende necessario il trattamento polverulento con o senza zolfi, si consiglia l'impiego di Kg. 4-4,5 di prodotto per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i nostri insetticidi, acaricidi e fungicidi e gli zolfi in polvere.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

0329

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

DESORMONE PESANTE

Diserbante selettivo a base di estere non volatile dell'acido 2,4-D per il diserbo del grano e la spollonatura del nocciolo.

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 32,6 di 2,4 D acido puro (da estere isottilico)
Sostanze emulsionanti quanto basta a 100.
Contiene Xilolo

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:

Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per la dermatosi.

Controindicazioni:

E' sconsigliata la digitale.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diserbo del grano: Il periodo utile per il trattamento è quello compreso fra la fine dell'accestimento e lo stadio che precede la formazione della botticella.

La dose da impiegare va da kg. 0,4 a kg. 1,5 per ettaro.

Le dosi più basse si impiegano quando le infestanti sono giovani ed in piena attività vegetativa, e le temperature sono più alte. Perché il prodotto manifesti la sua efficacia occorre che la temperatura sia almeno di 10-15° C.

La quantità di acqua da distribuire può variare, a seconda del tipo di irroratrice di cui si dispone. Se si opera con le comuni irroratrici a getto nebulizzato si possono distribuire in media 200 litri per ettaro.

Se si opera con apparecchi atomizzatori si può scendere fino ad un minimo di litri 50 per ettaro. Per la preparazione della emulsione basta versare la dose voluta di **DESORMONE PESANTE** in acqua e agitare.

Il **DESORMONE PESANTE** distrugge fiordaliso, capsella o borsa del pastore, cardo, ravanello, senape, veccia, papavero, farinaccio, convolvolo, ranuncolo, acetosella, pettine di venere. Per la sua rapidità di penetrazione il **DESORMONE PESANTE** mantiene la sua efficacia anche in caso di pioggia subito dopo il trattamento.

Spollonatura del nocciolo: Il **DESORMONE PESANTE** si può impiegare per la lotta chimica ai polloni erbacei dell'annata.

Impiegare kg. 0,800-1,000 di prodotto per 100 litri di acqua, localizzando scrupolosamente il getto sui polloni da distruggere, per evitare danni alla pianta madre. Effettuare il trattamento quando i polloni erbacei hanno emesso la 5ª foglia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Causa l'attività del **DESORMONE PESANTE** anche minime quantità di prodotto possono provocare danni alle colture sensibili vicine a quelle da trattare, come vite, leguminose, alberi da frutta e piante ortensi.

Conseguentemente: non trattare in prossimità di vigneti.

Qualora colture sensibili, come fruttiferi, leguminose, bietole, ortaggi si trovino in prossimità di cereali da trattare, osservare le seguenti norme:

1) trattare durante giornate senza vento e con temperatura dolce;

2) utilizzare un apparecchio distributore erogante almeno 200 litri per ettaro impiegandolo a debole pressione e con barre molto basse per evitare la formazione di particelle piccole che possono essere trasportate anche da deboli correnti d'aria nelle colture vicine le quali potrebbero restare danneggiate.

Non gettare i residui della soluzione in acqua che debba servire per la preparazione di poltiglie per trattamenti antiparassitari o per irrigazione.

Pulire accuratamente gli apparecchi e attrezzi usati per il trattamento, con soda al 5%. I recipienti di legno e quelli porosi sono difficilmente bonificabili e non più utilizzabili per la preparazione e distribuzione di insetticidi o anticrittogamici.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 0329 **Ministero della Sanità del** 23-10-1974

E/2

0334

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 85 Dalapon puro (da prodotto tecnico - purezza 87,6%). Sostanze disperdenti e coadiuvanti quanto basta a 100. 0334

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

DALAPON PB

Diserbante per la lotta alle graminacee infestanti.

POLVERE SOLUBILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

IV Classe tossicologica

REG. N. 0334 MINISTERO SANITÀ DEL 17.2.72

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **DALAPON PB** è un erbicida per la lotta alle infestanti graminacee, sia annuali che perennanti.

Il **DALAPON PB** esplica la sua efficacia attraverso le foglie delle infestanti con un'azione sistemica e non di contatto.
Una volta infatti entrato in circolo nelle piante, determina l'arresto dello sviluppo delle stesse che subiscono un progressivo e graduale ingiallimento delle foglie prima, e dello stelo poi.
L'erbicida colpisce anche l'apparato radicale, rizomi e stoloni che, oltre a cessare di svilupparsi, diventano necrotici e marciscono nel giro di 2-3 settimane.

MODALITÀ E EPOCHE D'IMPIEGO

Il diserbo deve essere effettuato in giornate soleggiate e quando le infestanti si trovano nel pieno della ripresa vegetativa (primavera-autunno) dopo le prime piogge.
Indispensabile per ottenere la migliore efficacia del trattamento è l'aggiunta, in tutte le applicazioni dell'Etaldyn.
Nell'eseguire il diserbo in colture di piante legnose (frutteti di pero e di melo, agrumeti), si consiglia di bagnare le infestanti evitando lo sgocciolamento della soluzione diserbante sul terreno.
Evitare inoltre di bagnare le foglie delle piante in coltura. La quantità di acqua pertanto non deve superare i 7-10 q.li per ha.

DOSI D'IMPIEGO

Il **DALAPON PB** è un erbicida per il controllo delle graminacee, ma esplica la sua azione anche verso altre infestanti. In particolare esso agisce contro Cynodon Dactylon (Gramigna), Agropyrum repens (Gramigna), Poa pratensis (Gramigna dei prati), Echinochloa crusgalli (Giavone), Digitaria Sanguinalis (Sanguinella), Lolium perenne (Loglierella), Lolium Italicum (Loglio italico), Avena Fatua (Avena selvatica), Setaria glauca (Pesarone), Setaria viridis (Falso Panico).
Le dosi d'impiego del **DALAPON PB** variano a seconda delle applicazioni, e precisamente:

Per il diserbo di piante da frutto: (frutteti di pero e di melo, vigneti, oliveti, agrumeti, ecc.).
La dose d'impiego è di kg. 5-8 sciolti in 7-8 q.li d'acqua per ettaro.
Le colture non devono avere meno di 5 anni di vita e bisogna evitare di colpire le parti verdi di esse. Se ne sconsiglia l'uso in terreni sabbiosi.

Per il diserbo di medicai e trifogliai: il diserbante s'impiega a dosi di kg. 4-5 per ettaro a partire dal secondo anno, prima della ripresa vegetativa o subito dopo gli sfalci estivi, con la stessa quantità di acqua su raccomandata.

NB. - In presenza di forti infestazioni, piuttosto che ricorrere all'impiego delle dosi alte, è consigliabile effettuare due trattamenti distanziati di 15-20 giorni a dosi dimezzate.

Per il diserbo Colza: contro Panico, Setaria, Coda di topo, ecc. usare il **DALAPON PB** alla dose di kg. 2-2,5/ha. in almeno 300 lt. d'acqua da quando la Colza ha un minimo di 2-3 foglie e fino al momento della levata.

Per la preparazione dei terreni: nella lotta contro le graminacee che infestano i terreni destinati alla semina di colture erbacee o all'impianto di frutteti usare il **DALAPON PB** alla dose di kg. 10-15/ha. in 600-800 lt. di acqua.

NB. - È indispensabile lavorare il terreno 1 mese dopo il trattamento. La semina e l'impianto dovranno essere effettuati dopo almeno 3 mesi dal trattamento

Per il diserbo nel settore Urbano-Industriale: (bordi stradali, aie, campi sportivi, aeroporti, sedi ferroviarie, piazzali e viali di Stabilimenti industriali), la dose può variare da kg 20-30/ha a seconda della natura delle infestanti e del grado di infestazione.

Per il diserbo canali, bacini idrici. Con un solo trattamento, in genere, si eliminano le infestanti monocotiledoni (Canna, Tifa, Giunco, ecc.) per più di un anno
In qualche caso sarà opportuno effettuare sui ricacci un secondo trattamento localizzato.
Le dosi di impiego del prodotto, varianti con il tipo di infestazione, oscillano fra i kg 25 e 35/ha, in 2.000-3.000 lt. di acqua.
Le dosi massime devono essere usate su malerbe di altezza superiore al m. 2, su vegetazione molto fitta e rigogliosa o contro Fragmites e Tifa.
Per la lotta contemporanea contro infestanti dicotiledoni si può effettuare il trattamento miscelando il **DALAPON PB** con Scirpex oppure Desormone 90.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

Il **DALAPON PB** è miscibile con altri diserbanti della nostra gamma.

FITOTOSSICITÀ

Il **DALAPON PB** non è volatile e, dato secondo le avvertenze riportate, non presenta pericolo per le colture vicine.

NOCIVITÀ

Si consiglia tenere lontani dalle zone trattate persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

AVVERTENZE

Cercare di effettuare il trattamento in giornate soleggiate e senza vento, al fine di non colpire le parti verdi delle piante utili.
Evitare il più possibile lo sgocciolamento della soluzione erbicida sul terreno.
Nel diserbo di piante da frutto cercare di limitarsi ad effettuare il trattamento sulle chiazze di infestanti graminacee da distruggere.
Lavare accuratamente con acqua e soda le pompe ed i recipienti usati per il diserbo prima di destinarli ad altri impieghi.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Cod. n.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

0338

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

REDRAN PB 25

Acaricida per la lotta contro le forme mobili di acari, compresi quelli resistenti ai fosfo-organici ed ai comuni acaricidi
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 25 CIEXATIN puro (purezza 95-96%) pari a gr. 26,31-26,04 di prodotto tecnico.
Conformulanti quanto basta a 100.

NATURA DEL RISCHIO: Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Nocivo per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

— **Sintomi d'intossicazione:**
Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi.

— **Consigli teraputici di massima e condizioni al caso**
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale. Terapia sintomatica.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 0338 **Ministero della Sanità del** 5.7.71

CARATTERISTICHE

Il **REDRAN P.B. 25** è un acaricida, caratterizzato da una struttura chimica di nuovo tipo, efficace per il controllo delle forme mobili degli acari che infestano le piante da frutto (melo e pero), i fiori (garofano, rosa non in serra), e le piante ornamentali.

Il **REDRAN P.B. 25** agisce per contatto sia contro gli acari sensibili sia contro quelli che si dimostrano resistenti ai prodotti fosfo-organici ed ai cloroderivati comunemente impiegati o come acaricidi specifici o come prodotti ad azione generica per la lotta contro i fitofagi.

Il prodotto ha una azione iniziale piuttosto lenta, ma in compenso il suo effetto residuo è molto lungo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **REDRAN P.B. 25** si impiega alle dosi di 80-120 gr. per hl. di acqua, usando la dose minore nel caso di lievi infestazioni e la dose massima quando la popolazione degli acari è molto numerosa; in ogni caso si dovrà aver cura di bagnare completamente le piante.

I trattamenti da effettuare sono normalmente due per stagione (soprattutto sulle piante da frutto come il melo ed il pero).

Il primo trattamento va eseguito alla prima comparsa degli acari sulle foglie (1-2 acari per foglia); il secondo trattamento va effettuato alla distanza di 2-4 settimane dal primo a seconda dell'intensità dell'attacco.

Solo in caso di precoce comparsa delle forme mobili o di forti infestazioni può rendersi necessario un terzo trattamento.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro), le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.

Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 grammi di bagnante adesivo Etaldyn.

Stemperare la dose di prodotto indicata in poca acqua e diluire poi la poltiglia così ottenuta fino ad ottenere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **REDRAN P.B. 25** è compatibile con la maggior parte dei prodotti usati in fitoiatria. Si raccomanda di effettuare la miscela con un solo preparato (fungicida o insetticida). E' invece sconsigliabile miscelarlo con i polisolfuri di calcio e di bario o con la poltiglia bordolese.

« **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Si consiglia tenere lontani dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

0347

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono: 75 gr. di sostanza adesivante e bagnante. Sostanze coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100

BAGNANTE ADESIVO BPD

Coadiuvante liquido non ionico per miscele anticrittogamiche, insetticide ed acaricide.

IV Classe Tossicologica

REG. N. 0347 MINISTERO SANITÀ DEL 29.9.72

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Con l'aggiunta del **BAGNANTE ADESIVO BPD** le miscele antiparassitarie rivestono di un sottilissimo velo liquido piante e parassiti, facendo ottenere risultati migliori e più duraturi nella lotta contro i parassiti, con minor consumo di prodotti e perciò con vantaggio economico.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il **BAGNANTE ADESIVO BPD** si adopera come additivo per miscele acquose di insetticidi, di acaricidi e di anticrittogamici, allo scopo di elevarne il potere « bagnante » e « adesivo ».
L'uso del **BAGNANTE ADESIVO BPD** è indispensabile allorchè si eseguono irrorazioni sulle piante (cavoli, garofani, uva) o contro insetti (afidi, cocciniglie) per natura difficilmente bagnabili, in quanto ricoperti o protetti da sostanze pruinose o cerose.

DOSI D'IMPIEGO

Gr. 100-150 per 100 lt. di miscela antiparassitaria (soluzioni, sospensioni, emulsioni insetticide, acaricide ed anticrittogamiche).

Per le poltiglie (bordolese, borgognona), elevare la dose a gr. 200 per ettolitro. Aggiungere il **BAGNANTE ADESIVO BPD** alla miscela preparata e solo al momento dell'impiego.
Per le sue caratteristiche, l'impiego del BAGNANTE ADESIVO BPD con mezzi aerei è legato all'antiparassitario con il quale viene unito.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con tutti gli antiparassitari della nostra gamma.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate, il prodotto non esercita effetti nocivi sulla vegetazione e non distrugge la pruina dei frutti.

NOCIVITA'

Per l'impiego che del **BAGNANTE ADESIVO BPD** si fa in unione agli antiparassitari, si consiglia tenere lontani dalle zone trattate persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Cod. n.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

0367

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 90 di DAC 2787 (tetracloroisoftalonitrile da prodotto tecnico - purezza 95-96 %); gr. 9 di Polivinilpirrolidone. Sostanze inerti quanto basta a 100.

DACOTHERM*

Fungicida organico per le colture ornamentali e ortive in serra.

POLVERE SECCA PER FUMIGAZIONI

* Marchio registrato dalla DIAMOND SHAMROCK CHEMICAL Co. - Cleveland - Ohio - U.S.A.

IV Classe Tossicologica

REG. N. 0367 MINISTERO SANITÀ DEL 9-3-1972

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZE

Non impiegare il **DACOTHERM** in serre con temperatura superiore ai 24 °C.
Conservare il prodotto nell'imballo originale chiuso, in luogo asciutto e fresco.
Tenere lontano dal fuoco.

CARATTERISTICHE

Il **DACOTHERM** è un anticrittogamico organico formulato sotto forma di polvere secca che, bruciando genera fumi fungicidi atti a combattere molte crittogame dannose alle colture ornamentali e ortive in serra.
Il **DACOTHERM** agisce in modo rapido ed efficace
Non lascia residui visibili sulla vegetazione delle piante trattate.

APPLICAZIONI

Il **DACOTHERM** si è dimostrato altamente efficace contro:
- Botrytis o muffa grigia delle piante ornamentali e delle colture ortive, quali pomodori, cetrioli, fave, fagioli, peperoni, lattuga.
- Sclerotinia dei pomodori, cetrioli, peperoni.
- Muffa delle foglie dei pomodori (Cladosporium Phitophtora).
- Oidio delle Cucurbitacee (zucchini, meloni, cetrioli) e delle piante ornamentali (rosa).

Per le applicazioni sulle **colture ornamentali e da fiore**, è raccomandato l'uso del **DACOTHERM:**

su foglie e fiori: Viola africana, Ageratum, Alyssum, Aphelandra, Azalea, Calceolaria, Celosia, Crysanthemum, Cineraria, Cyclamen, Dianthus, Easter Lily, Fuchsia, Geranium, Gloxinia, Hydrangea, Lantana, Calendula, Nasturtium, Primula, Rosa, Salvia, Scarlet Sage, Schizanthus, Snapdragon, St. Paullus, Verbena, Zinnia;

solo su foglie: Ajuga Hoya, Aster, Balsam, Begonia, Blue Fescue, Caladium, Garofano, Chinese Ming, Coleus, Delphinium, Impatiens, Lobelia, Palma, Petunia, Poinsettia, Parch Ivy, Vinca rosea.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le applicazioni di **DACOTHERM** vanno iniziate per tempo, all'inizio della coltura, per distruggere le spore dei funghi rimaste dai raccolti precedenti e proteggere, allo stesso tempo, le piante nuove.
I migliori risultati si ottengono sempre con applicazioni preventive.
Il momento migliore per effettuare le applicazioni con **DACOTHERM** è alla sera, quando la serra è stata chiusa per la notte.

Prima del trattamento:
- sospendere ogni irrigazione o umidificazione della serra;
- essere certi che tutte le parti delle piante siano asciutte;
- chiudere tutte le aperture, l'apparato di ventilazione;
- apporre segnali di pericolo e prendere provvedimenti onde evitare l'entrata di persone e animali nella serra.

DOSI: impiegare gr. 100 di **DACOTHERM** ogni 100 metri quadrati di superficie di serra, se la serra è di altezza superiore ai 3 metri.
Se la serra è di altezza inferiore ai 3 m., impiegare gr. 100 di **DACOTHERM** ogni 280-300 metri cubi di serra. Porre le confezioni di **DACOTHERM** nelle parti mediane della serra (nel passaggio centrale). Nel caso dell'impiego di più confezioni, la distanza alla quale esse devono essere poste non deve superare i 15 m.
Ad evitare l'insediamento di infezioni soprattutto da Botrytis sulle ferite da taglio provocato nella raccolta, intervenire entro 12 ore dalla raccolta stessa.
La polvere, accesa con un fiammifero di carta, inizia a bruciare e sviluppa vapori bianchi che si diffondono uniformemente per tutta la serra e si posano su tutte le diverse parti delle piante.
Dopo il trattamento la serra va lasciata chiusa per tutta la notte.
Se ciò non è possibile, lasciare la serra trattata chiusa e senza ricambio d'aria per tre ore.
Non entrare nella serra durante il periodo di chiusura dopo il trattamento.
Dopo il periodo di chiusura della serra, prima di rientrarvi, è consigliabile effettuare una ventilazione per due ore.
Si consiglia di effettuare un'applicazione di **DACOTHERM** ogni settimana.
In caso di intervento con infezione già iniziata effettuare i primi due trattamenti a 3 giorni di distanza l'uno dall'altro, poi proseguire con cadenza settimanale.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Alle dosi d'impiego consigliate, il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITÀ

Si consiglia tenere lontani dalle zone trattate persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Cod. n.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

0369

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

DACONIL 2787*

Fungicida organico per fruttiferi, vite, grandi colture, colture ortive, colture ornamentali.
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:

Gr. 75 di DAC 2787 puro (purezza 95-96%) pari a gr. 78,95-78,3 di prodotto tecnico.

Sostanze inerti quanto basta a 100.

* Marchio registrato dalla DIAMOND SHAMROCK CHEMICAL Co. - Cleveland - Ohio - U. S. A.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

« **Avvertenze:** Conservare il prodotto nell'imballo originale chiuso, in luogo asciutto e fresco.
Tenere lontano dal fuoco ».

CARATTERISTICHE

Il **DACONIL 2787** è un efficace fungicida organico a vasto campo di azione. alta resistenza al dilavamento ed attività residuale.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

FRUTTIFERI: contro Ticchiolatura e Oidio del pero, del melo e del pesco, alla dose di gr. 100-150 per ettolitro; contro Bolla, Corineum, Cancro dei rametti del pesco, alla dose di gr. 200-250 per ettolitro; contro Botrytis, Sclerotinia, Monilia dei fruttiferi alla dose di gr. 200 per ettolitro.

VITE: contro Peronospora, Botrytis, Oidio, alla dose di gr. 150-250 per ettolitro.

COLTURE ORTIVE: **Cavoli**, contro Peronospora e Alternaria Kg. 1,6-1,7 per ha.; **carote**, contro Alternaria e Cercospora Kg. 1,6-2,2 per ettaro; **cetrioli**, contro Antracnosi e Peronospora Kg. 1,6-2,2 per ettaro, contro Alternaria, Ticchiolatura, Oidio Kg. 2,2-3,3 per ettaro, contro Rizoctonia Kg. 3,3 per ettaro; **meloni**, contro Antracnosi e Peronospora Kg. 1,6-2,2 per ettaro, contro Alternaria, Cercospora, Ticchiolatura, Oidio Kg. 2,3-3,3 per ettaro; **sedano**, contro Septoria, Cercospora, Rizoctonia, Kg. 2,2-3,3 per ettaro.

POMODORO: contro Stemphilium, Alternaria, Peronospora Kg. 1,6-2,2 per ettaro; contro Antrocnosi Kg. 2,2-3,3 per ettaro; contro Septoria, Rizoctonia, Botrytis Kg. 3,3 per ettaro.

PATATA: contro Alternaria, Septoria, Botrytis Kg. 1,1-1,6 per ettaro.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora Kg. 1,6-2,2 per ettaro.

MAIS: contro Helmintosporium, Kg. 1,6-2,2 per ettaro.

ARACHIDI: contro Cercospora,, Ruggine, Kg. 1,6 per ettaro.

COLTURE ORNAMENTALI: contro Ruggini, Black spot della rosa, Botrytis: dose gr. 200 per hl. Contro Oidio. dose gr. 300 per hl.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Aggiungere al prodotto un volume doppio o triplo di acqua mescolando sino ad ottenere una pasta omogenea. Aggiungere acqua sino a rendere abbastanza fluida tale pasta versarla nel serbatoio dell'irroratrice e, continuando a mescolare, portare a volume.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **DACONIL 2787** è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi formulati in polvere bagnabile. Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide.
Non si consiglia l'impiego di bagnanti adesivanti

« **Avvertenze:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi consigliate non è fitotossico per le colture, ad eccezione che per varietà di melo del gruppo Golden e per alcune altre a buccia rossa sulle quali può produrre rugginosità.
Non trattare le colture floreali durante la fioritura; su quelle più delicate, eseguire saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione.

NOCIVITA'

Il prodotto è innocuo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 0369 Ministero Sanità del . 30.7.1975 .

0390

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MINAR P. B.

Acaricida ad azione collaterale antioidica

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 18,2 Kelthane puro (purezza minima 82%) pari a gr. 22,20 minimo di prodotto tecnico
Gr. 9,1 Karathane puro (purezza minima 78%) pari a gr. 11.67 minimo di prodotto tecnico
Solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed il caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

— *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

CARATTERISTICHE GENERALI

IL MINAR P.B. è un prodotto efficace contro gli acari delle colture frutticole ed agrarie. Esso ha una rapida azione, una lunga persistenza ed assicura un controllo degli acari, anche di ceppi resistenti ai composti fosfo-organici e ad altri acaricidi.

IL MINAR P.B. è un rimedio per controllare all'inizio delle infestazioni le specie di acari quali il Metatetranychus ulmi (Koch) e il Tetranychus orticae. Dà altresì un prolungato controllo del Tetranychus telarius e delle specie estive simili. Un'accurata applicazione è efficace per diverse settimane e, sotto determinate condizioni, anche per qualche mese.

IL MINAR P.B. esplica pure una collaterale azione antioidica.

IL MINAR P.B., essendo una polvere bagnabile, può essere impiegato anche quando le piante sono sensibili ai prodotti in emulsione e sui frutti che, come ad esempio quelli del melo Golden Delicious, arrugginiscono facilmente se trattati con antiparassitari in formulazione liquida.

Per ottenere i migliori risultati è necessario irrorare abbondantemente tutte le parti della pianta in modo da ottenere una perfetta copertura della vegetazione.

Nel caso si debba trattare foglie difficilmente bagnabili è consigliabile aggiungere gr. 20-30 di Bagnante Adesivo Liquido 2.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 0390 Ministero Sanità del . 28.2.1974 .

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

FRUTTIFERI: All'inizio della stagione per controllare gli acari impiegare 200-300 gr. di **MINAR P.B.** per 100 litri d'acqua. In primavera effettuare il trattamento prima e dopo la fioritura alla schiusura della maggior parte delle uova invernali dei ragnetti rossi. Per controllare gli attacchi di ragnetti rossi durante l'estate iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti.

VITE: Contro i ragnetti gialli o rossi della vite impiegare 200 gr. di **MINAR P.B.** per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti se necessario, in primavera quando i getti sono lunghi 2-5 cm. In tale periodo avviene la fuoriuscita degli adulti. Nei trattamenti estivi iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti sulle foglie.

FRAGOLA: Contro il Tetranychus telarius e simili nonchè contro lo Steneotarsonemus pallidus impiegare il **MINAR P.B.** alla dose di 200 gr. per 100 litri d'acqua.
Ripetere il trattamento ad intervalli di 10-20 giorni se necessario.

ORTAGGI VARI: Iniziare i trattamenti al primo comparire dei ragnetti rossi e gialli impiegando 150-200 gr. di **MINAR P.B.** per 100 litri d'acqua .

PIANTE ORNAMENTALI: Per il controllo degli acari delle rose, azalee, cactus astri, crisantemi, ciclamini, dalie, gigli, gardenie, gerani, gladioli, edera, ortensie, petunie, oleandri: usare da 150 a 200 gr. per 100 litri d'acqua. Sulle piante sensibili usare la dose più bassa. Con forti attacchi si raccomanda di usare le dosi alte.
Ripetere i trattamenti a seconda delle necessità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

IL MINAR P.B. è miscibile con diversi antiparassitari della nostra gamma, quali ad esempio: Dithane M 45, Delfithex, Fitofos, Delfos M, Emmaton 50 e Tortrin.
Tuttavia per ottenere i migliori risultati si consiglia di usarlo da solo con abbondante irrorazione.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Non applicare il **MINAR P.B.** sulle melanzane: tale coltura può essere danneggiata.

NOCIVITA'

Il prodotto non è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

0393

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MD/E

INSETTICIDA

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 Malathion puro (purezza 96-98%) pari a gr. 52,08-51,02 di prodotto tecnico.
Gr. 5 Dimetoato puro (purezza 95-96%) pari a gr. 5,26-5,21 di prodotto tecnico.
Solventi, bagnanti e disperdenti quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 0393 Ministero Sanità del . 7.5.1977. . . .

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

— **Sintomi d'intossicazione:**

Scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 per ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

— **Controindicazioni:**

Morfina, Vitamina B1, coramina, latte e grassi.

DOSI D'IMPIEGO

L'MD/E è un insetticida indicato per i seguenti impieghi:

In frutticoltura: contro afidi in genere, Tripidi, Oplocampe, Cydia, Carpocapsa gr. 200 per hl.

In viticoltura: contro Tignole gr. 200 per hl.

In floricoltura e orticoltura e su tutte le altre colture: contro Afidi, Tripidi, Cocciniglie gr. 200 per hl.

MODALITA' D'IMPIEGO

Aggiungere la dose occorrente di prodotto a qualche litro di acqua e, dopo aver agitato, versare l'emulsione ottenuta nella quantità di acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'MD/E è compatibile con tutti gli anticrittogamici e insetticidi della ns. gamma di produzione; non è compatibile con la Poltiglia Bordolese e solfocalcica e arseniati di calce e zinco.
L'aggiunta di Bagnante Adesivo L/2 è consigliabile per ottenere un effetto totale.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura. Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

0396

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

M 555 BLU

Fungicida organico per la prevenzione e la lotta contro la Peronospora della vite e malattie crittogamiche di seguito indicate, del pomodoro, del garofano e del pioppo

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 65 Zimb puro (da p.a. tecnico minimo 80%).
Sostanze coloranti, coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

a) in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 0396 Ministero Sanità del 17 - 2 - 1972

E/1

MODALITA' D'IMPIEGO

L'M 555 BLU è un fungicida efficace, di facile impiego, possiede elevate dosi di adesività, non macchia e non ustiona la vegetazione.

Versare il prodotto in poca acqua e mescolare accuratamente; indi aggiungere la quantità d'acqua necessaria tenendo la miscela costantemente agitata. L'aggiunta di Etaldyn (gr. 50/hl.) assicura una migliore distribuzione della miscela sulle piante.

Dosi: gr. 200-300 per 100 lt. d'acqua.

A queste dosi si possono controllare le malattie crittogamiche della vite, del pomodoro, del garofano e del pioppo quali:

Peronospora della vite; Peronospora, Alternariosi del pomodoro,fino alla prima fioritura; Ruggine del garofano.

Contro la Marssonina del pioppo impiegare kg. 5-5,5 per ettaro e per trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

L'M 555 BLU è miscibile con Sofril, Veravit e gli insetticidi della nostra gramma.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

0397

CLASSE III

MAISAR

Composizione:
100 gr. di prodotto contengono:
50 gr. di ATRAZINA pura
q. b. a 100 gr. di bagnanti e diluenti.

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche
In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Il MAISAR è selettivo per la coltura del mais ed esplica la sua azione sulla maggior parte delle infestanti annuali a foglia larga e stretta.
L'azione del MAISAR avviene per assorbimento radicale da parte dei semi delle infestanti in via di germinazione.
Al contrario, il prodotto eventualmente assorbito dal mais viene trasformato in metaboliti innocui per la pianta.
Le piante infestanti sono colpite dal MAISAR anche per contatto nella fase di germinello.
Il prodotto non interviene nei confronti del Panicum capillaris, della digitaria, delle setarie e delle infestanti perenni con apparato radicale profondo dotato di rizomi, stoloni, bulbi e bulbilli.

Modalità d'impiego
Preparare il terreno per la semina in modo tale che sia affinato, privo di zolle e possibilmente anche rullato.
Il MAISAR può essere distribuito nel periodo che va da subito dopo la semina alla nascita della coltura.
Si può intervenire anche dopo qualche giorno dalla nascita, purchè le infestanti non abbiano superato le primissime fasi di sviluppo.
Si può trattare un'intera superficie o anche effettuare interventi localizzati, trattando fasce larghe 25-30 cm., ricorrendo, in quest'ultimo caso, alle seminatrici-diserbatrici che consentono di effettuare l'opera di diserbo e di semina contemporaneamente.
La dose d'impiego è di 4 Kg/ettaro, diluiti in 400-500 litri d'acqua o più, a seconda del tipo di irroratrice.
In terreni leggeri e umidi, la dose può essere ridotta a 3 Kg/ettaro.
Trattare sempre preferibilmente terreni umidi. Eventualmente intervenire in mancanza di piogge, con irrigazioni superficiali.
Gli interventi meccanici effettuati dopo il trattamento devono essere sempre molto superficiali per evitare l'eccessivo interramento del prodotto.
Il prodotto viene disperso accuratamente prima in poca acqua e successivamente diluito, sotto agitazione, nella quantità totale di acqua necessaria.

Da non applicare con mezzi aerei.

Il prodotto è compatibile con AGRUMOL alla dose di 15 Kg. per ettaro, quando si debba intervenire su terreni torbosi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Si sconsiglia di effettuare trattamenti in terreni torbosi, di usare dosi superiori a quelle indicate che potrebbero, pur non danneggiando la coltura del mais, colpire colture successive, di rotazione.

Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione.

Nei terreni trattati non è possibile effettuare coltivazioni consociate per tutta la stagione.

Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive al mais occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per le altre colture (es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Il prodotto è dannoso per le api. Sospendere quindi i trattamenti durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti almeno 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S.p.A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
VISPLANT CHIMIREN s.r.l.
RENAZZO DI CENTO (FE) - Via Salvi n. 1

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0397 del 22-8-1972

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso kg**

0399

CLASSE I

SANDOMIT

VELENO

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI AZINPHOS-METILE

Composizione

gr. 25 di azinphos-metile (0,0-dimetil-S-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-(4H)-il metil ditiofosfato) puro (pari a gr. 28,1 di azinphos-metile tecnico all'89% di purezza minima)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— evitare di respirarne i vapori;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
— durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi;
— dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, bruciandole con l'avvertenza di stare sopra vento e di non respirarne il fumo; interrare le ceneri;
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

— **Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.**
— **Sintomi di intossicazione:**
Lacrimazione - miosi - scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - bradicardia - ipotensione - fibrillazioni muscolari - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti; 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina - teofillina - aminifillina - coramina - latte - olio e grassi.
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 0399 del 17.2.1972 del Ministero della Sanità

Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Afidi, Cicaline, Tortrici (Bega del garofano, Cacoecia, Eulia), Carpocapsapomonella, Cydia molesta, Psille, Microlepidotteri (Cemiostoma, Litocollete), Tentredini, Tignole, Tripidi, Cocciniglie, Dorifora delle patate, Altiche.	0,15 - 0,2% = gr. 150 - 200
Cleono delle bietole	0,2% = gr. 200 con un consumo per ettaro di litri 600-700 di poltiglia.

Modalità di impiego

Stemperare bene il SANDOMIT in poca acqua onde ottenere una poltiglia senza grumi e diluire sino alla concentrazione desiderata, sempre rimescolando.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il SANDOMIT è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ nonchè con la maggior parte degli antiparassitari di uso comune sulle colture per le quali è indicato lo stesso SANDOMIT; evitare di miscelarlo con prodotti fortemente alcalini, come poltiglia bordolese e polisolfuri.

Per la preparazione delle poltiglie miste aggiungere il SANDOMIT nella poltiglia prescelta già pronta all'uso dopo averlo sospeso a parte in poca acqua, mescolando il tutto a fondo.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Durante i trattamenti e per 20 giorni susseguenti gli stessi non introdurre il bestiame nelle colture irrorate con il prodotto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

0407

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi Fungicida cupro-organico con adiuvanti speciali ad azione biologica ottenuto con uno speciale procedimento « diretto » brevettato che ne accresce la efficacia e i pregi. Raccomandato per la difesa della vite, delle pomacee, del pomodoro e del garofano

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 37,5 Rame puro (da Ossicloruro tetraramico al 50% di Cu)
Gr. 15 Zineb puro (da p.a. tecnico minimo 80%)
Sostanze inerti quanto basta a 100

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

a) In caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 0407 Ministero Sanità del 7 - 9 - 1974

E/1

CARATTERISTICHE

A differenza dei cuprorganici classici, l'R 6 D è una associazione chimica di tutti i suoi costituenti. Questa associazione attuata ad una fase precisa della fabbricazione dell'ossicloruro e dello zineb (procedimento « diretto ») provoca una interazione che si traduce in:

- accresciuta efficacia;
- eccezionale persistenza.

Grazie al « complesso ad azione biologica » aumenta la ricchezza in clorofilla delle foglie, che restano attive sino a fine stagione.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

VITE
Contro Peronospora dose gr 300-350 per ettolitro
MELO E PERO
Contro Ticchiolatura dose gr. 200-400 per ettolitro, a seconda dell'epoca di applicazione: le dosi più alte nel periodo pre-fiorale
POMODORO fino alla prima fioritura
Contro Peronospora, Septoriosi, Alternariosi. dose gr 300-400 per ettolitro.
GAROFANO
Contro Ruggine dose gr. 400 per ettolitro

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare l'R 6 D in poca acqua sino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

L'R 6 D è miscibile con SOFRIL, KELTHANE, ZITIOL, PARAFENE, METILON, FOSFENE.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Su varietà di melo (Abbondanza « Belford » - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nei trattamenti anticchiolatura, sulle varietà di meli e di peri sopra citate, molto sensibili al rame, preferire l'impiego di prodotti acuprici quali DITHANE M 45, M 555, ZIRASAN.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

0413

Stanol® 30

Fungicida, in polvere bagnabile, specifico per la lotta contro la cercospora della barbabietola e il cancro della corteccia del pioppo.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
27 g di fentin acetato (stagno trifenilacetato) puro
q.b. a 100 g coformulanti

Attenzione!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato, munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I^A

VELENO

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0413 del 16.2.1972
® marchio registrato

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Durante la preparazione e l'impiego, usare tute, guanti, maschera ed occhiali protettivi.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio, interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni mediche
Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione
Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale - terapia sintomatica.

Indicazioni
Lo STANOL® 30 è un nuovo anticrittogamico specifico, che sostituisce vantaggiosamente i prodotti tradizionalmente usati per la lotta contro la cercospora della barbabietola, il cancro della corteccia, la ruggine del pioppo.
L'uso del prodotto migliora anche lo sviluppo dei vegetali trattati e determina per le barbabietole un aumento della produzione in quantità ed in tenore zuccherino.
Lo STANOL® 30 esplica anche una azione insetticida contro le larve degli agrotidi.

Dosi e modalità di impiego
Barbabietola
Contro la cercospora il prodotto si impiega alla dose di Kg 0,800-1,200 in 600 litri di acqua per ettaro, effettuando in genere 2-4 trattamenti distanziati fra di loro da un intervallo di tempo non superiore ai 20 giorni, in funzione anche dell'andamento climatico.
Il primo trattamento dovrebbe essere effettuato preventivamente o comunque alle prime manifestazioni della malattia.

Pioppo
Contro il cancro della corteccia il prodotto si usa alla concentrazione dello 0,2%, impiegando da 1000 a 3000 litri di poltiglia per ettaro, in funzione ovviamente dell'età e dell'altezza delle piante.
I trattamenti andranno iniziati in maggio e ripetuti almeno 3-4 volte ad intervalli di venti giorni tra di loro.
Si consiglia di iniziare le applicazioni sulle piante giovani (preferibilmente al primo anno di età), poichè quando la malattia è progredita, sarà più difficile riuscire a controllarla.
I trattamenti sul pioppo saranno contemporaneamente efficaci anche contro la ruggine.

Da non applicare con i mezzi aerei

Preparazione della miscela
Stemperare dapprima il prodotto in poca acqua e versare poi il tutto, agitando, nel quantitativo di acqua richiesto.

Compatibilità: Lo STANOL® 30 non è miscibile con i formulati oleosi.
« Avvertenza » - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ». Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg

0415

TMTD CIBA 50

Fungicida acuprico in polvere bagnabile.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
50 g di Thiram tecnico al 95 % di purezza
q.b. a 100 g coformulanti.

CLASSE III

Attenzione:
manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)
Officina di produzione: SILD, Aprilia (LT)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0415
del 15.2.72

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni mediche
Sostanza nociva per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione
Nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, rinorrea, broncospasmo, irrequietezza, prostrazione, irritazione nervosa seguita da astenia o paralisi, lacrimazione, dermatosi, congestione del viso quando il paziente ha bevuto alcool.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavanda gastrica - terapia sintomatica: ossigenoterapia, respirazione artificiale, antistaminici, soluzioni glucosate, endovena, vitamina C e complesso B.

Controindicazioni
Bevande alcooliche, grassi ed olii.

Caratteristiche
Il prodotto è indicato per la lotta contro malattie di origine fungina, quali: la ticchiolatura delle pomacee, la bolla delle drupacee, il marciume dei frutti, il corineo e la muffa grigia delle colture orticole e floreali e dell'uva da tavola.
L'azione del prodotto migliora inoltre il colore e l'aspetto della frutta.

Settori d'impiego e dosi (riferite a 100 litri di acqua)

Frutticoltura
Pomacee - ticchiolatura e mummificazione dei frutti: trattamenti prima della fioritura g 300; trattamenti dopo la fioritura g 250; trattamenti prima della raccolta g 300.
Drupacee - corineo, bolla, monilia e cancro dei rametti: trattamenti autunnali ed invernali g 500-700; trattamenti primaverili ed estivi g 200-300.
Vite - muffa grigia (botrytis) g 250-300.
Fragola - muffa grigia (botrytis) e vaiolatura g 250-300.

Orticoltura
Pomodoro - alternariosi, ticchiolature e septoriosi g 200-250.
Lattuga, cipolle ed aglio - muffa grigia (botrytis) g 300-600.
Fagiolo - antracnosi, ruggine, botrytis g 300-600.

Floricoltura
Rosa - peronospora, oidio e ruggine g 200-400.
Garofano - ruggine, occhio di pavone, fusariosi g 200-400.
Crisantemo, tulipano e ciclamino - oidio e botrytis g 200-400.
Tuberi e bulbi - prima della messa a dimora g 300-400.

Trattamenti alle sementi
Riso, mais, piselli, colza, cavoli, fagioli, meloni, lattuga: g 200-300 per quintale di seme.
Bietola da zucchero: g 600 per quintale di seme.
Tabacco - oidio g 300-400.

Semenzai e letti caldi
Disinfezione del terreno, mal della tela, g 300, impiegando 4 litri di miscela per mq.

Da non applicare con mezzi aerei

Preparazione della miscela e compatibilità
Stemperare dapprima il prodotto in poca acqua e versare poi il tutto, agitando, nel quantitativo di acqua richiesto.
Il TMTD 50 è miscibile con i più comuni insetticidi e con gli zolfi bagnabili e colloidali; bisognerà invece evitare le miscele con prodotti a base di rame e le applicazioni sulle piante ove vi siano residui di trattamenti eseguiti con formulati rameici.

Fitotossicità: Alle normali dosi d'impiego il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività: Impiegato secondo le modalità prescritte, il prodotto non è tossico.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti ad un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg** ¹

0439

0439

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 90 di ziram puro (da prodotto tecnico - purezza 95-96 %). Sostanze diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON
PRUDENZA

ZIRASAN 90 BLU

POLVERE BAGNABILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI

Anticrittogamico organico a base di Ziram per la lotta contro la bolla e gommosi del pesco e la Ticchiolatura delle pomacee.

III Classe tossicologica

REG. N. 0439 MINISTERO SANITÀ DEL 17.2.72

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle gli indumenti e gli occhi.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Lo **ZIRASAN 90 Blu** è un fungicida organico micronizzato al 90 % di Ziram, per la lotta contro la Bolla e la Vaiolatura (Coryneum) del pesco. È altresì efficace contro Fusicoccum e Ticchiolatura del pesco ed altre crittogame delle pomacee, delle piante ortive ed ornamentali.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

Contro Bolla e Coryneum del pesco e del mandorlo:
Per trattamenti autunno-invernali: gr. 300-400 in 100 lt. d'acqua.
Per trattamenti primaverili-estivi: gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua.
Sospendere i trattamenti su pesco nei periodi più caldi.
Contro Ticchiolatura del melo e del pero:
Per trattamenti pre-fiorali: gr. 200 in 100 lt. d'acqua.
Per trattamenti post-fiorali: gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua.
Contro crittogame diverse delle colture ortive ed ornamentali: gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua.

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere allo **ZIRASAN 90 Blu**, nella dose occorrente, poca acqua agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere poi il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Irrorare la soluzione così preparata sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.
Per le miscele con prodotti in emulsione si consiglia di preparare prima la soluzione normale di **ZIRASAN 90 Blu** e quindi aggiungere la dose occorrente del prodotto emulsionabile, agitando).
Per le Polveri Bagnabili si consiglia di miscelare prima i due prodotti a secco, preparando quindi la poltiglia acquosa, come illustrato nelle norme d'impiego.
Le eventuali miscele sono comunque da prepararsi al momento dell'impiego.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

Lo **ZIRASAN 90 Blu** non è compatibile con la poltiglia solfocalcica e la poltiglia bordolese.
Il prodotto è compatibile con il Sofril, Arseniato di Piombo,픞araravit, Parafene, Kelthane.

FITOTOSSICITÀ

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITÀ

Si consiglia tenere lontani dalle zone trattate persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Cod. n.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

0442

NABAM P.B. 80

Contro le alghe infestanti le risaie

COMPOSIZIONE

– Nabam puro . . . . g 80,8
– Diperdenti, bagnanti . . . . q.b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
– Conservare la confezione ben chiusa.
– Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
– Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
– Evitare di respirarne i vapori.
– Non operare contro vento.
– Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
– Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
– Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
– In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

– Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
– Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
– In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
– Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
TERAPIA: In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato in incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

NABAM P.B.80 è un prodotto in polvere bagnabile all'80% di etilenbisditiocarbammato di sodio, di specifica azione contro le alghe verdi presenti in risaia: Vaucheria, Spirogyra, Hydrodiction, Cladophora. L'azione di NABAM P.B. 80 è molto rapida; infatti a poche ore dal trattamento si manifesta la decolorazione delle alghe, che in seguito precipitano sul fondo della risaia, per poi sparire completamente.

EPOCHE, MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

NABAM P.B. 80 può essere applicato secondo tre diverse modalità:

– Trattamento al seme: mescolare il prodotto al seme, già inumidito ma non ancora pregerminato, e procedere subito dopo alla semina: 1-2 kg/quintale di seme.
– Trattamento preventivo post-semina: è questa l'epoca migliore per la lotta alle alghe; 3-5 giorni dopo la semina, con le alghe nelle prime fasi di sviluppo, disporre in recipienti forati, all'imboccatura delle camere: 1,2 kg/ha/giorno.
Ripetere il trattamento per 6-7 giorni, operando in modo che il deflusso dell'acqua sia modesto.
– Trattamento curativo, su alghe già formate: è questo un trattamento di emergenza da effettuarsi solo in casi eccezionali; abbassare il livello dell'acqua e distribuire uniformemente: 8-11 kg/ha.
A distanza di 1-2 giorni dal trattamento, che può effettuarsi anche "localizzato", ristabilire il livello normale dell'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO
Officina di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0442 del 19/3/77

DA NON VENDERSI SFUSO PESO Kg.

0449

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

MOCAP®

Nematocida insetticida granulare per il terreno destinato a colture floreali, ornamentali, ortaggi, tabacco, agrumi

® Marchio registrato RAVIT S.p.A.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 10 ETOPROFOS puro
Inerti q.b. a 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- — Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- — Conservare la confezione ben chiusa.
- — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- — Evitare di respirarne i vapori.
- — Non operare contro vento.
- — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- — Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti 0,2 - 1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 0449 Ministero della Sanità del 20-11-1971

E/2

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto possiede nematocida ed insetticida per contatto senza azione fumigante o sistemica e quindi va usato alle seguenti dosi per metro quadrato di superficie e secondo le seguenti indicazioni:

Terreno destinato a colture floreali ed ornamentali: distribuire prima dell'impianto della coltura una dose di 8-12 gr./mq. incorporandolo al terreno e facendo seguire unirrigazione dopo l'impianto delle colture.

Terreno destinato a ortaggi: impiegare una dose di 6-10 gr./mq. per impieghi su tutta la superficie riducendo proporzionalmente la dose per impieghi localizzati nel solco di trapianto. Solo per la lotta contro gli insetti del terreno si può usare una dose di 3-4 gr./mq. per trattamenti su tutta la superficie.

Incorporare sempre il prodotto al terreno almeno una settimana prima dell'impianto delle colture per applicazioni contro gli insetti del terreno. Per la lotta contro nematodi incorporare sino a 15 cm. di profondità; per la lotta solo contro insetti del terreno incorporare solo a 5-7,5 cm. di profondità. Far sempre seguire un'irrigazione all'impianto della coltura.

Tabacco: impiegare a striscie larghe 40-50 cm. usando una dose di 6 gr. per metro lineare di striscia oppure usare una dose di 10 gr./mq. per impiego su tutta la superficie, incorporando alla profondità di 15 cm. prima del trapianto e facendo seguire al trapianto un'irrigazione.

Agrumi: per la lotta contro i nematodi il prodotto si può usare alla dose di 20-30 gr./mq. di superficie incorporando a 15 cm. di profondità e facendo seguire un'irrigazione di 4-5 mm. di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non compatibile con sostanze alcaline. Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITA'

A causa del numero particolarmente elevato di varietà e specie floreali, ornamentali, aventi eventuale diversa sensibilità, si consiglia di effettuare una prova su limitata superficie, prima di passare ad applicazioni su larga scala.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, il bestiame.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

0458

I CLASSE TOSSICOLOGICA

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 27,8 di Metomil 90 ovvero (S-metil-N-(metilcarbamoil)-ossi)-Tioacetimidato (purezza 92%) pari a gr. 25,57 di prodotto puro.
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Insetticida a base di Metomil - Polvere bagnabile

* Marchio registrato dalla E. I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Natura del rischio

— Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.
— Nel caso che il prodotto raggiunga incidentalmente gli occhi, lavarli per 15 minuti con acqua abbondante. Recarsi dal medico.

INFORMAZIONI MEDICHE

— **Sintomi:** miosi, sudorazione profusa, debolezza, polso lento, nausea e vomito, tremori muscolari, visione confusa, crampi addominali e diarrea.

Trattamento:

— Nel caso di inalazione, trasportare il paziente in ambiente non contaminato; nel caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare prontamente la pelle e gli occhi contaminati con acqua abbondante;
— In caso di ingestione lavanda gastrica;
— All'apparire di segni locali o sistemici o di sintomi di avvelenamento colinesterasico somministrare atropina: **intossicazione leggera** 1,2-2 mg. per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento ad intervalli di 10-30 minuti fino a comparsa di fenomeni di atropinizzazione; **intossicazione severa:** 2-4 mg. per via intravenosa, ripetendo la somministrazione di 2 mg. ogni 3-10 minuti fino a scomparsa dei segni e dei sintomi;
— **Non somministrare 2-PAM: controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione;**
— Se necessario rimuovere le eccessive secrezioni e mantenere aperte le vie respiratorie;
— In caso di severa intossicazione pratica.e la respirazione artificiale o ossigenoterapia;
— Per alleviare le convulsioni, nel caso che interferiscano con la respirazione e non siano alleviate dall'atropina, somministrare sodio thiopental (soluzione, 2,5%) intravena.

Pronto soccorso:

— Se ingerito provocare il vomito con acqua salata calda (1 cucchiaio da tavola di sale in 1 bicchiere d'acqua), ripetendo fino a che il vomito non sia chiaro;
— Se inalato allontanare dall'ambiente contaminato, far coricare e riposare calmo;
— In caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare la pelle o gli occhi contaminati con abbondante quantità di acqua;
— Se il paziente mostra difficoltà respiratoria praticare immediatamente la respirazione artificiale;
— Somministrare 2 tavolette di atropina da 0,6 mg. per via orale o facendole sciogliere sotto la lingua, se sono disponibili. In seguito, ogni 10-15 minuti, somministrare una tavoletta di atropina fino a che la gola e la pelle siano asciutte;
— Se necessario somministrare altre tavolette per mantenere asciutta la gola e la pelle.

CARATTERISTICHE

Il **LANNATE 25** è un insetticida per il controllo di larve ed adulti di alcuni insetti che attaccano: fruttiferi, vite, colture industriali ed ortive.
Distribuire il prodotto con una quantità sufficiente di acqua per ottenere una uniforme e completa distribuzione sulle parti trattate.
Non applicare con attrezzature a basso volume.
In generale la dose d'impiego più bassa viene consigliata per gli intervalli più brevi fra un trattamento e quello successivo, viceversa la dose più alta si raccomanda per lunghi intervalli.
La migliore efficacia si ottiene con la tempestività del trattamento, colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Immettere acqua nel serbatoio della pompa pari ad un quarto-metà del volume necessario. Mettere in moto l'agitatore meccanico od idraulico (non usare agitatori ad aria). Aggiungere la quantità stabilita di **LANNATE 25** e, sempre con l'agitatore in moto, portare a volume. Continuare l'agitazione della miscela per alcuni minuti prima dell'inizio del trattamento e mantenerla nel corso dello stesso.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 0458 Ministero Sanità del . 30.7.71. . . . .

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Afidi: Applicare 150-180 gr. di **LANNATE 25** per 100 litri di acqua all'inizio della infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. Il **LANNATE 25** è efficace contro gli afidi di tutte le colture sottomenzionate includendo gli Afidi del tabacco, delle piante ornamentali, da fiore e delle Drupacee. Il **LANNATE 25** in particolare è molto efficace contro l'Afide verde del pesco (Myzus persicae) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici e contro l'Afide farinoso (Hyalopterus Amygdaly).

MELI E PERI
Minatori: contro larve alla dose di gr. 200 per 100 litri di acqua.

Lithocolletis Blancardella F. E.: per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare in primavera contro le larve di prima generazione. E' strettamente raccomandabile applicare il **LANNATE 25** a tempo opportuno, cioè quando il primo stadio delle larve è visibile sulle foglie come « macchia d'olio ».
Inoltre il controllo delle successive generazioni deve essere principalmente orientato contro le larve di primo stadio.

Leucoptera (cemiostoma)-Scitella zell.: è consigliabile applicare il **LANNATE 25** all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle « macchie circolari » sulle foglie ha un diametro inferiore a 5 mm.

DRUPACEE
Afidi: dose gr. 150-180 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione sulle foglie e ripeterlo in caso di reinfestazione.

Il **LANNATE 25** è efficace contro l'afide verde del pesco (Myzus Persicae) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici e contro l'Afide farinoso (Hyalopterus Amygdaly Blanch).

VITE
Tignole: (Lobesia Botrana Schiff e Clysia Ambiguella Hb). Applicare il **LANNATE 25** come curativo e preventivo alla dose di gr. 150-200 per 100 litri di acqua.
Intervenire con il trattamento in base allo stato vegetativo della pianta ed al grado di infestazione della stessa.
Un solo trattamento, eseguito al momento opportuno, può essere sufficiente per il controllo dell'insetto.

AGRUMI E OLIVO
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae): dose gr. 150-180 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento in estate durante la massima presenza di « neanidi ».

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Cleono: (Temnorrhinus mendicus). Dose gr. 180 per 100 litri di acqua. Usare non meno di Kg. 1,800 per ettaro di **LANNATE 25**.
Eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo una o due volte ad intervalli di 12-15 giorni.
Altica: (Chaetocnema tibialis). Dose gr. 160 per 100 litri di acqua quando l'insetto appare sulle foglie.

POMODORO - MELANZANA - PEPERONE E CUCURBITACEE
Nottue: Dose gr. 150 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento quando le prime larve dell'insetto appaiono sui frutti e ripeterlo a 5-7 giorni di intervallo, durante il periodo della infestazione.

CAVOLO E LATTUGA
Cavolaie: Dose gr. 150-200 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo con un intervallo di 5-7 giorni durante il periodo vegetativo.
E' consigliabile l'aggiunta di Bagnante Etaldyn.

FAGIOLO - PISELLO
Larve di Lepidotteri: Dose gr. 150-180 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione, ripeterlo in caso di reinfestazione.

GAROFANO: Bega (Tortrix pronubana): Dose gr. 150-200 per 100 litri di acqua. Trattare ogni 8-10 giorni contro le larve di prima generazione, iniziando i trattamenti alla schiusura delle uova deposte dai primi adulti dell'annata.

In tutte le colture: Esche contro Nottue.
Dose per ettaro: **LANNATE 25** Kg. 1 + Crusca Kg. 50 + Zucchero Kg. 1.

Mescolare a secco la crusca e lo zucchero, indi inumidire e, sempre mescolando, aggiungere il **LANNATE 25**.
Distribuire sul terreno a spaglio o a mucchietti (a 30-40 cm. l'uno dall'altro) l'esca così preparata. Si raccomanda di impiegare esche preparate al momento dell'uso e di tenere lontani dall'esca i bambini e gli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e gli animali selvatici.
Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni.

Il prodotto è anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 14 giorni prima del raccolto sulle insalate e 10 giorni prima su tutte le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

0503

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

BENLATE*

Fungicida a base di Benomyl
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Benomyl puro
Ingredienti inerti quanto basta a 100.

*Marchio registrato
E.I. du Pont de Nemours & Co.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE GENERALI

Il **BENLATE** è un fungicida sistematico dotato di azione preventiva, curativa ed eradicante contro malattie crittogamiche dei fruttiferi, della vita, del frumento e delle colture ornamentali. E' pure efficace per la difesa dalle malattie della frutta in genere.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite: Botrytis: usare gr. 60 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua. Iniziare i trattamenti subito prima della fioritura per le varietà sensibili alla Botrytis del peduncolo o in caso di andamento stagionale piovoso, oppure subito dopo la fioritura. Effettuare 5 o 6 trattamenti fino alla fase di avanzata maturazione.

Usare non meno di 1.500 lt. di acqua per ettaro, bagnando accuratamente i grappoli. Il **BENLATE** non ha effetti nocivi sulla fermentazione.

Oidio: usare gr. 60 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua. Iniziare i trattamenti nella fase di gemma mossa a 3-4 cm. e continuare per tutta la stagione secondo il normale calendario antioidico.

Melo e Pero: Ticchiolatura ed Oidio: usare gr. 45-60 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua ad intervalli fissi, iniziando all'apparizione dei mazzetti florali. Alla dose superiore il **BENLATE** svolge azione curativa ed eradicante contro la Ticchiolatura.

Usato in un calendario regolare il **BENLATE** esplica una qualche azione di contenimento del Ragno rosso.

Gloeosporium: usare gr. 60 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua in un unico trattamento pre-raccolta all'inizio di settembre.

Nel caso di varietà particolarmente sensibili, si consiglia di aumentare la dose a gr. 100 per 100 litri.

Pesche, Susine, Albicocche: Moniliosi, Ticchiolatura e Oidio: usare gr. 60 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua.

Trattare prima e dopo la fioritura. Ripetere se necessario prima della raccolta (questo trattamento è indicato soprattutto per prevenire le malattie da conservazione (Botrytis e Monilia) sulle pesche da industria). Per la Ticchiolatura e l'Oidio continuare i trattamenti secondo le condizioni atmosferiche.

Rose: Oidio e « Blak Spot »: usare gr. 60-80 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua.

Iniziare i trattamenti ai primi sintomi della malattia e ripeterli ogni 7-12 giorni.

Usare la dose più alta e l'intervallo più ravvicinato in caso di andamento stagionale sfavorevole.

Bulbi (Tulipani, Gladioli, Gigli, Fresie): Marciumi da fusarium, Botrytis, Penicillium, Sclerotinia: immergere i bulbi per la durata di 15-20 minuti in una soluzione di gr. 200 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua.

Garofano: Phialophora Cinerescens: effettuare un trattamento al terreno con gr. 0,5-1 di **BENLATE** in 10 lt. di acqua per mq. Ripetere le applicazioni ogni 15 giorni per la durata del ciclo vegetativo come trattamento preventivo.

In caso di infezione già in atto, effettuare al primo apparire della malattia, un trattamento al terreno con gr. 4 di **BENLATE** in 10 lt. di acqua per mq. facendolo seguire da trattamenti ogni 15 giorni con la dose di grammi 0,5-1 in 10 lt. di acqua per mq.

— **Fusarium: BENLATE** gr. 2 per metro quadrato con le stesse modalità applicative descritte per la **Phialophora.**

Crisantemo: - Botrytis e Septoria: **BENLATE** gr. 60/hl. effettuare trattamenti ogni 15 giorni sulla vegetazione.

— **Tracheomicosi** (Verticilliosi e Fusariosi): **BENLATE** gr. 2-3 per metro quadrato. Innaffiare il terreno 3 settimane dopo l'impianto effettuando 2-3 trattamenti alla cadenza di 10-15 giorni.

Frumento: Oidio, Mal del piede, Septoriosi, Fusariosi: Irrorare la coltura con **BENLATE** a gr. 400-500 per ettaro distribuiti con 5-8 ettolitri d'acqua intervenendo all'inizio della levata e all'apparizione della spiga.

Per aumentare la polivalenza d'azione, in particolare contro la Ruggine, si consiglia l'aggiunta di kg. 2 per ettaro di Maneb o di Mancozeb.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di **BENLATE** in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua, tenendo la miscela in costante agitazione.

Fatta eccezione per il Melo, si consiglia l'aggiunta di un bagnante per i trattamenti a piante di difficile bagnatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA:
L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

Il **BENLATE** è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi attualmente in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 60 gg. prima del raccolto per il frumento e 15 gg. prima per le altre colture.

ATTENZIONE

Non lasciare che il **BENLATE** diventi umido durante l'immagazzinamento; ciò può provocare alcune trasformazioni chimiche che riducono l'efficacia fungicida del prodotto. Tenere la confezione ben chiusa quando il prodotto non è impiegato.

Bruciare la confezione dopo l'uso.

Se il trattamento con **BENLATE**, effettuato secondo le istruzioni riportate in etichetta, non è efficace, può essere che ci si trovi in presenza di un ceppo di fungo resistente.

L'impiego immediato di altro fungicida adeguato è consigliabile.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 0503 Ministero della Sanità del 15 - 1 - 1972

E/2

0510

0510

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON
PRUDENZA

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 37,2 di Sale potassico dell'acido 2-(4-cloro-2 metifenoasi) propionico (Mecoprop) all'86 % di acido MCPP. Sostanze solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

III CLASSE TOSSICOLOGICA

Reg. n. 0510 Ministero Sanità del 29.2.72

SCIRPEX K

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Lo **SCIRPEX K** si utilizza per la lotta contro le erbe infestanti dei cereali (escluso il mais) e, particolarmente, del riso.
Può essere inoltre impiegato per trattamenti localizzati contro il romice infestante dei prati.
Lo **SCIRPEX K** si diluisce in acqua e, dopo agitazione, si distribuisce uniformemente sulla superficie da diserbare a mezzo di pompe irroratrici ad alto o medio volume, avendo cura, nell'eseguire la distribuzione, di evitare sovrapposizioni del trattamento.
Si sconsiglia l'uso di irroratrici a basso volume.
La quantità di acqua per ettaro non deve essere inferiore a litri 200-300.
Le dosi di **SCIRPEX K** variano in funzione dello sviluppo e delle specie di infestanti, dell'epoca del trattamento e della temperatura al momento del trattamento stesso.
Usare dosi alte contro infestanti resistenti o molto sviluppate; dosi basse con infestanti giovani e più sensibili.
Le infestanti sono più sensibili allo **SCIRPEX K** se colpite quando sono in attiva crescita **e la temperatura è attorno ai 15°C. E' questa la temperatura ideale per l'effettuazione del trattamento. Evitare di trattare con temperature più basse o troppo elevate.**
Evitare di trattare quando le temperature notturne sono troppo basse e quando si prevede una pioggia imminente.
Il trattamento perde gran parte della sua efficacia se sopravviene una pioggia entro 5-10 ore dal momento del trattamento stesso.

DISERBO DEL RISO: lo **SCIRPEX K** è consigliato per combattere lo Scirpus maritimus (cipollino), oltre alle altre infestanti più comuni della risaia quali l'Alisma plantago, lo Scirpus mucronatus.

Dosi d'impiego: da Kg. 4 a Kg. 6 per ettaro in funzione dello sviluppo del riso e delle infestanti da combattere.
Sul riso di semina il trattamento va effettuato possibilmente nel periodo in cui il riso ha 3-4 foglie sul culmo principale, e sempre prima dell'inizio dell'accestimento.
Trattamenti tardivi si possono effettuare dopo la fine dell'accestimento, ma comunque prima dell'inizio della fase di botticella, tuttavia si consiglia di preferire il trattamento precoce (3-4 foglie).

E' in ogni modo importante ricordare che lo **SCIRPEX K** non si deve impiegare durante la fase di accestimento del riso, nè durante la fase di botticella perchè il riso, in questi periodi, è particolarmente sensibile. Prima del trattamento il livello dell'acqua della risaia deve essere abbassato onde far emergere le erbe infestanti da colpire, senza però eseguire l'asciutta completa. Successivamente l'acqua va riportata al giusto livello 18-24 ore dopo l'esecuzione del trattamento.

DISERBO DEL GRANO: lo **SCIRPEX K** si può impiegare per la lotta contro numerose infestanti alla dose di Kg. 5-8 per ettaro.
Il trattamento si dovrà eseguire tra la fine della fase di « accestimento » e l'inizio della fase di « botticella » del grano.

DISERBO DEI PRATI: contro i vari tipi di romice infestante dei prati stabili lo **SCIRPEX K** si impiega alla dose di Kg. 1,5 per ettolitro di acqua, mediante un trattamento localizzato che consiste nel bagnare accuratamente tutte le foglie delle piante di romice.
Il trattamento va eseguito possibilmente in primavera, tuttavia si possono effettuare anche trattamenti durante la stagione dei tagli quando i romici hanno già un buon numero di foglie in attivo accrescimento.
E' importante che non vengano effettuate irrigazioni e concimazioni organiche liquide entro 10 giorni dal trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Numerose colture fra le quali fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi, sono sensibili all'azione dello **SCIRPEX K** che può danneggiarle per contatto diretto o indiretto, per cui si raccomanda di eseguire i trattamenti dirigendo scrupolosamente i getti soltanto sulle colture da diserbare che figurano in etichetta e in giornate senza vento.
Non utilizzare le attrezzature d'irrorazione impiegate per lo **SCIRPEX K** per eseguire altri trattamenti insetticidi o fungicidi o erbicidi.

NOCIVITÀ

Non contaminare con residui di **SCIRPEX K** corsi d'acqua in genere sia utilizzati per scopi irrigui o meno.
Si consiglia tenere lontani dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

Fra l'ultimo trattamento e la raccolta deve essere rispettato un intervallo di 20 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE Via Pio Foà 65 TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli 91 Tel 63 [illegible]
UFFICIO TECNICO NAZIONALE 40138 BOLOGNA
Via B Provaglia 3 - Tel 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ

Ravit

Peso netto Kg.

0511

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SCIRPEX MP

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 52,3 Estere cicloesilico tecnico di MCPP all'85% di estere (contenente il 72% di acido MCPP equivalente) pari a gr. 32 di acido.
Sostanze emulsionanti quanto basta a 100

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. N. 0511 Ministero Sanità del . 2.12.71 . . . . .

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agni animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Con contaminare alimenti e bevande o corsi dacqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

— **Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

— **Sintomi d'intossicazione:**
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - fibrillazione ventricolare - convulsioni - coma.

— **Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.**
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

— **Controindicazioni**
E' sconsigliata la digitale

MODALITA' D'IMPIEGO

Lo SCIRPEX MP si utilizza per la lotta contro le erbe infestanti dei cereali (escluso il mais) e del riso.
Può essere inoltre impiegato per trattamenti localizzati contro il romice infestante dei prati.
Lo SCIRPEX MP si diluisce in acqua e, dopo agitazione, si distribuisce uniformemente sulla superficie da diserbare a mezzo di pompe irroratrici ad alto o medio volume, avendo cura, nell'eseguire la distribuzione, di evitare sovrapposizioni del trattamento.
Si consiglia di trattare con irroratrici a bassa pressione, massimo 3-4 atmosfere.
La quantità di acqua per ettaro non deve essere inferiore a litri 200-300.
Le dosi di SCIRPEX MP variano in funzione dello sviluppo e delle specie di infestanti, dell'epoca del trattamento e della temperatura al momento del trattamento stesso.
Usare dosi alte contro infestanti resistenti o molto sviluppate; dosi basse con infestanti giovani e più sensibili.
Le infestanti sono più sensibili allo SCIRPEX MP se colpite quando sono in attiva crescita e la temperatura è attorno ai 15° C. . **E' questa la temperatura ideale per l'effettuazione del trattamento. Evitare di trattare con temperature più basse o troppo elevate.**
Evitare di trattare quando le temperature notturne sono troppo basse e quando si prevede una pioggia imminente.

Il trattamento perde gran parte della sua efficacia se sopravviene una pioggia entro 5-10 ore dal momento del trattamento stesso.

Diserbo del Riso:
Lo SCIRPEX è consigliato per combattere soprattutto lo Scirpus maritimus e lo Scirpus mucronatus.
Per la lotta contro l'Alisma plantago si consiglia di miscelarlo con il nostro Risonet STM.
Dosi d'impiego: da Kg. 4 a Kg. 6 per ettaro in funzione dello sviluppo del riso e delle infestanti da combattere.
Sul riso di semina il trattamento va effettuato nel periodo in cui il riso ha 3 o 4 foglie sul culmo principale.
Prima del trattamento il livello dell'acqua della risaia deve essere abbassato onde far emergere le erbe infestanti da colpire, senza però eseguire l'asciutta completa. Successivamente l'acqua va riportata al giusto livello 18-24 ore dopo l'esecuzione del trattamento.

DISERBO DEL GRANO: lo SCIRPEX MP si può impiegare per la lotta contro numerose infestanti alla dose di kg. 5-8 per ettaro.
Il trattamento si dovrà eseguire tra la fine della fase di « accestimento » e l'inizio della fase di « botticella » del grano.

DISERBO DEI PRATI: contro i vari tipi di romice infestante dei prati stabili lo SCIRPEX MP si impiega alla dose di Kg. 1,5 per ettolitro di acqua, mediante un trattamento localizzato che consiste nel bagnare accuratamente tutte le foglie delle piante di romice.
Il trattamento va eseguito possibilmente in primavera, tuttavia si possono effettuare anche trattamenti durante la stagione dei tagli quando i romici hanno già un buon numero di foglie in attivo accrescimento.
E' importante che non vengano effettuate irrigazioni e concimazioni organiche liquide entro 10 giorni dal trattamento.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con Risormone e Risonet STM.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e floreali in genere, per cui si raccomanda di eseguire i trattamenti dirigendo scrupolosamente i getti soltanto sulle colture da diserbare che figurano in etichetta ed in giornate senza vento
Non utilizzare le attrezzature d'irrorazione impiegate per lo SCIRPEX MP per eseguire altri trattamenti insetticidi o fungicidi o erbicidi.

NOCIVITA'

Alle dosi d'impiego indicate, il prodotto non è tossico per gli insetti utili e per i pesci.
Non contaminare con residui di SCIRPEX MP corsi d'acqua in genere sia utilizzati per scopi irrigui o meno.
Nel corso dei trattamenti si consiglia tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Fra l'ultimo trattamento e la raccolta deve essere rispettato un intervallo di 20 giorni.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

0513

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

HERBIDAL RISO MP

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 52,3 Estere cicloesilico tecnico di MCPP all'85% di estere (contenente il 72% di acido MCPP equivalente) pari a gr. 32 di acido.
Sostanze emulsionanti quanto basta a 100

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 0513 Ministero Sanità del . 2. 12. 1971 . . . .

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agni animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Con contaminare alimenti e bevande o corsi dacqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

— **Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

— **Sintomi d'intossicazione:**
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - fibrillazione ventricolare - convulsioni - coma.

— **Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.**
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

— **Controindicazioni**
E' sconsigliata la digitale

MODALITA' D'IMPIEGO

L'HERBIDAL RISO MP si utilizza per la lotta contro le erbe infestanti dei cereali (escluso il mais) e del riso.

Può essere inoltre impiegato per trattamenti localizzati contro il romice infestante dei prati.

L'HERBIDAL RISO MP si diluisce in acqua e, dopo agitazione, si distribuisce uniformemente sulla superficie da diserbare a mezzo di pompe irroratrici ad alto o medio volume, avendo cura, nell'eseguire la distribuzione, di evitare sovrapposizioni del trattamento.

Si consiglia di trattare con irroratrici a bassa pressione, massimo 3-4 atmosfere.

La quantità di acqua per ettaro non deve essere inferiore a litri 200-300.

Le dosi di HERBIDAL RISO MP variano in funzione dello sviluppo e delle specie di infestanti, dell'epoca del trattamento e della temperatura al momento del trattamento stesso.

Usare dosi alte contro infestanti resistenti o molto sviluppate; dosi basse con infestanti giovani e più sensibili.

Le infestanti sono più sensibili all'HERBIDAL RISO MP se colpite quando sono in attiva crescita **e la temperatura è attorno ai 15° C. . E' questa la temperatura ideale per l'effettuazione del trattamento. Evitare di trattare con temperature più basse o troppo elevate.**

Evitare di trattare quando le temperature notturne sono troppo basse e quando si prevede una pioggia imminente.

Il trattamento perde gran parte della sua efficacia se sopravviene una pioggia entro 5-10 ore dal momento del trattamento stesso.

Diserbo del Riso:
L'HERBIDAL RISO MP è consigliato per combattere soprattutto lo Scirpus maritimus e lo Scirpus mucronatus.

Per la lotta contro l'Alisma plantago si consiglia di miscelarlo con il nostro HERBIDAL RISO SUPER.

Dosi d'impiego: da Kg. 4 a Kg. 6 per ettaro in funzione dello sviluppo del riso e delle infestanti da combattere.

Sul riso di semina il trattamento va effettuato nel periodo in cui il riso ha 3-4 foglie sul culmo principale.

Prima del trattamento il livello dell'acqua della risaia deve essere abbassato onde far emergere le erbe infestanti da colpire, senza però eseguire l'asciutta completa. Successivamente l'acqua va riportata al giusto livello 18-24 ore dopo l'esecuzione del trattamento.

DISERBO DEL GRANO: l'HERBIDAL RISO MP si può impiegare per la lotta contro infestanti alla dose di Kg. 5-8 per ettaro.
Il trattamento si dovrà eseguire tra la fine della fase di « accestimento » e l'inizio della fase di « botticella » del grano.

DISERBO DEI PRATI: contro i vari tipi di romice infestante dei prati stabili l'HERBIDAL RISO MP si impiega alla dose di kg. 1,5 per ettolitro di acqua, mediante un trattamento localizzato che consiste nel bagnare accuratamente tutte le foglie delle piante di romice.

Il trattamento va eseguito possibilmente in primavera, tuttavia si possono effettuare anche trattamenti durante la stagione dei tagli quando i romici hanno già un buon numero di foglie in attivo accrescimento.

E' importante che non vengano effettuate irrigazioni e concimazioni organiche liquide entro 10 giorni dal trattamento.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con MERBIDAL E 30 e con HERBIDAL RISO SUPER.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e floreali in genere, per cui si raccomanda di eseguire i trattamenti dirigendo scrupolosamente i getti soltanto sulle colture da diserbare che figurano in etichetta ed in giornate senza vento.

Non utilizzare le attrezzature d'irrorazione impiegate per l'HERBIDAL RISO MP per eseguire altri trattamenti insetticidi o fungicidi o erbicidi.

NOCIVITA'

Alle dosi d'impiego indicate, il prodotto non è tossico per gli insetti utili e per i pesci.

Non contaminare con residui di HERBIDAL RISO MP corsi d'acqua in genere sia utilizzati per scopi irrigui o meno.

Nel corso dei trattamenti si consiglia tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Fra l'ultimo trattamento e la raccolta deve essere rispettato un intervallo di 20 giorni.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

0514

0514

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

L'**HERBIDAL RISO K** si utilizza per la lotta contro le erbe infestanti dei cereali (escluso il mais) e, particolarmente, del riso.
Può essere inoltre impiegato per trattamenti localizzati contro il romice infestante dei prati.
L'**HERBIDAL RISO K** si diluisce in acqua e, dopo agitazione, si distribuisce uniformemente sulla superficie da diserbare a mezzo di pompe irroratrici ad alto o medio volume, avendo cura, nell'eseguire la distribuzione, di evitare sovrapposizioni del trattamento.
Si sconsiglia l'uso di irroratrici a basso volume.
La quantità di acqua per ettaro non deve essere inferiore a litri 200-300.
Le dosi di **HERBIDAL RISO K** variano in funzione dello sviluppo e delle specie di infestanti, dell'epoca del trattamento e della temperatura al momento del trattamento stesso.
Usare dosi alte contro infestanti resistenti o molto sviluppate; dosi basse con infestanti giovani e più sensibili.
Le infestanti sono più sensibili all'**HERBIDAL RISO K** se colpite quando sono in attiva crescita **e la temperatura è attorno ai 15°C. E' questa la temperatura ideale per l'effettuazione del trattamento. Evitare di trattare con temperature più basse o troppo elevate.**
Evitare di trattare quando le temperature notturne sono troppo basse e quando si prevede una pioggia imminente.
Il trattamento perde gran parte della sua efficacia se sopravviene una pioggia entro 5-10 ore dal momento del trattamento stesso.

DISERBO DEL RISO: l'**HERBIDAL RISO K** è consigliato per combattere lo Scirpus maritimus (cipollino) oltre alle altre infestanti più comuni della risaia quali l'Alisma plantago, lo Scirpus mucronatus.
Dose d'impiego: da Kg. 4 a Kg. 6 per ettaro in funzione dello sviluppo del riso e delle infestanti da combattere.
Sul riso di semina il trattamento va effettuato possibilmente nel periodo in cui il riso ha 3-4 foglie sul culmo principale, e sempre prima dell'inizio dell'accestimento.
Trattamenti tardivi si possono effettuare dopo la fine dell'accestimento, ma comunque prima dell'inizio della fase di botticella; tuttavia si consiglia di preferire il trattamento precoce (3-4 foglie).
E' in ogni modo importante ricordare che l'**HERBIDAL RISO K** non si deve impiegare durante la fase di accestimento del riso, nè durante la fase di botticella perchè il riso, in questi periodi, è particolarmente sensibile.
Prima del trattamento il livello dell'acqua della risaia deve essere abbassato onde far emergere le erbe infestanti da colpire senza però eseguire l'asciutta completa. Successivamente l'acqua va riportata al giusto livello 18-24 ore dopo l'esecuziono del trattamento.

DISERBO DEL GRANO: l'**HERBIDAL RISO K** si può impiegare per la lotta contro infestanti alla dose di Kg. 5-8 per ettaro.
Il trattamento si dovrà eseguire tra la fine della fase di « accestimento » e l'inizio della fase di « botticella » del grano.

DISERBO DEI PRATI: contro i vari tipi di romice infestante dei prati stabili l'**HERBIDAL RISO K** si impiega alla dose di Kg. 1,5 per ettolitro di acqua, mediante un trattamento localizzato che consiste nel bagnare accuratamente tutte le foglie delle piante di romice.
Il trattamento va eseguito possibilmente in primavera, tuttavia si possono effettuare anche trattamenti durante la stagione dei tagli quando i romici hanno già un buon numero di foglie in attivo accrescimento.
E' importante che non vengano effettuate irrigazioni e concimazioni organiche liquide entro 10 giorni dal trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Numerose colture fra le quali fruttiferi, vite, pioppi, ortaggi, sono sensibili all'azione dell'**HERBIDAL RISO K** che può danneggiarle per contatto diretto o indiretto, per cui si raccomanda di eseguire i trattamenti dirigendo scrupolosamente i getti soltanto sulle colture da diserbare che figurano in etichetta e in giornate senza vento.
Non utilizzare le attrezzature d'irrorazione impiegate per l'**HERBIDAL RISO K** per eseguire altri trattamenti insetticidi o fungicidi o erbicidi.

NOCIVITÀ

Non contaminare con residui di **HERBIDAL RISO K** corsi d'acqua in genere sia utilizzati per scopi irrigui o meno.
Si consiglia tenere lontani dalle zone trattate animali domestici e bestiame.

Fra l'ultimo trattamento e la raccolta deve essere rispettato un intervallo di 20 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 37,2 di Sale potassico dell'acido 2-(4-cloro-2 metilfenossi) propionico (Mecoprop) all'88 % di acido MCPP. Sostanze solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

III CLASSE TOSSICOLOGICA

Reg. n. 0514 Minist. Sanità del 18.4.72

HERBIDAL RISO K

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

PESO NETTO KG.

0539

MICORAN

CLASSE III

FUNGICIDA CUPRORGANICO

Composizione gr 100 contengono: Folpet puro gr 18,6 - Rame Metallo gr 25 (sotto forma di ossicloruro) - Inerti e Diluenti q.b. a gr 100.

ATTENZIONE! Manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi di intossicazione. Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr 30 per litro di acqua) e digitale.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

IMPIEGO: Viticoltura: contro Peronospora e Botrite. - **Floricoltura:** contro Ticchiolatura e Botrite. - **Orticoltura:** Patata e Pomodoro contro Peronospora, Antracnosi e Alternaria.

DOSE D'IMPIEGO: gr 300 per hl. di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA! Sospendere i trattamenti su uve da vino almeno due settimane prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': In viticoltura sconsigliamo l'impiego del prodotto nei trattamenti a cavallo della fioritura.

NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per insetti utili e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

officina di produzione bimex s.p.a. — isola vicentina (vi)

Reg. N. 0539 del 29-02-1972 del Ministero Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

0554

Gesaprim® liquido

Erbicida selettivo per il mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
44,4 g Atrazina tecnica, purezza minima 97-98 %
pari a g 40,0 di atrazina e g 3 di triazine correlate biologicamente attive
q.b. a 100 g veicoli, disperdenti e bagnanti.

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

***Informazioni mediche:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)
Stabilimento di SILIA, Aprilia (LT)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0554 del 20-11-1971
® marchio depositato

CIBA–GEIGY

Modalità d'impiego
GESAPRIM Liquido combatte efficacemente le più dannose infestanti graminacee e dicotiledoni provenienti da seme a germinazione primaverile-estiva, fra cui principalmente i Giavoni, gli Amaranti, il Farinaccio, le Persicarie, le Poe, l'Ortica, l'Erba Porcellana, le Stellarie, la Borsa Pastore, l'Erba Morella, i Gerani, la Mercurella, le Veroniche, le Matricarie. Agisce per assorbimento fogliare e radicale sulle infestanti allo stadio di germinello e di plantula; le malerbe ad apparato radicale profondo, rizomatoso ed in genere perenni non risentono in misura determinante dell'azione del prodotto; in particolare risultano resistenti la Gramigna, il Convolvolo, il Sorgo selvatico, l'Artemisia, nonché il Panicum dicothomiflorum fra le infestanti annuali.

Dosi e tempi di applicazione - Kg 4-6/ha in 600-1000 litri di acqua.
Adottare il dosaggio più basso nei terreni sciolti e di medio impasto, il più alto nei terreni compatti e ricchi di sostanza organica.
Per preparare la miscela basterà versare la dose di prodotto stabilita nel quantitativo di acqua previsto, rimestando la sospensione acquosa ottenuta. Eseguire i trattamenti subito dopo la semina del mais od al massimo quando le malerbe hanno raggiunto uno sviluppo vegetativo di 4-6 cm.
Applicazioni più ritardate possono risultare meno efficaci.

AVVERTENZE
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture, (es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Applicare il GESAPRIM Liquido su terreni ben preparati, sminuzzati e possibilmente rullati dopo la semina. Curare l'uniformità della distribuzione, evitando di soffermarsi con gli ugelli aperti sulle capezzagne o in qualsiasi altra posizione del campo. Evitare anche sovrapposizioni nelle strisciate della macchina distributrice. Se dopo 4-5 giorni dal trattamento non piove a sufficienza è necessario intervenire con irrigazioni (possibilmente a pioggia). Evitare l'impiego di acque luride, sia per l'irrigazione che per la preparazione delle miscele. Durante il trattamento tenere la miscela in continua agitazione per evitare depositi nella botte della macchina distributrice. In terreni torbosi e comunque molto ricchi di humus, si esclude l'impiego del GESAPRIM Liquido in pre-emergenza e si consiglia il trattamento in post-emergenza alla dose per ettaro di kg 5 con aggiunta di kg 15 di olio bianco in 600-1000 litri di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego, e se impiegato secondo le predette istruzioni, il prodotto non è fitotossico.
Danni invece possono derivare ad alcune colture sensibili (quali bietola, tabacco, ecc.) che seguono il mais e soprattutto il mais tardivo di secondo raccolto.
Sono raccomandati in tal caso, trattamenti al mais localizzati sulle file e non in pieno campo.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg 5

LZMC

0557

Lasso®

Diserbante di pre-emergenza selettivo per mais al 46 % di Allaclor Erbicida Monsanto

Composizione
100 g di prodotto contengono:
46 g 2-cloro-2',6'-dietil-N-(metossimetil) acetanilide al 93,5 % di purezza
q.b. a g 100 emulsionanti e tensioattivi, solventi

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)
Registrazione Ministero Sanità n 0557 del 16.2.1972
● marchio registrato Monsanto Co. - St. Louis - Missouri U.S.A.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
conservare la confezione ben chiusa.
non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
non operare contro vento;
evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti;
dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali provenienti da semi, soprattutto Graminacee (Giavone, Poa) comprese Digitaria, Setaria, Panico americano (Panicum dichotomiflorum), Sorghetta da seme (Sorgum halepense), nonchè su alcune dicotiledoni (Amaranto, Capsella, Camomilla, Porcellana, Senape, Veronica); il prodotto è poco efficace su Stellaria, Ortica, Poligonacee, ed è inoltre inefficace sulle malerbe perennanti munite di rizomi, bulbi, bulbilli, stoloni (Gramigna, Convolvolo, Sorghetta e Stoppione, Artemisia). Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in via di germinazione.

Modalità d'impiego: Il diserbo si effettua su tutta la superficie del campo, oppure in forma localizzata a fasce larghe 20-25 cm lungo le file; in questo ultimo caso la dose d'impiego va rapportata all'effettiva superficie trattata.
— Preparare accuratamente il terreno affinchè non rimangano zolle e zollette;
— impiegare il prodotto subito dopo la semina o qualche giorno dopo, ma prima della nascita delle infestanti, di preferenza alla dose di lt 3 in associazione a Kg 2/ha di Gesaprim; il prodotto può essere anche usato da solo, dove predominano le graminacee resistenti all'Atrazina o nel mais di seconda raccolta, alle dosi di lt 6/ha, che possono essere ridotti a lt 5 nei terreni sciolti e aumentati a lt 7-8/ha nei terreni organici.
— diluire il prodotto in 4-5 o più ettolitri di acqua e distribuire la poltiglia uniformemente a mezzo delle comuni irroratrici a mano o meccaniche;
— perchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 8-10 mm, cada entro due settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad un'irrigazione a pioggia superficiale;
— le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento per rompere la crosta o per arieggiare il terreno, devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenente l'erbicida;
— i trattamenti non devono essere ripetuti prima di sette mesi.

Preparazione della poltiglia: Versare il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Precauzioni: Le coltivazioni di mais trattate con il prodotto non possono essere consociate ad altre colture.
Alle dosi normali di impiego non si hanno residui dannosi per le colture seminate, purchè dall'applicazione del diserbante alla semina delle altre colture, intercorrano 3-4 mesi e si proceda ad una buona aratura prima della semina.

Avvertenze: Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari

Fitotossicità: In condizioni normali di ambiente e d'impiego e se utilizzato secondo le istruzioni, il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività: Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Contenuto lt. 1
lt. 5

DA NON VENDERSI SFUSO

0559

KALIRAM

Ossicloruro tetraramico, in polvere bagnabile, per la lotta contro le crittogame sensibili al rame

Composizione
gr. 32 di rame metallo sotto forma di ossicloruro tetraramico, pari a gr. 64 di ossicloruro tetraramico al 50% di rame metallo
gr. 9,4 di solfato di potassio al 99%, equivalenti a gr. 5 di ossido di potassio
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Peronospora della vite, Peronospora della patata, Occhio di Pavone dell'olivo, Cercospora della barbabietola da zucchero, Alternarie, Antracnosi e Septorie in orto-floricoltura.	0,4-0,6% = gr. 400-600

Sulla vite il **KALIRAM** oltre combattere la Peronospora, ha azione contro la Muffa grigia (Botritys).

Modalità di impiego
Stemperare il quantitativo stabilito di **KALIRAM** in poca acqua, mescolando e portare al volume previsto.
Intervenire tutte le volte che la biologia dei parassiti e l'andamento stagionale lo impongono.
« Da non applicare con mezzi aerei »

Compatibilità
Il **KALIRAM** è miscibile con gli antiparassitari di produzione Sandoz (tranne EUFITANA ESTIVA) e in genere con tutti gli antiparassitari normalmente consigliati per le colture sulle quali viene utilizzato lo stesso **KALIRAM.**
Per la preparazione di poltiglie miste con OLIO BIANCO SANDOZ oppure con FLAVINA SANDOZ, è bene approntare prima l'emulsione dell'olio prescelto in molta acqua e poi aggiungere la poltiglia concentrata di **KALIRAM**, completando con acqua fino alla concentrazione prevista e mescolando energicamente. Per la preparazione di poltiglie miste con altri prodotti, non oleosi, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di **KALIRAM** già pronta per l'uso, agitando sempre a fondo.

Fitotossicità
Sulle colture indicate e seguendo le modalità consigliate il **KALIRAM** non è fitotossico, anzi conferisce una maggior vigoria alla vegetazione.

Rischi per la fauna utile
L'impiego del **KALIRAM** non comporta rischi per la fauna utile.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta
« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 0559 del 16-2-1972 Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

0566

Classe IV

FRAMED®

Erbicida residuale in polvere bagnabile che agisce per assorbimento radicale sulle infestanti annuali delle colture di asparago, rose, ribes, more, lamponi, dei vivai di essenze forestali e delle piante madri di vite americane nonché dei fossi e degli argini delle risaie

COMPOSIZIONE

Simazina pura	g 50
Coadiuvanti e supporti inerti q. b. a.	g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison
S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.**
Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità N. 0566 del 21-12-1971

- Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere i migliori risultati dall'applicazione del FRAMED occorre osservare le seguenti norme:
lavorare accuratamente il terreno riducendo al minimo la zollosità;
effettuare il trattamento su terreno nudo prima dell'emergenza delle infestanti. Il FRAMED infatti, agisce solo sui semi germinanti mentre non è attivo verso le malerbe già sviluppate e profondamente radicate e quelle provenienti da rizomi (Artemisia, Acetosella, Cipero, Convolvolo, Gramigna, Stopplone, Equiseto);
curare l'uniformità di distribuzione, evitando di lasciare zone non trattate e di ripassare sulle parti di terreno che già hanno fruito dell'intervento diserbante. Prima di applicare la sospensione erbicida è pertanto consigliabile effettuare una prova in bianco;
le dosi ad ettaro che verranno indicate vanno diluite in 400-1000 litri di acqua;
le asparagiaie, di almeno 3 anni di età si diserbano in primavera dopo la rincalzatura e prima dell'emergenza dei turrioni con 4 Kg di FRAMED per ettaro il trattamento può essere effettuato anche dopo la raccolta riducendo la dose a Kg 2;
i rosai, di almeno 3 anni di età si diserbano a primavera con FRAMED impiegando Kg 4 ad ettaro nei terreni di medio impasto e Kg 3 ad ettaro in quelli sciolti;
i vivai di piante madri di vite americane, il ribes, le more ed i lamponi di almeno 3 anni di età vengono diserbati a primavera prima del germogliamento della coltura con Kg 4 di FRAMED ad ettaro;
i vivai forestali di conifere e latifoglie esclusi il larice, il pioppo, la betulla, il frassino ed il tiglio nonché i semenzai in genere, si diserbano con FRAMED, dopo la crisi conseguente alle operazioni di trapianto, impiegando Kg 2 ad ettaro nei terreni sciolti, Kg 3 ad ettaro nei terreni di medio impasto e Kg 4 ad ettaro in quelli compatti o umiferi;
i fossi e i canali di scolo e di irrigazione si diserbano a fine inverno, nella fase di asciutta, prima dello sviluppo delle infestanti distribuendo sul fondo 1 Kg di FRAMED ogni 1000 metri quadri diluito in 50-100 litri di acqua. Dopo l'applicazione i fossi devono rimanere asciutti per almeno una settimana: trascorso tale periodo non vi è alcun rischio di dilavamento del prodotto;
gli argini delle risaie di nuova formazione si diserbano prima della nascita delle malerbe con grammi 200-300 di FRAMED, diluiti in 100 litri di acqua, ogni 1000 metri lineari di argine avente una larghezza di 50 cm. Per larghezze diverse, regolarsi in proporzione. Non contaminare le camere con la sospensione erbicida al fine di evitare danni al riso.
Una pioggia od una irrigazione che seguano il trattamento erbicida esaltano la sua azione.

Preparazione della sospensione

Stemperare a parte la dose stabilita di prodotto in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea e versare poi questa nella quantità di acqua richiesta sino a raggiungere la diluizione voluta, rimescolando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenze

Da usare su colture specializzate.
Il trattamento con FRAMED è assolutamente sconsigliato per i terreni torbosi.

Compatibilità

Il FRAMED è miscibile con l'Atred.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Per evitare fenomeni di fitotossicità nei vivai forestali e nei roseti, il trattamento diserbante dovrà essere preceduto da saggi preliminari su superficie ristretta per accertare il grado di tolleranza delle diverse varietà.
Evitare il contatto dell'erbicida con colture diverse da quelle previste per il suo impiego ed in particolare impedire che si verifichi scorrimento del liquido o il suo trasporto verso terreni contigui diversamente coltivati.
Lavare accuratamente le irroratrici ed i recipienti utilizzati prima di destinarli ad altri trattamenti antiparassitari. Ove possibile si destini una pompa esclusivamente per la distribuzione dell'erbicida.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: kg 5

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

0577

Natura del rischio: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE *Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale, o per assorbimento attraverso la pelle.*

Sintomi d'intossicazione:

Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psico motoria - tachicardia - dispnea - notevole ipertermia - colorazione gialla delle sclere - la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1 % od iposolfito di sodio al 5 %. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestioni. *Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda - trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5 % o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collassi od ipotensioni. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale - ossigeno, respirazione artificiale. E' controindicata l'atropina.*

AVVERTENZE

L'ERBOGIL non è caustico e non attacca metalli, gomma, legno, ma macchia fortemente i tessuti per cui è consigliabile usare indumenti idonei durante i trattamenti.

CARATTERISTICHE

Efficace anche contro le erbe infestanti annuali resistenti al 2,4 D ed all'MCPA. In considerazione di ciò se ne consiglia l'impiego dopo qualche anno di diserbo effettuato con questi ultimi prodotti.

Può essere impiegato sulle varietà di frumento, orzo, avena, segale, ed in vicinanza di colture sensibili agli altri erbicidi.

La formula crema permette una diluizione istantanea. Alcuni giorni sono sufficienti per ottenere la distruzione delle erbe infestanti.

L'ERBOGIL distrugge specialmente:

camomilla selvatica, paverina o stellaria, poligono persicaria ed aviculare, capsella borsa del pastore, chenopodio, papavero, **veccia, crisantemo delle messi, ravanello,** senape, veronica, ranuncolo (le erbe infestanti il cui nome è evidenziato non sono distruggibili con gli erbicidi ormonici ma lo sono con Erbogil).

VELENO

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 50 Dinitrocresolato d'ammonio (da prodotto tecnico - purezza 98.5 %). Sostanze solubilizzanti e diluenti quanto basta a 100.

I CLASSE TOSSICOLOGICA

Reg. n. 0577 Ministero Sanità del 29.9.72

ERBOGIL

DISERBANTE SELETTIVO

Prodotto originale della PECHINEY-PROGIL

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Peso netto Kg.

EPOCA D'IMPIEGO SUI CEREALI

Trattare sempre molto presto: a partire da quando la piantina del cereale presenta 2 o 3 foglie e fino alla fine dell'accestimento, allorquando le erbe infestanti sono giovani. Per i cereali d'inverno le epoche migliori sono in novembre e inizio di dicembre, oppure nei primi giorni belli di fine inverno.

Nota: Per i cereali consociati ad una leguminosa trattare 15 giorni prima della semina del trifoglio o, dovendo trattare dopo la semina, impiegare Risormone 30.

MODO D'IMPIEGO

Aggiungere progressivamente acqua alla quantità necessaria di **ERBOGIL** posta in un secchio; versare in seguito questa poltiglia concentrata nella pompa e completare con l'acqua necessaria, agitando.

L'ERBOGIL deve essere utilizzato con una quantità sufficiente di acqua:

- 400 litri o più per ettaro quando le condizioni sono favorevoli e le infestanti molto giovani;
- 600 litri o più per ettaro se il trattamento è tardivo o se il tempo è umido o coperto.

DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

Diserbo cereali

Dose normale: kg. 7 per ettaro.

Dose debole: contro erbe infestanti molto giovani ed in piena vegetazione: kg. 5/ha.

Dose forte: per un trattamento tardivo o contro: veccia, crisantemo delle messi, bifora kg. 9/12 per ettaro.

Distruzione della cuscuta nelle leguminose

Falciare in primavera le zone parassitate con un margine di 2 metri intorno alla zona stessa. Trattare impiegando ogni 100 mq. litri 20 di una poltiglia contenente 1 kg. di **ERBOGIL** per ettolitro. Trattare soltanto le leguminose impiantate da almeno un anno.

Lotta contro Escoriosi e Mal dell'Esca della vite:

Eseguire un trattamento a fine inverno, nel momento del « pianto della vite », circa 15 giorni prima del germogliamento, mediante irrorazione alle piante con una poltiglia di **ERBOGIL** kg. 1 in 100 litri di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITÀ

Si consiglia tenere lontani dalle zone trattate persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

0579

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'**ETALDYN** rinforza l'azione delle poltiglie permettendo loro di bagnare completamente la vegetazione trattata come pure gli insetti da distruggere per contatto.

L'**ETALDYN** possiede tutte le qualità per essere un bagnante adesivo e cioè:

Presenta un potere bagnante che ne permette l'impiego a soli 50 gr. per hl. di poltiglia. Una poltiglia all'**ETALDYN** anzichè gocciolare a terra si stende sulle parti trattate procurando una perfetta distribuzione ed uniformità del deposito.

Aumenta l'adesività del trattamento. Contrariamente ai comuni bagnanti che favoriscono il dilavamento del trattamenti ad opera delle piogge, l'**ETALDYN** è un bagnante irreversibile ed adesivo che conferisce una energica adesività sia alle poltiglie anticrittogamiche che insetticide.

Non provoca schiuma.

PRINCIPALI IMPIEGHI DELL'ETALDYN

In tutte le poltiglie anticrittogamiche ed insetticide a gr. 50-100 per ettolitro di poltiglia.

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 50 di bagnanti, adesivanti; gr. 50 di disperdenti e coadiuvanti.

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Reg. n. 0579 Ministero Sanità del 16.3.72

ETALDYN

Bagnante adesivo irreversibile per potenziare ed aumentare il potere coprente delle poltiglie antiparassitarie su tutte le colture.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE Via P.o Foà 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 00136 ROMA Viale degli Ammiragli 91 Tel 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE 40138 BOLOGNA Via B Provaglia 3 - Tel 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Peso netto Kg.

MODALITA' D'IMPIEGO

Aggiungere l'**ETALDYN** alla poltiglia già preparata e solo al momento dell'impiego.

Essendo l'ETALDYN un bagnante adesivo, l'impiego con mezzi aerei è legato all'antiparassitario con il quale viene unito.

COMPATIBILITA'

L'**ETALDYN** è compatibile con tutti i prodotti anticrittogamici ed insetticidi.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non esercita effetti nocivi sulla vegetazione e non distrugge la pruina dei frutti.

NOCIVITA'

Per l'impiego che dell'**ETALDYN** si fa in unione agli antiparassitari, si consiglia tenere lontani dalle zone trattate persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

0581

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

ESPEROL®

FUNGICIDA ED ERBICIDA LIQUIDO FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO DESTINATO A COLTURE ORTICOLE, FLORICOLE ED INDUSTRIALI NONCHÈ DEI SEMENZAI E DEI VIVAI E PER LA LOTTA CONTRO IL RISO CRODO

COMPOSIZIONE

Metam sodium puro	g 32,7
Acqua e coloranti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 0581 del 17-3-1972

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

L'ESPEROL risulta efficace:
contro i funghi del suolo dei generi Pythium, Sclerotinia, Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium, Phialophora cinerescens;
contro i semi di numerose erbe infestanti (Portulaca sp, Stellaria sp, Taraxacum sp, Convolvulus sp, Chenopodium sp, Capsella sp, Amaranthus spp);
contro le forme libere dei Nematodi (Pratylenchus spp, Paratylenchus spp, Criconemoides);
contro insetti terricoli (Grillotalpa).
L'ESPEROL deve essere applicato servendosi di comuni annaffiatoi o di pali iniettori, prima della messa a dimora della coltura, su terreno nudo accuratamente lavorato e perfettamente sminuzzato, 30 giorni circa dopo l'interramento della concimazione organica (letame). Il suolo dovrà inoltre possedere adeguate condizioni di temperature, da 15 a 30 °C, ed un certo grado di umidità.
La dose d'impiego dell'ESPEROL è di kg 1 diluiti in 30-50 litri di acqua. La soluzione così ottenuta va distribuita su una superficie di 10 metri quadrati. Aumentare la dose a 1,5-2 kg qualora si vogliano combattere i funghi del suolo che provocano la **Tracheomicosi** e in presenza di temperature basse.
Subito dopo il trattamento eseguire un'abbondante bagnatura per favorire l'uniforme penetrazione del prodotto in profondità (circa 20-30 cm).
Da una a due settimane dopo il trattamento (osservare l'intervallo maggiore se la temperatura è sui 15 °C) occorre eseguire una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di eliminare i vapori residui del prodotto.
Lasciare trascorrere altri 8-12 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto delle colture, usando l'intervallo minore in stagione calda e asciutta e quello superiore in condizioni opposte.

Non applicare l'ESPEROL ad una distanza inferiore ad un metro dalle colture limitrofe.

Lotta contro il riso crodo: 200 kg/ha dispersi in 1200 litri di acqua e applicati come segue:

trattare il terreno, già preparato per la semina, e sommergere immediatamente dopo la risaia con 10 cm. d'acqua.

Dopo 7 giorni seminare il riso.

Il trattamento esercita una efficace azione collaterale sui giavoni, l'Alisma plantago, il Cyperus difformis e le alghe.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il prodotto non può essere mescolato con altri formulati.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e il bestiame. È tossico per i pesci.

Far trascorrere almeno 7 giorni prima di seminare riso e 20-30 giorni prima di seminare o traplantare altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Evitare di respirarne i vapori.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito.
Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza

Consultare un Centro Antiveleni. 79

0677

ERBICIDA Monsanto

ERBICIDA SELETTIVO PER MAIS E SOIA

COMPOSIZIONE 0677

Principio attivo
Alaclor puro gr. 43,1

Inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100,0

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITÀ DI IMPIEGO

Generalità
LASSO® è efficace nei confronti di svariate infestanti annuali originate da seme quali *Amaranto, Capsella, Camomilla, Galinsoga, Porcellana, Erba morella, Senecio, Sonco, Veronica, Viola, Giavone comune, Giavone americano, Poa, Setaria, Digitaria, Panico migliaceo, Bromo, Lolio e Sorghetta.*
Preparare accuratamente il terreno in modo che non rimangano zolle e zollette.
Occorre una certa freschezza del terreno affinchè il **LASSO®** esplichi appieno la propria azione pertanto, in caso di assenza di piogge entro alcuni giorni dal trattamento, intervenire irrigando preferibilmente a pioggia.

Dosi e campi di impiego
LASSO® si impiega subito dopo la semina della coltura e comunque in pre-emergenza delle infestanti.
Distribuire il prodotto a basse pressioni, possibilmente con ugelli a ventaglio, impiegando 400-600 lt di acqua con le seguenti dosi per ettaro.

Mais da granella e da foraggio: lt. 4 - 8
Per uno spettro di azione più ampio impiegare 1 kg/ha (p.a.) di Atrazina.

Soia: lt. 4 - 7

Adottare le dosi maggiori nei terreni pesanti e quando predominano infestanti molto aggressive tipo *Sorghetta* proveniente da seme.
In caso di siccità e nell'impossibilità di irrigare, effettuare prima della semina l'interramento (2-3 cm di profondità) del prodotto. Allo scopo impiegare erpici con denti elastici (tipo S o C) alla velocità di avanzamento di almeno 10 km/h. Aumentare la dose prescelta del 20-25% per compensare la distribuzione del prodotto in tutto lo strato lavorato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
LASSO® è miscibile con Atrazina e Linuron laddove questi p.a. sono selettivi per le colture da diserbare.
Curare la omogenea preparazione della poltiglia erbicida prima della sua distribuzione.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Nel caso di diserbo di varietà poco note o di recente acclimatazione per le quali non si conosce la rispondente selettività si raccomandano prima prove parcellari di selettività.
La stessa avvertenza si applica quando si impieghino, in miscela con **LASSO®**, prodotti non adeguatamente sperimentati.

AVVERTENZE
- **Conservare** il prodotto **protetto dal gelo.**
- **Agitare** la confezione **prima dell'uso.**
- Non impiegare il prodotto nei terreni torbosi od organici.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MONSANTO ITALIANA S.p.A.
Via M. Gioia, 8 - MILANO Registrazione Ministero Sanità N°0677 del 19.9.1972
Officina di produzione
S.I.L.I.A. S.p.A. Aprilia(LT)

DA NON VENDERSI SFUSO - Volume netto lt. 10 ® Marchio Registrato Monsanto

0697

ASAR 80

CLASSE III

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 79 di Mancozeb puro
q.b. a 100 di supporti e coadiuvanti

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Natura dei rischi di intossicazione:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:
— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il medico
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

Modalità e campi d'impiego:
L'ASAR 80 è un fungicida organico per la lotta contro le principali malattie crittogamiche in frutticoltura, viticoltura, floricoltura e colture industriali.
L'ASAR 80 è dotato anche di un'azione acaricida cosicché, intervenendo con i normali trattamenti fungicidi, si ottiene anche un ottimo controllo del ragno rosso e ragno giallo.
POMACEE: contro ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria e glomerella: gr. 150-200 hl.
VITICOLTURA: per i trattamenti prefiorali e nel periodo della fioritura, contro la peronospora: gr. 150-200 hl.
POMODORO: contro peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi, antracnosi, solo fino alla prima fioritura: gr. 150-200 hl.
PIOPPICOLTURA: contro la Marsonina brunnea del pioppo: kg. 4-5 ha.
GAROFANO: contro le ruggini: gr. 150-200 hl.
TABACCHICOLTURA: contro la peronospora tabacina: in semenzaio, gr. 150 per hl., in pieno campo, gr. 200 per hl.
Il quantitativo prescelto di ASAR 80 va stemperato, sotto buona agitazione, prima in poca acqua, poi diluito fino al volume desiderato.
CONCIA DEI SEMI: l'ASAR 80 può essere usato anche per la concia delle sementi alla dose di gr. 200/300 per quintale di seme.
È attivo contro: Fusarium nivale del GRANO
Fusarium moniliforme e Gibberella zeae del MAIS
Pericularia oryzae, Fusarium sp. del RISO
Phoma betae, Fusarium sp., Rhizoctonia solani e Cercospora beticola della BARBABIETOLA
Fusarium sp., Rhizoctonia solani e Phytium sp. delle orticole.
Si mescola a secco il seme con il quantitativo indicato di ASAR 80, utilizzando apparecchiature dotate di un energico mescolatore meccanico o manuale, fino ad ottenere un uniforme impolveramento su tutta la superficie dei semi che, al momento dell'operazione, non devono presentare tracce di umidità.
AVVERTENZA: i semi trattati devono essere utilizzati esclusivamente per la semina; non devono essere quindi usati per l'alimentazione dell'uomo, degli animali domestici, del bestiame e della selvaggina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità:
L'ASAR 80 è compatibile con i normali antiparassitari, ad eccezione di quelli aventi reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Non usare l'ASAR 80 per le varietà di pero sensibili: Abate Fetel, Armella, Butirra, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Decana d'Inverno, Gentil bianca, Gentilona, Giardina, Kaiser Alexander, Mora, S. Giovanni, S. Maria, Scipiona, Spadona, Spadoncina, Spinacarpi, William precoce.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
PENNWALT HOLLAND B.V. - Rotterdam (Olanda)

Registrazione Ministero della Sanità n. 0697 del 17/2/1972 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

0752

TRI - MILTOX

Anticrittogamico, in polvere bagnabile, di colore bleu intenso, costituito da sali di: rame - zinco - manganese

Composizione

rame metallico gr. 8,34 (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
rame metallico gr. 2,43 (sotto forma di solfato tetraramico tricalcico)
rame metallico gr. 2,75 (sotto forma di carbonato basico di rame)
gr. 12,8 di mancozeb (etilenbisditiocarbamato di zinco e di manganese) puro (da p.a. tecnico all'80%)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
— conservare la confezione ben chiusa.
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

Informazioni per il medico

— Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose può provocare irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
— Controindicazioni
Alcool, oli e grassi

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	
Pomodoro (fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi	0.4-0.8% - gr 400-800
Pomacee	Ticchiolature	

Versare lentamente il TRI-MILTOX nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando

Intervenire secondo le necessità dettate dall'andamento stagionale e dalla biologia dei parassiti

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità

Il TRI-MILTOX è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ, ad eccezione del TIOTOX « 50 ».
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio TRI-MILTOX + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di TRI-MILTOX da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del TRI-MILTOX con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di TRI-MILTOX, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiute.

Fitotossicità

Su pomacee evitare di trattare in fioritura e in presenza di basse temperature.

Rischi per la fauna utile

E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 0752 del 17-2-1972 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

0762

IV CLASSE

MYCODIFOL® 23-54

Fungicida organico di sintesi in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE IN PESO

Captafol, puro	. . . g	23,0
Folpet, puro	. . . g	54,4
Disperdenti, diluenti, bagnanti .	. q.b. a g	100,0

® Marchio registrato Chevron Chemical Co.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi;
— Evitare il contatto diretto con i prodotti puri o diluiti ed anche di sollevare polveri nel maneggio dei prodotti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0762 in data 6-6-1972.

MODALITA' DI IMPIEGO

VITE — Muffa grigia: 120-150 g per 100 litri di acqua in trattamenti ripetuti ogni 10-15 giorni ad iniziare dalla fase degli «acini formati» sino a 40 giorni prima della raccolta per le uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
Il Mycodifol® 23-54 è efficace anche contro la Peronospora.

— Marciume bruno dell'uva (**Guignardia bidwellii**), rossore parassitario delle foglie (**Pseudopeziza tracheiphila**) ed antracnosi (**Elsinoe ampelina**): 200-250 g per 100 litri di acqua, in 2 trattamenti precoci, a partire dallo stadio di inizio germogliamento (prima dei trattamenti antiperonosporici che seguono poi normalmente).
Per combattere l'antracnosi si consiglia un trattamento anche al bruno, alle stesse dosi.

— Escoriosi (**Phomopsis viticola**): 200-250 g per 100 litri di acqua, in 2 trattamenti precoci:
1) all'inizio del germogliamento, punta verde, comparse delle prime foglioline;
2) con germogli di 2-4 cm e con 2-3 foglioline.

FRAGOLA — Muffa grigia: 120-150 g per 100 litri di acqua in tre trattamenti da effettuarsi rispettivamente quando circa il 10% dei fiori è sbocciato, a metà fioritura e verso la fine di questa, allo scopo di contenere l'infezione primaria che si insedia sui petali e sugli stami marcescenti, particolarmente quando la stagione decorre piovosa.
Bagnare abbondantemente le piante ed il suolo circostante.

Altre malattie che si combattono con il Mycodifol® 23-54:

ORTICOLTURA		dose g/hl acqua
Cipolla	peronospora, alternariosi	150-200
Cocomero, melone	peronospora, antracnosi	100-150
Fagiolo	antracnosi	150-200
Fragola	vaiolatura	100-150
Lattuga	peronospora	150-200
Patata	peronospora, alternariosi	100-150
Pomodoro	peronospora, alternariosi septoriosi, ticchiolatura	100-150
Sedano	septoriosi, cercospora	150-200
Tabacco	botrite	150-200

FLORICOLTURA		dose g/hl acqua
Crisantemo	septoriosi	100-150
	botrite	150-200
Gladiolo, tulipano	botrite	100-150
Rosa	ticchiolatura, peronospora	100-150

MODALITA' DI PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Stemperare subito prima dell'uso il quantitativo stabilito di Mycodifol® 23-54 in poca acqua, così da ottenere una pasta omogenea sufficientemente fluida, ed aggiungere successivamente l'acqua rimanente sino alla diluizione richiesta.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'

Il Mycodifol® 23-54 è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o leggermente acida.
Non è miscibile con TEPP, antiparassitari, a reazione alcalina, Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

Avvertenza: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

«DA NON VENDERSI SFUSO» Contenuto netto:

0763

IV CLASSE

MYCODIFOL® 23-54 BLU

Fungicida organico di sintesi in polvere bagnabile.

COMPOSIZIONE IN PESO

Captafol, puro . . . . g 23,0
Folpet, puro . . . . g 54,4
Disperdenti, diluenti, bagnanti e coloranti . . q.b. a g 100,0

® Marchio registrato Chevron Chemical Co.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi;
— Evitare il contatto diretto con i prodotti puri o diluiti ed anche di sollevare polveri nel maneggio dei prodotti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.

Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità, n. 0763 in data 9-5-1972.

MODALITA' DI IMPIEGO

VITE — Muffa grigia: 120-150 g per 100 litri di acqua in trattamenti ripetuti ogni 10-15 giorni ad iniziare dalla fase degli «acini formati» sino a 40 giorni prima della raccolta per le uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
Il Mycodifol® 23-54 blu è efficace anche contro la Peronospora.

— Marciume bruno dell'uva (**Guignardia bidwellii**), rossore parassitario delle foglie (**Pseudopezîza tracheiphila**) ed antracnosi (**Elsinoe ampelina**): 200-250 g per 100 litri di acqua, in 2 trattamenti precoci, a partire dallo stadio di inizio germogliamento (prima dei trattamenti antiperonosporici che seguono poi normalmente).
Per combattere l'antracnosi si consiglia un trattamento anche al bruno, alle stesse dosi.

— Escoriosi (**Phomopsis viticola**): 200-250 g per 100 litri di acqua, in 2 trattamenti precoci:
1) all'inizio del germogliamento, punta verde, comparsa delle prime foglioline;
2) con germogli di 2-4 cm e con 2-3 foglioline.

FRAGOLA — Muffa grigia: 120-150 g per 100 litri di acqua in tre trattamenti da effettuarsi rispettivamente quando circa il 10% dei fiori è sbocciato, a metà fioritura e verso la fine di questa, allo scopo di contenere l'infezione primaria che si insedia sul petali e sugli stami marcescenti, particolarmente quando la stagione decorre piovosa.
Bagnare abbondantemente le piante ed il suolo circostante.

Altre malattie che si combattono con il Mycodifol® 23-54 blu:

ORTICOLTURA		dose g/hl acqua	FLORICOLTURA		dose g/hl acqua
Cipolla	peronospora, alternariosi	150-200	Crisantemo	septoriosi	100-150
Cocomero, melone	peronospora, antracnosi	100-150		botrite	150-200
Fagiolo	antracnosi	150-200	Gladiolo, tulipano	botrite	100-150
Fragola	vaiolatura	100-150	Rosa	ticchiolatura, peronospora	100-150
Lattuga	peronospora	150-200			
Patata	peronospora, alternariosi	100-150			
Pomodoro	peronospora, alternariosi septoriosi, ticchiolatura	100-150			
Sedano	septoriosi, cercospora	150-200			
Tabacco	botrite	150-200			

MODALITA' DI PREPARAZIONE DELLA MISCELA:
Stemperare subito prima dell'uso il quantitativo stabilito di Mycodifol® 23-54 blu in poca acqua, così da ottenere una pasta omogenea sufficientemente fluida, ed aggiungere successivamente l'acqua rimanente sino alla diluizione richiesta.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'
Il Mycodifol® 23-54 blu è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o leggermente acida.
Non è miscibile con TEPP, antiparassitari a reazione alcalina, Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Avvertenza: devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

«DA NON VENDERSI SFUSO» Contenuto netto:

0769

Polvere bagnabile
Erbicida selettivo per il mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
80 g di Atrazina tecnica, purezza minima 97-98%, pari a g 72 di 2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-s-triazina e g 7 di altre triazine erbicide
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (Va)
Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0769 del 17.8.72
® marchio registrato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

Modalità d'impiego
Gesaprim 80 combatte efficacemente le più dannose infestanti graminacee e dicotiledoni provenienti da seme a germinazione primaverile-estiva, agendo per assorbimento fogliare e soprattutto per assorbimento radicale sulle infestanti in via di germinazione.
Le malerbe ad apparato radicale profondo, rizomatose ed in genere perenni non risentono in misura determinante dell'azione del prodotto; in particolare risultano resistenti il Panicum dichotomiflorum, la Gramigna, il Convolvolo, il Sorgo selvatico, l'Artemisia.

Dosi e tempi di applicazione
Kg 2,5-3/ha in 600-1000 litri d'acqua.
Adottare il dosaggio più basso nei terreni sciolti e di medio impasto, il più alto nei terreni compatti ed in quelli ricchi di sostanza organica.
Per preparare la miscela si dovrà stemperare in poca acqua la dose stabilita di prodotto versandola poi nel quantitativo di acqua previsto, rimestando continuamente la sospensione acquosa ottenuta. Eseguire i trattamenti subito dopo la semina del mais od al massimo quando le malerbe hanno raggiunto uno sviluppo vegetativo di 4-6 cm. Applicazioni più ritardate possono risultare meno efficaci.

Avvertenze
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi **per altre colture (es. bietola, tabacco).**
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Applicare il prodotto su terreni ben preparati, sminuzzati e possibilmente rullati dopo la semina. Curare l'uniformità della distribuzione, evitando di soffermarsi con gli ugelli aperti sulle capezzagne o in qualsiasi altro posto del campo. Evitare anche sovrapposizioni nelle strisciate della macchina distributrice. Se dopo 4-5 giorni dal trattamento non piove a sufficienza è necessario intervenire con irrigazioni (possibilmente a pioggia).
Evitare l'impiego di acque luride, sia per l'irrigazione che per la preparazione delle miscele. Durante il trattamento tenere la miscela in continua agitazione per evitare depositi nella botte della macchina distributrice. Il trattamento è assolutamente sconsigliato in terreni torbosi o comunque molto ricchi di humus.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e d'impiego e se adoperato secondo le predette istruzioni, il prolotto non è fitotossico.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg
Kg

0777

Faneron®

Diserbante selettivo per la lotta contro le infestanti dicotiledoni nelle colture di frumento e altri cereali nonchè del mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
50 g bromofenossima pura
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Va)

Officina di produzione: SILIA - Aprilia (LT)

Registrazione Ministero Sanità n. 0777 del 29.5.1972
® marchio depositato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

FANERON è essenzialmente un erbicida di contatto che agisce per assorbimento fogliare. Pertanto deve essere impiegato esclusivamente in post-emergenza.
Controlla la maggior parte delle infestanti dicotiledoni annuali che infestano le colture di cereali quali, ad esempio, Amaranthus, Bifora, Camomilla, Capsella, Chenopodium, Fiordaliso, Fumaria, Galeopsis, Lamium, Papavero, Poligoni, Rafano, Senape, Ranuncoli, Solanum, Veccia.

Impiego e dosi
Frumento ed altri cereali invernali
3-4 Kg per ettaro in 600-1000 litri di acqua.

Cereali di semina primaverile
2-3 Kg per ettaro in 600-1000 litri di acqua.
In tutti i casi, il trattamento si effettua dopo l'emergenza delle infestanti ed in qualsiasi stadio di sviluppo della coltura. I migliori risultati si ottengono quando le infestanti non hanno ancora superato lo stadio di 6 foglie.

Mais
contro Solanum nigrum: 1,5-2 Kg/ha
contro Amaranthus spp.: 2-2,5 Kg/ha.

Trasemina
L'impiego del Faneron consente la trasemina nel frumento delle colture leguminose (trifoglio, ladino), che può essere fatta già poco dopo il trattamento (2-3 giorni).
La trasemina è possibile anche prima del trattamento purchè questo venga effettuato prima dell'emergenza della coltura di leguminose.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. **« Avvertenza »** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg

0780

ACARICIDA 8

PRODOTTO SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO IL RAGNETTO ROSSO DELLE COLTURE DI PERO E MELO

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Composizione
gr. 100 contengono:

CIEXATIN puro . . .	gr. 11,8
Inerti e Sospensivanti q. b. a	gr. 100

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Informazioni per il medico
Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: Cefalea occipitale continua o parossistica - Ronzii auricolari - Iperacusia - Vertigini - Rachialgia - Dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - Ritenzione urinaria - Insufficienza respiratoria e di circolo - Interessamento del sistema nervoso centrale - Nevralgie e Paralisi - Dermatosi.
Consigli Terapeutici di massima condizionati al caso: Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità effettuando, in relazione alla via di contaminazione, abluzioni cutanee - Lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza - Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale - Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego
L'**Acaricida 8** esplica la sua azione contro tutte le forme mobili di acari, anche contro le specie resistenti ai prodotti fosforganici e cloroderivati. La grande efficacia, viene esaltata dalla notevole persistenza d'azione del prodotto.
L'**Acaricida 8** si impiega alla dose di gr. 150-200 per ettolitro di acqua usando la dose minore nelle infestazioni lievi (1-2 acari per foglia), e la dose massima in caso di forti infestazioni (4-5 acari per foglia). In ogni caso, perchè il trattamento possa essere valido, si dovrà aver cura di bagnare completamente ed abbondantemente le piante. Ripetere il trattamento alla ricomparsa delle forme mobili. Per aumentare l'efficacia del prodotto nei trattamenti, aggiungere alla miscela gr. 50 di Bagnante Sariaf. Si raccomanda di non ripetere subito il trattamento: il prodotto è lento ad agire (entra in attività dopo 3-4 giorni dal trattamento) e quindi si potrebbe essere tratti in inganno dalla vitalità degli acari anche dopo 1-2 giorni dal trattamento.
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'**Acaricida 8** è compatibile con la maggior parte dei prodotti usati in fitoiatria. E' sconsigliata la miscela con Polisolfuri di Calcio e di Bario, o con Poltiglia Bordolese.

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, i pesci e il bestiame. Per quanto concerne il bestiame, si consiglia di non immettere animali nelle zone trattate prima di 30 giorni dopo il trattamento nè di alimentarli con prodotti trattati direttamente o accidentalmente con il prodotto.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

S. p. A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
S.I.L.I.A. S.p.A. - APRILIA (LT) - Via Nettunense Km. 23,4

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0780 del 30-9-1976

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso . kg**

0798

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZA
FOLTAPET può essere irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi. In soggetti particolarmente sensibili, si possono verificare manifestazioni anche vistose, ma transitorie e non preoccupanti. Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione. Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITA
Il prodotto è tossico per gli insetti utili e per i pesci.
Su uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti. Su uve da tavola e sulle altre colture sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'FOLTAPET'

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di Captafol e di Folpet per trattamenti in:
VITICOLTURA - FRUTTICOLTURA
ORTICOLTURA - FLORICOLTURA

COMPOSIZIONE

Captafol puro	g 24
Folpet puro	g 56
Coadiuvanti, inerti	q.b. a g 100

CLASSE IV

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 0798 del 15-2-1972
'FOLTAPET' marchio registrato Chevron Chemical Company

FOLTAPET è un'associazione di due fungicidi organici, il Folpet ed il Captafol. Ciò rende FOLTAPET indicato per una lotta efficace contro le più comuni malattie fungine delle colture erbacee ed arboree.

MODALITA' DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 litri di acqua)
Peronospora della vite: g 150. Trattamenti ogni 10-15 giorni. g 250. Per le due ultime applicazioni.
Muffa grigia della vite: g 150-200. Trattamenti continui, in condizioni favorevoli di sviluppo del parassita. Ultimi due trattamenti: rispettivamente sei e quattro settimane prima della raccolta.
Ticchiolatura del pero e del melo: g 100-150. Trattamenti ogni 10-15 giorni.
Malattie in fruttaio: g 150. Tre trattamenti: a fine luglio, metà agosto e quattro settimane più tardi.
Bolla del pesco: g 300. Un trattamento all'apertura delle gemme ed uno 10 giorni più tardi.
Sclerotinia dell'albicocco: g 150. Applicazione a bottone rosa, a piena fioritura e a tre quarti di petali caduti.
Cicloconio dell'olivo: g 200. Due applicazioni: in primavera presto e in autunno.
Antracnosi dell'olivo: g 200. A seconda dell'infezione.
Ticchiolatura del nespolo: g 150. Ogni due settimane.
Peronospora e Alternariosi della patata: g 200. 4-5 trattamenti nella stagione.
Peronospora e Alternariosi del pomodoro: g 150. Ogni 7-10 giorni a seconda del tempo.
Muffa grigia delle melanzane: g 200.
Peronospora della cipolla: g 200. Trattamenti ogni 7-10 giorni a seconda del tempo.
Peronospora ed Antracnosi della lattuga, del cetriolo, del melone: g 150. Ad intervalli di 7-10 giorni.
Muffa grigia delle fragole: g 250. Trattamenti settimanali.
Antracnosi, Alternariosi, Muffa grigia delle piante ornamentali: g 250. Ad intervalli di 7-10 giorni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per ottenere una sospensione acquosa uniforme, si versa la prescelta dose di FOLTAPET in metà della quantità di acqua necessaria, agitando accuratamente per qualche tempo; indi si aggiunge il rimanente volume di acqua ripetendo il rimescolamento.
Si consiglia di usare di preferenza pompe irroranti munite di agitatore.
Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
FOLTAPET può essere miscelato con la maggior parte degli insetticidi e anticrittogamici di uso comune.
Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco. Avvertenza: devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
E' fitotossico per la cultivar di pero Butirra d'Anjou. Su melo da non usarsi dopo la fioritura perchè può manifestare fitotossicità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

0853

CLASSE III

Per il diserbo selettivo in pre-emergenza su colture industriali ed in orticoltura

Composizione:
100 gr. di prodotto contengono:
50 gr. di LINURON puro
q.b. a 100 di supporti e coadiuvanti

ATTENZIONE:

manipolare con prudenza

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Terapia:
Per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche.
Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epato-protettori.

Avvertenza:
Consultare un Centro Antiveleni.

L'ARBAX controlla: Amaranto, Poligono convolvolo, Chenopodio, Atriplice, Erba morella, Stellaria, Portulaca, Papavero, Camomilla, Erba storna, Senape, Rafano, Capsella, Rucola, Euforbia, Cicerbita, Senecio, Erba stregona, Anagallide, Poa.
Mediamente sensibili risultano, nei terreni argillosi e siccitosi: Setaria, Digitaria, Giavone, Poligono aviculare, Persicaria, mentre resistenti sono: Fumaria, Veronica, Alopecuro, Avena selvatica e tutte le perennanti, quali: Stoppione, Vilucchio, Equiseto, Gramigna.

Dosi e modalità d'impiego:

CAROTA:	pre-emergenza, 1-2 kg/ha. in 400/600 lt. d'acqua post-emergenza, 1,5-2 kg/ha., in funzione dello sviluppo delle infestanti, in 400/600 lt. d'acqua.
SEDANO, FINOCCHIO:	pre-emergenza, 1,5-2 kg/ha. in 400/600 lt. d'acqua post-trapianto, 1,5-2 kg/ha. in 400/600 lt. d'acqua.
PREZZEMOLO:	pre-emergenza, 1,2-2 kg/ha. in 400/600 lt. d'acqua.
PATATA:	su varietà precoci, 1,5-2 kg/ha. in 400/600 lt. d'acqua su varietà medie e tardive, 1,5-2,5 kg/ha. in 400/600 lt. d'acqua.
FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO:	pre-emergenza, 1-1,5 kg/ha. in 400/600 lt. d'acqua.
ASPARAGO:	pre-emergenza, 1,5-2,5 kg/ha. in 400/600 lt. d'acqua.
CARCIOFO:	1,5-2,5 kg/ha. in 400/600 lt. d'acqua. Si possono eseguire 1 o 2 trattamenti, alla fine dell'estate, e ripetere il secondo dopo 4-5 mesi circa.
MAIS:	pre-emergenza, 1,5-2 kg/ha. in 400/600 lt. d'acqua. Effettuare il trattamento subito dopo la semina e comunque prima della germinazione dei semi che devono essere ad una prpfondità di 4-5 cm.

Usare normali pompe irroratrici munite di agitatore, con ugelli a getto sottile e uniformi. Eseguire i trattamenti su terreno finemente sminuzzato e livellato, umido e privo di infestanti molto sviluppate. In mancanza di pioggia entro 7-8 giorni dal trattamento, intervenire con una equilibrata irrigazione.
Evitare di effettuare i trattamenti nei terreni molto sabbiosi, ricchi di scheletro ed estremamente poveri di sostanze organiche.
Nei terreni torbosi e molto ricchi di sostanze organiche, effettuare solo trattamenti di post-emergenza.
Eseguire i trattamenti in giornate poco ventilate e non molto calde.
Dopo il trattamento non lavorare in alcun modo il terreno.
Rispettare rigorosamente le dosi: minime nei terreni sciolti, massime nei terreni argillosi o molto ricchi di sostanza organica.
Nei terreni trattati con l'ARBAX si sconsiglia di seminare colture diverse da quelle sopra indicate prima di 3/4 mesi dall'applicazione del prodotto.
Sciogliere in poca acqua la quantità di prodotto necessaria ed aggiungere poi la quantità totale di acqua, sotto agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con i seguenti diserbanti: CP 40, DCA 50, D 75, MAISAR.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non è previsto l'abbinamento con anticrittogamici ed insetticidi.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S.p.A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
VISPLANT-CHIMIREN S.r.l. - RENAZZO DI CENTO (FE)
Via Salvi n. 1

Registrazione del Ministero della Sanità N.0853 del 15/6/1972

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

0877

SANDOCAR GRANULI

Insetticida a base di carbaryl per la lotta contro la Piralide del mais

Composizione
gr. 5,05 di carbaryl tecnico (1-naftil-N-metilcarbamato) al 99% di purezza minima, equivalenti a gr. 5 di carbaryl puro
supporti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
— **Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo**
— **Sintomi di intossicazione:**
Nausea - vomito - diarrea - scialorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - brachicardia - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio - lavaggio cutaneo se vi fu contatto - atropina solfato (mg. 2 ogni quarto d'ora per via endomuscolare fino a comparsa dei fenomeni d'atropinizzazione) - ossigenoterapia se vi è cianosi. PAM (gr. 0,50 ogni 3 ore per endovena) o similari.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 0877 del 17.8.72 del Ministero della Sanità

Modalità di impiego

Impiegare il SANDOCAR GRANULI, in ragione di kg. 30-35 per ettaro, contro la prima generazione della Piralide, per impedire la penetrazione delle larve negli steli.

Il SANDOCAR GRANULI deve essere distribuito uniformemente, lasciandolo cadere dall'alto sulle piante, in modo che il prodotto, scivolando sulle pagine superiori delle foglie, vada ad accumularsi alle ascelle delle foglie stesse.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il SANDOCAR GRANULI non è miscibile con altri antiparassitari data la sua formulazione granulare.

Fitotossicità

Sulla coltura indicata e seguendo le modalità consigliate il SANDOCAR GRANULI non è fitotossico.

Rischi per la fauna utile

L'impiego del SANDOCAR GRANULI non comporta rischi per la fauna utile.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

0902

Diserbante selettivo per la coltura del mais particolarmente indicato per trattamenti di post-emergenza del mais.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
15 g Atrazina tecnica, purezza minima 97-98%, pari a g 13,4 di 2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-s-triazina e g 1,3 di altre triazine correlate biologicamente attive
q.b. a 100 g olio emulsionabile, disperdenti e coadiuvanti

CLASSE IV

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)
Registrazione Ministero della Sanità n. 0902 del 15.9.1972
® marchio depositato

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

Campo d'azione
Il Gesaprim O combatte efficacemente le più dannose e diffuse infestanti graminacee e dicotiledoni provenienti da seme fra cui i Giavoni, gli Amaranti, il Farinaccio, le Persicarie, le Poe, l'Ortica, l'Erba Porcellana, la Stellaria, la Borsa Pastore, l'Erba Morella (Solanum nigrum), i Gerani, la Mercurella, le Veroniche, la Plantaggine, le Matricarie.
Agisce energicamente anche per via fogliare in virtù dell'azione attivante e fitotossica esercitata dal veicolo oleoso presente nella formulazione.
Sono da considerarsi comunque resistenti tutte le infestanti rizomatose e perenni come Gramigna, Convolvolo, Sorgo selvatico.

Epoca del trattamento
Il trattamento dovrà essere eseguito in post-emergenza quando le infestanti hanno uno sviluppo di 5-10 cm di altezza.

Dosi d'impiego
Kg 10-20/ha (a seconda dello sviluppo e delle specie di infestanti presenti) in 600 litri di acqua.

Modalità di applicazione
Stemperare prima la quantità di prodotto indicata in poca acqua in modo da ottenere un'emulsione omogenea, quindi versarla nella restante quantità d'acqua. Per una buona riuscita del diserbo è indispensabile l'uso di pompe irroratrici perfettamente funzionali in modo da garantire una completa ed uniforme copertura della superficie da trattare.

Avvertenze
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Note particolari per i terreni torbosi
Nei terreni torbosi dovrà essere sempre usata la dose di 20 Kg/ha e su una vegetazione infestante più sviluppata in modo da colpire la maggior parte della popolazione delle malerbe germinanti. In caso di germinazioni delle infestanti prolungate e dilazionate nel tempo possono essere necessari due trattamenti opportunamente distanziati.
Nell'impiego di pre-emergenza il prodotto è completamente inefficace.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e d'impiego e se adoperato secondo le predette istruzioni il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg

0917

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

R 6 - BLU TOTAL

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Anticrittogamico contro le principali malattie della vite: Peronospora, Oidio, Botrytis

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 49,6 di Rame puro
(sotto forma di Ossicloruro tetramico)
Gr. 16,5 di Zineb puro
Gr. 8,7 Benornyl puro
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

a) in caso di ingestione

Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:

Lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 0917 Ministero della Sanità del 9 - 11 - 1972

E/1

CARATTERISTICHE

L'R 6 BLU TOTAL è una formulazione studiata per la difesa della vite dalle principali malattie crittogamiche che possono attaccarla durante l'intero periodo vegetativo Peronospora, Oidio, Botrytis, ed inoltre Blok-rot, Antracnosi.

DOSI D'IMPIEGO

L'R 6 BLU TOTAL s'impiega alla dose di gr 400 per ettolitro d'acqua, secondo il calendario antiperonosporico.

Per una migliore difesa contro la Botrytis è importante che un trattamento cada nel periodo precedente la chiusura del grappolo.

Inoltre, se la stagione decorre particolarmente piovosa e quindi favorevole allo sviluppo delle crittogame (particolarmente Peronospora e Botrytis) è ugualmente utile l'esecuzione di trattamenti nel periodo che va dall'invaiatura del grappolo alla raccolta dell'uva.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare l'**R 6 BLU TOTAL** in un volume d'acqua uguale al suo peso. Mescolare bene. Diluire poco a poco fino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea. Portare a volume.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

AVVERTENZA:
L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta

COMPATIBILITA'

L'R 6 BLU TOTAL è compatibile con la maggior parte degli insetticidi ed acaricidi di impiego viticolo della nostra gamma.

Attenzione: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

0918

CLASSE III

RAME SARIAF

Composizione:
100 gr. di prodotto contengono
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro di rame e calcio) gr. 32
Solfato di potassio gr. 7,5 di K_2O
q.b. a 100 di supporti, coadiuvanti e disperdenti

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Il RAME SARIAF è un anticrittogamico efficace per la difesa delle seguenti colture:
POMACEE: contro Ticchiolatura
PESCO: contro Bolla e Gomma
VITE: contro Peronospora
OLIVO: contro l'Occhio di pavone
POMODORO: contro Peronospora, Alternariosi, Antracnosi, Septoriosi, Marciume zonato, Marciume concentrico
PATATA: contro Alternaria e Peronospora
BIETOLA: contro Cercospora.

Il RAME SARIAF, oltre a svolgere una completa azione anticrittogamica, consente di sviluppare e fortificare la vegetazione.
Il RAME SARIAF è una polvere fine, preparata in formulazione adesiva, tale da assicurare una superiore efficacia anticrittogamica.
Per la sua concentrazione, il RAME SARIAF si presta bene per irrorazioni a mezzo di pompe a basso volume, permettendo di raggiungere forti concentrazioni, senza rendere le sospensioni troppo dense.

Dosi e modalità d'impiego
Il prodotto può essere impiegato in poltiglia acquosa, alla dose di kg. 0,5-1 per 100 litri di acqua, oppure a mezzo di polverizzazioni, sia allo stato pure sia mescolato a zolfo ventilato od a polvere inerte. La dose d'impiego contro la Cercospora della barbabietola è di kg. 5-7 per ettaro e per trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei.

Il RAME SARIAF è miscibile con i più comuni anticrittogamici ed insetticidi.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, . e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nocività: È tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Registrazione Ministero della Sanità n. 0918 del 1/9/1972 Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO 10 kg**

0929

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

ASULOX*

Erbicida per la distruzione dei Romici nei prati avvicendati e permanenti.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 33,9 Asulame puro.
Acqua quanto basta a 100.

®marchio registrato della Divisione Fitosanitaria Rhône-Poulenc - Paris

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione: *nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 0929 Ministero Sanità del 5.6.1972

MODALITA' D'IMPIEGO

L'ASULOX è attivo su Rumex obtusifolius, Rumex crispus e Rumex alpinus.
L'applicazione si può effettuare in due momenti:

1) in primavera, su romici in attiva crescita, allo stadio di « foglie in rosetta » pienamente sviluppate, prima dell'apparizione degli scapi florali;
2) all'inizio dell'autunno, su romici in buone condizioni vegetative, al massimo dello sviluppo fogliare, sempre prima dell'emissione degli scapi florali ».

L'efficacia è lenta a manifestarsi, ma la penetrazione del prodotto nelle radici è rapida: di conseguenza si può effettuare un taglio una settimana dopo il trattamento.

L'eliminazione del RUMEX, si ottiene mediante un trattamento annuale ripetuto per 2 o 3 anni, soprattutto nei prati fortemente infestati (Rumex impiantati da lunga data o riserve importanti di semi nel terreno).

Il trattamento va effettuato su prati in buone condizioni vegetative.

Non si consiglia l'impiego dell'ASULOX su praterie mal concimate, né subito dopo forti gelate, né in periodi di siccità.

DOSE D'IMPIEGO

Trattamento generalizzato: 4 lt per ha. in un volume di poltiglia/ha. da 400 a 600 lt. (goccioline da fini a medie).

Trattamento localizzato: 300 a 400 cm^3 per ettolitro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare direttamente l'ASULOX nel serbatoio del polverizzatore colmo di acqua, agitare per ben omogeneizzare la poltiglia e, in corso di spargimento, mantenere un'agitazione molto moderata.

Risciacquare accuratamente il polverizzatore dopo lo spargimento.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

L'erba medica è resistente a qualsiasi stadio.

I trifogli e la Dactylis glomerata sono in qualche caso leggermente frenati nel loro sviluppo, ma ricacciano normalmehte dopo il taglio.

Evitare di trattare le colture vicine.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del taglio del prato o dell'immissione del bestiame al pascolo.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Litri

0937

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

RONSTAR LIQUIDO

Diserbante per il controllo dell'Echinocloa crusgalli (Giavone), panicum, ciperacee in risaia

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 25,5 Oxadiazon puro.
Solventi quanto basta a 100.

L'oxadiazon è caratterizzato da una debolissima tossicità e da una notevole durata d'azione nel terreno.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

DOSI D'IMPIEGO

4-6 lt/ha. a seconda dell'intensità delle infestazioni e della natura del terreno.
Impiegare da 400 a 600 litri d'acqua per ettaro.

EPOCA DI APPLICAZIONE

Prima della semina e dell'allagamento della risaia.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 0937 Ministero della Sanità del 28-6-1973

Contenuto netto litri

0938

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con
prudenza

AFIDINA® M

INSETTICIDA LIQUIDO PER IRRORAZIONI CONTRO GLI INSETTI AD APPARATO BOCCALE SUCCHIATORE E MASTICATORE

COMPOSIZIONE

Fenitrothion puro	g 47,5
Solventi ed emulsionanti (Contiene xilolo)	q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison
S.pA. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento di **Massa (MS)**

Registrazione Ministero della Sanità, n. 0938 del 23.8.1972
® Marchio registrato

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME

g 150-200
contro Afidi di: agrumi, melo, pero, ciliegio, pesco, cavoli, cipolla, patata, barbabietole, bietole, aglio, asparago, cardo, carciofo, carota, cece, fagiolino, fagiolo, fava, lenticchia, pisello, cetriolo, cocomero, melone, zucca, zucchino, melanzana, peperone, insalate, sedano, prezzemolo, rapa, rapanello, fragola, cereali (frumento, mais, orzo, sorgo, riso, avena);

Tripide dell'olivo e dei fiori nelle serre;
Aleurodidi degli agrumi e dei fiori nelle serre;
Cocciniglie del melo, pero ed agrumi;
Psille e Tingide del pero;
Larve defogliatrici del melo e pero, Tignole della vite, Verme delle mele e delle pere, Tentredini delle pere, delle mele e delle susine, Mosca delle ciliegie.

g 150
contro la Mosca delle olive, eseguendo un primo trattamento nella prima decade di luglio, nel caso di una infestazione precoce (5-10 % di punture fertili) ed un secondo in autunno (settembre-primi ottobre).
Quando invece le condizioni più favorevoli allo sviluppo massiccio della Mosca si verificano in epoca normale, può bastare il solo trattamento autunnale.

g 200-300 (1-1,5 kg per ettaro)
contro l'Altica, i Cleoni ed il Lixo della barbabietola.

PREPARAZIONE DELL'EMULSIONE

Versare lentamente in poca acqua la quantità necessaria di AFIDINA M agitando fortemente fino ad ottenere una emulsione omogenea. Quindi diluire l'emulsione così ottenuta con la rimanente quantità di acqua sempre agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

L'AFIDINA M è miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra; se si vuole aggiungere il prodotto a polisolfuro o a poltiglia bordolese, si consiglia di aumentare di 1/3 la dose di AFIDINA M e di usare al più presto la poltiglia ottenuta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto: kg 0,050

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovera al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

15

0940

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

RONSTAR GRANULARE

Diserbante per il controllo dell'Echinocloa crusgalli (Giavone), panicum, ciperacee in risaia

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 2 Oxadiazon puro.
Supporto inerte quanto basta a 100.

L'oxadiazon è caratterizzato da una debolissima tossicità e da una notevole durata d'azione nel terreno.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI D'IMPIEGO

40-50 Kg/ha. a seconda dell'intensità delle infestazioni e della natura del terreno.

EPOCHE DI APPLICAZIONE

5-7 giorni dopo la semina, in risaia allagata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 0940 Ministero della Sanità del 18-1-1973

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

0950

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono: gr. 22 di condensati di ossido di etilene del nonilfenolo. Sostanze coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100.

BAGNANTE ADESIVO LIQUIDO 2

Coadiuvante liquido non ionico per miscele anticrittogamiche, insetticide ed acaricide.

IV Classe Tossicologica

REG. N. 0950 MINISTERO SANITÀ DEL 2.1.73

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Con l'aggiunta del **BAGNANTE ADESIVO LIQUIDO 2**, le miscele antiparassitarie rivestono di un sottilissimo velo liquido piante e parassiti, facendo ottenere risultati migliori e più duraturi nella lotta contro i parassiti, con minor consumo di prodotti e perciò con vantaggio economico.

Il **BAGNANTE ADESIVO LIQUIDO 2** si adopera come additivo per miscele acquose di insetticidi, di acaricidi e di anticrittogamici, allo scopo di elevarne il potere « bagnante » e « adesivo ».

L'uso del **BAGNANTE ADESIVO LIQUIDO 2** è indispensabile allorchè si eseguono irrorazioni sulle piante (cavoli, garofani, uva) o contro insetti (afidi, cocciniglie) per natura difficilmente bagnabili, in quanto ricoperti o protetti da sostanze pruinose o cerose.

DOSI D'IMPIEGO

Gr. 10-20 per 100 lt. di miscela antiparassitaria (soluzioni, sospensioni, emulsioni insetticide, acaricide ed anticrittogamiche).
Per le poltiglie (bordolese, borgognona) elevare la dose a gr. 30 per ettolitro. Aggiungere il **BAGNANTE ADESIVO LIQUIDO 2** alla miscela preparata e solo al momento dell'impiego.

Essendo il BAGNANTE ADESIVO LIQUIDO 2 un bagnante adesivo, l'impiego con mezzi aerei è legato all'antiparassitario con il quale viene unito.

COMPATIBILITA'

Il **BAGNANTE ADESIVO LIQUIDO 2** è compatibile con tutti i prodotti anticrittogamici ed insetticidi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non esercita effetti nocivi sulla vegetazione e non distrugge la pruina dei frutti.

NOCIVITA'

Il prodotto da solo non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
L'intervallo di carenza deve essere quello dei prodotti cui viene aggiunto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGITARE PRIMA DELL'USO

DA NON VENDERSI SFUSO

Cod. n.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

0989

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISORT 75 PB

Diserbante selettivo per colture ortive, ornamentali e floreali

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 75 di Clortal Dimetile puro
Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un diserbante per la fragola, per colture ortive, ornamentali e floreali.

Il prodotto ha un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti sensibili impedendone lo sviluppo. Pertanto, non esplica nessuna azione sulle infestanti già nate o sui loro semi già germogliati.

E' efficace contro le seguenti erbe infestanti annuali provenienti da seme:

Digitaria sanguinalis (sanguinella) Amarantus retroflexus (amaranto) Chenopodium album (farinaccio) Setaria verticillata (panicastrella) Portulaca oleracea (erba porcellana), Stellaria media (centocchio) Erodium cicutarium (erba cicutaria) Beta vulgaris (barbabietola), Poa Annua, Papaver rhoeas (papavero).

Sono invece resistenti le infestanti perennanti come gramigna, cipero, vilucchio, stoppione (o cirsium) ed altre come: coda cavallina, capsella.

Inoltre sono poco sensibili al prodotto le poligonacee come: convolvolo, persicaria, correggiola (polygonum aviculare ecc.).

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Dose normale d'impiego kg. 15-18 per ha. in almeno 500 lt. di acqua. La dose più bassa va impiegata nei terreni sciolti o di medio impasto, la più alta nei terreni pesanti ed argillosi.

- Post-semina o post-trapianto delle colture:
  cipolle, agli, porri, cavoli, cavolfiori, finocchi, sedani, piselli;
- post-trapianto:
  lattuga, scarola, peperoni, melanzane.

Può anche essere impiegato su cetrioli, angurie e meloni, dopo che le piantine hanno superato la crisi del trapianto e su pomodoro, effettuando il trattamento da 4 a 6 settimane dopo il trapianto.

Fragole ed asparagi

Il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora per i nuovi impianti e, prima della ripresa vegetativa primaverile per i vecchi impianti.

Bulbose da fiori (Gladioli, Tulipani, Iris)

Il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora dei bulbi, anche con piante già in fioritura.

Qualora dopo 60-70 gg. dal trattamento avesse luogo una nuova apparizione delle erbe infestanti, sarà sufficiente applicare altri 10 kg/ha. di prodotto avendo prima cura di erpicare e pulire bene il terreno.

Campi da golf. Prati all'inglese (Turf)

Il trattamento va eseguito alla dose di kg. 13 per ha. con 500-600 lt. di acqua all'inizio della primavera, prima della germinazione delle infestanti da combattere e dopo aver eseguito il taglio del tappeto erboso, quanto più raso possibile. Dopo il trattamento effettuare una abbondante irrigazione a pioggia, per facilitare la penetrazione del diserbante nel terreno.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il terreno, prima del trattamento deve essere **ben lavorato, ripulito da erbacce ed avere un sufficiente tenore di umidità** (l'umidità richiesta in genere è quella necessaria per mettere a dimora la coltura). Per la preparazione della miscela aggiungere alla dose occorrente di prodotto poca acqua, agitando a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea.

Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Distribuire la miscela acquosa uniformemente sulla superficie da disinfestare, usando normali pompe a mano o a motore.

Durante il trattamento mantenere la miscela acquosa in costante agitazione. In periodi di siccità, è opportuno mantenere il terreno umido per almeno una settimana dopo il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Evitare che, durante l'irrorazione, lo spruzzo giunga su altre colture vicine.

AVVERTENZE

Non effettuare il diserbo in terreni torbosi, perché il prodotto viene inattivato dalla sostanza organica.

Se le colture dovessero fallire per cause ambientali, si possono subito ripiantare le stesse colture per le quali il prodotto è selettivo.

Quando capita di seminare cereali che seguono, sullo stesso terreno, colture trattate con il prodotto nel periodo estivo, è prudente effettuare prima una buona aratura e lasciare il terreno a riposo per qualche tempo (15-20 gg.).

Lavare perfettamente dopo l'uso la pompa e i recipienti usati per l'irrorazione.

Effettuare il trattamento con tempo buono e senza vento.

Conservare il prodotto in locale asciutto.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalle zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68

Stabilimento Ravit: Quassolo (To)

Reg. n. 0989 Ministero della Sanità del 13-12-1972

10/84

1006

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

KELTHANE * MF

Acaricida selettivo

* Marchio registrato dalla ROHM AND HAAS Co.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 42 di Kelthane purc. (purezza minima 82%) pari a gr. 51,3 di prodotto tecnico.
Sostanze adevisanti, emulsionanti e solventi quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 1006 Ministero Sanità del . 9.2.1973 . . . . .

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

— **Avvelenamento acuto per ingestione inalazione e contatto cutaneo**

— **Sintomi d'intossicazione:**
Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

— **Consigli Terapeutici di massima e condizionati al caso**
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio). Per la liposulubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0.1 - 0.2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

— **Controindicazioni**
la morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, la efedrina, l'alcool.

CARATTERISTICHE

Il Kelthane MF è efficace nel controllo dei vari acari. Esso ha un alto potere iniziale abbattente ed un lungo effetto residuo. Il Kelthane MF è un acaricida selettivo e non uccide la maggior parte dei predatori. E' efficace contro ragnetti rossi, gialli, allungati.

APPLICAZIONI

Su pomacee: gr. 125 per hl.
Su drupacee: gr. 100-125 per hl.
Su vite, agrumi, noce, nocciuolo, fragole, lampone, ortaggi, ecc. gr. 100-125 per hl.
Per il controllo degli acari sulle rose, azalee, cactus, astri, crisantemi, ciclamini, dalie, gigli, gardenia, gerani, glodioli, edera, ortensia, petunie, oleandri, usare da 60 a 120 gr. per 100 litri d'acqua. Sulle piante sensibili usare la dose più bassa. Con forti attacchi si raccomanda di usare le dosi alte.
Ripetere i trattamenti a seconda della necessità.
Trattare accuratamente le piante onde assicurare una completa copertura di tutte le foglie. Sulle foglie difficili a bagnarsi aggiungere Bagnante Adesivo Liquido 2.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITA'

Il Kelthane MF è compatibile con la maggior parte degli altri insetticidi e fungicidi, e può essere usato da solo o in combinazione con [illegible], Parathion, Malathion, Lindano, Arseniato di Piombo, Dithane, Karathane, zolfo ed olii. Non deve essere usato in combinazione con alcun pesticida non compatibile con il solvente base della formulazione.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.
Non trattare su melanzana: tale coltura può essere danneggiata.

NOCIVITA'

Il prodotto non è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura: goni altro uso è pericoloso.
— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle precedenti istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1008

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

KARATHANE* PB

Fungicida organico per la lotta contro l'oidio o mal bianco in frutticoltura, viticoltura e nelle colture orticole, industriali e floreali

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 19,5 Dinocap puro.
Ingredienti inerti quanto basta a 100.

* Marchio registrato dalla Rohm and Haas - Philadelphia - USA

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere la ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.

Controindicazioni:
Atropina.

CARATTERISTICHE

Fungicida organico contro l'oidio o mal bianco in frutticoltura, viticoltura e nelle colture orticole, tabacco, floreali e ornamentali.
Dotato di azione preventiva e curativa è meglio sopportato dello zolfo dalla vegetazione e non produce rugginosità.

Trattamenti ripetuti a 7-10 giorni di distanza esprimono una qualche attività collaterale contro il Ragno rosso.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 1008 Ministero della Sanità del 18 - 1 - 1973
E/1

MODALITA' D'IMPIEGO

Versare la dosa occorrente in poca acqua indi portare a volume aggiungendo l'acqua rimanente. L'aggiunta di Etaldyn (gr. 50-100 per hl.) assicura una bagnatura perfetta delle parti trattate.

Frutticoltura: Contro Oidio e Mal bianco del melo, pero, pesco ed albicocco: gr. 80-120 per hl. di acqua.

Viticoltura: Oidio della vite: gr. 80-120 per hl. di acqua. Particolarmente indicato per le uve da tavola per evitare la rugginosità degli acini.

Oidio delle colture orticole:
— Melone, cocomero, cetriolo, zuccheno, gr. 45-90 per hl. d'acqua;
— carciofo, fragola, sedano, carota, finocchio, cardo, pisello, fagiolo, fagiolino, melanzana, peperone, pomodoro: gr. 60-100 per hl. d'acqua.

Oidio delle colture floreali e ornamentali in pieno campo: gr. 60 per hl. d'acqua.

Per le rose in serra gr. 50-60 per hl. d'acqua.

Oidio del tabacco: gr. 60-80 per hl. d'acqua. Il **KARATHANE PB** non conferisce nessun gusto particolare al tabacco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica ed alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri), con Promecarb, Carbo-Fenothion, Dimeton-Metile, Triclorfon, Olii minerali (estivi ed invernali), T.M.T.D., con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacryl.

Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura non deve essere miscelato con Parathion.

E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, Zolfo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Durante la stagione calda, utilizzare il **KARATHANE PB** solo alle dosi minime e nelle prime ore del mattino e della sera. Non impiegare il **KARATHANE PB**:
— quando la temperatura supera i 32°C;
— durante la fioritura.

Sul melo, nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura, usare il Parathion separatamente da **KARATHANE PB.**

Su cultivar di uve sensibili quale Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

Deve essere impiegato a distanza di tre settimane dalla distribuzione di olii minerali e di qualunque formulato emulsionabile.

NOCIVITA'

E' tossico per acari ed insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto sulle cucurbitacee e 20 giorni prima sulle altre colture.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

1028

Elocron

Carbammato insetticida in polvere bagnabile per uso agricolo

Composizione
100 g di prodotto contengono:
30 g dioxacarb (2-(1,3 dioxolan-2-yl)-fenil-N-metil-carbammato) tecnico al 95% di purezza pari a g 28,5 di dioxacarb puro
q.b. a 100 g coformulanti

I CLASSE

VELENO

CIBA - GEIGY S.p.A., Origgio (Va)
Officina di produzione:
SIIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1028 del ...2.10.1972
® marchio registrato

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego, usate tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni mediche
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo

Sintomi di intossicazione
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio - lavaggio cutaneo se vi fu contatto - atropia (2 mg ogni quarto d'ora per via endomuscolare fino a comparsa di fenomeni di atropinizzazione) - ossigenoterapia se vi è cianosi - PAM (g 0,50 ogni 3 ore per via endovenosa) o similari.

Elocron agisce per contatto e per ingestione contro gli insetti parassiti delle piante coltivate.

Indicazioni - Dorifora della patata, afidi (compreso Myzus persicae), carpocapsa, tignole della vite ed altre larve di lepidotteri.

Dosi d'impiego - 180-260 g in 100 litri di acqua nella generalità dei casi e per i trattamenti ad alto volume.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto è miscibile con i più comuni insetticidi ed anticrittogamici ad eccezione di quelli a carattere spiccatamente alcalino. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego e se adoperato secondo le predette istruzioni il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg 1 / Kg 10

1032

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

GUTENE

Insetticida, acaricida per la lotta contro Carpocapsa, afidi, acari, tignole, psille, minatori, tortricidi. Raccomandato sulle varietà sensibili alla rugginosità come la Golden Delicious

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 28 Azinphos-metile tecnico (purezza 88-90%) pari a gr. 24,6-25,2 di prodotto puro.
Sostanze diluenti e disperdenti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE

— **Avvelenamento acuto per ingestione inalazione e contatto cutaneo**
— **Sintomi d'intossicazione:**
Scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

— **Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:**

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 per ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni:
Morfina, oppiacei, Teofillina, Aminofillina.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. N. 1032 Ministero Sanità del . . 9.2.73. . . . . .

PRINCIPALI IMPIEGHI

Si impiega alla dose di gr. 150-200/hl.

IN FRUTTICOLTURA: contro carpocapsa, cydia molesta, afidi, acari, minatori, psille, oplocampe, tortricidi, orgya, cocciniglie (generazioni estive).

IN VITICOLTURA: contro tignola, acari, sigaraio.

IN ORTICOLTURA: contro acari, afidi, dorifora.

IN AGRUMICOLTURA: contro acari, afidi, tripidi.

IN OLIVICOLTURA: contro tripidi, tignola.

IN FLORICOLTURA: contro acari, tripidi, larve di lepidotteri.

IN BIETICOLTURA: contro pegomia, afidi, altiche, cleono.

MODALITA' D'IMPIEGO

Versare la dose di **GUTENE** in un recipiente e aggiungere lentamente un volume di acqua uguale. Agitare in modo da ottenere una pasta omogenea indi continuare a versare acqua per ottenere una poltiglia concentrata: poi versare nell'irroratrice e portare a volume.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI».

COMPATIBILITA'

Il **GUTENE** è miscibile con Cuprothex Super blu, Dithane M 45, Maneb 80, Delfithex, Dithane Z 78, Kelthane, Vericuivre Micronisé.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api, gli animali domestici, i pesci, i volatili da cortile, la selvaggina ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1033

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

METILON 20

A BASE DI METIL-PARATHION

Insetticida polivalente a base di Metil-Parathion contro insetti ed apparato boccale masticatore e succhiatore. Agisce per ingestione, contatto ed asfissia.

Composizione: Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Metilparathion tecnico (purezza minima 95%) corrispondente a gr. 19 minimo di prodotto attivo puro.
Sostanze emulsionanti coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 1033 Ministero Sanità del . 17.3.73. . . . .

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Scialiorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispena, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per adulti e mg 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni:
Morfina, Vitamina B 1, Coramina, Latte e grassi.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN FRUTTICOLTURA: contro Psilla, Carpocapsa, Cydia molesta, Lepidotteri Minatori, Antonomo, Tingidi, Cocciniglie, Eriofide del pesco, Afidi in genere, Tentredini, Mosca della frutta, Cocciniglia di S. Josè, Diaspis Pentagona (generazioni estive), Zeuzera, Cossus.

IN VITICOLTURA: contro Piralide, Tignola dell'uva, Altica della vite, Ragno giallo (Tetranychus, Telarius), Cocciniglia Cotonosa, Pseudococco.

IN OLIVICOLTURA: contro le Tignole, il Cotonello, il Rinchite, la Cocciniglia, il Fleotribo (tarlo), la Cimice.

IN AGRUMICOLTURA: contro gli Afidi, le Cocciniglie, lo Pseudococco, la Mosca della frutta, i Tripidi, le Tignole, la Cicalina.

IN ORTICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI: contro Afidi, Tripidi, Altiche delle crocifere, Meligete del Colza, Coleotteri fillofagi.

IN FLORICOLTURA: contro Afidi, Tripidi, Mosche bianche, Bega del garofano.

Dosi: gr. 200-300 per hl. di acqua.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il METILON 20 può essere versato direttamente nel quantitativo di acqua necessario avendo cura di agitare bene durante la preparazione.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITA'

Il METILON 20 è miscibile con tutti gli anticrittogamici e insetticidi della nostra gamma di produzione: non è compatibile con la Poltiglia Bordolese e Solfocalcica e Arseniati di calce e zinco.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api, gli animali domestici, i pesci, i volatili, la selvaggina ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1035

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

TORTRIN

Insetticida agricolo
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 Carbaryl puro. Assente beta-naftolo.
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Intossicazione grave per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).**

— **Sintomi d'intossicazione:**
Nausea - vomito - diarrea - scialorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno - Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini - Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive - Ossigenoterapia se vi è cianosi.

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

Dose: gr. 150-250 per 100 litri di acqua.
In Frutticoltura: Contro la Carpocapsa del melo e del pero, le Tortrici del melo (Capua, Cacoecia), l'Antonomo, la Cecidomia delle foglie del pero, la Cydia del pesco, la Campa del mandorlo, il verme delle susine e delle albicocche, l'Antonomo e il verme del lampone, il verme delle noci, Tentredini, Falene e tignole varie; limita lo sviluppo delle minatrici delle foglie, degli afidi e delle psille.
In Viticoltura: Contro le tignole dell'uva, il sigaraio, la piralide e le cicaline della vite.
In Orticoltura: Contro la Dorifora della patata, altiche, nottue, cavolaie, piralidi, la tignola del porro, la depressaria e idroecia del carciofo e numerosi altri insetti degli ortaggi.
Colture industriali: Contro la tignola dell'aglio, le casside, altiche, nottue, lixus e Cleono della barbatietola; il fitonomo, apion, miaurino e sputacchine della medica e del trifoglio; antonomo, verme rosa e cicaline del cotone.
In Floricoltura in campo: Contro la bega del garofano, afidi e tentredini delle rose, tripidi e cetonie.
In Olivicoltura: Contro la tignola dell'olivo, la cocciniglia Mezzograno di pepe.
In Agrumicoltura: Contro le tignole degli agrumi, la piralide, la cocciniglia Mezzograno di pepe.
In Pioppicoltura: Contro la crisomela e gli insetti defogliatori dei pioppeti.
In Selvicoltura: Contro la limantria e gli insetti defogliatori.

NORME PER L'USO

Stemperare la dose occorrente di prodotto in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi la quantità di acqua necessaria per ottenere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il TORTRIN è generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma. Non miscelare il prodotto con i polisolfuri o con poltiglia bordolese alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Sul melo (soltanto su quello) non impiegare il prodotto per 30 gg. dopo la fioritura.

NOCIVITA'

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura essendo il prodotto molto tossico per le api.
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci, il bestiame e gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 1035 Ministero della Sanità del 22/2/73

E/1

1037

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

TORTRIN CREMA

Insetticida agricolo
Crema emulsionante per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 Carbaryl puro. Assente beta-naftolo.
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Avvelenamento acuto per ingestione e contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).**

— **Sintomi d'intossicazione:**

Nausea - vomito - diarrea - scialorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno - Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini - Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive - Ossigenoterapia se vi è cianosi.

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

Dose: gr. 150-250 per 100 litri di acqua.

In Frutticoltura: Contro la Carpocapsa del melo e del pero, le Tortrici del melo (Capua, Cacoecia), l'Antonomo, la Cecidomia delle foglie del pero, la Cydia del pesco, la Campa del mandorlo, il verme delle susine e delle albicocche, l'Antonomo e il verme del lampone, il verme delle noci, Tentredini, Falene e tignole varie; limita lo sviluppo delle minatrici delle foglie, degli afidi e delle psille.

In Viticoltura: Contro le tignole dell'uva, il sigaraio, la piralide e le cicaline della vite.

In Orticoltura: Contro la Dorifora della patata, altiche, nottue, cavolaie, piralidi, la tignola del porro, la depressaria e idroecia del carciofo e numerosi altri insetti degli ortaggi.

Colture industriali: Contro la tignola dell'aglio, le casside, altiche, nottue, lixus e Cleono della barbabietola; il fitonomo, apion, miaurino e sputacchine della medica e del trifoglio; antonomo, verme rosa e cicaline del cotone.

In Floricoltura in campo: Contro la bega del garofano, afidi e tentredini delle rose, tripidi e cotonie.

In Olivicoltura: Contro la tignola dell'olivo, la cocciniglia Mezzograno di pepe.

In Agrumicoltura: Contro le tignole degli agrumi, la piralide, la cocciniglia Mezzograno di pepe.

In Pioppicoltura: Contro la crisomela e gli insetti defogliatori dei pioppeti.

In selvicoltura: Contro la limantria e gli insetti defogliatori.

NORME PER L'USO

Stemperare la dose occorrente di prodotto in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi la quantità di acqua necessaria per ottenere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **TORTRIN CREMA** è generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma. Non miscelare il prodotto con polisolfuri o con poltiglia bordolese alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Sul melo (soltanto su quello) non impiegare il prodotto per 30 gg. dopo la fioritura.

NOCIVITA'

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura essendo il prodotto molto tossico per le api.

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci, il bestiame e gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 1037 Ministero della Sanità del 22/2/73

E/1

1039

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

DELFOS M 20

A BASE DI METIL-PARATHION

Insetticida polivalente a base di Metil-Parathion contro insetti ed apparato boccale masticatore e succhiatore. Agisce per ingestione, contatto ed asfissia.

Composizione: Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Metilparathion tecnico (purezza minima 95%) corrispondente a gr. 19 minimo di prodotto attivo puro.
Sostanze emulsionanti coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Ravit

Reg. N. 1039 Ministero Sanità del .12.3.73. . . . .

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Scialiorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispena, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per adulti e mg 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni:
Morfina, oppiacei, Teofillina, Aminofillina.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN FRUTTICOLTURA: contro Psilla, Carpocapsa, Cydia molesta, Lepidotteri Minatori, Antonomo, Tingidi, Cocciniglie, Eriofide del pesco, Afidi in genere, Tentredini, Mosca della frutta, Cocciniglia di S. Josè, Diaspis Pentagona (generazioni estive), Zeuzera, Cossus.

IN VITICOLTURA: contro Piralide, Tignola dell'uva, Altica della vite, Ragno giallo (Tetranychus, Telarius), Cocciniglia Cotonosa, Pseudococco.

IN OLIVICOLTURA: contro le Tignole, il Cotonello, il Rinchite, la Cocciniglia, il Fleotribo (tarlo), la Cimice.

IN AGRUMICOLTURA: contro gli Afidi, le Cocciniglie, lo Pseudococco, la Mosca della frutta, i Tripidi, le Tignole, la Cicalina.

IN ORTICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI: contro Afidi, Tripidi, Altiche delle crocifere, Meligete del Colza, Coleotteri fillofagi.

IN FLORICOLTURA: contro Afidi, Tripidi, Mosche bianche, Bega del garofano.

Dosi: gr. 200-300 per hl. di acqua.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il **DELFOS M 20** può essere versato direttamente nel quantitativo di acqua necessario avendo cura di agitare bene durante la preparazione.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITA'

Il **DELFOS M 20** è miscibile con tutti gli anticrittogamici e insetticidi della nostra gamma di produzione: non è compatibile con la Poltiglia Bordolese e Solfocalcica e Arseniati di calce e zinco.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api, gli animali domestici, i pesci, i volatili, la selvaggina ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1080

Composizione: Gr. 100 di prodotto contengono: Gr. 50 di Linuron puro (da prodotto tecnico purezza 98%). Sostanze inerti e disperdenti quanto basta a 100

ZEALAN

Diserbante selettivo in polvere bagnabile per uso agricolo

III Classe Tossicologica

REG. N. 1080 MINISTERO SANITA' DEL 13-12-1972

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini od agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

— *In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

Lo ZEALAN è un erbicida che, distribuito uniformemente sul terreno, agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in fase di germinazione e per assorbimento fogliare sulle infestanti nelle primissime fasi di sviluppo.
L'azione erbicida dello ZEALAN può persistere fino a 3 mesi dal trattamento in condizioni favorevoli di stagione e di terreno.
Viene successivamente degradato nel suolo e non lascia quindi residui tossici per le colture successive.

ERBE COMBATTUTE

In base alle nostre attuali conoscenze, ed in condizioni pedo-climatiche normali (terreno di medio impasto, sufficientemente umido, ben lavorato e sminuzzato allo strato superficiale, in ambiente mediamente piovoso) lo ZEALAN combatte: Giavone, Setaria, Amaranto, Digitaria, Farinello, Persicaria, Erba porcellana, Camomilla, Veronica, Senape, Mercorella, Galinsoga, Coda di Volpe, Borsa Pastore, Morella, Erba Paperina, Piantaggine, Falso Convolvolo, Euforbia.
Lo ZEALAN, alle dosi selettive per le colture, non combatte le erbe perennanti ad apparato radicale bulboso, profondo e rizomatoso tipo: Convolvolo, Sorghum Halepense, Gramigna, Cipollino, Cardo Campestre, Equiseto, Soffione.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

CAROTE:
Pre-emergenza: dalla semina fino a 2-3 giorni prima della nascita della coltura:
— terreni sciolti: kg. 1,5 per ha
— terreni medio-impasto: kg. 2 per ha
— terreni pesanti-argillosi: kg. 2,5 per ha
Post-emergenza: da quando le carote hanno 2-4 foglie e le infestazioni sono allo stato di plantula:
— per ogni tipo di terreno kg. 1,5-2 per ha
a seconda dello sviluppo più o meno avanzato delle infestanti.

PREZZEMOLO:
Pre-emergenza: dalla semina fino a 2-3 giorni prima della nascita della coltura:
— terreni sciolti: kg. 1,5 per ha
— terreni medio-impasto: kg. 2 per ha
— terreni pesanti-argillosi: kg. 2,5 per ha

SEDANO-FINOCCHIO:
Pre-emergenza: dalla semina fino a 2-3 giorni prima della nascita della coltura:
— terreni sciolti: kg. 1,5 per ha
— terreni medio-impasto: kg. 2 per ha
— terreni pesanti-argillosi: kg. 2,5 per ha
Post-trapianto: dopo che la coltura ha superato la crisi del trapianto:
— terreni sciolti: kg. 1 per ha
— terreni medio-pesanti: kg. 2 per ha

PATATA:
Pre-emergenza: subito dopo il collocamento a dimora dei tuberi o successivamente, ma prima della nascita della patata:
— terreni sciolti: kg. 1,5 per ha
— terreni medio-impasto: kg. 2 per ha
— terreni pesanti-argillosi: kg. 2,5-3 per ha

MAIS:
In post-emergenza del mais e delle infestanti (mais 40-50 cm. di altezza - infestanti cm. 15 di altezza) alla dose di kg. 4 per ettaro + Bagnante Adesivo L/2 alla dose di gr. 20-30 per hl. d'acqua. Per evitare danni alla coltura di mais, dirigere scrupolosamente il getto della irroratrice sulle piante infestanti, **evitando di colpire le piante di mais**, applicando alla barra irroratrice opportuni schermi protettori.
Per raggiungere questi stadi di sviluppo del mais e delle infestanti indicati per il trattamento, potrebbe presentarsi la necessità di distruggere, mediante un'erpicatura o fresatura, le nascite precoci d'infestanti. Tale tecnica favorirebbe contemporaneamente la crescita del mais.

PISELLO:
In pre-emergenza, alla dose di kg. 1,5-2 per ettaro.
Poiché alcune varietà di pisello, in particolari condizioni ambientali potrebbero risultare sensibili all'azione del prodotto, è indispensabile eseguire saggi varietali prima dell'applicazione di campo.

CARCIOFO:
Eseguire il trattamento prima della ripresa vegetativa dei carducci, alla dose di kg. 1,5-2 per ettaro.
Occorre che il trattamento venga effettuato su terreno lavorato, ben sminuzzato e ripulito da erbe, facendo seguire immediatamente dopo un'irrigazione.

PORRO: (trapiantato)
Eseguire il trattamento circa 15 giorni dopo il trapianto, alla dose di kg 1 per ettaro; non superare tale dose. Le piante dovranno essere sane ed aver ben superato la crisi di trapianto.

ARGINI RISAIA:
Eseguire il trattamento dal momento della sistemazione dell'argine e quando le infestanti hanno raggiunto un'altezza di 10 cm. Dose: gr. 40 per 100 mq. con un quantitativo di acqua di lt 10 (kg. 4 per ettaro con 1.000 litri di acqua)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.
— Evitare superdosaggi e sovrapposizioni durante i trattamenti.
— Nei terreni trattati con ZEALAN si consiglia di non seminare altre colture (al di fuori di quelle per le quali è consigliato il trattamento) se non sono passati, a seconda delle dosi, da due a tre mesi dall'applicazione del prodotto.

NOCIVITA'

— Alle dosi raccomandate il prodotto non è tossico per le api, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
— Nel corso del trattamenti, si consiglia tenere lontani dalle zone persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZE:

— Eseguire il diserbo in giornate poco ventilate.
— Preparare accuratamente il letto di semina.
— Seminare uniformemente e il più profondo possibile in relazione alla specie coltivata.
— Negli impieghi di pre-emergenza non irrorare su terreno secco nello strato superficiale.
— Irrorare unicamente colture asciutte e ad investimento e sviluppo regolari.
— E' necessario che i serbatoi delle irroratrici siano muniti di agitatore affinché, durante l'esecuzione del trattamento, la poltiglia sia costantemente agitata per evitare sedimentazione di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice.
— Evitare di effettuare trattamenti in terreni decisamente sabbiosi ed in quelli ricchi di scheletro.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

• IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI •

DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

1085

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA

'ZOLFO WP' 2

(Micronizzato)

Anti-crittogamico in polvere idrosospensabile a base di zolfo micronizzato per trattamenti contro malattie fungine su vite, melo, pero, colture ortive e floreali, colture erbacee ed arboree in genere. Specifico per la lotta contro l'oidio (mal bianco).

COMPOSIZIONE

Zolfo puro (esente da selenio) . . . . g 80
Bagnanti, adesivanti, coadiuvanti, disperdenti . . q.b. a g 100

CLASSE IV

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

COLTURA	PARASSITA	Dose per 100 lt. d'acqua
Vite	Oido (mal bianco)	g 200-400
Pomacee (pero e melo)	Ticchiolatura Oidio (mal bianco)	g 500-600 (1) g 200-300 (2)
Drupacee (pesco, albicocco)	Oidio (mal bianco)	g 200-300 (2)
Colture ortive (pomodoro, peperone, melanzana, pisello, carciofo, carota, finocchio)	Oidio (mal bianco)	g 200-300
Colture arboree (nocciolo, quercia)	Oidio (mal bianco)	g 300-500
Colture erbacee Fragola Tabacco Frumento	Oidio (mal bianco)	 g 400-500 g 300-400 kg 5-6/ha

(1) In pre fioritura
(2) In post fioritura

Queste dosi sono indicative e pertanto possono essore anche sensibilmente variate a seconda delle condizioni ambientali generali e della gravità degli attacchi parassitari.

Nelle zone normalmente asciutte e calde e comunque con temperature elevate (oltre i 25°C) si consiglia di usare le dosi più basse.

Contro Oidii particolarmente resistenti si ottengono risultati più duraturi ed efficaci aggiungendo 50-70 gr di Agral ogni 100 litri di poltiglia di ZOLFO WP 2 (micronizzato).

MODALITA' DI IMPIEGO

Versare la necessaria quantità di Zolfo WP 2 (micronizzato) in un recipiente idoneo, indi aggiungere una piccola quantità di acqua e mescolare bene fino ad ottenere una poltiglia omogenea.

Diluire poi tale poltiglia con la rimanente quantità di acqua, sempre mescolando, sino ad ottenere la concentrazione voluta.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, captan, DDVP, binapacryl, diclofluanide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del captan.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Evitare di applicare ZOLFO WP 2 nelle ore calde e soleggiate.
Può essere fitotossico per curcurbitacee e vite Sangiovese.

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di **mele:** Blak Ben Davis, Blak Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap e di **pere:** Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione: AGRINDUSTRIA - S. Cipriano Po (PV)
Registrazione Ministero della Sanità n. 1085 del 12-3-1973
'ZOLFO WP' Trade Mark - ICI Solplant S.p.A

DA NON VENDERSI SFUSO

1089

Polvere bagnabile
Diserbante selettivo
del frumento a largo spettro
di azione per trattamenti
di post-emergenza.

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
31 g GS 14260 tecnico
(= terbutrina), purezza 96% pari a g 28 di 2-terz-butilammino-4-etilammino-6-metil-tio-s-triazina pura e g 2 di altre triazine erbicide
25,3 g MCPA sale sodico tecnico, purezza 90% pari a g 20 di acido equivalente puro

Classe III
Attenzione:
manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (Va)
Officina di produzione:
SILIA, Aprilia (LT)
Registrazione Ministero della Sanità n. 1089
del 2.10.72
® marchio depositato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni mediche
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione da MCPA
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, fibrillazione ventricolare, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Abbondante lavaggio gastrico e ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni
È sconsigliata la digitale.

Caratteristiche
Controlla sia le più comuni infestanti a foglia larga, quali Camomilla, Stellaria, Veronica, Capsella, Cerastium, Papavero, Geranium, Veccia, Sinapis, Raphanus, Bifora, sia alcune infestanti graminacee provenienti da seme e non controllate dai diserbanti gialli ed ormonici, quali Alopecurus m., Poa annua, Poa trivialis.
Agren controlla pure alcune malerbe perennanti, quali Romice, Cirsium e Convolvolo.

Modalità d'impiego
Agren si impiega in post-emergenza alla fine dell'inverno (febbraio-marzo), quando il frumento ha già emesso la quarta foglia ed inizia ed è in corso la fase di accestimento. In caso di necessità, il trattamento può essere effettuato ancora all'inizio della levata.
Le infestanti sono maggiormente sensibili nei primi stadi di sviluppo; in particolare, al momento del trattamento le infestanti graminacee non devono avere superato i 3-4 cm di altezza (cioè 1-3 foglie).

Dosi d'impiego
Kg 2,5-3,5/ha in 500-1000 litri di acqua, secondo l'epoca di impiego e lo sviluppo delle infestanti, riservando le dosi più elevate quando le infestanti sono più sviluppate.
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità - Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari, mentre è possibile la miscela con concimi fogliari misti (tipo Greenzit).

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego e se utilizzato secondo le predette istruzioni, il prodotto non è fitotossico. Occasionali sintomi di sofferenza delle colture hanno carattere transitorio e non recano alcun pregiudizio alla produzione. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e floreali in genere (per la presenza dell'MCPA).

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni, è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

1093

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

AZIFENE PB

Insetticida, acaricida per la lotta contro Carpocapsa, afidi, acari, tignole, psille, minatori. tortricidi. Raccomandato sulle varietà sensibili alla rugginosità come la Golden Delicious

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 28 Azinphos-metile tecnico (purezza 88-90%) pari a gr. 24,6-25,2 di prodotto puro.
Sostanze diluenti e disperdenti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Nen operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE

— Avvelenamento acuto per ingestione inalazione e contatto cutaneo
— Sintomi d'intossicazione:
Scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 per ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni:
Morfina, oppiacei, Teofillina, Aminofillina.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 1093 Ministero Sanità del . 9.2.73 . . . . . .

PRINCIPALI IMPIEGHI

Si impiega alla dose di gr. 150-200/hl.

IN FRUTTICOLTURA: contro carpocapsa, cydia molesta, afidi, acari, minatori, psille, oplocampe, tortricidi, orgya, cocciniglie (generazioni estive).

IN VITICOLTURA: contro tignola, acari, sigaraio.

IN ORTICOLTURA: contro acari, afidi, dorifora.

IN AGRUMICOLTURA: contro acari, afidi, tripidi.

IN OLIVICOLTURA: contro tripidi, tignola.

IN FLORICOLTURA: contro acari, tripidi, larve di lepidotteri.

IN BIETICOLTURA: contro pegomia, afidi, altiche, cleono.

MODALITA' D'IMPIEGO

Versare la dose di **AZIFENE PB** in un recipiente e aggiungere lentamente un volume di acqua uguale. Agitare in modo da ottenere una pasta omogenea indi continuare a versare acqua per ottenere una poltiglia concentrata: poi versare nell'irroratrice e portare a volume.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI».

COMPATIBILITA'

L'**AZIFENE PB** è miscibile con R6, Dithane M/45, Manesan, Meltisan, Veravit, M 555, Kelthane, Curtian 65, Benlate.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api, gli animali domestici, i pesci, i volatili da cortile, la selvaggina ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1094

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

TORTRIN 85

Insetticida agricolo

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 85 Carbaryl puro. (Assente beta-naftolo).
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere innocue dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

— Sintomi d'intossicazione:

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

— Consigli terapeutici:

Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini.
Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 1094 Ministero della Sanità del 22-2-73

E/1

Il **TORTRIN 85** è un insetticida ad alto titolo, efficace contro insetti dannosi alle piante coltivate, è dotato di alta persistenza di azione.

PRNCIPALI IMPIEGHI E DOSI

Il **TORTRIN 85** si impiega alla dose di gr 120-150 per hl.

In Frutticoltura: Contro la Carpocapsa del melo e del pero, le Tortrici del melo (Capua, Cacoecia) l'Antonomo, la Cecidomia delle foglie del pero, la Cydia del pesco, la Campa del mandorlo, il verme delle susine e delle albicocche, l'Antonomo e il verme del lampone, il verme delle noci, Tentredini, Falene e tignole varie; limita lo sviluppo delle minatrici delle foglie, degli afidi e delle psille.

In Viticoltura: Contro le tignole dell'uva, il sigaraio, la piralide e le cicaline della vite

In Orticoltura: Contro la Dorifora della patata, altiche, nottue, cavolaie, piralidi, la tignola del porro, la depressaria e idroecia del carciofo.

Colture Industriali: Contro la tignola dell'aglio, le casside, altiche, nottue, lixus e Cleono della barbabietola; il fitonomo, apion, misurino e sputacchine della medica e del trifoglio, antonomo, verme rosa e cicaline del cotone.

In Floricoltura in campo: Contro la bega del garofano, afidi e tentredini delle rose, tripidi e cetonie.

In Olivicoltura. Contro la tignola dell'olivo, la cocciniglia Mezzograno di pepe.

In Agrumicoltura: Contro le tignole degli agrumi, la piralide, la cocciniglia Mezzograno di pepe

In Pioppicoltura: Contro la crisomela e gli insetti defogliatori dei pioppeti.

In Selvicoltura: Contro la limantria e gli insetti defogliatori.

Stemperare la dose occorrente di prodotto in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi la quantità di acqua necessaria per ottenere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con le poltiglie alcaline (poltiglia bordolese, borgognona e solfocalcica).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Sul melo (soltanto su quello) non impiegare il prodotto per 30 gg. dopo la fioritura.

NOCIVITA'

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura essendo il prodotto molto tossico per le api.

Il prodotto è tossico per gli animali domestici i pesci, il bestiame e gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1096

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

HERBIDAL MAIS S

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Disorbante selettivo per la coltura del mais, efficace contro le infestanti dannose comprese setaria e digitaria. Disorbante totale degli argini di risaia.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 25 Atrazina pura (purezza 98-99%) pari a gr. 25,51-25,25 di prodotto tecnico.
Gr. 37,5 Simazina pura (purezza 98-99%) pari a gr. 38,26-37,88 di prodotto tecnico.
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'HERBIDAL MAIS S agisce sulle infestanti per contatto e soprattutto per assorbimento radicale. La sua azione è favorita e resa più immediata da un giusto grado di umidità del terreno o da opportune irrigazioni nei casi di prolungata siccità.
L'HERBIDAL MAIS S è attivo contro le principali infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali: giavoni ed altre graminacee (setaria, digitaria sanguinalis) amaranti, farinaccio, persicaria, poa, ortica, erba porcellana, stellaria, capsella, erba morella, geranio, mercurella, veronica, piantaggine, matricaria.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO

Per il diserbo selettivo del mais: il trattamento va effettuato in primavera, in pre-emergenza della coltura, alla dose di Kg. 4 di HERBIDAL MAIS S per ha., distribuiti con 400-1000 litri di acqua per ettaro.
Per il diserbo totale degli argini delle risaie: Kg. 6-8 di HERBIDAL MAIS S per ettaro, pari a gr. 300-400 sciolti in litri 100 di acqua, irrorati su 500 metri quadrati di superficie.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare l'HERBIDAL MAIS S in poca acqua, versare la poltiglia nel serbatoio dell'irroratrice e indi aggiungere l'acqua occorrente agitando energicamente.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Per il diserbio del mais impiegare comuni irroratrici a pressione costante munite di agitatore meccanico: il liquido erbicida deve essere sempre ben agitato per evitare depositi.
Stabilire con esattezza il volume di acqua da distribuire che non deve mai essere inferiore a lt. 400 per ettaro, per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona penetrazione dell'erbicida nel terreno.

Eseguire le applicazioni in preferenza su terreno già umido o che potrà ricevere la necessaria acqua da pioggie o irrigazioni.
Il trattamento può anche effettuarsi localizzato sulle file di semina per una larghezza di cm. 30 riducendo di 1/3 la dose di prodotto. Tale trattamento potrà farsi in terreni non soggetti a forti inerbimenti.
Prima del trattamento di HERBIDAL MAIS S, per ottenere buoni risultati erbicidi, occorrerà che il terreno sia ben preparato e non zolloso.
Le eventuali sarchiature meccaniche per la rimozione della crosta superficiale del terreno non dovranno superare i 4-5 cm. di profondità per conservare l'effetto erbicida residuo.
Tale effetto residuo si protrae per tutto il periodo del ciclo colturale del mais, qualora non si intervenga con rincalzature.
I trattamenti estivi su mais di secondo raccolto possono effettuarsi solo se la successiva coltura di frumento si distanzia di 5-6 mesi, per consentire l'estinzione dell'effetto erbicida residuo. **Tali trattamenti estivi sono pertanto consentiti soltanto quando il terreno viene investito ad altra coltura soltanto nella primavera successiva.** La scarsità o il ritardo di pioggia richiede in misura maggiore, nel periodo estivo, l'ausilio delle irrigazioni per ottenere il miglior effetto erbicida.
L'umidificazione del terreno è determinante perché l'erbicida possa essere assorbito dalle radici delle infestanti e quindi esplicare la sua azione: **per cui, se non si verificano pioggie entro le due settimane seguenti, il trattamento**, occorre intervenire con **opportune e tempestive irrigazioni.**

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ».

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

I terreni coltivati a mais trattati con HERBIDAL MAIS S non consentono la consociazione concolture ortive, da foraggio od arboree (legumi, crucifere, pioppi).
Non impiegare mai dosi di HERBIDAL MAIS S superiori a quelle consigliate che potrebbero compromettere colture in rotazione.

NOCIVITA'

Il prodotto è relativamente tossico per gli insetti utili e per i pesci. Non è pericoloso per gli animali domestici e per il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

AVVERTENZE

Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive a mais occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Da impiegare in colture specializzate.

L'efficacia dell'HERBIDAL MAIS S è ridotta dalla presenza di sostanza organica in quantità molto elevata: non è consigliabile trattare su terreni torbosi.
Evitare passaggi ripetuti della irroratrice su porzioni di terreno. Lavorare il terreno con aratura profonda (30-35 cm.) all'epoca della raccolta del mais, prima di far seguire le colture di avvicendamento.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1096 Ministero Sanità del . 9.2.1973 . . . .

1101

DACONIL® 2787 CIBA—GEIGY

Polvere bagnabile

Anticrittogamico a largo spettro di azione contro varie malattie fungine delle piante da frutto, vite, colture orticole, piante ornamentali e da fiore e per la concia dei cereali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
75 g clorotalonil puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE IV

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
DACONIL 2787 CIBA-GEIGY è un fungicida a largo spettro di azione che consente di combattere contemporaneamente diverse malattie delle piante coltivate.
È dotato di azione residua e di resistenza al dilavamento che assicurano un'efficace protezione delle piante anche nelle condizioni più sfavorevoli.

Indicazioni
DACONIL 2787 CIBA-GEIGY è indicato contro:
peronospora: vite, patata, pomodoro, lattuga, piante da fiore, cipolla, spinacio
muffa grigia: vite, fragola, piante ornamentali
ticchiolatura: melo, pero
ruggine: fagiolo, fava, piante da fiore
alternariosi e septoriosi: pero, cavolo, carota, cetriolo, meloni, zucchine, patata, pomodoro, sedano, ornamentali
cladosporiosi: pesco, pomodoro, cetriolo, meloni, ornamentali
bolla: pesco
vaiolatura: pesco
antracnosi: pomodoro, peperone, fagiolo, meloni, cetriolo, patata, ornamentali
marciume dei frutti: melo, pero, pesco
moniliosi: pesco, albicocco, susino, mandorlo, ciliegio
cancro dei rami: pero, pesco, melo
rizottoniosi: barbabietola, carota
trattamento pre-raccolta per conservazione: mele, pere, pesche, albicocche, susine, ciliegie

Dosi d'impiego
150-250 g in 100 litri di acqua.

Concia cereali:
frumento, orzo: 100 g/100 Kg di seme
riso (come conciante disalgante): 500-600 g/100 Kg di seme

Epoca e modalità d'impiego
Usare il prodotto a scopo preventivo. Bagnare bene le colture da proteggere e ripetere i trattamenti ad ogni necessità e cioè a seconda del calendario di incubazione delle malattie.
L'aggiunta di un buon bagnante è in genere consigliabile e specie sulle piante difficilmente bagnabili.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri e olii minerali). La miscela con antiparassitari liquidi è possibile solo dopo averne accertato la compatibilità. «**Avvertenza**» In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
In particolari condizioni può provocare fenomeni di rugginosità su varietà di melo del gruppo Golden e su altre a buccia rossa.
Sulle colture da fiore più delicate, eseguire saggi preliminari su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SARIAF, Faenza (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1101 del 8.11.1972
® marchio registrato della Diamond Shamrock

1121

Primatol® 3588

Erbicida per il diserbo degli argini delle risaie e per il diserbo totale di aie, strade, canali, aree industriali, incolti in genere e fossi aziendali.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
24 g terbutilazina pura
23,5 g secbumeton puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A. - Origgio (Va)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero Sanità n. 1121 del 9-11-1972
® marchio depositato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi d'intossicazione *(non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.*

Consigli terapeutici. *Data la non specificità dei sintomi, la terapia è sintomatica.*

Caratteristiche
È un erbicida non selettivo che agisce per assorbimento radicale e per assorbimento fogliare. Ha un largo spettro di attività che comprende sia infestanti annuali, mono e dicotiledoni, sia molte infestanti perennanti. La sua persistenza d'azione è direttamente proporzionale alle dosi d'impiego.

Epoca del trattamento
Le applicazioni migliori con PRIMATOL 3588 risultano quelle effettuate a fine inverno in pre-emergenza delle infestanti, prima delle piogge primaverili; è tuttavia possibile eseguire trattamenti al massimo in post-emergenza delle infestanti purché queste non siano troppo sviluppate.

Dosi e modalità d'impiego
Diserbo degli argini delle risaie
Kg 5 - 7/ha contro le infestanti annuali

Diserbo totale
Kg 10 - 20/ha contro le infestanti annuali
Kg 30 - 50/ha contro le infestanti perennanti ad apparato radicale profondo

La quantità di acqua in cui diluire la dose stabilita varia in rapporto al tipo di superficie da trattare e cioè:
— su terreno nudo: da 500 a 1000 litri per ettaro
— su terreno con cotica erbosa: da 2 a 3000 litri o più di acqua per ettaro, in rapporto allo strato di cotica erbosa (secca o in vegetazione), presente al momento del trattamento.

Avvertenza
Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali colture successive occorre un intervallo di almeno 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto può essere utilizzato in miscela estemporanea con altri erbicidi. La miscibilità, tuttavia, deve essere accertata con prove preliminari. « Avvertenza ». In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità - Il prodotto è fitotossico per le colture.

Sospendere i trattamenti al massimo alla post-emergenza delle infestanti

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi previsti; ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg

1122

Gardoprim® M 50

Erbicida per
- il diserbo selettivo della vite, pero, melo, agrumi, ribes, rose ed asparago - solo in colture specializzate
- il diserbo degli argini delle risaie
- il diserbo totale di aie, bordi stradali, fossi aziendali, canali, aree industriali ed incolti in genere

Composizione

100 g di prodotto contengono:
52 g GS 13529 tecnico, purezza minima 96%, pari a g 50 di 2-terz.butilammino-4-cloro-6-etilammino-s-triazina puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A. - *ORIGGIO (Va)*
Officina di produzione: *SIIIA, Aprilia (LT)*
Registrazione Ministero della Sanità n. 1122 del 27.11.72
® marchio depositato

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

Sintomi d'intossicazione *(non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.*

Consigli terapeutici. *Data la non specificità dei sintomi, la terapia è sintomatica.*

Caratteristiche
Agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Il prodotto è poco solubile in acqua (8,5 ppm) e pertanto resta localizzato negli strati superficiali del suolo. Ha un largo spettro di azione che comprende la maggior parte delle infestanti annuali, mono e dicotiledoni e, come erbicida di pre-emergenza, anche alcune infestanti perennanti. La persistenza di azione del prodotto è direttamente proporzionale alle dosi d'impiego.

Dosi e modalità d'impiego
Diserbo selettivo contro infestanti annuali della vite, agrumi, melo e pero solo in colture specializzate

Impianti giovani (1 - 3 anni)	Kg 2 - 3/ha
Impianti adulti (oltre 3 anni)	Kg 5 - 8/ha
Ribes e Rose	
Impianti di almeno 3 anni	Kg 2 - 3/ha
Diserbo dell'asparago	Kg 3 - 5/ha
Diserbo degli argini delle risaie	Kg 4 - 5/ha

In tutti i casi il trattamento si effettua in pre-emergenza o al massimo in post-emergenza precoce delle infestanti.
Per l'applicazione del prodotto si utilizza una quantità di acqua sufficiente per assicurare un'uniforme distribuzione.

Diserbo totale
Kg 10 - 20/ha in 700 - 1000 litri di acqua contro le infestanti annuali
Kg 30 - 50/ha in 700 - 1000 litri di acqua contro le infestanti perennanti più resistenti (come Convolvolo)

I trattamenti vanno eseguiti prima o durante il periodo di maggiore piovosità in pre-emergenza o al massimo in post-emergenza precoce delle infestanti.
La quantità di prodotto varia a secondo il tipo di infestazione e della persistenza di azione richiesta.

Avvertenze
Da impiegare solo su colture specializzate e cioè in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Risciacquare le irroratrici e i recipienti utilizzati prima di destinarli ad altri trattamenti.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. « Avvertenza » - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego e se utilizzato secondo le predette istruzioni, il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti al massimo alla post-emergenza delle infestanti

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg 1
Kg 10
Kg 25

1131

Primatol® M 50

Diserbante totale per aie, strade, argini, canali, aree industriali ed incolti in genere

Composizione

100 g di prodotto contengono:
52 g GS 13529 tecnico, purezza minima 96%, pari a g 50 di 2-terz.butilammino-4-cloro-6-etilammino-s-triazina puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A. - ORIGGIO (VA)
Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)
Registrazione Ministero della Sanità n. 1131 del 9.1.72
® marchio depositato

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

Sintomi d'intossicazione *(non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.*

Consigli terapeutici. *Data la non specificità dei sintomi, la terapia è sintomatica.*

Caratteristiche

Agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Il prodotto è poco solubile in acqua (8,5 ppm) e pertanto resta localizzato negli strati superficiali del suolo. Ha un largo spettro di azione che comprende la maggior parte delle infestanti annuali, mono e dicotiledoni e, come erbicida di pre-emergenza, anche alcune infestanti perennanti.
La persistenza di azione del prodotto è direttamente proporzionale alle dosi d'impiego.

Epoca del trattamento

Date le caratteristiche del prodotto, le applicazioni vanno effettuate a fine inverno, prima o durante i periodi di maggiore piovosità, quando le infestanti non sono ancora emerse o sono nei primi stadi di sviluppo.

Dosi e modalità d'impiego

Kg 10 - 20/ha in 700 - 1000 litri di acqua contro le infestanti annuali
Kg 30 - 50/ha in 700 - 1000 litri di acqua contro le infestanti perennanti ad apparato radicale profondo
La quantità di prodotto varia a secondo il tipo di infestazione e della persistenza di azione richiesta.

Avvertenze

Se al trattamento erbicida segue la semina di colture sensibili occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (per es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto può essere usato in miscela estemporanea con altri erbicidi. La miscibilità, tuttavia, deve essere accertata con prove preliminari. « Avvertenza » - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - Il prodotto è fitotossico per le colture.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente per gli usi previsti; ogni altro impiego è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg 1
Kg 10
Kg 25

1138

Gesaprim® combi liquido

Diserbante di **pre-emergenza** selettivo per il Mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
23,5 g **Terbutrina** (= GS 14260) tecnica al 94% minimo di 2-terz. butilammino-4-etilammino-6-metiltio-s-triazina, pari a g 22 di prodotto puro
23,5 g **Atrazina** tecnica al 92% minimo di 2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-s-triazina, pari a g 21,6 di prodotto puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III

Attenzione:
manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (Va)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)
Registrazione Ministero della Sanità n. 1138 del 25.6.73
® marchio registrato

Caratteristiche
GESAPRIM COMBI Liquido agisce essenzialmente per via radicale e combatte efficacemente le più dannose infestanti graminacee e dicotiledoni provenienti da seme a germinazione primaverile-estiva, fra cui principalmente i Giavoni, gli Amaranti, il Farinaccio, le Persicarie, le Poe, l'Ortica, l'Erba Porcellana, le Stellarie, la Borsa Pastore, l'Erba Morella, i Gerani, la Mercurella, le Veroniche, le Matricarie.
Il prodotto controlla anche alcune infestanti graminacee talora resistenti alla sola atrazina, quali Panicum dichotomiflorum, Digitaria, Setaria.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi d'impiego
Kg 4-5 in 600-1000 litri di acqua per ettaro, nella generalità dei casi
Kg 7-8 in 600-1000 litri di acqua per ettaro, in presenza di Panicum dichotomiflorum.
Adottare il dosaggio più basso nei terreni sciolti e di medio impasto, il più alto nei terreni compatti e ricchi di sostanza organica.
Il prodotto si impiega solo in pre-emergenza ossia subito dopo la semina.

Avvertenze
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per le altre colture (es. bietole, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Applicare il GESAPRIM COMBI Liquido su terreni ben preparati, sminuzzati e possibilmente rullati dopo la semina. Curare la uniformità della distribuzione. Evitare l'impiego di acque luride, sia per l'irrigazione che per la preparazione delle miscele. In terreni torbosi e comunque molto ricchi di humus, si esclude l'impiego del GESAPRIM COMBI Liquido.
Risciacquare le irroratrici ed i recipienti utilizzati, prima di destinarli ad altri trattamenti.
Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari.

Fitotossicità. In condizioni normali di ambiente e di impiego e se utilizzato secondo le predette istruzioni, il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività. Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente in pre-emergenza ossia subito dopo la semina del mais.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Lt 1
Lt 5
Lt 10

1139

Gesaprim® combi 80

Polvere bagnabile
Diserbante selettivo di **pre - emergenza** per la coltura del Mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
40 g di Atrazina tecnica, purezza minima 92%, pari ad almeno g 36,8 di atrazina pura (2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-s-triazina)
40 g Terbutrina (= GS 14260) tecnica, purezza minima 94%, pari ad almeno g 37,6 di terbutrina pura (2-terz. butilammino-4-etilammino-6-metiltio-s-triazina)
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., *ORIGGIO (Va)*
Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*
Registrazione Ministero della Sanità n. 1139 del 12.12.72
® marchio depositato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

Caratteristiche
GESAPRIM COMBI 80 agisce essenzialmente per via radicale e combatte efficacemente le più dannose infestanti graminacee e dicotiledoni provenienti da seme a germinazione primaverile-estiva.
Il prodotto controlla anche alcune infestanti graminacee talora resistenti alla sola atrazina, quali Panicum dichotomiflorum, Digitaria, Setaria.

Dosi e modalità d'impiego
Il prodotto si impiega solo in pre-emergenza ossia subito dopo la semina secondo le normali modalità applicative.

Dosi d'impiego
Kg 3 in 600-1000 litri di acqua per ettaro, nella generalità dei casi
Kg 4,5-5 in 600-1000 litri di acqua per ettaro, in presenza di Panicum dichotomiflorum.

Avvertenze
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Risciacquare le irroratrici e i recipienti utilizzati, prima di destinarli ad altri trattamenti.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego e se utilizzato secondo le predette istruzioni, il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente in pre-emergenza ossia subito dopo la semina del Mais.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg 1
Kg 5
Kg 10

1140

GS 14260 WP 50

Polvere bagnabile

Diserbante selettivo per le colture di frumento, mais, pisello, girasole, fava e patata

Composizione

100 g di prodotto contengono:
50 g di Terbutrin tecnico (= GS 14260) al 95% minimo di 2-terz. butilammino-4-etilammino-6-metil-tio-s-triazina, pari a g 47,5 di prodotto puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A. - ORIGGIO (VA)

Officina di produzione: SILIA, APRILIA (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1140 del 25.1.73

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il **GS 14260 WP 50** agisce per assorbimento radicale e fogliare controllando sia le più comuni infestanti annuali a foglia larga, sia le più diffuse infestanti graminacee provenienti da seme.

Dosi e modalità d'impiego
Frumento
pre-emergenza (ossia subito dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura), contro Papavero, Camomilla, Ranuncoli, Stellaria, Capsella, Cerastium, Geranium, Alopecurus m., Poa annua, Poa trivialis (da seme), Lolium.
GS 14260 WP 50 Kg 2-3,5/ha a secondo la natura del terreno
post-emergenza (dallo stadio di 4 foglie all'accestimento della coltura), contro tutte le infestanti prima menzionate, purchè in fase iniziale di sviluppo (2-3 foglie) e contro Veronica e Bifora.
GS 14260 WP 50 Kg 2/ha
post-emergenza (dallo stadio di 4 foglie fino al termine dell'accestimento), contro una infestazione mista che comprende sia tutte le infestanti prima citate sia altre quali Galeopsis, Canapa selvatica, Rafano, Veccia, Senape, Polygonum c., Centaurea, nonchè alcune infestanti perennanti quali Cirsium, Convolvolo, Romice.
GS 14260 WP 50 Kg 1,5 + MCPA (a.e. 25%) Kg 3/ha

Mais
(Solo in miscela con Gesaprim). Si impiega solo in pre-emergenza (ossia subito dopo la semina)
GS 14260 WP 50 Kg 2 + **Gesaprim** Kg 2/ha
contro le più comuni infestanti del Mais, compreso Digitaria e Setaria
GS 14260 WP 50 Kg 3 + **Gesaprim** Kg 3/ha, in presenza di Panicum dichotomiflorum.

Pisello
Kg 1,5-3/ha solo in pre-emergenza (ossia subito dopo la semina)

Girasole e Fava
Kg 2-3/ha solo in pre-emergenza (ossia subito dopo la semina)

Patata
Kg 3/ha solo in pre-emergenza (ossia subito dopo la semina)

In tutti i casi, per la distribuzione del prodotto si utilizza un quantitativo di acqua variabile da 500 a 1000 litri per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Oltre agli erbicidi del gruppo delle triazine e del gruppo degli ormonici, già menzionati in etichetta, il prodotto è miscibile con altri erbicidi quali FANERON (bromofenoxim) e derivati dell'urea (es. DICURAN). Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari, mentre è possibile la miscela con concimi fogliari misti (es. Greenzit). **Avvertenze** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - Il prodotto può risultare fitotossico nei seguenti casi:
— sui terreni sabbiosi, ghiaiosi ed in quelli normalmente soggetti a ristagni d'acqua
— sui grani duri coltivati nelle regioni cerealicole dell'Italia del Nord.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nei trattamenti in post-emergenza (solo frumento) sospendere i trattamenti almeno 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg 1
Kg. 5
Kg 10

1159

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

RO-NEET*

Erbicida selettivo di pre-semina per barbabietola e spinacio. Emulsionabile per trattamenti liquidi.

* Marchio registrato dalla Stauffer Chemical Co. - New York

72,7

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. [illegible] di Solfoetil cicloesiletiltiocarbammato puro (purezza 98%) pari a gr. 73,47 di prodotto tecnico.
Conformulanti quanto basta a 100.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. N. 1159 Ministero Sanità del . 28.2.74. . . . .

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

IL RO-NEET è un erbicida selettivo di pre-semina della barbabietola e dello spinacio, con incorporamento.
Il prodotto, una volta incorporato nel suolo, agisce contro le malerbe, principalmente nella fase di germinazione, rispettando la coltura.
Controlla una vasta gamma di infestanti graminacee ed a foglia larga quali: Lolium spp., Echinochloa spp. (Giavone), Digitaria spp., Avena selvatica, Solanum spp., Chenopodium album, Portulaca oleracea, Amaranthus retroflexus, Capsella bursa pastoris.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il RO-NEET s'impiega in pre-semina della coltura, immediatamente dopo il trattamento (entro 30 minuti), con incorporazione mediante erpice o altra attrezzatura idonea a portare il prodotto ad una profondità di cm. 5-8 e le dosi variano in funzione del tipo di terreno sul quale si opera:
- su terreni leggeri e sabbiosi . . . . 5 lt/Ha
- su terreni argillosi o ricchi di sostanza organica . . . 7 lt/Ha

Per ottenere dal trattamento i migliori risultati suggeriamo:
1) distribuire il RO-NEET sul terreno in tempera, ben livellato, sminuzzato e privo di malerbe, con 3,5-9 quintali di acqua per ettaro, erogandolo ad una pressione non superiore alle 5 atmosfere;
2) incorporare il prodotto al terreno impiegando erpici a dischi, a denti oppure zappe rotanti.
Se l'operazione viene eseguita con erpici, è consigliabile effettuare due passaggi, possibilmente a croce, nei terreni pesanti, mentre nei terreni leggeri è sufficiente un solo passaggio, al quale si può farne seguire un secondo molto superficiale.
3) La semina della barbabietola o dello spinacio può immediatamente seguire l'incorporamento. L'emergenza delle colture viene favorita effettuando dopo la semina una rullatura del terreno.
4) Dopo il trattamento, nel corso della coltura, eventuali lavorazioni del terreno dovranno essere leggere, senza mai superare la profondità d'incorporamento del diserbante.

Preparazione della miscela:
Aggiungere la dose voluta di RO-NEET in poca acqua.
Agitare energicamente e ottenuta l'emulsione, portare a volume.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'

Il RO-NEET va impiegato solo. Non può essere quindi applicato in miscela con fertilizzanti, insetticidi ed anticrittogamici.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi normalmente consigliate, il prodotto non è tossico per le colture utili.

NOCIVITA'

Il prodotto non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e per il bestiame.
Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

AVVERTENZE

La coltivazione della carota non può seguire quella della barbabietola e dello spinacio nella normale rotazione.

Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto. Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle precedenti istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1164

ERBICIDA MONSANTO

Diserbante in polvere bagnabile per cipolla, aglio, porro, cavolo, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo cappuccio, rutabaga, ravanello, bulbose da fiore.

Caratteristiche: il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in fase di germinazione.
Il prodotto è selettivo per le colture ortive e floreali sopra indicate e distrugge invece la maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme, quali Amaranto, Giavone, Galinsoga, Stellaria, Poa, Portulaca, Setaria, Senecio, Veronica, Papavero, Ortica, Canapa selvatica, Viola, Spergola, Erba Morella, Falsa Ortica, Anagallide. Mediamente sensibili sono invece alcune poligonacee (Centinodia, Persicaria, Chenopodio, Capsella, Camomilla, Cicerbita, Euforbia, Trifoglio).
Resistenti sono la Fumaria, Convolvolo e tutte le infestanti perenni quali Gramigna, Cipero, Vilucchio, Stoppione.
La persistenza di azione del prodotto è di circa 6-8 settimane.
Il prodotto successivamente viene degradato nel suolo senza lasciare residui tossici per le colture successive.

COMPOSIZIONE

– Propachlor puro	g 65
– Coadiuvanti ed Inerti: quanto basta a	g 100

(R) Marchio registrato MONSANTO

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM–Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 1164 del 25.6.1973 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in pre-emergenza ed in post-emergenza.
Perchè i trattamenti possano dare buoni risultati è necessario, se si opera su terreno asciutto, che una pioggia di 10-15 mm. cada entro 8-10 giorni dal diserbo; in caso contrario si deve provvedere ad una irrigazione superficiale.

- **Trattamenti in pre-emergenza:** su tutte le colture indicate intervenendo subito dopo la semina od al massimo 1-2 giorni dopo.
- **Trattamenti in post-trapianto:** su cipolla e altre colture indicate intervenendo dopo il superamento della crisi di trapianto, ma prima della nascita delle infestanti.

Le dosi di impiego variano in funzione della natura del terreno e precisamente:

- **nei terreni sciolti e sabbiosi** Kg. 6/ha
- **nei terreni di medio impasto** Kg. 7/ha
- **nei terreni pesanti o argillosi** Kg. 8/ha

Per allargare lo spettro di azione del prodotto nei confronti delle infestanti e per avere nel contempo un'efficacia erbicida pronta e duratura, impiegare l'associazione di Kg. 4 di RAMROD con Kg. 8 di CEPTAL.
Diluire il prodotto in 500-600 o più litri di acqua e distribuire uniformemente la poltiglia su tutta la superficie del campo con le comuni irroratrici a mano o meccaniche.

Preparazione della poltiglia: stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua agitando energicamente; durante il trattamento tenere in costante agitazione la poltiglia.
Avvertenze: impiegare il prodotto solo per il diserbo delle colture seminate o trapiantate in autunno-inverno ed inizio della primavera, cioè quando la temperatura è bassa; in estate o durante la stagione calda, la termolabilità del prodotto porta ad una riduzione sensibile della persistenza.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : il prodotto è miscibile con altri erbicidi (per es. CEPTAL) onde allargarne lo spettro di azione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità : evitare che il prodotto venga a contatto con le colture non indicate in etichetta, per le quali il prodotto non è selettivo.
Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

1174

Polvere bagnabile

Diserbante selettivo per le colture di frumento, mais, pisello, girasole, fava e patata

Composizione

100 g di prodotto contengono:
52 g di terbutrina tecnica, purezza 96 %, pari a g 49 di terbutrina pura (2-terz. butilammino-4-etilammino-6-metil-tio-s-triazina) e g 1 di altre triazine erbicide
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A. - ORIGGIO (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1174 del 17.4.74

® marchio depositato

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la mapinolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Igran 50 agisce essenzialmente per assorbimento radicale e controlla sia le più comuni infestanti annuali a foglia larga, sia le più diffuse infestanti graminacee provenienti da seme.

Dosi e modalità d'impiego

Frumento

pre-emergenza (ossia subito dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura), contro Papavero, Camomilla, Ranuncoli, Stellaria, Capsella, Cerastium, Geranium, Alopecurus m., Poa annua, Poa trivialis (da seme), Lolium.
Igran 50 Kg 2-3,5/ha a secondo la natura del terreno

post-emergenza (alla fine dell'inverno, dopo lo stadio di 3-4 foglie della coltura), contro tutte le infestanti prima menzionate, purchè in fase iniziale di sviluppo (2-3 foglie) e contro Veronica e Bifora.
Igran 50 Kg 2/ha

post-emergenza (dalle prime fasi di accestimento della coltura fino all'inizio della levata), contro una infestazione mista che comprende sia tutte le infestanti prima citate, sia altre, quali Galeopsis, Canapa selvatica, Rafano, Veccia, Senape, Polygonum c., Centaurea, nonchè alcune infestanti perennanti, quali Cirsium, Convolvolo, Romice.
Igran 50 Kg 1,5 + MCPA (a.e. 25 %) Kg 3/ha.

Mais

(Solo in miscela con Gesaprim). Si impiega solo in pre-emergenza (ossia subito dopo la semina).
Igran 50 Kg 2 + Gesaprim Kg 2
per ettaro contro le più comuni infestanti del Mais, compreso Digitaria e Setaria
Igran 50 Kg 3 + Gesaprim Kg 3
per ettaro in presenza di Panicum dichotomiflorum.

Pisello

Kg 1,5-3/ha, solo in pre-emergenza (ossia subito dopo la semina)

Girasole e Fava

Kg 2-3/ha, solo in pre-emergenza (ossia subito dopo la semina)

Patata

Kg 3/ha, solo in pre-emergenza (ossia subito dopo la semina)
In tutti i casi per la distribuzione del prodotto si utilizza un quantitativo di acqua variabile da 500 a 1000 litri per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Non è prevista la miscela con altri prodotti oltre quelli già menzionati. Il prodotto, tuttavia, è miscibile con altri erbicidi quali FANERON (bromophenoxim) e derivati dell'urea (es. DICURAN).

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - Il prodotto può risultare fitotossico nei seguenti casi:
— sui terreni sabbiosi, ghiaiosi ed in quelli normalmente soggetti a ristagni d'acqua
— sui grani duri coltivati nelle regioni cerealicole dell'Italia del Nord.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nei trattamenti di post-emergenza (solo frumento) sospendere i trattamenti almeno 60 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg 1
Kg 5
Kg 10

1178

Starox

Erbicida ormonico per il diserbo selettivo del frumento e di altri cereali

Composizione
100 g di prodotto contengono:
25 g MCPA (acido equivalente) da sale sodico e ammonico
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione: SIPCAM, Salerano s/Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1178 del 15-2-1973

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni
È sconsigliata la digitale.

Caratteristiche
Ha attività erbicida contro le più comuni infestanti a foglia larga, mentre non possiede attività erbicida contro le infestanti graminacee.

Dosi e modalità d'impiego

Diserbo del frumento
Kg 3-4 in 400-600 litri di acqua per ettaro in relazione alla temperatura ambiente ed al grado di sviluppo delle infestanti. Il trattamento si effettua nel periodo compreso tra la fine dell'accestimento e l'inizio della fase di botticella del frumento.
In presenza di infestanti miste cioè sia d'infestanti graminacee quali Alopecurus, Poa che di infestanti a foglia larga comprese le perennanti, quali Romice, Cirsium e Convolvolo è consigliata la seguente miscela:

STAROX Kg 2-3 + IGRAN Kg 1,5 in 400-600 litri di acqua per ettaro.

Il trattamento si effettua in post-emergenza, alla fine dell'inverno, quando il frumento ha già messo la 4ª foglia ed inizia o è in corso la fase di accestimento.

Diserbo dell'avena e dell'orzo
Kg 3-4 in 400-600 litri di acqua per ettaro.
Il trattamento si effettua nel periodo compreso tra la fine dell'accestimento e l'inizio della fase di botticella.

Compatibilità: Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. « Avvertenza ». In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può danneggiare colture sensibili adiacenti, quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Rischi di nocività: Il prodotto, a seguito dei trattamenti, è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO It

1209

SANDIT

**Anticrittogamico organico, di colore blu,
a base di etilenbisditiocarbamato di zinco (zineb)**

Composizione

gr. 80 di zineb (etilenbisditiocarbamato di zinco) puro (da p.a. tecnico al 91 %)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico

- Sintomi di intossicazione
  L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose può provocare irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
  In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
- Controindicazioni
  Alcool, oli e grassi.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Pomacee	Ticchiolatura	0,15-0,2 % = gr. 150-200
Garofano	Ruggini	0,15-0,25% = gr. 150-250
Pomodoro (fino alla prima fioritura)	Peronospora	0,15-0,25% = gr. 150-250
Viticoltura	Peronospora	0,15-0,25% = gr. 150-250

Intervenire secondo le necessità dettate dall'ambiente stagionale e dalla biologia dei parassiti, attenendosi ai calendari dei trattamenti suggeriti in zona. Le dosi più elevate si consigliano solo in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle crittogame citate.

Per la preparazione della poltiglia: versare la quantità necessaria di SANDIT nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume con l'acqua mancante, sempre agitando.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità

Il SANDIT è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ; è incompatibile con la poltiglia solfo-calcica, il permanganato di potassio.

Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio SANDIT + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di SANDIT da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del SANDIT con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di SANDIT, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Si deve evitare di trattare le varietà di pero sensibili allo zineb, quali Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi e Zucchermanna.

Su pomodori è bene evitare trattamenti con SANDIT miscelato a concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 1209 del 3-8-1973 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg.

1212

Dalapon

Erbicida sistemico per la lotta contro le infestanti graminacee annuali e peremi.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
85 g Dalapon puro

CLASSE IV

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1212 del 26-3-1973

DALAPON è un erbicida sistemico ad assorbimento fogliare e radicale. Viene principalmente assorbito per via fogliare e traslocato alle radici ed ai rizomi.
DALAPON è dotato di un'attività specifica nei confronti di tutte le graminacee infestanti annuali e perennanti.

IMPIEGO E DOSI
Diserbo di aree non coltivate (aree industriali, bordi stradali, scarpate ferroviarie, reti di recinzioni, impianti sportivi).

Diserbo di canali, fossi, laghi.

Dosi d'impiego
Kg 30/ha contro l'infestante Arundo donax (Canna gargana).
Kg 20/ha contro Phragmites communis (Canna di palude) ed altre graminacee.
Effettuare il trattamento durante il periodo di maggiore attività vegetativa delle piante infestanti. Contro la canna di palude, in particolare, l'epoca migliore per il trattamento coincide con l'inizio della fioritura. Ripetere il trattamento su eventuali ricacci.
Le dosi indicate vanno diluite in un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una completa bagnatura delle infestanti; per piante alte circa un metro occorrono circa 2.000 litri per ettaro.
È consigliabile l'aggiunta di un buon bagnante (Etravon) o di olio minerale (Vaissol).

Diserbo di aree coltivate (trattamento di rimonda)
Il trattamento di rimonda consiste nella eliminazione delle graminacee infestanti (es. gramigna, cannarecchia o sorgo alepense) presenti sul terreni destinati alla semina di colture erbacee o all'impianto di frutteti o vigneti.

Dose d'impiego: Kg 15-20 in 800-1000 litri di acqua per ettaro.
Effettuare il trattamento con le piante infestanti in pieno sviluppo ed eseguire una lavorazione del terreno dopo un mese. La semina o l'impianto devono essere effettuati dopo almeno 3 mesi dal trattamento.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con i diserbanti ormonici (es. 2,4 D), gli ureici, le triazine (es. Simazina) ed anzi le miscele sono consigliabili nel caso si voglia conseguire un diserbo totale e prolungato nel tempo.

« Avvertenza »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Da non applicare con mezzi aerei

Fitotossicità
Curare che a causa del vento non si verifichi trasporto dell'erbicida nelle zone adiacenti coltivate. Risciacquare diligentemente le irroratrici ed i recipienti utilizzati, prima di destinarli ad altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi indicati; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO   Kg

1233

Caragard® 3775

Polvere bagnabile

Erbicida per:

il diserbo selettivo della vite, pero, melo, olivo e agrumi - solo in colture specializzate

il diserbo degli argini delle risaie

il diserbo totale di aie, bordi stradali, fossi aziendali, canali, aree industriali ed incolte in genere

Composizione
100 g di prodotto contengono:
34,3 g GS 13529 tecnico al 96% di purezza, pari a g 31,3 di 2-terz. butilammino-4-cloro-6-etilammino-s-triazina pura e g 1,7 di altre triazine erbicide
17,7 g GS 14259 tecnico al 96% di purezza, pari a g 16,1 di 2-terz. butilammino-4-etilammino-6-metossi-s-triazina pura e g 0,9 di altre triazine erbicide
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A. - *ORIGGIO (VA)*

Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*
Registrazione Ministero Sanità n. 1233 del 28.7.73
® marchio depositato

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

Sintomi d'intossicazione *(non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.*

Consigli terapeutici. *Data la non specificità dei sintomi, la terapia è sintomatica.*

Caratteristiche
Il Caragard controlla la grande maggioranza delle infestanti annuali, mono e dicotiledoni, provenienti da seme e molte infestanti perennanti, quali: Stoppione **(Cirsium)**, Romice, Gramigne **(Agropyron, Cynodon)**, Convolvolo, Artemisia.

Dosi d'impiego
Diserbo selettivo (vite, pero, melo, olivo, agrumi)
kg 7/ha in 500 - 1000 litri di acqua contro le infestanti annuali nei terreni leggeri
kg 10/ha in 500 - 1000 litri di acqua contro le infestanti annuali nei terreni pesanti
kg 15/ha in 1000 - 2000 litri di acqua contro le infestanti perennanti nei terreni leggeri
kg 20/ha in 1000 - 2000 litri di acqua contro le infestanti perennanti nei terreni pesanti

Diserbo degli argini delle risaie
kg 5-7/ha in 500 - 1000 litri di acqua contro le infestanti annuali

Diserbo totale
kg 20/ha in 500 - 1000 litri di acqua contro le infestanti annuali
kg 40-50/ha in 1000 - 2000 litri di acqua contro le infestanti perennanti

Il trattamento per irrorazione si effettua in pre-emergenza o, al massimo, in post-emergenza precoce delle infestanti, cioè più comunemente alla fine dell'inverno o all'inizio della primavera.
Nel diserbo della vite e delle piante da frutto, il trattamento può effettuarsi anche nel periodo autunnale (prima del riposo vegetativo delle infestanti perenni). Nel diserbo totale, il trattamento può effettuarsi anche in post-emergenza delle infestanti (sia in autunno che in primavera), purché queste non siano molto sviluppate, ma in tal caso bisogna utilizzare un quantitativo di acqua 2 o 3 volte superiore a quello indicato e ciò in rapporto allo spessore dello strato di cotica erbosa presente al momento del trattamento.

Avvertenze
Da impiegare solo in colture specializzate, cioè in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Da non impiegarsi con mezzi aerei

Compatibilità - Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego e se utilizzato secondo le predette istruzioni, il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti al massimo alla post-emergenza delle infestanti

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

1247

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CICLONEX

Erbicida selettivo di pre-semina per barbabietola e spinacio. Emulsionabile per trattamenti liquidi.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 72,7 di Solfoetil cicloesiletiltiocarbammato puro (purezza 98%) pari a gr. 74,18 di prodotto tecnico.
Conformulanti quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 1247 Ministero Sanità del . 6.12.1973 . . .

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il CICLONEX è un erbicida selettivo di pre-semina della barbabietola e dello spinacio, con incorporamento.

Il prodotto, una volta incorporato nel suolo, agisce contro le malerbe, principalmente nella fase di germinazione, rispettando la coltura.

Controlla una vasta gamma di infestanti graminacee ed a foglia larga quali: Lolium spp., Echinochloa spp. (Giavone), Digitaria spp., Avena selvatica, Solanum spp., Chenopodium album, Portulaca oleracea, Amaranthus retroflexus, Capsella bursa pastoris.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il CICLONEX s'impiega in pre-semina della coltura, immediatamente dopo il trattamento (entro 30 minuti) con incorporazione mediante erpice o altra attrezzatura idonea a portare il prodotto ad una profondità di cm. 5-8 e le dosi variano in funzione del tipo di terreno sul quale si opera:

— su terreni leggeri e sabbiosi . . . . 6 lt/Ha
— su terreni argillosi o ricchi di sostanza organica . . . . 7 lt/Ha

Per ottenere dal trattamento i migliori risultati suggeriamo:

1) distribuire il CICLONEX sul terreno in tempera, ben livellato, sminuzzato e privo di malerbe, con 3,5-9 quintali di acqua per ettaro, erogandolo ad una pressione non superiore alle 5 atmosfere;
2) incorporare il prodotto al terreno impiegando erpici a dischi, a denti oppure zappe rotanti.
Se l'operazione viene eseguita con erpici, è consigliabile effettuare due passaggi, possibilmente a croce, nel terreni pesanti, mentre nel terreni leggeri, è sufficiente un solo passaggio, al quale si può farne seguire un secondo molto superficiale.
3) La semina della barbabietola o dello spinacio può immediatamente seguire l'incorporamento. L'emergenza delle colture viene favorita effettuando dopo la semina una rullatura del terreno.
4) Dopo il trattamento, nel corso della coltura, eventuali lavorazioni del terreno dovranno essere leggere, senza mai superare la profondità d'incorporamento del diserbante.

Preparazione della miscela:
Aggiungere la dose voluta di CICLONEX in poca acqua.
Agitare energicamente e ottenuta l'emulsione, portare a volume.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ».

COMPATIBILITA'

Il CICLONEX va impiegato solo. Non può essere quindi applicato in miscela con fertilizzanti, insetticidi ed anticrittogamici.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi normalmente consigliate, il prodotto non è tossico per le colture utili.

NOCIVITA'

Il prodotto non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e per il bestiame.
Nel corso del trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

AVVERTENZE

La coltivazione della carota non può seguire quella della barbabietola e dello spinacio nella normale rotazione.

Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto. Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1252

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

HERBINEX

Diserbante

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 di Diuron puro.
Ingredienti inerti q.b. a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'HERBINEX, a base di Diuron, è un erbicida che agisce per assorbimento radicale colpendo tanto le infestanti in via di germinazione quanto quelle in sviluppo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

DISERBI SELETTIVI

L'HERBINEX elimina erbe annuali ed alcune perennanti allo stadio di giovani piantine.

Dà buoni risultati se il terreno, prima del trattamento, è ben lavorato, senza zollosità e libero da erbe. Non lavorare il terreno dopo il trattamento.

Agendo per assorbimento radicale è necessario che dopo il trattamento, sia portato a contatto con le radici da un certo grado di umidità.

OLIVETI: effettuare il trattamento su terreno lavorato, pareggiato e ripulito da erbe nel mese di settembre con Kg. 4 di prodotto per ha. diluiti in 1000 lt. di acqua.

AGRUMETI: effettuare il trattamento con 2-3 Kg. per ha. nel periodo autunnale (ottobre-novembre) e ripeterlo nel periodo primaverile (marzo-aprile). Il terreno deve essere prima sistemato per l'irrigazione.

ASPARAGI: di nuovo e vecchio impianto. Dosi: Kg. 0,500 per ha. in terreni leggeri: Kg. 0,500-1 per ha. in terreni pesanti. Trattare sino a 60 gg. prima dell'inizio della raccolta.

ERBA MEDICA: su medicai di almeno 1 anno di impianto prima della ripresa vegetativa Kg. 1,500-2 per ha. in almeno 400 lt. di acqua. Non trattare terreni sabbiosi o leggeri.

RIBES: su piante di almeno un anno di età - Dosi: ottobre-novembre Kg. 2 per ha. per il controllo di erbe autunno-invernali. Primavera avanzata Kg. 2 per ha. per il controllo di erbe annuali estive (almeno 60 gg. prima dell'inizio del raccolto).

Gennaio-febbraio Kg. 3 per ha. per il controllo di erbe invernali ed estive. Meglio i trattamenti separati.

MENTA PIPERITA: Dosi: Kg. 2-3 per ha. In primavera subito dopo l'ultima lavorazione ma prima dell'emergenza della menta. Irrigare non oltre due settimane dal trattamento. Non trattare la menta già emersa o in terreni sabbiosi o leggeri.

DISERBI TOTALI

DISERBO ARGINI RISAIE: **effettuare il trattamento dal momento della sistemazione dell'argine o quando le infestanti hanno raggiunto l'altezza non superiore a 5 cm. Sia il terreno umido che la pioggia non pregiudicano la buona riuscita del trattamento.**

Dosi d'impiego: gr. 50 per 100 mq. con quantitavo di acqua di lt. 10 (Kg. 5 per ha. con 1000 lt. di acqua).

DISERBO TOTALE DI AREE NON COLTIVATE - Dosi: Kg. 20-60 per ha. con una quantità di acqua sufficiente ad assicurare una perfetta distribuzione del prodotto sul terreno. I migliori risultati si ottengono seguendo i trattamenti in primavera all'inizio della ripresa vegetativa o quando si prevede l'inzio di un periodo piovoso.

Contro alghe ed erbe acquatiche

Contro alghe, anche di tipo filamentoso e certi tipi di erbe acquatiche sommerse (Nayas, Potamogeton, Lemna, Utricularia, Chara) in acque non correnti dosi gr. 1,5-2,5 per metro cubo di acqua.

Eseguire il trattamento impiegando almeno 500 litri di acqua per ettaro, distribuiti uniformemente sulla superficie da disinfestare.

Attenzione: effettuare una distribuzione molto uniforme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare zone vicine a colture utili o zone interessate dalle loro radici o zone dalle quali il prodotto può essere portato a contatto con le radici stesse.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 1252 Ministero della Sanità del 28 - 2 - 1974

10/82

1267

ECATOX® GRANULI

CLASSE I

VELENO

Insetticida e nematocida a base di paratione

Composizione

gr. 5 di paratione (0,0-dietil 0-p-nitrofenil tiofosfato) puro (pari a gr. 5,1 di paratione tecnico al 98% di purezza minima); supporti quanto basta a gr. 100.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— evitare di respirarne i vapori;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
— durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli impiegati per il trattamento;
— rendere inutilizzabili, dopo l'uso, le confezioni che contenevano il prodotto sotterrandole in buche profonde, lontano da ruscelli e sorgenti e cospargendole con calce;
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni mediche

— **Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo;**
— **Sintomi di intossicazione**
Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore; iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Alcune controindicazioni

Morfina - vitamina B_1 - coramina - latte e grassi.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 1267 del 29.9.78 del Ministero della Sanità

Modalità di impiego Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi per ettaro
Mais	Piralide del mais (lasciare cadere il prodotto dall'alto, in modo che questo, scivolando sulle pagine superiori delle foglie, vada ad accumularsi alle ascelle delle foglie stesse)	kg. 30-40
Barbabietola da zucchero	Insetti terricoli (Grillotalpa, Elateridi, Maggiolini, Tipule, Agrotidi) (distribuire il prodotto subito prima della semina o alla semina, in strisce lungo la fila, interrandolo leggermente)	kg. 40-60
	Nematode del colletto (Ditylenchus dipsaci) (effettuare due distribuzioni, in strisce sulle file, la prima all'emergenza delle foglie cotiledonari e la seconda allo stadio delle 2-4 foglie vere)	kg. 30-40 per distribuzione
Patate, colture ortive	Insetti terricoli (Grillotalpa, Elateridi, Maggiolini, Tipule, Agrotidi) (distribuire il prodotto nei solchi subito prima della semina o del trapianto oppure alla semina o al trapianto, in modo che rimanga leggermente interrato).	kg 60-80

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Data la sua formulazione (granuli) non si consigliano miscele del prodotto con altri antiparassitari.

Fitotossicità

Sulle colture indicate e seguendo le modalità consigliate l'ECATOX GRANULI non è fitotossico.

Rischi per la fauna

Durante il trattamento e almeno per 20 giorni susseguenti lo stesso non introdurre animali domestici e di bassa corte nelle colture disinfestate. Il prodotto è pericoloso per la fauna selvatica, gli uccelli e i pesci.
Tenuto conto dei metodi e campi di impiego non sussistono pericoli per gli insetti utili; ad ogni modo evitare che granuli del formulato vadano a finire su colture in fiore, in quanto il paratione è tossico per le api.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg. 1-10-20-30

1321

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

LISATEX LIQUIDO

Attrattivo per la Mosca dell'olivo e la Mosca della frutta.

Composizione
Idrolizzato di proteine:
Grammi 3,8 - 4,8 Azoto totale (proveniente da glutammati e proteine)
Grammi 5-9 Cloruri (espressi in Na Cl)
Acqua quanto basta a 100.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. N. 1321 Ministero Sanità del . . 28.6.73. . . . .

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

N.B. - Seguire le norme e le informazioni mediche dei prodotti cui viene aggiunto.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il LISATEX LIQUIDO è un idrolizzato di proteine che ha la proprietà di attirare la Mosca dell'olivo e la Mosca della frutta.
Si impiega in miscela con l'insetticida.
Il suo principale vantaggio è quello di permettere di trattare soltanto una parte dell'oliveto o del frutteto: sia un filare su tre o quattro, sia una parte della chioma delle piante.
Ne consegue una economia di prodotto insetticida e di LISATEX LIQUIDO.

DOSI D'IMPIEGO

- Per trattamenti di un filare su tre o quattro: LISATEX LIQUIDO litri 2/ha + l'insetticida distribuito con 400 litri d'acqua.
- Per trattamenti localizzati a una parte della fronda di ciascun albero: LISATEX LIQUIDO cm³ 300-400 per ettolitro d'acqua + l'insetticida.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ».

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con gli antiparassitari della nostra gamma.

« **Avvertenza** »: miscelando il prodotto con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITA'

Il LISATEX LIQUIDO non è fitotossico alle dosi d'impiego consigliate.

NOCIVITA'

Dato l'uso che del prodotto si fa in miscela con altri antiparassitari, si consiglia tenere lontani dalle zone trattate persone non protette, animali domestici e bestiame.
Il LISATEX LIQUIDO non sporca i frutti, rispetta la fauna utile e non favorisce lo sviluppo della fumaggine.

I trattamenti dovranno essere sospesi rispettando l'intervallo fissato per il prodotto che viene miscelato al « LISATEX LIQUIDO ».

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1325

Maizina® L

Diserbante liquido selettivo per il controllo delle erbe infestanti nelle coltivazioni di mais.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti a foglia stretta ed a foglia larga **ed è selettivo per la coltura** del mais; non agisce invece nei confronti delle Setarie, della Digitaria, del Panicum dichotomiflorum e delle infestanti perenni ad apparato radicale profondo munito di rizomi, stoloni, bulbi e bulbilli (Gramigna, Sorghetta, Vilucchio). Il prodotto agisce per assorbimento radicale da parte dei semi delle infestanti in via di germinazione, mentre il mais decompone l'eventuale prodotto assorbito in metaboliti non tossici per la pianta; la MAIZINA L agisce anche parzialmente per assorbimento fogliare sulle plantule delle infestanti nella fase di germinello.

COMPOSIZIONE	
– Atrazina pura	g 40
– Coadiuvanti,coloranti,inerti quanto basta a	g 100

(R) Marchio registrato SIPCAM–Milano

SIPCAM–Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 1325 del 20.10.1973 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Effettuare la semina del mais su terreno perfettamente affinato nel quale non siano presenti zolle o zollette e possibilmente effettuare una rullatura; il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto; tale azione viene pure ridotta od annullata dallo spargimento di liquame. Il diserbo con MAIZINA L può essere eseguito nel periodo che va da subito dopo la semina alla nascita della coltura, od anche dopo la nascita purchè le infestanti non siano nate o si trovino nelle primissime fasi di sviluppo.

Il trattamento può essere fatto su tutta la superficie del campo oppure in forma localizzata lungo le file a fasce larghe 25-30 cm.; in questo caso si effettua la semina e contemporaneamente il diserbo con le seminatrici-diserbatrici; la dose normale di impiego del prodotto è di Kg. 4/Ha che vanno diluiti in 400-500 o più litri di acqua a seconda del tipo di irroratrice di cui si dispone; nei terreni leggeri e in condizione di buona umidità del terreno, la dose di impiego può essere ridotta a Kg. 3/Ha.

Perchè il prodotto possa esercitare in pieno la sua azione è necessario che entro 8-10 giorni dal trattamento cada una pioggia di almeno 10 mm. altrimenti si deve provvedere con irrigazioni superficiali.

Le eventuali sarchiature meccaniche o manuali che dovessero venire effettuate dopo il trattamento per rompere la crosta e per arieggiare il terreno debbono essere molto superficiali per evitare un eccessivo interramento del prodotto che ne ridurrebbe la persistenza. Nelle zone dove si teme la presenza di Giavone Americano (Panicum dichotomiflorum) Setaria e Digitaria, adottare l'associazione di Kg. 2 di MAIZINA L con lt. 3 di LASSO per Ha.

Il prodotto non agisce nei terreni torbosi essendo assorbito e degradato rapidamente. In detti terreni la MAIZINA L si può impiegare in post-emergenza da sola, se le infestanti sono molto piccole o meglio attivandola con 12-15 Kg/Ha di SIPCAMOL E se le malerbe sono un po' più sviluppate. Talvolta sono necessari due trattamenti per avere ragione delle malerbe. Non ricorrere all'attivazione con SIPCAMOL E quando la temperatura supera i 25°C e con elevate umidità dell'ambiente perchè potrebbero aversi rallentamenti e disturbi a carico del mais.

Preparazione della poltiglia: versare direttamente la quantità di prodotto stabilita nei serbatoi delle irroratrici facendo funzionare l'agitatore meccanico o idraulico.

Avvertenza: le coltivazioni di mais trattate con il prodotto non possono essere consociate ad altre colture per tutta la durata della stagione. Dopo la coltura del mais prima di seminare altre colture è necessario effettuare una lavorazione profonda.

Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive al mais occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco)

Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: la MAIZINA L si può miscelare con LASSO e con SIPCAMOL E, come sopra indicato

Nel caso di miscela fra MAIZINA L e LASSO e fra MAIZINA L e SIPCAMOL E, diluire la MAIZINA L nel totale quantitativo di acqua sempre agitando entro la pompa irroratrice; a parte diluire il LASSO od il SIPCAMOL E in poca acqua ed agitare bene; infine versare le miscele acquose del LASSO o del SIPCAMOL E nella totale quantità di acqua contenente la MAIZINA L.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.

Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

1329

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

GEOSTER

Soluzione fumigante per la disinfezione del terreno

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 32,7 metam-sodium puro (anidro)
Sostanze coadiuvanti ed emulsionanti quanto basta a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- — Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- — Conservare la confezione ben chiusa.
- — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- — Non operare contro vento.
- — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il **GEOSTER** è un fumigante raccomandato nel trattamento preventivo del terreno:
- — contro le crittogame parassite che vivono nel terreno quali: Fusarium, Verticillium, Pythium, Armillaria, Rizoctonia;
- — come erbicida contro le erbe infestanti annuali;
- — contro i Nematodi liberi quali: Pratylenchus;
- — contro gli insetti del terreno: ha azione secondaria su alcune loro forme.

Il **GEOSTER** è un fumigante del terreno a base di metilditiocarbammato di sodio. Iniettato allo stato liquido si decompone in un gas sterilizzante: il metilisotiocianato di sodio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati dal **GEOSTER** è consigliabile lavorare bene il terreno e mantenerlo in buone condizioni di umidità. Non applicarlo in terreno asciutto e costipato.
Temperatura del terreno: al momento dell'applicazione la temperatura del terreno ad una profondità di 25-30 cm. dovrebbe essere compresa tra i 14 e i 32° C.
Sostanza organica: il letame e la torba devono essere interrati almeno un mese prima del trattamento.

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

1) **Disinfezione di grandi superfici:** normalmente il **GEOSTER** viene distribuito mediante l'impianto di irrigazioni od un irroratore a spruzzo. La dose di **GEOSTER** deve essere prima diluita in acqua e distribuita nel modo più uniforme possibile sul terreno.

2) **Innaffiature:** su piccole superfici (semenzai, letti caldi) basta versare in un annaffiatoio a mano litri 1-2 di **GEOSTER**, riempirlo d'acqua (fino a 20-25 litri circa) agitare e quindi distribuire uniformemente su 10 mq. di superficie.

3) **Pompe irroratrici:** per superfici più ampie si usano le dosi necessarie di **GEOSTER** con tanta acqua, sufficiente per permettere una perfetta distribuzione (circa 40-50 litri di acqua per ogni litro di **GEOSTER**).

4) **Irrigazione:** in questo caso i volumi di acqua dovranno essere superiori per rendere uniforme la distribuzione (50-60 litri di acqua per litro di **GEOSTER**).

5) **Pali iniettori:** si useranno le consuete modalità di applicazione dei fumiganti, praticando le iniezioni a distanza di cm. 15 in quadrato.

6) **Macchine fumigatrici:** il **GEOSTER** si può anche distribuire allo stato puro mediante le apposite macchine fumigatrici applicate al motocoltivatore o al trattore. Poiché il prodotto ha una scarsa diffusione laterale, è bene, adottando tale sistema, tenere i cannelli distributori ad una distanza non superiore ai 15 cm. e per una profondità di 10 cm. Effettuata l'applicazione si deve irrigare superficialmente (cm. 2-3) il terreno allo scopo di evitare una troppo rapida dispersione del gas prodotti dal **GEOSTER**.

N.B. - Riteniamo tuttavia utile far rilevare che i fumiganti che contengono metilisotiocianato di sodio, o che in esso si trasformano, esplicano la loro azione nel modo migliore se distribuiti per innaffiatura o irrorazione. Infatti la caratteristica di questi prodotti è di diffondersi sotto forma di vapore, soprattutto verticalmente.

Il prodotto va somministrato 21 giorni prima della semina o del trapianto.

DOSI D'IMPIEGO

La dose normale d'impiego del **GEOSTER** è di 1000 Kg/ha. Tale dose dovrà essere portata a 1500-2000 kg/ha. nel caso si operi su terreni pesanti e infestati prevalentemente da verticillosi, fusariosi e fialoforosi.

Le dosi vanno variate anche in funzione delle temperature, per cui a temperature più basse è consigliabile adottare le dosi più elevate. Terminata la distribuzione del **GEOSTER** si eseguirà una lenta ed abbondante irrigazione in modo da far penetrare il fumigante alla profondità di 25-30 cm.

Nei terreni sabbiosi evitare una eccessiva distribuzione di acqua dopo il trattamento, che comporterebbe una perdita di prodotto per percolazione negli strati più profondi e nello stesso tempo una risalita tardiva del gas che potrebbe provocare dei fenomeni di fitotossicità nella coltura. In tali terreni può rendersi utile una rullatura del suolo.

Operazioni successive al trattamento.

Otto-dieci giorni dopo il trattamento (2 settimane se la temperatura è bassa), si deve effettuare una lavorazione veramente superficiale del terreno allo scopo di arieggiare lo stesso e favorire la dispersione del gas originatosi dal **GEOSTER**. Una lavorazione profonda in questo caso potrebbe infatti portare in superficie terreno non disinfettato compromettendo i risultati dell'operazione.

Dopo questa lavorazione attendere ancora 8-12 giorni, a seconda della temperatura dopo di che si può procedere alla semina o al trapianto. L'intervallo di tempo tra l'applicazione del prodotto e l'inizio della coltura può essere ridotto al minimo quando la stagione decorre calda e asciutta, e prolungato fino al massimo con andamento stagionale, freddo e piovoso.

Per l'applicazione in pieno campo il **GEOSTER**, che va sempre impiegato su terreni nudi, si può impiegare fino ad una distanza di almeno un metro da colture arboree o erbacee in atto.

In caso di trattamenti con temperature del terreno prossime a quella minima, è molto utile ricoprire immediatamente il terreno trattato, con un foglio di polietilene o CVP, possibilmente nero. Ciò allo scopo di determinare un innalzamento della temperatura del terreno (3-4° C) che influenzerà positivamente l'attività del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Impiegare il prodotto solo su terreno nudo.

Prima di eseguire semine o trapianti aereare il terreno

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci e nocivo per gli animali domestici e per il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

AVVERTENZE

Evitare l'inalazione di gas o di vapori.
Per l'applicazione del **GEOSTER** in serra bisognerà avere la precauzione che in queste non vi siano colture in atto. In tali applicazioni, gli operatori dovranno usare maschere di protezione.
Dopo i trattamenti, lavare le attrezzature usate.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 1329 Ministero della Sanità del 23-1-1974
7/82

Contenuto netto Kg.

1337

CLASSE I

EXTAR A

Diserbante selettivo a base di dinitro-ortocresolo per la distruzione delle erbe infestanti Dicotiledoni nelle coltivazioni cerealicole

VELENO

Composizione

gr 44 del sale ammonico del dinitro-ortocresolo al 98,7% di purezza minima, equivalenti a gr. 40 di dinitro-ortocresolo puro.
Disperdetni e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici,
— conservare la confezione ben chiusa in locale secco e fresco,
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto,
— non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— evitare di respirarne i vapori,
— non operare contro vento,
— evitare il contatto con la pelle e gli occhi,
— durante la preparazione e l'impiego usare tute guanti maschere ed occhiali protettivi,
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone,
— rendere inutilizzabili dopo l uso con i mezzi piu idonei le confezioni che contenevano il prodotto bruciando quelle in carta e sotterrando lontano da corsi d'acqua e sorgenti quelle in plastica
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni mediche

— *Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale e per assorbimento attraverso la pelle*
— *Sintomi di intossicazione*
Sudorazione sete · nausea spossatezza o agitazione psicomotoria · tachicardia dispnea notevole ipertermia Colorazione gialla delle sclere La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione *Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde spugnature d'alcool clisteri d'acqua fredda Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale Ossigeno respirazione artificiale*

— **Controindicazioni**
Atropina

Caratteristiche

L'EXTAR A è efficace contro la maggior parte delle Dicotiledoni infestanti il grano e i cereali minori e cioè Anagallis arvensis (Anagallide) Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore) Chenopodium album (Farinaccio) Galeopsis tetrahit (Canapa selvatica) Galium aparine (Attaccamano) Matricaria chamomilla (Camomilla) Papaver rhoeas (Papavero) Polygonum aviculare (Coreggiola) Polygonum convolvulus (Convolvulo) Polygonum persicaria (Persicaria) Raphanus raphanistrum (Rafanistro) Stellaria media (Centocchio), Thlaspi arvense (Erba storna), Veronica hederaefolia (Veronica), Vicia villosa (Veccia)

Modalità di impiego

1% di EXTAR A (kg 1 di EXTAR A per litri 100 di acqua)
Disperdere la quantità necessaria di EXTAR A in poca acqua agitando bene e diluire poi sino al volume desiderato oppure versare l'EXTAR A direttamente nel serbatoio della pompa che già contiene l acqua facendo funzionare l agitatore
Per evitare la formazione di polveri irritanti e tossiche vuotare il prodotto tenendo la bocca del sacchetto immersa nell acqua
La quantità di poltiglia da distribuire per ettaro oscilla sui 5-6 ettolitri
L'epoca del trattamento inizia quando il frumento (o il cereale minore) ha 3-4 foglie e dura sino alla fine dell'accestimento In questo periodo di tempo conviene intervenire il piu presto possibile quando cioè la maggior parte delle erbe infestanti si presenta nello stadio delle prime 4 foglie

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Non miscelare l'EXTAR A con altri erbicidi e antiparassitari

Fitotossicità

Su colture sane per le quali viene consigliato e in normali condizioni di ambiente e di impiego il prodotto non dà luogo a fitotossicità

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, il bestiame la fauna selvatica e per i pesci Non impiegare perciò il prodotto in fioritura perche tossico per le api
Durante il trattamento e per 20 giorni susseguenti lo stesso non introdurre animali domestici e di bassa corte nelle colture diserbate

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. · MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 1337 del del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg. 1 - 5

1347

® PRINTAZOL 75

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO PER CEREALI
(Soluzione da diluire nell'acqua)

COMPOSIZIONE: 2,4 D (da sale aminico) puro g 27,82, MCPA (da sale aminico) puro g 25,31, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.
Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.

20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di produzione CIFA - Caravaggio (Bergamo)

Registrazione n. 1347 del 23.1.74 del Ministero della Sanità

® Marchio registrato della Procida S.A. - Marsiglia

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire la dose di PRINTAZOL 75 in 200-800 litri di acqua in funzione delle caratteristiche delle macchine usate. Lavare accuratamente al termine delle operazioni, con acqua e soda, tutti i recipienti e gli utensili utilizzati per la diluizione e l'impiego del prodotto. E' raccomandato, se ciò è possibile, l'impiego di un apparecchio esclusivamente riservato al diserbo.

USI PRINCIPALI

PRINTAZOL 75 è un diserbante ormonico a bassa volatilità che consiste in una combinazione di MCPA e 2,4 D, che consente un'efficacia superiore ai due principi attivi presi separatamente. Viene impiegato per la lotta contro le erbe infestanti di frumento, orzo, avena, segale e riso. Attivo contro dicotiledoni (Anthemis, Artemisia, Cirsium, Lamium, Matricaria, Papaver, Polygonum, Ranunculus, Senecio, Tussilago, Veronica, Viola, Convolvolus).

EPOCA DEL TRATTAMENTO

— **Frumento e cereali minori:** tra la fine dell'accestimento e l'inizio della fase di botticella.
— **Riso:** tra l'emissione della quinta foglia e l'inizio della fase di botticella.

DOSI D'IMPIEGO

Cereali d'inverno: 0,700-1,250 lt/ha - Cereali di primavera: 0,500-1,250 lt/ha - Riso: 0,400-0,800 lt/ha. Le dosi minime consigliate per i cereali d'inverno e di primavera interessano le malerbe più sensibili, trattate nelle più favorevoli condizioni di temperatura. All'atto del trattamento la temperatura non deve essere inferiore ai 12-15 °C. Nel caso di temperature superiori ai 18 °C le dosi devono essere ridotte del 15-20%.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

PRINTAZOL 75 non viene miscelato con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e i floreali in genere. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Per l'impiego sul riso, al momento del trattamento, la risaia non deve trovarsi in asciutta ma presentare ancora la superficie degli appezzamenti coperta da qualche centimetro di acqua onde evitare danni.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali domestici e il bestiame. Far trascorrrere almeno 20 giorni prima di lasciare pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente od accidentalmente siano venuti a contatto con il formulato.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.684

1367

Gardoprim® D

Formulazione granulare

Erbicida per il diserbo selettivo della vite, delle colture arboree; per il diserbo localizzato contro i romici nei prati; per il diserbo totale di terreni non coltivati.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
2,6 g di GS 13529 tecnico al 96% minimo di 2-terz. butilammino-4-cloro-6-etilammino-s-triazina, pari a g 2,5 di prodotto puro
2,6 g di dichlobenil tecnico al 95% minimo di 2,6-diclorobenzonitrile pari a g 2,5 di prodotto puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1367 del 6.12.73

® marchio depositato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
Sintomi d'intossicazione:
(non specifici e rilevati su animali con superdosaggi)
Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.

Consigli terapeutici.
Data la non specificità dei sintomi, la terapia è sintomatica.

Caratteristiche
E' un erbicida che agisce essenzialmente per assorbimento radicale. Ha un largo spettro di attività che comprende sia infestanti annuali, mono e dicotiledoni, sia le infestanti perennanti quali l'Artemisia, Cirsium, Rumex, Agropyron. La sua persistenza d'azione è direttamente proporzionale alle dosi d'impiego.

Settori di applicazione e dosi d'impiego
- diserbo selettivo piante adulte (almeno 4 anni) di vite, melo su franco, olivo, nocciolo:
  kg 100-150 per ettaro, in terreni sciolti e poco provvisti di sostanza organica
  kg 150-200 per ettaro, in terreni forti, poco permeabili e ben dotati di sostanza organica
- diserbo selettivo di piante adulte di agrumi:
  kg 150-200 per ettaro
- diserbo localizzato contro il romice nei prati:
  g 2-3 per pianta in piena attività vegetativa
- diserbo totale di terreni non coltivati:
  kg 300 per ettaro

Epoca e modalità di applicazione
Il prodotto si impiega in autunno o fine inverno-inizio primavera cioè prima o durante l'emergenza delle infestanti.
Per l'attività del prodotto è di grande vantaggio un alto tenore di umidità del terreno o una pioggia subito dopo il trattamento.
Il prodotto si applica tal quale sia a mano che a mezzo di macchine idonee; in ogni caso bisogna curare che la distribuzione risulti sufficientemente uniforme su tutta la superficie.

Avvertenze
Da impiegare solo su colture specializzate e cioè in assenza di sottocolture. Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e d'impiego e se utilizzato secondo le istruzioni, il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti al massimo alla post-emergenza delle infestanti

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg. 1 - 5 - 10 - 25**

1374

CLASSE I^a

VELENO

TERRAFENE

Insetticida granulare per trattamenti al terreno

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 10 Parathion puro (purezza 97-98%)
pari a gr. 10,31-10,20 di prodotto tecnico
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirare i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE

— Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo

— Sintomi d'intossicazione:
Scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni edovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersioni con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

— Controindicazioni:
Morfina - Vitamina B1 - Coramina - latte e grassi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 1374 Ministero Sanità del 14.1.74.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **TERRAFENE** è un insetticida granulare indicato per la lotta contro gli insetti del terreno (Elateridi, Maggiolino, Tipule, Biblo, Grillotalpa, Mosca della cipolla e del cavolo, Agrotidi, Miriapodi).

Non trasmette odori sgradevoli alle piante.

Il **TERRAFENE** va distribuito uniformemente sul terreno, alla dose di Kg. 25-40 per ettaro, prima della semina della coltura.

Il trattamento va eseguito da una erpicatura superficiale bene eseguita.

Si può effettuare anche il trattamento localizzato, distribuendo il **TERRAFENE** nei solchi di semina o trapianto, alla dose di Kg. 15-20 per ettaro, e quindi interrandolo.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITA'

Non mescolate il **TERRAFENE** con concimi molto alcalini o concimi che abbiano granuli di grandezza diversa.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi consigliate non è fitotossico per le colture; può provocare in qualche caso fallanze su bietole coltivate in terreni sabbiosi particolarmente se il trattamento viene effettuato sulla fila.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api, gli animali domestici, i pesci, ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Far trascorrere 20 giorni prima d'immettere il bestiame al pascolo nelle zone trattate.
Dato l'impiego del prodotto in esclusiva pre-semina, non è richiesto periodo d'intervallo tra la semina e la raccolta della coltura.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1375

CLASSE I°

VELENO

TERRAFOS

Insetticida granulare per trattamenti al terreno

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 10 Parathion puro (purezza 97-98%)
pari a gr. 10,31-10,20 di prodotto tecnico
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirare i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE

— Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo

— Sintomi d'intossicazione:
Scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni edovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersioni con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

— Controindicazioni:
Morfina - Vitamina B1 - Coramina - latte e grassi.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 1375 Ministero Sanità del .19.12.1973 . . .

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **TERRAFOS** è un insetticida granulare indicato per la lotta contro gli insetti del terreno (Elateridi, Maggiolino, Tipure, Biblo, Grillotalpa, Mosca della cipolla e del cavolo, Agrotidi, Miriapodi).

Non trasmette odori sgradevoli alle piante.

Il **TERRAFOS** va distribuito uniformemente sul terreno, alla dose di Kg. 25-40 per ettaro, prima della semina delle colture.

Il trattamento va seguito da una erpicatura superficiale bene eseguita.

Si può effettuare anche il trattamento localizzato, distribuendo il **TERRAFOS** nei solchi di semina o trapianto, alla dose di Kg.15-20 per ettaro, e quindi interrandolo.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITA'

Non mescolate il **TERRAFOS** con concimi molto alcalini o con concimi che abbiano granuli di grandezza diversa.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi consigliate non è fitotossico per le colture; può provocare in qualche caso fallanze su bietole coltivate in terreni sabbiosi particolarmente se il trattamento viene effettuato sulla fila.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api, gli animali domestici, i pesci, ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Far trascorrere 20 giorni prima d'immettere il bestiame al pascolo nelle zone trattate.
Dato l'impiego del prodotto in esclusiva pre-semine, non è richiesto periodo d'intervallo tra la semina e la raccolta della coltura.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1405

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con
prudenza

PANAM® PB 50

Polvere bagnabile insetticida per la lotta contro la Carpocapsa delle pomacee e del noce, Tignola orientale del pesco, Tignole dell'uva e Bega del garofano in pieno campo e in serra

COMPOSIZIONE

Carbaryl puro, esente da β-naftolo	g 49
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.**
Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione n. 1405 del 28-1-1974 del Ministero della Sanità.

® Marchio registrato

Modalità e dosi di impiego per litri 100 di acqua in trattamenti a volume normale

MELO E PERO - **Carpocapsa (baco o verme) e i microlepidotteri (Cacoecia, Eulia, Capua)**: g. 120-150 iniziando circa 15 giorni dopo la caduta dei petali e ripetendo i trattamenti ogni 10-15 giorni sino a due settimane dalla raccolta.
PESCO - **Tignola orientale:** g 200 ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni dalla fine di maggio-primi di giugno sino in prossimità della raccolta.
NOCE - **Carpocapsa:** come per il melo.
MANDORLO - **Bombice gallonato o campa:** g 150-200, alla comparsa delle larve.
VITE - **Tignole:** g 150-200, intervenendo: 1) poco prima della fioritura; 2) ad acini grandi come un pisello ed eventualmente 3) all'invaiatura (inizio della maturazione).
OLIVO - **Tignola:** g 200 quando la maggior parte dei bocci florali sta per aprirsi. **Cocciniglia mezzo grano di pepe:** g 250, intervenendo di norma a fine agosto. In caso di forti infestazioni, trattare due volte rispettivamente all'inizio ed alla fine di agosto.
AGRUMI - su limone - **Tignola,** alla comparsa delle prime larve e ripetendo il trattamento dopo 15 giorni in caso di forti attacchi. **Cocciniglia mezzo grano di pepe:** g 200-250.
MAIS - **Piralide e Sesamia:** g 350-400. Intervenire contro la prima generazione quando le piante di mais ibrido hanno raggiunto un'altezza media di circa un metro. Aver cura di investire le piante dall'alto. Ripetere il trattamento all'incirca dalla fine di luglio-primi di agosto una o due volte a 10-12 giorni d'intervallo contro la seconda generazione che attacca le pannocchie.
PATATA - **Dorifora:** g 200-250.
FORAGGERE
Erba medica e Trifoglio - **Fitonomo, Apioni, Misurino, Sputacchina, Falene, Oziorrinco:** g 200-250, al primo apparire dell'infestazione dopo lo sfalcio se la coltura è destinata alla alimentazione del bestiame; in ogni periodo se da seme.
ORTAGGI
Carciofo - **Depressaria, Nottua o Idroecia, Altica, Punteruolo o Larino, Cassida:** g 200-250. Asparago - **Criocera, Nottuidi** (Heliothis armigera): g 150-200. Cavoli, Ortaggi a radice: Rapa, Ravanello e Navone - **Cavolaie, Mamestra, Punteruoli, Altiche:** g 150-200.
Ortaggi a frutto (Cucurbitacee): Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo - **Altiche:** g 150-200.
GAROFANO (in pieno campo e serra) - **Bega verde:** g 200, iniziando alla prima comparsa delle larve e ripetendo i trattamenti ogni 10-15 giorni in caso di necessità. È bene aggiungere g 30-50 di un bagnante adesivo per migliorare l'efficacia del trattamento.

Preparazione della sospensione
Versare il quantitativo di PANAM PB 50 necessario in poca acqua e quindi, agitando continuamente, aggiungere alla rimanente acqua sino ad ottenere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il PANAM PB 50 è miscibile con gli insetticidi e fungicidi di uso più comune esclusi i prodotti alcalini in genere (Poltiglia bordolese, polisolfuri).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili e pertanto, non può essere distribuito durante la fioritura. È nocivo per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: g

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto.
Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al Centro di rianimazione.
Ossigeno - terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

1412

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

BENLATE*

Fungicida a base di Benomyl
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Benomyl puro
Ingredienti inerti quanto basta a 100.

Marchio registrato
E.I. du Pont de Nemours & Co.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE GENERALI

Il **BENLATE** è un fungicida sistematico dotato di azione preventiva, curativa ed eradicante contro malattie crittogamiche dei fruttiferi, della vita, del frumento e delle colture ornamentali. E' pure efficace per la difesa dalle malattie della frutta in genere.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite: Botrytis: usare gr. 60 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua. Iniziare i trattamenti subito prima della fioritura per le varietà sensibili alla Botrytis del peduncolo o in caso di andamento stagionale piovoso, oppure subito dopo la fioritura. Effettuare 5 o 6 trattamenti fino alla fase di avanzata maturazione.

Usare non meno di 1.500 lt. di acqua per ettaro, bagnando accuratamente i grappoli. Il **BENLATE** non ha effetti nocivi sulla fermentazione.

Oidio: usare gr. 60 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua. Iniziare i trattamenti nella fase di gemma mossa a 3-4 cm. e continuare per tutta la stagione secondo il normale calendario antioidico.

Melo e Pero: Ticchiolatura ed Oidio: usare gr. 45-60 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua ad intervalli fissi, iniziando all'apparizione dei mazzetti florali. Alla dose superiore il **BENLATE** svolge azione curativa ed eradicante contro la Ticchiolatura.

Usato in un calendario regolare il **BENLATE** esplica una qualche azione di contenimento del Ragno rosso.

Gloeosporium: usare gr. 60 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua in un unico trattamento pre-raccolta all'inizio di settembre.

Nel caso di varietà particolarmente sensibili, si consiglia di aumentare la dose a gr. 100 per 100 litri.

Pesche, Susine, Albicocche: Moniliosi, Ticchiolatura e Oidio: usare gr. 60 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua.

Trattare prima e dopo la fioritura. Ripetere se necessario prima della raccolta (questo trattamento è indicato soprattutto per prevenire le malattie da conservazione (Botrytis e Monilia) sulle pesche da industria). Per la Ticchiolatura e l'Oidio continuare i trattamenti secondo le condizioni atmosferiche.

Rose: Oidio e « Blak Spot »: usare gr. 60-80 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua.

Iniziare i trattamenti ai primi sintomi della malattia e ripeterli ogni 7-12 giorni.

Usare la dose più alta e l'intervallo più ravvicinato in caso di andamento stagionale sfavorevole.

Bulbi (Tulipani, Gladioli, Gigli, Fresie): Marciumi da fusarium, Botrytis, Penicillium, Sclerotinia: Immergere i bulbi per la durata di 15-20 minuti in una soluzione di gr. 200 di **BENLATE** per 100 lt. di acqua.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 1412 Ministero della Sanità del 28 - 2 - 1974

E/2

Garofano: Phialophora Cinerescens: effettuare un trattamento al terreno con gr. 0,5-1 di **BENLATE** in 10 lt. di acqua per mq. Ripetere le applicazioni ogni 15 giorni per la durata del ciclo vegetativo come trattamento preventivo.

In caso di infezione già in atto, effettuare al primo apparire della malattia, un trattamento al terreno con gr. 4 di **BENLATE** in 10 lt. di acqua per mq. facendolo seguire da trattamenti ogni 15 giorni con la dose di grammi 0,5-1 in 10 lt. di acqua per mq.

— **Fusarium: BENLATE** gr. 2 per metro quadrato con le stesse modalità applicative descritte per la **Phialophora**.

Crisantemo: - Botrytis e Septoria: **BENLATE** gr. 60/hl. effettuare trattamenti ogni 15 giorni sulla vegetazione.

— **Tracheomicosi** (Verticilliosi e Fusariosi): **BENLATE** gr. 2-3 per metro quadrato. Innaffiare il terreno 3 settimane dopo l'impianto effettuando 2-3 trattamenti alla cadenza di 10-15 giorni.

Frumento: Oidio, Mal del piede, Septoriosi, Fusariosi: Irrorare la coltura con **BENLATE** a gr. 400-500 per ettaro distribuiti con 5-8 ettolitri d'acqua intervenendo all'inizio della levata e all'apparizione della spiga.

Per aumentare la polivalenza d'azione, in particolare contro la Ruggine, si consiglia l'aggiunta di kg. 2 per ettaro di Maneb o di Mancozeb.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di **BENLATE** in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua, tenendo la miscela in costante agitazione.

Fatta eccezione per il Melo, si consiglia l'aggiunta di un bagnante per i trattamenti a piante di difficile bagnatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA:
L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

Il **BENLATE** è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi attualmente in commercio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 60 gg. prima del raccolto per il frumento e 15 gg. prima per le altre colture.

ATTENZIONE

Non lasciare che il **BENLATE** diventi umido durante l'immagazzinamento; ciò può provocare alcune trasformazioni chimiche che riducono l'efficacia fungicida del prodotto. Tenere la confezione ben chiusa quando il prodotto non è impiegato.

Bruciare la confezione dopo l'uso.

Se il trattamento con **BENLATE**, effettuato secondo le istruzioni riportate in etichetta, non è efficace, può essere che ci si trovi in presenza di un ceppo di fungo resistente.

L'impiego immediato di altro fungicida adeguato è consigliabile.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

1417

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ORTHOMANEB

Fungicida organico per pomacee, vigneti, tabacchicoltura, pomodoro e garofano
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 25 di captan puro (da p.a. tecnico al 91-93%).
Gr. 40 di maneb puro (da p.a. tecnico minimo 80%).
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

a) in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii e grassi.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1417 Ministero Sanità del 22 - 7 - 1974

E/1

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

L'Orthomaneb è un fungicida organico formato da due principi attivi in proporzioni ben definite per la lotta contro malattie di diverse colture.

Dose d'impiego: gr. 200 per ettolitro d'acqua.

Applicazioni:

IN FRUTTICOLTURA: contro Ticchiolatura delle pomacee.

IN VITICOLTURA: contro peronospora.

IN ORTICOLTURA: contro peronospora, alternariosi, cladosporiosi e septoriosi del pomodoro fino alla prima fioritura.

IN FLORICOLTURA: contro ruggine del garofano.

IN TABACCHICOLTURA: contro peronospora.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

E' compatibile con i prodotti della nostra gamma ad eccezione degli olii e degli zolfi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico, per le varietà di mele. Delicious rosse, Winesap e Renetta del Canadà e la varietà di pero Butirra d'Anjon.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

1422

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 27,8 di Metomil 90 ovvero (S-metil-N-(metilcarbamoil)-ossi)-Tioacetimidato (purezza 92%) pari a gr. 25,57 di prodotto puro.
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Insetticida a base di Metomil - Polvere bagnabile

* Marchio registrato dalla E. I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Natura del rischio
— Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.
— Nel caso che il prodotto raggiunga incidentalmente gli occhi, lavarli per 15 minuti con acqua abbondante. Recarsi dal medico.

INFORMAZIONI MEDICHE

— **Sintomi:** miosi, sudorazione profusa, debolezza, polso lento, nausea e vomito, tremori muscolari, visione confusa, crampi addominali e diarrea.

Trattamento:
— Nel caso di inalazione, trasportare il paziente in ambiente non contaminato; nel caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare prontamente la pelle e gli occhi contaminati con acqua abbondante;
— In caso di ingestione lavanda gastrica;
— All'apparire di segni locali o sistemici o di sintomi di avvelenamento colinesterasico somministrare atropina: **Intossicazione leggera** 1,2-2 mg. per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento ad intervalli di 10-30 minuti fino a comparsa di fenomeni di atropinizzazione; **Intossicazione severa:** 2-4 mg. per via intravenosa, ripetendo la somministrazione di 2 mg. ogni 3-10 minuti fino a scomparsa dei segni e dei sintomi;
— **Non somministrare 2-PAM: controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione;**
— Se necessario rimuovere le eccessive secrezioni e mantenere aperte le vie respiratorie;
— In caso di severa intossicazione praticare la respirazione artificiale o ossigenoterapia;
— Per alleviare le convulsioni, nel caso che interferiscano con la respirazione e non siano alleviate dall'atropina, somministrare sodio thiopental (soluzione, 2,5%) intravena.

Pronto soccorso:
— Se ingerito provocare il vomito con acqua salata calda (1 cucchiaio da tavola di sale in 1 bicchiere d'acqua), ripetendo fino a che il vomito non sia chiaro;
— Se inalato allontanare dall'ambiente contaminato, far coricare e riposare calmo;
— In caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare la pelle o gli occhi contaminati con abbondante quantità di acqua;
— Se il paziente mostra difficoltà respiratoria praticare immediatamente la respirazione artificiale;
— Somministrare 2 tavolette di atropina da 0,6 mg. per via orale o facendole sciogliere sotto la lingua, se sono disponibili. In seguito, ogni 10-15 minuti, somministrare una tavoletta di atropina fino a che la gola e la pelle siano asciutte;
— Se necessario somministrare altre tavolette per mantenere asciutta la gola e la pelle.

CARATTERISTICHE

Il **LANNATE 25** è un insetticida per il controllo di larve ed adulti di alcuni insetti che attaccano: fruttiferi, vite, colture industriali ed ortive.
Distribuire il prodotto con una quantità sufficiente di acqua per ottenere una uniforme e completa distribuzione sulle parti trattate.
Non applicare con attrezzature a basso volume.
In generale la dose d'impiego più bassa viene consigliata per gli intervalli più brevi fra un trattamento e quello successivo, viceversa la dose più alta si raccomanda per lunghi intervalli.
La migliore efficacia si ottiene con la tempestività del trattamento, colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Immettere acqua nel serbatoio della pompa pari ad un quarto-metà del volume necessario. Mettere in moto l'agitatore meccanico od idraulico (non usare agitatori ad aria). Aggiungere la quantità stabilita di **LANNATE 25** e, sempre con l'agitatore in moto, portare a volume. Continuare l'agitazione della miscela **per alcuni minuti prima dell'inizio del trattamento e mantenerla nel corso dello stesso.**

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. N. 1422 Ministero Sanità del 7.3.74

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Afidi: Applicare 150-180 gr. di **LANNATE 25** per 100 litri di acqua all'inizio della infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione. Il **LANNATE 25** è efficace contro gli afidi di tutte le colture sottomenzionate includendo gli Afidi del tabacco, delle piante ornamentali, da fiore e delle Drupacee. Il **LANNATE 25** in particolare è molto efficace contro l'Afide verde del pesco (Myzus persicae) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici e contro l'Afide farinoso (Hyalopterus Amygdaly).

MELI E PERI
Minatori: contro larve alla dose di gr. 200 per 100 litri di acqua.

Lithocolletis Blancardella F. E.: per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare in primavera contro le larve di prima generazione. E' strettamente raccomandabile applicare il **LANNATE 25** a tempo opportuno, cioè quando il primo stadio delle larve è visibile sulle foglie come « macchia d'olio ».
Inoltre il controllo delle successive generazioni deve essere principalmente orientato contro le larve di primo stadio.

Leucoptera (cemiostoma)-Scitella zell.: è consigliabile applicare il **LANNATE 25** all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle « macchie circolari » sulle foglie ha un diametro inferiore a 5 mm.

DRUPACEE
Afidi: dose gr. 150-180 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione sulle foglie e ripeterlo in caso di reinfestazione.

Il **LANNATE** 25 è efficace contro l'afide verde del pesco (Myzus Persicae) difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici e contro l'Afide farinoso (Hyalopterus Amygdaly Blanch).

VITE
Tignole: (Lobesia Botrana Schiff e Clysia Ambiguella Hb). Applicare il **LANNATE 25** come curativo e preventivo alla dose di gr. 150-200 per 100 litri di acqua.
Intervenire con il trattamento in base allo stato vegetativo della pianta ed al grado di infestazione della stessa.
Un solo trattamento, eseguito al momento opportuno, può essere sufficiente per il controllo dell'insetto.

AGRUMI E OLIVO
Coccinig'ia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae): dose gr. 150-180 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento in estate durante la massima presenza di « neanidi ».

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Cleono: (Temnorrhinus mendicus). Dose gr. 180 per 100 litri di acqua. Usare non meno di Kg. 1,800 per ettaro di **LANNATE 25.**
Eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo una o due volte ad intervalli di 12-15 giorni.
Altica: (Chaetocnema tibialis). Dose gr. 160 per 100 litri di acqua quando l'insetto appare sulle foglie.

POMODORO - MELANZANA - PEPERONE E CUCURBITACEE
Nottue: Dose gr. 150 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento quando le prime larve dell'insetto appaiono sui frutti e ripeterlo a 5-7 giorni di intervallo, durante il periodo della infestazione.

CAVOLO E LATTUGA
Cavolaie: Dose gr. 150-200 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo con un intervallo di 5-7 giorni durante il periodo vegetativo.
E' consigliabile l'aggiunta di Bagnante Adesivo Liquido 2.

FAGIOLO - PISELLO
Larve di Lepidotteri: Dose gr. 150-180 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione, ripeterlo in caso di reinfestazione.

GAROFANO: Bega (Tortrix pronubana): Dose gr. 150-200 per 100 litri di acqua.
Trattare ogni 8-10 giorni contro le larve di prima generazione, iniziando i trattamenti alla schiusura delle uova deposte dai primi adulti dell'annata.

In tutte le colture: Esche contro Nottue.
Dose per ettaro: **LANNATE 25** Kg. 1 + Crusca Kg. 50 + Zucchero Kg. 1.
Mescolare a secco la crusca e lo zucchero, indi inumidire e, sempre mescolando, aggiungere il **LANNATE 25.**
Distribuire sul terreno a spaglio o a mucchietti (a 30-40 cm. l'uno dall'altro) l'esca così preparata. Si raccomanda di impiegare esche preparate al momento dell'uso e di tenere lontani dall'esca i bambini e gli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e gli animali selvatici.
Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni.

Il prodotto è anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 14 giorni prima del raccolto sulle insalate e 10 giorni prima su tutte le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1426

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

FOLCAPTAL

Antiperonosporico della vite

Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 64 di folpet puro (purezza 91-93%) pari a gr. 70,33-60,81 di prodotto tecnico.
Gr. 14 di captafol puro (purezza minima 94%) pari a gr. 14.90 minimo di prodotto tecnico.
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti e occhiali protettivi.
- Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polvere nella manipolazione del preparato.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

IL FOLCAPTAL è un fungicida ad azione preventiva indicato nella lotta contro la peronospora della vite nel periodo che va dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di allegagione.

Possiede inoltre azioni collaterali contro l'Oidio e la Botrite.

Dosi gr. 150-200 per ettolitro d'acqua (non impiegare meno di Kg. 1,5-2 di FOLCAPTAL per ettaro).

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semiliquida, sciogliendo la dose di FOLCAPTAL in poca acqua, indi versare nell'irroratrice e portare a volume.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ».

COMPATIBILITA'

Il FOLCAPTAL è miscibile con i nostri insetticidi, acaricidi e fungicidi. Non è compatibile con olii.

« Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi consigliate non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Non è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sulle uve da tavola sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Sulle ue da vino, sospendere il trattamento almeno 4 settimane prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione di mosti.

Attenzione:

da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. N. 1426 Ministero Sanità del . 30.4.74 . . . . .

Peso netto Kg.

1430

Sandovit liquido

Bagnante - adesivo

COMPOSIZIONE

gr. 9 di nonil-fenil-poliglicoletere puro (da p.a. tecnico all'85%); coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità di impiego

0,050 - 0,1% di SANDOVIT LIQUIDO (gr. 50 - 100 di SANDOVIT LIQUIDO per litri 100 di acqua).
Aggiungere la quantità necessaria di SANDOVIT LIQUIDO alla poltiglia pronta per l'uso, rimescolando.
Usare spruzzatori a foro piccolo per la perfetta nebulizzazione delle miscele.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Principali antiparassitari ai quali si consiglia l'aggiunta di SANDOVIT LIQUIDO:

Anticrittogamici semplici: **a base di zolfo** (polisolfuri, zolfi bagnabili)
a base di rame (poltiglia bordolese, ossicloruri)
a base di organici (T.M.T.D., zineb, ziram)

Anticrittogamici misti: a base di rame + organici (cupro-organici)

Insetticidi

Acaricidi di contatto

Avvertenza: il SANDOVIT LIQUIDO è un bagnante-adesivo e di conseguenza viene usato solo in miscela con antiparassitari; per questa ragione deve essere sempre rispettato il periodo di carenza dell'antiparassitario miscelato (in caso di miscela con più antiparassitari vale, logicamente, il periodo di carenza più lungo). Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricolsura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 1430 del 2.3.1974 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

1445

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

CUPROTHEX C

Fungicida cuprorganico per vite, fruttiferi, olivo, agrumi, colture ortive e floreali

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 40 Ossicloruro tetraramico al 50% di rame attivo (purezza 99%) pari a gr. 19,8 di rame puro
Gr. 20 Captan puro (purezza 91-93%) pari a gr. 21,98-21,50 di prodotto tecnico
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

— *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

IL CUPROTHEX C è un fungicida cuprorganico indicato per la lotta contro la maggior parte delle malattie crittogamiche delle piante, in sostituzione dei tradizionali sali e poltiglie rameiche (ossicloruro di rame, poltiglia bordolese).

Dose d'impiego: gr. 400 per ettolitro d'acqua contro i seguenti parassiti: peronospora della vite; occhio di pavone e lebbra dell'olivo; ticchiolatura del melo e del pero; bolla e vaiolo del pesco e del mandorlo; peronospora, alternariosi e septoria del pomodoro; peronospora e alternaria delle patate; cercospora della bietola; septoria del sedano; ramulariosi e ruggine del garofano; mal secco e allupatura degli agrumi.

Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose di CUPROTHEX C in poca acqua fino ad ottenerne una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con i prodotti della nostra gamma ad eccezione degli olii e degli zolfi.

« Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi consigliate non è fitotossico.

Non trattare durate la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo. (Abbondanza « Belford » - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Goolden Delicious - Gravenstein - Jonathan) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

N.B. Su uve da vino sospendere i trattamenti almeno un mese prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, ma non presenta rischi di nocività verso insetti utili, animali domestici e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalle zone persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1445 Ministero Sanità del . 30.4.1974 . . . .

Peso netto Kg.

1458

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

CAPTALIDAN

Antiperonosporico della vite

Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 64 di folpet puro (purezza 91-93%) pari a gr. 70,33-60,81 di prodotto tecnico.
Gr. 14 di captafol puro (purezza minima 94%) pari a gr. 14.90 minimo di prodotto tecnico.
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti e occhiali protettivi.
- Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polvere nella manipolazione del preparato.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

IL CAPTALIDAN è un fungicida ad azione preventiva indicato nella lotta contro la peronospora della vite nel periodo che va dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di allegagione.

Possiede inoltre azioni collaterali contro l'Oidio e la Botrite.

Dosi gr. 150-200 per ettolitro d'acqua (non impiegare meno di Kg. 1,5-2 di CAPTALIDAN per ettaro).

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semiliquida, sciogliendo la dose di CAPTALIDAN in poca acqua, indi versare nell'irroratrice e portare a volume.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ».

COMPATIBILITA'

IL CAPTALIDAN è miscibile con i nostri insetticidi, acaricidi e fungicidi. Non è compatibile con olii.

« Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi consigliate non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Non è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sulle uve da tavola sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Sulle ue da vino, sospendere il trattamento almeno 4 settimane prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione di mosti.

Attenzione:

da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. N. 1458 Ministero Sanità del . 28.5.1974 .

Peso netto Kg.

1474

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CUPROTHEX D 40-20

Fungicida cupro-organico per la vite, fruttiferi, olivo, grandi colture, colture ortive e floreali.

Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:

gr. 40 Ossicloruro tetraramico al 50% di rame attivo (purezza 99%) pari a gr. 19,8 di rame puro

gr. 20 di 2, 4, 5, 6 tetracloroisoftalonitrile (purezza 95-96%) pari a gr. 21,05-20,83 di prodotto tecnico

Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitaré il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

— *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il CUPROTHEX D 40-20 è un fungicida cupro-organico indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle piante, in sostituzione dei tradizionali sali e poltiglie rameiche (ossicloruro di rame, poltiglia bordolese).

Dosi d'impiego: gr. 400 per ettolitro d'acqua contro i seguenti parassiti: peronospora della vite; occhio di pavone e lebbra dell'olivo; ticchiolatura del melo e del pero; bolla e vaiolo del pesco e del mandorlo; peronospora, alternariosi e septoria del pomodoro; peronospora e alternaria delle patate; cercospora della bietola; septoria del sedano; ramulariosi e ruggine del garofano; mal secco e allupatura degli agrumi.

Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose di CUPROTHEX D 40-20 in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1474 Ministero Sanità del . . 30.4..1974. . .

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi formulati in polvere bagnabile.

Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide. Non si consiglia l'impiego di bagnanti adesivanti.

« Avvertenza »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi consigliate non è fitotossico.

Non trattare durate la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo. (Abbondanza « Belford » - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Goolden Delicious - Gravenstein - Jonathan) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, ma non presenta rischi di nocività verso insetti utili, animali domestici e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalle zone persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1478

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CUPROTHEX D 60-8

Fungicida cupro-organico per la vite, fruttiferi, olivo, grandi colture, colture ortive e floreali.

Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:

Gr. 60 Ossicloruro tetraramico al 50% di rame attivo (purezza 99%) pari a gr. 29,7 di rame puro

Gr. 8 di 2, 4, 5, 6 tetracloroisoftalonitrile (purezza 95-96%) pari a gr. 8,42-8,33 di prodotto tecnico

Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

— *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il CUPROTHEX D 60-8 è un fungicida cupro-organico indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle piante, in sostituzione dei tradizionali sali e poltiglie rameiche (ossicloruro di rame, poltiglia bordolese).

Dosi d'impiego: gr. 400 per ettolitro d'acqua contro i seguenti parassiti: peronospora della vite; occhio di pavone e lebbra dell'olivo; ticchiolatura del melo e del pero; bolla e vaiolo del pesco e del mandorlo; peronospora, alternariosi e septoria del pomodoro; peronospora e alternaria delle patate; cercospora della bietola; septoria del sedano; ramulariosi e ruggine del garofano; mal secco e allupatura degli agrumi.

Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose di CUPROTEX D 60-8 in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua corrente.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi formulati in polvere bagnabile.
Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide. Non si consiglia l'impiego di bagnanti adesivanti.

« Avvertenze »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi consigliate non è fitotossico.

Non trattare durata la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo. (Abbondanza « Belford » - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Goolden Delicious - Gravenstein - Jonathan) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clergeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, ma non presenta rischi di nocività verso insetti utili, animali domestici e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

Reg. N. 1478 Ministero Sanità del . 30.5.1974. . . .

1484

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CUPROTHEX D 60-15

Fungicida cupro-organico per la vite, fruttiferi, olivo, grandi colture, colture ortive e floreali.

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 60 Ossicloruro tetraramico al 50% di reattivo (purezza 99%) pari a gr. 29,7 di rame puro
gr. 15 di 2, 4, 5, 6 tetracloroisoftalonitrile (purezza 95-96%) pari a gr. 15,79-15,62 di prodotto tecnico
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

— *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il CUPROTHEX D 60-15 è un fungicida cupro-organico indicato per la lotta contro malattie crittogamiche delle piante, in sostituzione dei tradizionali sali e poltiglie rameiche (ossicloruro di rame, poltiglia bordolese).

Dosi d'impiego: gr. 400 per ettolitro d'acqua contro i seguenti parassiti: peronospora della vite; occhio di pavone e lebbra dell'olivo; ticchiolatura del melo e del pero; bolla e vaiolo del pesco e del mandorlo; peronospora, alternariosi e septoria del pomodoro; peronospora e alternaria delle patate; cercospora della bietola; septoria del sedano; ramulariosi e ruggine del garofano; mal secco e allupatura degli agrumi.

Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose di CUPROTHEX D 60-15 in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi formulati in polvere bagnabile.
Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide. Non si consiglia l'impiego di bagnanti adesivanti.

« Avvertenze »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi consigliate non è fitotossico.

Non trattare durate la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo. (Abbondanza « Belford » - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Goolden Delicious - Gravenstein - Jonathan) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, ma non presenta rischi di nocività verso insetti utili, animali domestici e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

Reg. N. 1484 Ministero Sanità del . 30.4.1974 . . . .

1485

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CUPROTHEX MR

Fungicida cupro-organico

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 14 Rame puro (da Ossicloruro tetrarameco al 50% di Cu).
Gr. 40 Mancozeb puro (da p.a. tecnico minimo 80%).
Coadiuvanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

a) in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1485 Ministero Sanità del 4 - 9 - 1974
E/1

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **Cuprothex MR** è un fungicida cuprorganico indicato per la lotta contro la peronospora della vite nel periodo post-fiorale.

APPLICAZIONI E DOSI

	(in 100 lt. di acqua)
Peronospora della vite (nel periodo post-fiorale	dose gr. 300-400
Ticchiolatura del melo e del pero (a seconda dell'epoca di applicazione: le dosi più alte nel periodo pre-fiorale)	dose gr. 200-500
Peronospora, Alternariosi, Septoriosi del pomodoro fino alla prima fioritura	dose gr. 300-400
Ruggine del garofano	dose gr. 400

N.B. In condizioni poco favorevoli allo sviluppo della Peronospora della vite la dose di **Cuprothex MR** può essere ridotta a gr. 250 per hl. di acqua. Viceversa in condizioni molto favorevoli allo sviluppo della malattia, la dose dovrà essere elevata a gr 500 ed in casi estremi a gr. 600 per hl. d'acqua.

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare il **Cuprothex MR** in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile zolfi compresi quelli polverulenti per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora e può essere miscelato con altri antiparassitari

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Su varietà di melo. (Abbondanza - « Belford » - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Goolden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Commercio) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard - Armella - Butirra Morettini - Coscia - Curato - Decana del Comizio - Gentil bianca - Gentilona - Giardina - Mora - Santa Maria - Scipiona - Spadona d'estate - Spadoncina - Spinacarpi) sensibili al rame ed allo zineb, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetative.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

148

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CUPROTHEX B - 50

Antiperonosporico d'impiego nel periodo attorno alla fioritura della vite. Si usa inoltre contro le malattie del pomodoro e del garofano di seguito indicate

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 42,9 Maneb puro (da p.a. tecnico minimo 80%).
Gr. 7,1 Zineb puro (da p.a. tecnico minimo 80%).
Coadiuvanti e coloranti speciali quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

a) in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1488 Ministero Sanità del 5 - 11 - 1974

E/1

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

IN VITICOLTURA: Contro la Perenospora a gr. 300-400/hl come preventivo, nel periodo attorno alla fioritura.

IN ORTICOLTURA: Contro la Perenospora, Alternariosi del pomodoro fino alla prima fioritura a gr. 300-400/hl.

IN FLORICOLTURA: Contro la Ruggine del garofano; a gr. 250-300/hl.

MODALITA' D'IMPIEGO

Per la preparazione della Poltiglia, formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di **Cuprothex B/50** in poca acqua, indi versare nella irroratrice e portare a volume.

Dove è d'uso o si rende necessario il trattamento polverulento con o senza Zolfi si consiglia l'impiego di Kg. 4 - 4,50 di **Cuprothex B/50** per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i nostri insetticidi, acaricidi e fungicidi di uso comune.

Miscibile agli zolfi in polvere.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto è fitotossico, per alcune Cultivar di pero (Abate Fetel - Armella - Butirra Moretti - Coscia - Curato - Decana del Comizio - Gentil bianca - Gentilona - Giardina - Mora - Santa Maria - Scipiona - Spadona d'estate - Spadoncina - Spinacarpi).

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

1500

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

Fungicida cuprorganico per vite, fruttiferi, olivo, agrumi, colture ortive e floreali

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 40 Ossicloruro tetrarameico al 50% di rame attivo (purezza 99%) pari a gr. 19,8 di rame puro
Gr. 20 Captan puro (purezza 91-93%) pari a gr. 21,98-21,50 di prodotto tecnico
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

— In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

L'R 6/C è un fungicida cuprorganico indicato per la lotta contro la maggior parte delle malattie crittogamiche delle piante, in sostituzione dei tradizionali sali e poltiglie rameiche (ossicloruro di rame, poltiglia bordolese).

Dose d'impiego: gr. 400 per ettolitro d'acqua contro i seguenti parassiti: peronospora della vite; occhio di pavone e lebbra dell'olivo; ticchiolatura del melo e del pero; bolla e vaiolo del pesco e del mandorlo; peronospora, alternariosi e septoria del pomodoro; peronospora e alternaria delle patate; cercospora della bietola; septoria del sedano; ramulariosi e ruggine del garofano; mal secco e allupatura degli agrumi.

Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose di R 6/C in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

E' miscibile con i prodotti della nostra gamma ad eccezione degli olii e degli zolfi.

« **Avvertenze:** In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi consigliate non è fitotossico.

Non trattare durante la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo. (Abbondanza « Belford » - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Goolden Delicious - Gravenstein - Jonathan) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuproesensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

N.B. Su uve da vino sospendere i trattamenti almeno un mese prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, ma non presenta rischi di nocività verso insetti utili, animali domestici e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zone persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 1500 Ministero Sanità del 24.6.74.

Peso netto Kg.

1502

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Antiperonosporico d'impiego nel periodo attorno alla fioritura della vite. Si usa inoltre contro le malattie del pomodoro e del garofano di seguito indicate

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 42,9 Maneb puro (da p.a. tecnico minimo 80%).
Gr. 7,1 Zineb puro (da p.a. tecnico minimo 80%).
Coadiuvanti e coloranti speciali quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

a) in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii e grassi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 1502 Ministero Sanità del 4 - 9 - 1974

E/1

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

IN VITICOLTURA: Contro la Peronospora a gr. 300-400/hl come preventivo, nel periodo attorno alla fioritura.

IN ORTICOLTURA: Contro la Peronospora, Alternariosi del pomodoro fino alla prima fioritura a gr. 300-400/hl.

IN FLORICOLTURA: Contro la Ruggine del garofano: a gr. 250-300/hl.

MODALITA' D'IMPIEGO

Per la preparazione della Poltiglia, formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di R 6 B/50 in poca acqua, indi versare nella irroratrice e portare a volume.

Dove è d'uso o si rende necessario il trattamento polverulento con o senza Zolfi si consiglia l'impiego di Kg. 4 - 4,500 di R 6 B/50 per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i nostri insetticidi, acaricidi e fungicidi di uso comune.

Miscibile agli zolfi in polvere.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto è fitotossico, per alcune Cultivar di pero (Abate Fetel - Armella - Butirra Moretti - Coscia - Curato - Decana del Comizio - Gentil bianca - Gentilona - Giardina - Mora - Santa Maria - Scipiona - Spadona d'estate - Spadoncina - Spinacarpi).

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

1504

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Fungicida cupro-organico
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 14 Rame puro (da Ossicloruro tetraramico al 50% di Cu).
Gr. 40 Mancozeb puro (da p.a. tecnico minimo 80%).
Coadiuvanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

<u>Sintomi di intossicazione</u>

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

<u>Terapia</u>

a) in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

<u>*Controindicati:*</u> *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 1504 Ministero Sanità del 7 - 9 - 1974

E/1

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

L'R 6 - MR è un fungicida cuprorganico indicato per la lotta contro la peronospora della vite nel periodo post-florale.

APPLICAZIONI E DOSI

(In 100 lt. di acqua)

Peronospora della vite (nel periodo post-florale)	dose gr. 300-400
Ticchiolatura del melo e del pero (a seconda dell'epoca di applicazione: le dosi più alte nel periodo pre-fiorale)	dose gr. 200-500
Peronospora, Alternariosi, Septoriosi del pomodoro fino alla prima fioritura	dose gr. 300-400
Ruggine del garofano	dose gr. 400

N B In condizioni poco favorevoli allo sviluppo della Peronospora della vite la dose di R 6 - MR può essere ridotta a gr. 250 per hl. d'acqua. Viceversa in condizioni molto favorevoli allo sviluppo della malattia, la dose dovrà essere elevata a gr. 500 ed in casi estremi a gr. 600 per hl. di acqua.

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare l'R 6 - MR in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile zolfi compresi quelli polverulenti per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora e può essere miscelato con altri antiparassitari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto alle dosi consigliate non è fitotossico.

Non trattare durante la fioritura.

Su varietà di melo. (Abbondanza - « Belford » - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Goolden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Commercio) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard - Armella - Butirra Morettini - Coscia - Curato - Decana del Comizio - Gentil bianca - Gentilona - Giardina - Mora - Santa Maria - Scipiona - Spadona d'estate - Spadoncina - Spinacarpi) sensibili al rame ed allo zineb, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

15101

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CAPTANEB

Fungicida organico per pomacee, vigneti, tabacchicoltura, pomodoro e garofano
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 25 di captan puro (da p.a. tecnico al 91-93%).
Gr. 40 di maneb puro (da p.a. tecnico minimo 80%).
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

a) in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 1510 Ministero Sanità del 22 - 7 - 1974

E/1

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il CAPTANEB è un fungicida organico formato da due principi attivi in proporzioni ben definite per la lotta contro malattie di diverse colture.

Dose d'impiego: gr. 200 per ettolitro d'acqua.

Applicazioni:

IN FRUTTICOLTURA: contro Ticchiolatura delle pomacee.

IN VITICOLTURA: contro peronospora.

IN ORTICOLTURA: contro peronospora, alternariosi, cladosporiosi e septoriosi del pomodoro fino alla prima fioritura.

IN FLORICOLTURA: contro ruggine del garofano.

IN TABACCHICOLTURA: contro peronospora.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

E' compatibile con i prodotti della nostra gamma ad eccezione degli olii e degli zolfi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico, per le varietà di mele, Delicious rosse, Winesap e Renetta del Canadà e la varietà di pero Butirra d'Anjon.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

1529

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

SULFOSOL 80

Zolfo bagnabile micronizzato per la lotta contro l'Oidio della vite, dei fruttiferi, delle piante ortive e ornamentali.

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:

Gr. 80 Zolfo bagnabile micronizzato esente da Selenio (purezza minima 99%) pari a gr. 80,8 minimo di prodotto tecnico.

Sostanze bagnanti e sospensive quanto basta a 100.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

— *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN VITICOLTURA: Contro l'Oidio o Mal Bianco dalla ripresa vegetativa al raccolto gr. 200-300 per ettolitro di acqua.

IN FRUTTICOLTURA: Contro l'Oidio del melo: gr. 500-600 per hl d'acqua nei trattamenti prefiorali; gr. 200-300 nei trattamenti post florali.

Contro l'Oidio dell'albicocco: gr. 300 per hl. d'acqua durante il periodo vegetativo. Con la stagione calda e per trattamenti tardivi su albicocchi da conservare utilizzare il Karathane P.B. gr. 70-80 per hl. d'acqua.

Contro l'Oidio del pesco: dalla fine della fioritura gr. 200 per ettolitro d'acqua + gr. 70 di Bagnante Adesivo Liquido 2. Se la temperatura decorre calda preferire gr. 70-80 di Karathane P.B.

IN ORTICOLTURA E FLORICOLTURA: Contro l'Oidio o Mal bianco del pomodoro, peperone, melanzana gr. 200-300 per hl. d'acqua + gr. 50 di Bagnante Adesivo Liquido 2. Per le colture sensibili (meloni, zucchine, cocomeri) e quando la temperatura oltrepassa i 25° preferire gr. 70-80 di Karathame P.B. + gr. 50 di Bagnante Adesivo Liquido 2 per hl. d'acqua.

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire bene il Sulfosol 80 in una piccola quantità di acqua (poco più di mezzo litro per Kg. di prodotto) e poi aggiungere il volume d'acqua totale agitando accuratamente.

Nel caso di trattamenti misti mescolare preferibilmente il SULFOSOL 80 alla polvere insetticida o fungida e poi procedere come per la preparazione di una poltiglia semplice. Se gli insetticidi sono liquidi, essi vanno aggiunti alla poltiglia di SULFOSOL 80 già pronta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il SULFOSOL 80 è miscibile con molti fungicidi, insetticidi ed acaricidi della nostra gamma. Non è miscibile con olii minerali, con l'Arseniato di calcio con il Captano ed il Binapacryl.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici »

FITOTOSSICITA'

Con temperature elevate il SULFOSOL 80 va usato alle dosi inferiori e il trattamento va effettuato nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio. Distanziare i trattamenti di SULFOSOL 80 da quelli a base di olio e di Captano di almeno 3 settimane.

Il prodotto è tossico per alcune varietà di melo (Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Rome Beauty, Stayman); sostituire il SULFOSOL 80 con gr. 80-90 di Karathane P.B.

NOCIVITA'

Alle dosi d'impiego consigliate, il prodotto non è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Ravit

Reg. N. 1529 Ministero Sanità del 2.3.74

1531

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

DAFENE E

Insetticida a base di Dimetoato, attivo contro Mosca delle olive, delle Ciliege, della frutta ed insetti parassiti delle colture di seguito indicate

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Dimetoato puro
Sostanze solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.
Contiene Xilolo e Cicloesanone

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. n. 1531 Ministero della Sanità del 31-7-75

E/1

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Contro la Mosca dell'olivo: gr. 300/hl.
Eseguire i trattamenti all'inizio dell'ovideposizione, cioè, quando si notano le prime punture di mosca sulle olive.

Contro Mosca delle ciliege: gr. 100/hl.

Contro Mosca della frutta: gr. 250/hl. su pesco, gr. 150/hl. su albicocco, gr. 200/hl su agrumi.

Contro Tignola dell'olivo: gr. 250/hl.

Contro Zeurera del pero: gr. 200/hl.
Eseguire trattamenti distanziati di 12-15 gg. da fine maggio ai primi di settembre.

Contro Biancarosa degli agrumi: gr. 250/hl.
Eseguire due trattamenti a distanza di 15-20 gg. l'uno dall'altro dopo la raccolta e prima della fioritura, oppure nel periodo estivo (fine luglio primi agosto).

Contro Cocciniglia Cotonosa degli agrumi: gr. 250/hl.
Trattare in settembre-ottobre quando si manifestano le prime colonie.

Contro Depressaria del carciofo: gr. 150/hl.
Trattare al momento della nascita delle larve, da fine ottobre alla 3 decade di novembre.

Contro Liotripide dell'olivo gr. 200/hl; Mosca dell'asparago gr. 150-200/hl.; Mosca della barbabietola e dello spinacio gr. 200-300/hl; Mosca del sedano gr. 100/hl; Nottua del carciofo gr. 200/hl; Oziorrinco dell'olivo gr. 300/hl; Psilla del pero gr. 250/hl.; Punteruolo dell'olivo gr. 300/hl; Striscino del garofano gr. 150/hl; Vasate del pomodoro gr. 200/hl.

Contro Afidi, Acari (non residenti agli esteri fosforici), Oplocampe, Tingidi alla dose di gr. 150-250/hl.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto nel quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

Effettuare le irrogazioni coprendo uniformemente le varie parti delle piante interessate al trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **DAFENE E** è miscibile con tutti gli antiparassitari aventi reazione neutra e leggermente alcalina. E' compatibile con i prodotti a base di zolfi idrosospensibili, ditiocarbammati, (solo per le colture previste), composti di rame (eccetto poltiglia bordolese) ed esteri fosforici.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il **DAFENE E** su cedro, limone « interdonato » limone cedrato, arancio amaro, pistacchio, nocciolo e crisantemo.

Non impiegare il **DAFENE E** in trattamenti a basso volume sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

1534

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

DIMETOIL E

Insetticida a base di Dimetoato, attivo contro Mosca delle olive, delle ciliegie, della frutta ed insetti parassiti delle colture di seguito indicate

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Dimetoato puro (da p.a. tecnico al 95-96%)
Sostanze solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Ravit

Reg. N. 1534 : Ministero Sanità del 2.7.75 . . . . .
E/2

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Contro la Mosca dell'olivo: gr. 300/hl.
Eseguire i trattamenti all'inizio dell'ovideposizione, cioè, quando si notano le prime punture di mosca sulle olive.
Contro Mosca delle ciliege: gr. 100/hl.
Contro Mosca della frutta: gr. 250/hl. su pesco, gr. 150/hl. su albicocco, gr. 200/hl. su agrumi.
Contro Tignola dell'olivo: gr. 250/hl.
Contro Zeurea del pero: gr. 200/hl.
Eseguire trattamenti distanziati di 12-15 gg. da fine maggio ai primi di settembre.
Contro Biancarossa degli agrumi: gr. 250/hl.
Eseguire due trattamenti a distanza di 15-20 gg. l'uno dall'altro dopo la raccolta e prima della fioritura, oppure nel periodo estivo (fine luglio primi agosto).
Contro Cocciniglia Cotonosa degli agrumi: gr. 250/hl.
Trattare in settembre-ottobre quando si manifestano le prime colonie.
Contro Depressaria del carciofo: gr. 150/hl.
Trattare al momento della nascita delle larve, da fine ottobre alla 3a decade di novembre.
Contro Liotripide dell'olivo gr. 200/hl.; Mosca dell'asparago gr. 150-200/hl.; Mosca della barbabietola e dello spinacio gr. 200-300/hl.; Mosca del sedano gr. 100/hl.; Nottua del carciofo gr. 200/hl. Oziorrinco dell'olivo gr. 300/hl.; Psilla del pero gr. 250/hl.; Punteruolo dell'olivo gr. 300/hl.; Striscino del garofano gr. 150/hl.; Vasate del pomodoro gr. 200/hl.
Contro Afidi, Acari (non resistenti agli esteri fosforici), Oplocampe, Tingidi di colture diverse, alla dose di gr. 150-250/hl.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto nel quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.
Effettuare le irrorazioni coprendo uniformemente le varie parti delle piante interessate al trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **DIMETOIL E** è miscibile con tutti gli antiparassitari aventi reazione neutra e leggermente alcalina. E' compatibile con i prodotti a base di zolfi idrosospensibili, ditiocarbammati, composti, di rame (eccetto poltiglia bordolese) ed esteri fosforici.

« **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il **DIMETOIL E** su cedro, limone « interdonato » limone cedrato, arancio amaro, pistacchio, nocciolo e crisantemo.

Non impiegare il **DIMETOIL E** in trattamenti a basso volume sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1548

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

FITIOS B/77 E

Insetticida attivo contro mosca delle ciliege, della frutta ed insetti parassiti delle colture di seguito indicate

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Metil Etoato Puro
Sostanze solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo e Cicloesanone.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1548 del Ministero della Sanità del 22 - 7 - 1974
E/1

Il **FITIOS B/77 E** è un estere fosforico ad azione sistemica dotato inoltre di una azione di contatto.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN FRUTTICOLTURA: contro la Mosca della frutta e degli aranci a gr. 250/hl; contro la Mosca delle ciliege a gr. 100/hl; contro il Cemiostoma, appena si notano le mine, a gr. 250/hl; contro Carpocapsa e Cydia, a gr. 250/hl; contro Tortricidi e Tentredine delle susine a gr. 150-200/hl; contro Zeuzera a gr. 300/hl; contro Pseudococcus citri a gr. 100-250/hl; contro Diapsis Pentagona a gr. 100/hl.

IN FLORICOLTURA: contro la Mosca del garofano a gr. 150-200/hl; contro la Tortrice (bega) a gr. 250/hl.

IN ORTICOLTURA: contro la Mosca del sedano e altre mosche delle colture ortive a gr. 200/hl.

IN BIETICOLTURA: contro la Mosca della barbabietola da zucchero da kg. 1 a kg. 1,5 per ettaro.

IN CEREALICOLTURA: contro gli afidi e tripidi a gr. 100-250/hl.

MODALITA' D'IMPIEGO

Mettere la dose di **FITIOS B/77 E** in pochi litri di acqua; agitare energicamente e, ad emulsione ottenuta, portare a volume. Bagnare uniformemente le piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **FITIOS B/77 E** non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

1559

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

GRANITHEX

Diserbante selettivo

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 DNOC puro (purezza 95%) pari a gr. 52,64 di prodotto tecnico.
Sostanze solubilizzanti e diluenti quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 1559 Ministero Sanità del . 27.2.1975.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione; per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego, usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale, o per assorbimento attraverso la pelle.

— **Sintomi d'intossicazione:**

*Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psico motoria - tachicardia - dispnea - notevole ipetermia - colorazione gialla delle sclere - la morte consegue ad edema **cerebrale** e paralisi respiratoria e circolatoria.*

— **Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso**

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1‰ od iposolfito di sodio al 5‰. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni all'esofago molto frequenti nel caso di ingestioni. Combattere l'ipertemia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda - trasfusioni o fleboclisi glucosate a 5‰ o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collassi od ipotensioni. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale - ossigeno, respirazione artificiale.

— **Controindicazioni**

Atropina.

CARATTERISTICHE

Agisce contro le erbe infestanti annuali resistenti al 2,4 D' ed all'MCPA. In considerazione di ciò se ne consiglia l'impiego dopo qualche anno di diserbo effettuato con questi ultimi prodotti.
Può essere impiegato su tutte le varietà di frumento, orzo, avena, segale, ed in vicinanza di colture sensibili agli altri erbicidi.
La formula crema permette una diluizione istantanea. Alcuni giorni sono sufficienti per ottenere la distruzione totale delle erbe infestanti .
Il GRANITHEX distrugge specialmente:
camomilla selvatica, paverina o stelaria, poligono persicaria ed avinculare, capsella borsa del pastore, chenopodio, papavero, veccia, **crisantemo delle messi,** ravanella, senape, **veronica,** ranuncolo.

EPOCA D'IMPIEGO SUI CEREALI

Trattare sempre molto presto: a partire da quando la piantina del cereale presenta 2 o 3 foglie e fino alla fine dell'accestimento, allorquando le erbe infestanti sono giovani. Per i cereali d'inverno le epoche migliori sono in novembre e inizio dicembre, oppure nei primi giorni belli di fine inverno.
Nota: per i cereali consociati ad una leguminosa trattare 15 giorni prima della semina del trifoglio o, dovendo trattare dopo la semina, impiegare Herbidal E. 30.

MODO D'IMPIEGO

Aggiungere progressivamente acqua alla quantità necessaria di GRANITHEX posta in un secchio; versare in seguito questa poltiglia concentrata nella pompa e completare con l'acqua necessaria, agitando.
Il GRANITHEX deve essere utilizzato con una quantità sufficiente di acqua:
- 400 litri o più per ettaro quando le condizioni sono favorevoli e le infestanti molto giovani.
- 600 litri o più per ettaro se il trattamento è tardivo o se il tempo è umido o coperto.

DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

Diserbo cereali
Dose normale: Kg. 7 per ettaro.
Dose debole: Contro erbe infestanti molto giovani ed in piena vegetazione: Kg. 5 per ha.
Dose forte: Per un trattamento tardivo o contro: veccia, crisantemo delle messi, bifora Kg. 9/12 per ettaro.
Distruzione della cuscuta nelle leguminose
Falciare in primavera le zone parassitate con un margine di 2 metri intorno alla zona stessa. Trattare impiegando ogni 100 mq litri 30 di una poltiglia contenente 1 Kg. di GRANITHEX per ettolitro. Trattare soltanto le leguminose impiantate da almeno un anno.
Lotta contro Escoriosi e Mal dell'Esca della vite:
Eseguire un trattamento a fine inverno, nel momento del « pianto della vite », circa 15 giorni prima del germogliamento, mediante irrorazione alle piante con una poltiglia di GRANITHEX Kg. 1 in 100 litri di acqua.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITA'

Il prodotto s'impiega da solo

FITOTOSSICITA'

Alle dosi e norme d'impiego consigliate, il prodotto non è fitotossico per le colture

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZE

Il GRANITHEX non caustico e non attacca metalli, gomma, legno ma macchia fortemente i tessuti per cui è consigliabile usare indumenti idonei durante i trattamenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1565

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

PARAFENE ROSSO

Insetticida agricolo

Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Parathion tecnico (purezza 97-98%) pari a gr. 19,40-19,60 di prodotto puro.
Sostanze solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 1565 Ministero Sanità del . . 22.7.74

Natura del rischio:

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirare i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli queste etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

Scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.

Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni:

Morfina, Vitamina B 1, Coramina, Latte e grassi.

PRINCIPALI IMPIEGHI

Dosi: gr. 200-300 per ettolitro d'acqua.

IN FRUTTICOLTURA: contro Antonomo, Tingidi, Carpocapsa, Cydia, Lepidotteri minatori, Afidi, Cocciniglia di S. José, Eriofide del pesco, Mosca della frutta, Diaspis pentagona (generazioni estive).

IN VITICOLTURA: contro Piralide, Tignole dell'uva, Altica, Ragno giallo, Cocciniglia bianca cotonosa.

IN OLIVICOLTURA: contro Tignola, Cocciniglie, Fleotribo, Cotonello, Rinchite, Cimice.

IN ORTICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI: contro Afidi, Tripidi, Altiche, Meligete del colza, Coleotteri fillofagi.

IN AGRUMICOLTURA: contro Afidi, Cocciniglie, Mosca, Tripidi, Tignola, Cicalina.

IN FLORICOLTURA: contro Afidi, Tripidi, Psille, Mosche bianche, Bega del garofano.

NORME D'IMPIEGO

Il PARAFENE ROSSO nella dose occorrente, va versato in poca acqua, agitando la miscela con un bastone; si aggiunge quindi altra acqua, sempre agitando, fino al volume richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, i volatili, la selvaggina ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1570

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

NEODAFENE

Insetticida attivo contro mosca delle ciliege, della frutta ed insetti parassiti delle colture di seguito indicate

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Metil Etoato Puro
Sostanze solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo e Cicloesanone.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 1570 del Ministero della Sanità del 22 - 7 - 1974

E/1

Il **NEODAFENE** è un estere fosforico ad azione sistemica dotato inoltre di una azione di contatto

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN FRUTTICOLTURA: contro la Mosca della frutta e degli aranci a gr. 250/hl; contro la Mosca delle ciliege a gr. 100/hl, contro il Cemiostoma, appena si notano le mine, a gr. 250/hl; contro Carpocapsa e Cydia, a gr. 250/hl; contro Tortricidi e Tentredine delle susine a gr. 150-200/hl; contro Zeuzera a gr. 300/hl, contro Pseudococcus citri a gr. 100-250/hl; contro Diapsis Pentagona a gr. 100/hl.

IN FLORICOLTURA: contro la Mosca del garofano a gr. 150-200/hl; contro la Tortrice (bega) a gr. 250/hl

IN ORTICOLTURA: contro la Mosca del sedano e altre mosche delle colture ortive a gr. 200/hl.

IN BIETICOLTURA contro la Mosca della barbabietola da zucchero da kg. 1 a kg. 1,5 per ettaro.

IN CEREALICOLTURA: contro gli afidi e tripidi a gr. 100-250/hl.

MODALITA' D'IMPIEGO

Mettere la dose voluta di **NOEDAFENE** in pochi litri di acqua; agitare energicamente e, ad emulsione ottenuta, portare a volume. Bagnare uniformemente le piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **NEODAFENE** non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

1571

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

DATHIOS E

Insetticida selettivo a base di Endosulfan, dotato di azione di contatto e di ingestione sugli insetti di seguito indicati, dannosi in agricoltura.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
35 di Eudosulfon puro (purezza 98-99%) pari a gr. 35,71-35,55 di prodotto tecnico.
Sostanze solvente, emulsonanti e coadiuvanti quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1571 Ministero Sanità del . 19.4.1975 .

Natura del rischio:
Rischio d'intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego, usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intosicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologia contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

PRINCIPALI IMPIEGHI

In frutticoltura:
Contro la Psilla del pero gr. 150-200/hl; Afide verde ed altri Afidi gr. 100-150 per hl.; Litocollete ed altri minatori fogliari delle pomacee gr. 150/hl; Eriofide del nocciuolo gr. 150/hl; Cicadelle, Tentredini del pero, melo e susino, maggiolino gr. 100-150/hl.

In orticoltura:
Contro la Dorifora della patata gr. 200-400/hl; contro Criocera dell'asparago, Altiche, Punteruoli, Pieridi, Tignole delle crucifere, Cavolaia, Afidi, Tripili, Cimici gr. 150/hl.

In floricultura:
Contro Afidi, Tripidi, Tarsonemo del ciclamino, Cimici, Cicadelle, gr. 100-150/hl.

Su altre colture:
Afidi, Tripidi, Cimici, Maggiolino, Cicadelle gr. 100-150/hl; Altica, Cleono, Lixus delle barbabietole a gr. 200/hl; Penteruolo e Cecidomia del Colza Kg. 2-2,5/ha; Meligete del colza Kg. 1,2-1,5/ha; Apion, Fitonomo, Ozziorrinco delle colture foraggere, Cecidomia dei fiori di medica Kg. 1,25-1,5ha; Maggiolino e Crisomela del pioppo gr. 750-900/ha; Formica argentina gr. 400-500 hl.

Esche
Contro Nottue, impiegare gr. 60 di DATHIOS E per 10 Kg. di crusca, mescolare uniformemente con 6-8 litri di acqua e impiegare Kg. 40-50 per ettaro di esca così preparata.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il DATHIOS E è un liquido emulsionabile che si mescola istantaneamente in acqua.

Irrorare l'emulsione sulle piante curando una uniforme copertura di esse.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il DATHIOS E non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate, il prodotto non è fitotossico per le colture.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso del trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGITARE PRIMA DELL'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1579

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ZITIOL E

Insetticida agricolo di sintesi
agisce per contatto, ingestione e vapore

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Malathion puro
Sostanze solubilizzanti quanto basta a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare praliddossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:

morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 1579 Ministero della Sanità del 27 - 2 - 1975

PRINCIPALI IMPIEGHI

Frutticoltura: pero, melo, pesco, albicocco, susino, mandorlo, ciliegio, agrumi, olivo, nocciolo contro Afidi in genere, Tripidi, Oplocampe, Cydia, Carpocapsa gr. 200 per hl.
Viticoltura: contro Tignole gr. 200 per hl.
Floricoltura in Pieno Campo: contro Afidi, Tripidi, Cocciniglie: gr. 200 per hl.
Orticoltura ed altre colture: fagiolo, fagiolino, pisello, pomodoro, peperone, melanzana, patata, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, sedano, carota, carciofo, cipolla, aglio, cavolo, cavolfiore, cavolo verza: contro Afidi, Tripidi, Cocciniglie a gr 200 per hl.

MODALITA' D'IMPIEGO

Lo **ZITIOL E** può essere versato direttamente nel quantitativo di acqua necessaria avendo cura di agitare bene durante la preparazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Lo **ZITIOL E** è compatibile con tutti gli anticrittogamici e insetticidi della nostra gamma di produzione; non è compatibile con la Poltiglia Bordolese e solfo calcica.
L'aggiunta di Etaldyn è consigliabile per ottenere un effetto totale.
« **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo ».
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api; non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.
E' tossico anche per gli animali domestici i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

E/2

1582

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

REDREX

Acaricida selettivo

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 18,5 Kelthane puro (purezza minima 82%) corrispondente a gr. 22,56 minimo di prodotto tecnico.
Sostanze adevisanti, emulsionanti e solventi quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 1582 Ministero Sanità del . 12.11.1974

Natura del rischio:
Rischio d'intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impeigo del Prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

La morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

Tenere lontano dal fuoco.

CARATTERISTICHE

Il **REDREX** è efficace nel controllo dei vari acari. Esso ha un potere iniziale abbattente ed un effetto residuo. Il **REDREX** è un acaricida selettivo e non uccide la maggior parte dei predatori. E' efficace contro ragnetti rossi, gialli, allungati.

APPLICAZIONI

Su pomacee: gr. 250 per hl.
Su drupacee: gr. 200-250 per hl.
Su vite, agrumi, noce, nocciuolo, fragole, lampone, ortaggi.: gr. 200-250 per hl.
Per il controllo degli acari sulle rose, azalee, cactus astri, crisantemi, ciclamini, dalie, gigli, gardenia, gerani, gladioli, edera, ortensia, petunie, oleandri, usare da gr. 125 a gr. 250 per 100 lt. d'acqua .Sulle piante sensibili usare la dose più bassa. Con forti attacchi si raccomanda di usare le dosi alte.
Ripetere i trattamenti a seconda della necessità.
Trattare accuratamente le piante onde assicurare una completa copertura di tutte le foglie. Sulle foglie difficili a bagnarsi aggiungere Bagnante Adesivo Liquido 2.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITA'

Il RENDREX è compatibile con la maggior parte degli altri insetticidi e fungicidi, e può essere usato da solo o in combinazione con Parathion, Malathion, Lindano, Arseniato di Piombo ,Dithane, Karathane, zolfo ed olii. Non deve essere usato in combinazione con alcun pesticida non compatibile con il solvente base della formulazione.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.
Non trattare su melanzane: tale coltura può essere danneggiata.

NOCIVITA'

Il prodotto non è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1593

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

MITEX E

Composizione:
Gr 100 di prodotto contengono:
Gr. 30 di Fenson puro (purezza 98-99%) pari a gr. 30,81-30,30 di prodotto tecnico.
Sostanze bagnanti, solventi ed emulsificanti quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1593 Ministero Sanità del . 5.11.1974.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impeigo del Prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **MITEX E** svolge azione contro uova e forme giovanili degli acari. Esso non agisce pertanto contro insetti utili (impollinatori, predatori e parassiti degli insetti dannosi) e perciò non riesce nocivo al naturale equilibrio biologico.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il **MITEX E** è un preparato ad azione contro le uova estive dei ragnetti rossi.
Dose d'impiego: gr. 100-150 in 100 lt. di acqua.

Il **MITEX E** agisce contro le uova e contro le forme giovanili dei ragnetti rossi e degli altri acari che infestano: Agrumi (Ragnetti rossi ed Eriofide delle « Meraviglie » o Aceria Sheldoni), Meli, Peri, Peschi, Mandorli, Viti, Cotone, Pomodori (Eriofide « Vasates »), Rose, Garofani.

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere il **MITEX E** nella richiesta quantità di acqua agitando per qualche minuto.
L'emulsione ottenuta va spruzzata sulle piante a mezzo delle comuni pompe a mano o a motore, curando una perfetta nebulizzazione, in modo da assicurare una uniforme copertura di entrambe le pagine delle foglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **MITEX E** può essere miscelato con insetticidi, possibilmente emulsionabili, a base di Parathion.
Non è miscibile con poltiglia bordolese o con altri prodotti o miscele a reazione alcalina.

« **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate, il prodotto non è fitotossico per le colture.

NOCIVITA'

Alle normali dosi d'impiego il prodotto non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltrua. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGITARE PRIMA DELL'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1602

Faneron® IC 50 WP

Polvere bagnabile
Diserbante di post-emergenza selettivo per il frumento

Composizione
100 g di prodotto contengono:
35 g di bromofenoxim tecnico, purezza minima 93 %, pari a g 33 di 3,5-dibromo-4-idrossibenzaldossima, 0-(2',4'-dinitrofenil)-etere puro
18 g di terbutrina o GS 14260 tecnica, purezza 95 %, pari a g 17 di 2-terz. butilammino-4-etilammino-6-metiltio-s-triazina
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Agisce essenzialmente come erbicida fogliare di contatto ed in misura minore come erbicida ad azione residua nel terreno.
Controlla la maggior parte delle infestanti annuali a foglia larga (quali, Bifora, Camomilla, Canapa selvatica, Capsella, Fiordaliso, Fumaria, Papavero, Poligoni, Rafano, Stellaria, Veronica, Veccia, Viola) ed anche – ma solo nei primi stadi di sviluppo – alcune graminacee annuali (quali, Alopecurus, Lolium, Poa). Sono invece resistenti le malerbe provenienti da organi di propagazione vegetativa (stoloni, cespi) quali Stoppione, Romice, Artemisia.

Epoca di trattamenti
Il prodotto si impiega solo in post-emergenza ossia dopo l'emissione della quarta foglia del frumento ed alla comparsa delle infestanti. Queste sono più sensibili al prodotto quando si trovano nelle prime fasi del loro sviluppo.

Da non applicare con i mezzi aerei

Dosi d'impiego
Kg 1,5-2 in 500 litri o più d'acqua per ettaro.
Utilizzare le dosi più elevate quando le infestanti sono più sviluppate oppure nei terreni più ricchi di sostanza organica.

Trasemina - L'impiego del Faneron IC 50 WP consente la trasemina nel frumento delle colture leguminose (trifoglio, ladino) che può essere fatta a breve distanza dal trattamento (circa 10 giorni).

Compatibilità - La miscela con altri prodotti non è prevista; il prodotto, comunque, non dà luogo a fenomeni di incompatibilità.
« Avvertenza » - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - Dopo l'applicazione del prodotto possono occasionalmente manifestarsi sintomi di sofferenza della coltura; si tratta, però, di fenomeni transitori che in condizioni normali scompaiono in breve tempo e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti ,non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (Va)
Officina di produzione:
SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione ministero della Sanità N. 1602 del 10.6.74

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg 1
Kg 5
Kg 25

® marchio registrato

1612

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

NABAREX

Disalgante e fungicida agricolo per la lotta contro le alghe infestanti della risaia e contro crittogame di colture ortive di seguito indicate.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 93 di Nabam tecnico (purezza 91-94%) pari a gr. 84,6-87,4 di prodotto puro.
Sostanze eccipienti e coadiuvanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Intossicazioni grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabile dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc).

— Terapia:

In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

— Controindicazioni:

Alcool, olii, grassi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il **NABAREX** è un prodotto in polvere solubile di norma caratterizzato da una valida e rapida efficacia contro alghe presenti nella risaia.

E' altresì efficace contro alcune crittogame di colture ortive quali la Peronospora del peperone.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

IN RISICOLTURA: contro le alghe infestanti delle risaie.

Applicazioni al seme: mescolare Kg. 2-2,5 di **NABAREX** per q.le di seme, preventivamente inumidito, ma non pre-germogliato. Procedere poi alla semina. Durante questo periodo il movimento d'acqua deve essere ridotto al minimo.

Applicazioni preventive: 3-5 giorni dopo la semina del riso, in risaia non ancora invasa da alghe o appena all'inizio della infestazione, disporre, nella bocchetta della camera di imboccatura, dei recipienti opportunemente forati contenenti il **NABAREX** in maniera da permettere l'entrata dell'acqua da una parte e l'uscita della soluzione del prodotto dall'altra. Usare Kg. 1 di **NABAREX** per giorno e per ettaro di risaia, per la durata di 6-8 giorni.

Risultati notevolmente inferiori si sono ottenuti aumentando la dose giornaliera e riducendo il numero dei giorni di somministrazione. Importante si è rivelato praticare quegli accorgimenti nel governo delle acque, che consentano dapprima una rapida ed uniforme dispersione del prodotto, e, in un secondo tempo, quel moderato ricambio di acqua che costituisce la condizione essenziale per aumentare la persistenza dell'attività alghicida.

Applicazioni curative: quando le alghe hanno costituito il tipico feltro, abbassare il livello dell'acqua in risaia a 10-15 cm. cercando di mantenerlo col minimo ricambio possibile. Distribuire poi con una pompa irroratrice la soluzione di **NABAREX** alla dose di 7-10 Kg/ha.

Usare la dose elevata con feltri compatti e temperature basse.
Dopo 36-48 ore ristabilire il normale livello dell'acqua.

E' sempre consigliabile intervenire preventivamente o all'inizio della formazione del feltro. Trattamenti su feltro ispessito possono dare risultati incompleti.

IN ORTICOLTURA: contro Phytophtora capsici (Peronospora del peperone).

In applicazioni nell'acqua d'irrigazione (per scorrimento).

Per una superficie di 1 000 mq da trattare, ad esempio, diluire 600-700 gr. di prodotto in una quantità di acqua variabile dal 20 al 40 litri. La soluzione così ottenuta sarà versata progressivamente sull'acqua che scorre all'imboccatura del canale principale d'irrigazione. All'uopo utilizzare di preferenza un recipiente munito di rubinetto. L'erogazione deve essere regolata in maniera tale che la quantità di soluzione prevista venga mescolata all'acqua durante tutta la durata dell'irrigazione.

Con questo si vuol dire che è necessario iniziare la erogazione della soluzione disinfettante a base di **NABAREX** dal momento in cui l'acqua inizia a scorrere nella conduttura principale fino alla chiusura della bocchetta di emissione.

Si debbono prevedere circa 20 irrigazioni per stagione che rappresentano in totale Kg. 12-14 di **NAGAREX** per 1 000 metri quadri (cioè Kg. 120-140 per ha).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi e modalità d'impiego consigliate, il prodotto non è fitotossico nei confronti dei germinelli e delle giovani piantine di riso. Non è fitotossico per le applicazioni sulle colture ortive indicate.

Non si deve utilizzare il NABAREX per trattamenti diretti sulle piante.

NOCIVITA'

Se applicato a dosi e modalità suggerite, il prodotto non è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, le rane ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZE

Chiudere ermeticamente il sacchetto subito dopo l'uso, conservandolo in luogo asciutto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1612 Ministero Sanità del . 20.2.1975 .

1613

ANTRACOL

FUNGICIDA ORGANICO

per irrorazioni su viti, pomacee, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano, tabacco, riso e per la concia secca e umida del riso da seme

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Antracol contengono:
g 70 di propineb puro;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
— Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.
Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,15-0,2% contro peronospora.
Pomacee: 0,15-0,2% contro ticchiolatura.
Pomodoro fino alla prima fioritura: 0,2% contro alternariosi, peronospora, ticchiolatura e septoriosi.
Garofano: 0,15-0,2% contro ruggine.
Tabacco: 0,2% contro peronospora.
Riso: concia della semente: 200-250 g/q.le contro elmintosporiosi (Drechslera oryzae); per la concia umida diluire la dose prescritta di prodotto in acqua (da 500 a 1.000 cc a seconda delle apparecchiature usate) e quindi mescolare con la semente il più uniformemente possibile.
400-500 g/q.le contro alghe.
N.B. - La semente trattata non deve essere destinata all'alimentazione umana o animale.
Trattamenti in vegetazione: 3 kg/ha contro alghe e elmintosporiosi.

Divieti d'impiego

— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: l'Antracol è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: varietà di pere sensibili al propineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 1613 del 29-4-1974

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria

1618

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile al bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.

NOTA BENE
'SANSPOR' può essere irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi. In soggetti particolarmente sensibili si possono verificare manifestazioni anche vistose ma transitorie e non preoccupanti. Evitare tuttavia il contatto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polvere nel maneggio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia. **Terapia:** lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

AVVERTENZE
Su uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti. Su uve da tavola e sulle altre colture sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'SANSPOR'

Fungicida acuprico in formulazione liquida per trattamenti in viticoltura, frutticoltura, olivicoltura, orto-floricoltura

COMPOSIZIONE

Captafol puro	g 39
Disperdenti, adesivanti, inerti	q.b. a g 100

CLASSE IV

'SANSPOR' è un fungicida acuprico in particolare formulazione liquida, che offre i seguenti vantaggi:
omogenea sospensibilità del principio attivo;
completa copertura delle parti trattate;
semplicità di impiego, poichè è già predisposto per la diretta diluizione in acqua.

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE E DOSI DI IMPIEGO (riferite a 100 litri d'acqua).

g 200-300: **Ticchiolatura** del melo; **Phomopsis vexans e Botrytis** della melanzana; **Crittogame in genere** della lattuga, dei fagioli, delle fragole, del luppolo; **Botrytis** dei tulipani; **Ruggine** degli anemoni; **Maculatura fogliare** del ciclamino; **Bolla** del pesco, **Ticchiolatura** del nespolo; **Moniliosi** dei fiori di albicocco.

g 200-400: **Peronospora** e **Botrytis** (muffa grigia) della vite; **Peronospora** della patata e del pomodoro; **Alternariosi** della patata e del pomodoro.

g 400-500: **Ruggini** e **Alternariosi** del sedano e della cipolla.

g 500-600: **Occhio di pavone** e **Antracnosi** dell'olivo.

ISTRUZIONI PER L'USO
Data la formulazione del prodotto, per ottenere una sospensione acquosa uniforme, è sufficiente versare la prescelta dose di 'SANSPOR' nella quantità di acqua necessaria agitando per qualche momento.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ
'SANSPOR' può essere miscelato con la maggior parte degli anticrittogamici ed insetticidi di uso comune, ad eccezione della calce od altri prodotti fortemente alcalini.
Non è miscibile con poltiglia bordolese. Non può essere applicato in associazione con gli olii e fino ad almeno 20 giorni dopo il loro impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 1618 del 25-6-1974
SANSPOR' marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

DA NON VENDERSI SFUSO

g 100

1627

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

SUMIFENE 50 E

Insetticida fosfo-organico

Prodotto dalla Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Fenitrothion puro (purezza 95-97%) pari a gr. 52,63-51,55 di prodotto tecnico.
Emulsionanti e bagnanti quanto basta a 100.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. N. 1627 Ministero Sanità del . . . 5.11.74

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impeigo del Prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:
scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersioni con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni
Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

CARATTERISTICHE

Il SUMIFENE 50 E è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione.

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

In frutticoltura: contro Psille resistenti, Afidi, Carpocapsa, Rhagoletis e Zeuzera a gr. 120-160 per ettolitro; contro le minatrici delle foglie a gr. 200 per ettolitro.

In orticoltura: contro Afidi e Tripidi a gr. 120-160 per ettolitro.

In olivicoltura: contro il Dacus Oleae a gr. 150 per ettolitro.

In viticoltura: contro Tignola, Sigaraio a gr. 120-160 per ettolitro.

In floricoltura: contro Afidi e Mosche delle colture floricole e ornamentali a gr. 100-120 per ettolitro.

In bieticoltura: contro coleotteri parassiti (Cleono, ecc.) alla dose di Kg. 2-2,5 per ettaro.

In risaia: contro Coppette e Chironomi alla dose di Kg. 1 per ettaro.

MODALITA' D'USO

Il SUMIFENE 50 E può essere versato direttamente nel quantitativo di acqua necessario, avendo cura di agitare bene durante la preparazione.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITA'

Il SUMIFENE 50 E è miscibile con tutti gli anticrittogamici e insetticidi della ns. gamma di produzione; non è compatibile con la Poltiglia Bordolese e solfo calcica e arseniati di calce e zinco.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Dovono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate, il prodotto non è fitotossico per le colture.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1628

Gesal orto insetticida polivalente

Composizione
100 g di prodotto contengono: Fenitrothion puro g 47,5 Solventi ed emulsionanti q.b. a g 100. Contiene XILOLO

Classe III
Attenzione: manipolare con prudenza

AIRWICK Italia S.p.A.

Officina di produzione:
SARIAF S.p.A., Faenza (RA)

Registrazione n. 1628 del 22 - 7 - 1974 del Ministero della Sanità.

Natura del rischio Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico. Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso. In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg per gli adulti; 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

Modalità d'impiego Gesal Orto Insetticida polivalente è indicato in: **Frutticoltura:** si impiega alla dose di g 150 per 100 litri d'acqua per trattamenti al secco, prima della ripresa vegetativa su: Ciliegio (afidi, mosca della ciliegia). Melo (afidi, carpocapsa, Ceratitis Capitata o mosca della frutta). Pero (afidi, psilla, tingidi). Pesco (afidi). **Orticoltura:** si impiega alla dose di g 80-120 per 100 litri di acqua su: Cavolo (cavolaia), Barbabietola (agrotide), Patata (nottue della patata), Cipolla (tignola).
Preparazione dell'emulsione Diluire in poca acqua e sotto agitazione versare nel totale quantitativo di acqua.
DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI
Compatibilità Il prodotto è miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.
Avvertenze In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto. **Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 gg**
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO ml

1651

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

HERBIDAL L

Diserbante selettivo a base di estere non volatile dell'acido 2,4-D per il diserbo dei cereali.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 48 di estere isobutilico dell'acido 2,4 diclorofenossiacetico (purezza del prodotto tecnico 95 - 98% pari a 76 - 78% di acido libero) equivalente a gr. 37 di acido.
Sostanze emulsionanti quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 1651 Ministero Sanità del . 23-10-1974

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

— **Sintomi d'intossicazione:**

Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - fibrillazione ventricolare - convulsioni - coma.

— **Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso**

Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

— **Controindicazioni**

E' sconsigliata la digitale.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Diserbo del grano: il periodo utile per il trattamento è quello compreso fra la **fine dell'accestimento e lo stadio che precede la formazione della botticella.** La dose da impiegare va da kg. 0,4 a kg. 1,5 per ettaro.

Le dosi più basse si impiegano quando le infestanti sono giovani ed in piena attività vegetativa, e le temperature sono più alte. Perché il prodotto manifesti la sua efficacia occorre che la temperatura sia almeno di 10-15° C.

La quantità di acqua da distribuire può variare, a seconda del tipo di irroratrice di cui si dispone. Se si opera con le comuni irroratrici a getto nebulizzato si possono distribuire in media 200 litri per ettaro.

Se si opera con apparecchi atomizzatori si può scendere fino ad un minimo di litri 50 per ettaro. Per la preparazione della emulsione basta versare la dose voluta HERBIDAL L in acqua e agitare.

L'HERBIDAL L distrugge fiordaliso, capsella o borsa del pastore, cardo, ravanello, senape, veccia, papavero, farinaccio, convolvolo, ranuncolo, acetosella, pettine di venere. Per la sua rapidità di penetrazione l'HERBIDAL L mantiene la sua efficacia anche in caso di pioggia subito dopo il trattamento.

Spollonatura del nocciuolo: l'HERBIDAL L si può impiegare per la lotta chimica ai polloni erbacei dell'annata.

Impiegare kg. 0,800-1,000 di prodotto per 100 litri di acqua, localizzando scrupolosamente il getto sui polloni da distruggere, per evitare danni alla pianta madre. Effettuare il trattamento quando i polloni erbacei hanno emesso la 5ª foglia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Causa l'attività dell'HERBIDAL L anche minime qualità di prodotto possono provocare danni alle colture sensibili vicino a quelle da trattare, come vite, leguminose, alberi da frutta e piante ortensi.

Conseguentemente: non trattare in prossimità di vigneti.

Qualora colture sensibili, come fruttiferi, leguminose, bietole, ortaggi si trovino in prossimità di cereali da trattare, osservare le seguenti norme:

1) trattare durante giornate senza vento e con temperatura dolce;

2) utilizzare un apparecchio distributore erogante almeno 200 litri per ettaro impiegandolo a debole pressione e con barre molto basse per evitare la formazione di particelle troppo piccole che possono essere trasportate anche da deboli correnti d'aria nelle colture vicine le quali potrebbero restare danneggiate.

Non gettare i residui della soluzione in acqua che debba servire per la preparazione di poltiglie per trattamenti antiparassitari o per irrigazione.
Pulire accuratamente gli apparecchi e attrezzi usati per il trattamento, con soda al 5%. I recipienti di legno e quelli porosi sono difficilmente bonificabili e non più utilizzabili per la preparazione e distribuzione di insetticidi o anticrittogamici.

NOCIVITA'

Se impiegato secondo le istruzioni e con le precauzioni consigliate, il prodotto non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1655

DU PONT

LANNATE* L

CLASSE I°

VELENO

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 di Metomil tecnico ovvero (S. metil-N- (metilcarbomoil - ossi) - Tioacetimidato) (purezza 95%). Pari a gr. 19 di prodotto puro.
Sostanze emulsionanti quanto basta a 100.

Insetticida liquido a base di Metolil

* Marchio registrato dalla E. I du Pont de Nemours & Co (Inc.)

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione; per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirare i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.
Nel caso che il prodotto raggiunga incidentalmente gli occhi, lavarli per 15 minuti con acqua abbondante. Recarsi dal medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

Miosi, sudorazione profusa, debolezza, polso lento, nausea e vomito, tremori muscolari, visione confusa, crampi addominali e diarrea.

Trattamento

— Nel caso di inalazione, trasportare il paziente in ambiente non contaminato.

— Nel caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare prontamente la pelle o gli occhi contaminati con acqua abbondante.

— In caso di ingestione lavanda gastrica.

— All'apparizione di segni locali o sistemici o di sintomi di avvelenamento colinesterasico somministrare atropina:

Intossicazione leggera: 1, 2-2 mg. per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento ad intervalli di 10-30 minuti fino a comparsa di fenomeni di atropinizzazione;

Intossicazione severa: 2-4 mg. per via intravenosa, ripetendo la somministrazione di 2 mg. ogni 3-10 minuti fino a scomparsa dei segni e dei sintomi;
non somministrare 2-PAM: controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione;

— se necessario rimuovere le eccessive secrezioni e mantenere aperte le vie respiratorie;

— in caso di severa intossicazione praticare la respirazione artificiale o ossigenoterapia;

— per alleviare le convulsioni, nel caso che interferiscano con la respirazione e non siano alleviate dall'atropina, somministrare sodio thiopental (soluzione 2,5%) intravena.

Pronto soccorso:

— se ingerito provocare il vomito con acqua salata calda (1 cucchiaio da tavola di sale in 1 bicchiere d'acqua), ripetendo fino a che il vomito non sia chiaro;

— se inalato allontanare il paziente dall'ambiente contaminato, far coricare e riposare calmo;

— in caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare la pelle o gli occhi con abbondante quantità di acqua;

— se il paziente mostra difficoltà respiratoria praticare immediatamente la respirazione artificiale;

— somministrare 2 tavolette di atropina da 0,6 mg. per via orale o facendole sciogliere sotto la lingua, se sono disponibili. In seguito, ogni 10-15 minuti, somministrare una tavoletta di atropina fino a che la gola e la pelle siano asciutte.
Se necessario somministrare altre tavolette per mantenere asciutta la gola e la pelle.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. N. 1655 Ministero Sanità del 20.2.75. . .

CARATTERISTICHE

Il LANNATE L è un insetticida per il controllo di larve ed adulti degli insetti di seguito indicati che attaccano: fruttiferi, vite, colture industriali, ortive e ornamentali. Il prodotto non è dotato di attività aracaoida e nematocida.

Distribuire il prodotto con una quantità sufficiente di acqua per ottenere una uniforme e completa distribuzione sulle parti trattate.

Non applicare con attrezzature a basso volume.

In generale la dose d'impiego più bassa viene consigliata per gli intervalli più brevi fra un trattamento e quello successivo, viceversa la dose più alta si raccomanda per lunghi intervalli. La migliore efficacia si ottiene con la tempestività del trattamento, colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo.

PREPARAZIONE DELLA EMULSIONE

Immettere acqua nel serbatoio della pompa pari ad un quarto-metà del volume necessario. Mettere in moto l'agitatore meccanico od idraulico. Aggiungere la quantità stabilita di LANNATE L e agitando portare a volume desiderato.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

AFIDI
Dose gr. 180-220 per 100 litri d'acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione.
Il LANNATE L è efficace contro gli Afidi di tutte le colture sottocitate inclusi gli Afidi del Tabacco e delle Drupacee compreso l'Afide Verde del pesco (Myzus Persicae) anche se resistente agli organofosforici.

MELI E PERI
Minatori: contro larve alla dose di gr. 250 per 100 litri di acqua.

Lithocolletis Blancardella F. E.: per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare sempre contro le larve di primo stadio, cioè quando sono visibili sulle foglie come « macchie d'olio ».

Leucoptera (cemiostoma) Scintella zell.: è consigliabile applicare il LANNATE L all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle « macchie circolari » sulle foglie hanno un diametro inferiore a 5 mm.

VITE
Tignole: (Lobesia Botrana Schiff e Clysia Ambiguella Hb).
Applicare il LANNATE L come curativo e preventivo alla dose di gr. 200-250 per 100 litri di acqua. In base allo stato vegetativo della pianta ed al grado di infestazione della stessa.
Un solo trattamento, eseguito al momento opportuno, può essere sufficiente per il controllo dell'insetto.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Cleono: (Temnorrhinus mendicus) Dose gr. 250 per 100 litri di acqua.
Usare non meno di Kg. 2 per ettaro di LANNATE L. Eseguire il trattamento alla prima comparsa degli insetti e ripeterlo una o due volte ad intervallo di 12-15 giorni.

Altica: (Chaetocnema Tibialis) Dose gr. 200 per 100 litri di acqua quando l'insetto appare sulle soglie.

POMODORO - MELANZANA E CUCURBITACEE
Nottue: Dose gr. 200 per 100 litri di acqua. Eseguire il trattamento quando le prime larve dell'insetto appaiono sui frutti e ripeterlo a 5-7 giorni durante il periodo vegetativo. E' consigliabile l'aggiunta del Bagnante Adesivo Liquido 2.

FAGIOLO PISELLO
Larve di Lepidotteri: Dose gr. 180-200 per 100 litri di acqua. Eseguire il trattamento all'inizio dell'infestazione e ripeterlo in caso di reinfestazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il LANNATE L è generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenze. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali selvatici e domestici e per il bestiame.

Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni.

Il prodotto è anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area trattata.

Tenere lontani durante il trattamento persone non protette, animali e bestiame.

Sospendere il trattamento 14 giorni prima del raccolto sulle insalate e 10 giorni prima su tutte le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1660

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

KELTHANE *EC

Acaricida selettivo

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 18,5 di Kelthane puro (purezza minima 82%) corrispondente a gr. 22,56 minimo di prodotto tecnico.
Sostanze adesivanti, emulsionanti e solventi quanto basta a 100.

* Marchio registrato dalla ROHM AND HAAS Co - Philadelphia

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 1660 Ministero Sanità del 31.7.1975 .

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione
Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Intosicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).
Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.
Fleboclisi di soluzione fisiologia contro l'ipocloremia.
Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni
Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

TENERE LONTANO DAL FUOCO

CARATTERISTICHE

Il Kelthane EC è efficace nel controllo degli acari. Esso ha un potere iniziale abbattente ed un effetto residuo. Il Kelthane EC è un acaricida selettivo e non uccide la maggior parte dei predatori. E' efficace contro ragnetti rossi, gialli, allungati.

APPLICAZIONI

Su pomacee: gr. 250 per hl.
Su drupacee: gr. 200-250 per hl.
Su vite, agrumi, noce, nocciuolo, fragole, lampone, ortaggi gr. 200-250 per hl. Per il controllo degli acari sulle rose, azalee, cactus, astri, crisantemi, ciclamini, dalie, gigli, gardenia, gerani, gladioli, edera, ortensia, petunie, oleandri, usare da 125 a 250 gr per 100 litri di acqua. Sulle piante sensibili usare la dose più bassa. Con forti attacchi si raccomanda di usare le dosi alte.
Ripetere i trattamenti a seconda della necessità.
Trattare accuratamente le piante onde assicurare una completa copertura di tutte le foglie. Sulle foglie difficili a bagnarsi aggiungere il Bagnante Adesivo L/2.

« Da non applicare con mezzi aerei ».

COMPATIBILITA'

Il Kelthane EC è compatibile con la maggior parte degli altri insetticidi e fungicidi, e può essere usato da solo o in combinazione con Parathion, Malathion, Lindano, Arseniato di Piombo, Dithane, Karathane, zolfo ed olii. Non deve essere usato in combinazione con alcun pesticida non compatibile con il solvente base della formulazione.
« Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.
Non trattare su melanzane: tale coltura può essere danneggiata.

NOCIVITA'

Il prodotto non è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1665

CLASSE I^a

VELENO

FITOFOS 20

Insetticida agricolo

Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Parathion tecnico (purezza 97-98%) pari a gr. 19,40-19,60 di prodotto puro.
Sostanze solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Ravit

Reg. N. 1665 Ministero Sanità del 22.7.74

Natura del rischio:

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirare i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi .— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

Scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.

Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni:

Morfina, Vitamina B 1, Coramina, Latte e grassi.

PRINCIPALI IMPIEGHI

Dosi: gr. 200-300 per ettolitro d'acqua.

IN FRUTTICOLTURA: contro Antonomo, Tingidi, Carpocapsa, Cydia, Lepidotteri minatori, Afidi, Cocciniglia di S. Josè, Eriofide del pesco, Mosca della frutta, Diaspis pentagona (generazioni estive).

IN VITICOLTURA: contro Piralide, Tignole dell'uva, Altica, Ragno giallo, Cocciniglia bianca cotonosa.

IN OLIVICOLTURA: contro Tignola, Cocciniglie, Fleotribo, Cotonello, Rinchite, Cimice.

IN ORTICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI: contro Afidi, Tripidi, Altiche, Meligete del colza, Coleotteri fillofagi.

IN AGRUMICOLTURA: contro Afidi, Cocciniglie, Mosca, Tripidi, Tignola, Cicalina.

IN FLORICOLTURA: contro Afidi, Tripidi, Psille, Mosche bianche, Bega del garofano.

NORME D'IMPIEGO

Il FITOFOS 20 nella dose occorrente, va versato in poca acqua, agitando la miscela con un bastone; si aggiunge quindi altra acqua, sempre agitando, fino al volume richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, i volatili, la selvaggina ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

BINARAN E

Acaricida

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 40 Binapacryl puro (purezza 95-97%) pari a gr. 42,10-41,23 di prodotto tecnico.
Sostanze solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 1679 Ministero Sanità del 5.11.1974. .

Natura del rischio:
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale, o per assorbimento attraverso la pelle.

— **Sintomi d'intossicazione:**
Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psico motoria - tachicardia - dispnea - notevole ipetermia - colorazione gialla delle sclere - la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

— **Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso**
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% od iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni all'esofago molto frequenti nel caso di ingestioni. Combattere l'ipertemia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda - trasfusioni o fleboclisi glucosate a 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil ^ propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale - ossigeno, respirazione artificiale.

— **Controindicazioni**
Atropina.

CARATTERISTICHE

Acaricida dotato di persistenza. Agisce su uova estive, ninfe e adulti dei ragni parassiti delle colture. Il **BINARAN E**, è un acaricida a base di Binapacryl studiato per la lotta contro le principali specie di acari fitoparassiti; agisce contro le uova estive e le forme mobili (larve e adulti); è caratterizzato da persistenza di azione grazie alla sua caratteristica di rimanere inalterato sulle foglie. Il **BINARAN E** svolge inoltre una collaterale azione antiodica.

PRINCIPALI IMPIEGHI

In frutticoltura: contro il Ragno Rosso trattare, (dal giugno in poi) con gr. 150/200/hl.
In agrumicoltura: contro il Ragno Rosso gr. 50-150/hl.
In floricoltura: contro gli acari parassiti del garofano (purché non vi siano petali scoperti) gr. 100-150/hl.
In orticoltura: contro gli acari del pomodoro e del fagiolo gr. 100/hl.

MODALITA' D'IMPIEGO

Aggiungere la dose voluta di **BINARAN E** in poca acqua, agitare energicamente e, ottenuta l'emulsione, portare a volume. Bagnare accuratamente le piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non impiegare il prodotto in miscela con altri formulati e non aggiungere bagnanti od adesivi.

FITOTOSSICITA'

Sul melo trattare soltanto dalla totale caduta dei petali florali in avanti. Sul pero e pesco non trattare prima che siano passati 30/40 giorni dalla completa sfioritura. Trattamenti con **BINARAN E** fatti su vegetazione giovane o comunque prima dei periodi sopra indicati, possono causare danni alle piante.
Si raccomanda, pertanto, di trattare nei mesi estivi ma non nelle ore calde.

NOCIVITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto è innocuo per le api. E' innocuo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1680

II CLASSE TOSSICOLOGICA

BINARAN 50 PB

NOCIVO

Acaricida

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 Binapacryl tecnico (purezza 95-97%) pari a gr. 47,5-48,5 di prodotto puro.
Sostanze disperdenti ed inerenti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabile dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazioni per inalazione, ingestione accidentale, o per assorbimento attraverso la pelle.

— Sintomi d'intossicazione:

Sudorazione - sete- nausea - spossatezza - agitazione psico motoria - tachicardia - dispnea - notevole ipertemia - colorazione gialla delle sclere - la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all' 1% od iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestioni. Combattere l'ipertemia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda - trasfusioni o fleboclisi glucosate a 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale - ossigeno, respirazione artificiale.

— Controindicazioni

Atropina.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 1680 Ministero Sanità del 19.4.1975.

CARATTERISTICHE

Acaricida dotato di persistenza. Agisce su uova estive, ninfe e adulti dei ragni parassiti delle colture. Il **BINARAN 50 PB** è un acaricida a base di Binapacryl studiato per la lotta contro le principali specie di acari fitoparassiti. Agisce contro le uova estive e le forme mobili (larve e adulti); è caratterizzato da persistenza di azione grazie alla sua proprietà di rimanere inalterato sulle foglie.

Il **BINARAN 50 PB** svolge inoltre una collaterale azione antioidica.

PRINCIPALI IMPIEGHI

In frutticoltura: contro il Ragno Rosso trattare con gr. 100/150/hl.
In viticoltura: Contro Ragni rossi e gialli, trattare con gr. 100/150/hl.
In agrumicoltura: Contro il Ragno rosso trattare con gr. 50/100/hl.
In floricoltura: Contro gli acari parassiti del garofano trattare con gr. 100/hl. purchè non vi siano petali scoperti.
In orticoltura: Contro gli acari del pomodoro e del fagiolo gr. 100/hl.

MODALITA' DI IMPIEGO

Stemperare accuratamente la dose necessaria di **BINARAN 50 PB** con poca acqua. Ottenuta una poltiglia omogenea portare a volume. Bagnare le piante con cura .

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **BINARAN 50 PB** non è miscibile con esteri fosforici, con tutti i prodotti liquidi e con olii minerali.

Sarebbe invece miscibile con prodotti in polvere bagnabile come il Sevin, il Lindano, lo Zineb ,lo Ziram. Tuttavia si consiglia di impiegare il **BINARAN 50 PB** da solo.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauziogali prescritte per i prodotti tossici ».

FITOTOSSICITA'

Sul melo trattare soltanto dalla totale caduta dei petali in avanti.
Sul pero e pesco non trattare prima che siano passati 30/ 40 giorni dalla completa sfioritura.
In ogni caso non trattare mai nelle ore calde.

NOCIVITA'

Alle dosi d'impiego consigliate il prodotto è innocuo per le api. E' innocuo anche per gli animali domestici, i pesci ed il bestame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dala zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1681

DALASAR

Classe IV

Erbicida sistemico per il controllo di graminacee ed erbacee perenni. Si impiega in primavera, estate ed autunno.

Composizione

100 gr. di prodotto contengono:
85 gr. di DALAPON sale sodico puro
q. b. a gr. 100 Coformulanti

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione

Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici

Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni

È sconsigliata la digitale.

Avvertenza

Consultare un centro antiveleni.

Dosi e modalità d'impiego

Il DALASAR è un diserbante sistemico ad azione lenta, ma graduale, specifico per la distruzione delle erbe infestanti graminacee annuali e perenni. Il prodotto non esplica un'azione caustica per contatto, cioè non brucia istantaneamente le erbe trattate, ma, assorbito dalle infestanti per via fogliare, entra in circolo nella pianta, raggiungendo l'apparato radicale, determinando così l'arresto dello sviluppo dell'infestante.
L'effetto erbicida si evidenzia con un progressivo ingiallimento che si manifesta prima sull'apice delle foglie ed invade successivamente tutto lo stelo portando lentamente la pianta al totale disseccamento.
Il sistema radicale cessa di svilupparsi, annerisce assumendo un aspetto fibroso ed i rizomi diventano fragili e marciscono.
Il DALASAR esplica la sua azione nei confronti di: Echinocloa crusgalli (giavone), Digitaria sanguinalis (sanguinella), Cynodon dactylon (gramigna), Setaria glauca (pesarone), Setaria viridis (falso panico), Alopecurus agrestis (erba codina), Lolium perenne (loglierella), Lolium italicum (loglio italico), Agropyron repens (gramigna), Nardus stricta (erba cervina), Avena fatua (avena selvatica), Poa pratensis (gramigna dei prati), Phragmites communis (cannuccia), Juncus articulatus (giunco).
Date le specie infestanti controllate dal DALASAR, il prodotto può essere impiegato sia nel SETTORE AGRICOLO sia nel SETTORE URBANO INDUSTRIALE.

SETTORE AGRICOLO: PIANTE DA FRUTTO
Il DALASAR si impiega per il diserbo delle graminacee nei fruttiferi (pomacee, drupacee, vite, olivo, agrumi), effettuando i trattamenti tra i filari e rispettando le dosi riportate in seguito. Si dovrà aver cura di non investire la pianta utile con la nube irrorante.

SETTORE AGRICOLO: ERBA MEDICA E TRIFOGLIO
Il DALASAR si impiega per il diserbo selettivo degli erbai di trifoglio e di medica, purché impiegato a partire dal secondo anno, prima della ripresa vegetativa o subito dopo gli sfalci estivi. Se impiegato con la vegetazione in atto può danneggiare la coltura che può accusare un leggero ingiallimento od un temporaneo rallentamento di sviluppo.

DISERBO CANALI E CORSI D'ACQUA IN GENERE
Il DALASAR è specifico per la lotta contro le specie perenni Phragmites communis (cannuccia), Typha latifolia e angustifolia, Juncus articulatus e conglomeratus (giunco). Inoltre, il prodotto è attivo anche nei confronti delle graminacee tipo Agropyron repens (gramigna), Avena fatua (avena selvatica), Nardus stricta (erba codina).
Per una totale distruzione delle infestazioni acquatiche emerse e delle graminacee in genere è preferibile eseguire i trattamenti quando le specie da eliminare sono in pieno rigoglio vegetativo e cioè nel periodo compreso tra la fioritura e la spigagione: risultati si ottengono tuttavia anche intervenendo prima di tale epoca. Il trattamento dovrà essere effettuato preferibilmente in giornate soleggiate.

SETTORE URBANO E INDUSTRIALE
Il DALASAR si impiega contro le infestanti graminacee presenti sui bordi di strade, piazzali, aie, campi sportivi, velodromi, nonché lungo i binari ferroviari, negli aeroporti (piste di atterraggio).

DOSI
A seconda dei settori di impiego, le dosi consigliate sono:

Piante da frutto	7-10 kg/ha
Erba medica e trifoglio	4-8 kg/ha
Settore urbano e industriale in genere	20-25 kg/ha
Diserbo canali	20-30 kg/ha

Le dosi minime e massime si riferiscono ovviamente al grado di infestazione presente all'atto del trattamento. La quantità di acqua da impiegare per la distribuzione delle dosi di impiego dovrà essere tale da consentire un'uniforme irrorazione della vegetazione infestante.

Da non applicare con mezzi aerei.

Alcun problema di compatibilità si è verificato con altri erbicidi di uso comune. In polverizzazioni, in combinazione con altri erbicidi, non usare più di 5 kg di DALASAR in 50 litri di acqua. Sciogliere dapprima il DALASAR in acqua e aggiungere gli altri erbicidi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico prescritte per i prodotti più tossici.

Il prodotto è fitotossico per molte colture (cereali, mais, bietole, ecc.) per cui occorre evitare il contatto con dette colture.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Registrazione n. 1681 in data 5-11-1974 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO**

1685

USTINEX PD

DISERBANTE TOTALE

in assenza di colture agricole
per la lotta
contro le infestanti di argini, aree incolte,
piazze, viali, impianti sportivi e industriali, strade ferrate

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Ustinex PD contengono:
g 33 di Dalapon puro;
g 37 di Diuron puro;
g 10,5 di MCPA puro (come sale sodico);
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia, sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi e momento d'impiego: 15-20 kg/ha (15-20 g/10 mq) in 1.000 litri d'acqua (1 litro di soluzione ogni 10 mq di superficie), intervenendo dopo la nascita delle infestanti, prima che abbiano superato l'altezza di 5-10 cm. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo, dato il suo campo d'azione contro le infestanti.

Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a diretto contatto con colture sensibili (riso, frumento, ortaggi, vite, alberi da frutta e floreali in genere). Pertanto eseguire il trattamento preferibilmente in giornate senza vento. A lavoro ultimato, lavare accuratamente con acqua bollente e soda le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione e, quindi, risciacquarli ripetutamente con acqua. In genere è consigliabile di non usare le pompe ed i recipienti (soprattutto quelli di legno) destinati ai trattamenti alle piante da frutto ed alle viti.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Bayer AG-Leverkusen (Germ. Occ.)

Registrazione Ministero Sanità n. 1685 del 10-6-1974

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg -

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

1700

DURSBAN* Granulare

Insetticida per la lotta contro gli insetti del terreno all'atto della semina

Composizione (riferita a 100 g):

- **Chlorpyrifos** (0,0-dietil-0-(3,5,6-tricloro-2-piridil)-fosforotioato) puro	g 7,5
Coformulanti	q. b. a g 100,0

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

Modalità di applicazione:

Caratteristiche — Il Dursban Granulare è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie ed è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.

Il **Dursban Granulare** non trasmette odori sgradevoli ai vegetali e pertanto, può essere utilizzato anche su terreni destinati a colture sensibili come la Patata, le Bulbose ed il Tabacco. Non impiegare su terreni destinati a colture di barbabietola.

Dosi di impiego — Il Dursban Granulare è consigliato per la disinfestazione del terreno, contro Elateridi, Nottue, Grillotalpa, Maggiolino, Tipule, Bibio, Mosca del cavolo, Formiche, alla dose di 32-40 kg. per ettaro, incorporandolo al terreno con una leggera erpicatura o fresatura.

Nel caso di trattamenti localizzati, il **Dursban Granulare** viene distribuito a 10-16 kg./ha nei solchi preparati per la semina o per il trapianto. In terreni molto leggeri si consiglia la dose minima.

Nella distribuzione del **Dursban Granulare** in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa: in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

«Da non applicare con mezzi aerei»

Compatibilità — Tale prodotto, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.

Rischi di nocività — Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

* Marchio registrato - The Dow Chemical Company

Prodotto nello Stabilimento
INDALVA s.l. - ORIHUELA (Alicante) SPAGNA

Dow Chemical S.p.A.
Via R. Lepetit, 8 - Milano

Registrazione del Ministero della Sanità N. 1700 del 23-10-1974

DA NON VENDERSI SFUSO

Confezione da g. 500

1704

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

RISONET STM

Diserbante selettivo di post-emergenza
contro il Giavone del riso

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 35 Propanile puro
Sostanze inerti quanto basta a 100
Contiene Isoforone.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— *Indossare occhiali, maschere e guanti durante la diluizione del prodotto in acqua.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Il prodotto contiene anche Isoforone che ha azione narcotica, irritante per le mucose con possibilità di danno cumulativo epato-renale.

Controindicazioni:
Oppiacei, sedativi e comunque farmaci depressivi del SNC.

Il **RISONET STM** è un erbicida selettivo per azione di contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e dell'infestante.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il **RISONET STM** viene impiegato per la lotta contro il Giavone (Echinocloa crusgalli e specie affini) ed altre erbe infestanti della risaia nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto può essere applicato con le comuni attrezzature, diluito in quantità di acqua sufficiente a consentire una perfetta copertrura delle infestanti da combattere.

Epoche di intervento: L'applicazione del prodotto va effettuata quando il Giavone si trova nello stadio vegetativo compreso tra la 1ª e 3ª foglia; in questo stadio esso presenta la maggiore sensibilità. In linea di massima il Giavone si presenta allo stadio di 2ª-3ª foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina del riso; l'oscillazione è in rapporto alla temperatura e alle condizioni della risaia.

Allo scopo di ottenere la migliore contemporanea di nascita del Giavone si consiglia di tenere un livello d'acqua basso (al massimo 8-10 cm) dopo la semina del riso. In questo modo si avrà tutto o quasi tutto, il Giavone allo stesso stadio di sviluppo al momento del trattamento e la quasi totale eliminazione delle nascite successive dell'infestante.

DOSI D'IMPIEGO

In normali condizioni di vegetazione, cioè con temperatura elevata e Giavone in attiva crescita, le dosi sono le seguenti:
a) Giavone con 2-3-4 foglie, ma in prevalenza sulla 3ª foglia: kg. 13 per ha;
b) Giavone 3ª-4ª foglia e qualche pianta all'inizio dell'accestimento Kg. 16 per ha;
c) Giavone dalla 3ª-4ª foglia all'accestimento che comprende anche piante con due germogli secondari: kg. 19-20 per ha.

La valutazione dello stadio delle piantine deve essere fatta accuratamente e poco prima del trattamento. In particolare bisogna stabilire il dosaggio in relazione allo stadio delle piantine che si trovano sulle parti di terreno più alte e che quindi sono le più avanzate.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 1704 Ministero della Sanità del 23-10-1974
E/3

Per combattere il Giavone « invecchiato », cioè cresciuto con andamento climatico caratterizzato da basse temperature e quindi dotato di apparato radicale molto robusto e profondo in rapporto all'apparato fogliare, aumentare le dosi d'impiego come segue in relazione agli stadi vegetativi sopra riportati:
a) kg. 15 per ha. - b) kg. 18 per ha. - c) kg. 22 per ha

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Il **RISONET STM** va diluito in un quantitativo di acqua variabile a seconda del mezzo di distribuzione impiegato: con motopompe a barra munite di ugelli: lt. 300-400/ha. - con pompe a spalla: lt. 400-500/ha.

Nel caso di impiego delle dosi massime (inizio accestimento) è consigliabile aumentare il quantitativo d'acqua a 600-700 lt/ha. La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile, e cioè a circa 50 cm da terra.

L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutte le piante di Giavone, in modo da conseguire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare della guaina dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta, per la qual cosa è sufficiente, di norma, togliere l'acqua dalle camere 24-36 ore prima del trattamento. Anche le piantine di Giavone dovranno essere asciutte. La risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello più basso, ma tale da evitare nuove infestazioni di Giavone. Nel caso di riso trapiantato effettuare la distribuzione tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi a livello degli apici delle foglie del riso, per meglio colpire le piantine di Giavone che possono risultare protette dalla vegetazione del riso già abbastanza espansa.

Evitare di trattare nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di tre-sei ore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **RISONET STM** non deve esere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi o altri antiparassitari, non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego più elevate il **RISONET STM** sotto particolari condizioni può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie del riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piantine di riso. Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti ed altre.

Non eseguire il trattamento oltre 6 settimane dal trapianto del riso e non impiegare più di Kg. 8 di ingrediente attivo di prodotto per ha. e per stagione.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZE

Tenere lontano dal fuoco.

Dopo il trattamento lavare con acqua pura le attrezzature.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

1710

Polvere bagnabile
Diserbante di post-emergenza selettivo per il frumento

Composizione
100 g di prodotto contengono:
40 g bromofenoxim (3,5-dibromo-4-idrossi-benzaldossima, 0-(2',4-dinitrofenil)-etere) puro pari a g 43 di prodotto tecnico al 93% di purezza minima.
10 g terbutrin o GS 14260 (2-terz. butilammino-4-etilammino-6-metiltio-s-triazina) puro pari a g 10,6 di prodotto tecnico al 94% di purezza minima.
q.b. a g 100 coformulanti.

CLASSE III

ATTENZIONE:
manipolare con prudenza.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche:
Agisce essenzialmente come erbicida fogliare di contatto ed in misura minore come erbicida ad azione residua nel terreno.
Controlla la maggior parte delle infestanti annuali a foglia larga (quali Bifora, Camomilla, Canapa selvatica, Capsella, Fiordaliso, Fumaria, Papavero, Poligoni, Rafano, Stellaria, Veronica, Veccia, Viola) ed anche — ma solo nei primi stadi di sviluppo — alcune graminacee annuali (quali Alopecurus, Lolium, Poa). Sono invece resistenti le malerbe provenienti da organi di propagazione vegetativa (stoloni, cespi), quali Stoppione, Romice, Artemisia.

Epoca dei trattamenti:
Il prodotto si impiega solo in post-emergenza ossia dopo l'emissione della quarta foglia del frumento ed alla comparsa delle infestanti. Queste sono più sensibili al prodotto quando si trovano nelle prime fasi del loro sviluppo.

Dosi d'impiego:
Kg 2-3 in 500 litri o più di acqua per ettaro in relazione allo sviluppo delle infestanti e riservando le dosi più elevate quando le infestanti sono più sviluppate.

Trasemina - L'impiego del **Faneron S** consente la trasemina nel frumento delle colture leguminose (trifoglio, ladino) che può essere fatta a breve distanza dal trattamento (circa 10 giorni).

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:
Il prodotto è miscibile con STAROX (MCPA) ed altri fenossiderivati.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità:
Dopo l'applicazione del prodotto possono occasionalmente manifestarsi sintomi di sofferenza della coltura; si tratta, però, di fenomeni transitori che in condizioni normali scompaiono in breve tempo e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione.

Rischi di nocività:
Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti almeno 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg 1-5-25**

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (Va)

Officina di produzione:
SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1710 del 4-9-1974
® marchio registrato

1725

Uniran® 22 K

Diserbante sistemico liquido.
Specifico contro le infestanti arbustive, combatte altresì le dicotiledoni annue e perenni e le pteridofite (felci).
Agisce per assorbimento fogliare e radicale.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
24,9 g di acido 4-ammino-3,5,6-tricloropicolinico (sotto forma di sale potassico) pari a g 26 di prodotto tecnico al 95,7% di purezza minima (acido equivalente g 21,5)
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE IV

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)
Registrazione Ministero della Sanità n. 1725 del 4.9.74
® Marchio depositato

UNIRAN 22 K è un diserbante liquido che presenta le seguenti caratteristiche e proprietà:
— azione sistemica per assorbimento fogliare e radicale;
— persistenza nel terreno;
— spettro di azione;
— efficacia specifica contro le infestanti arbustive e legnose in genere (rovi, robinie, lentischi, rododendri, ginepri, astragali, eriche);
— attività contro le infestanti dicotiledoni erbacee, annue e perenni, anche resistenti ai consueti diserbanti (romice, cardi, ferule, convolvoli, poligoni, cisti);
— efficacia contro le pteridofite (felci).

UNIRAN 22 K trova impiego:
— per il diserbo di canali, fossi, capezzagne e simili;
— per i diserbi in luoghi incolti (strade, stazioni, depositi, spiazzi, zone archeologiche);
— per l'eliminazione della vegetazione arbustiva e legnosa in genere (suffrutici, frutici, arbusti, alberi);
— per la lotta contro le infestanti erbacee ed arbustive dei pascoli, in vista del miglioramento degli stessi con paraquat (« tecnica del sod-seeding »).

DOSI DI IMPIEGO

Contro infestanti erbacee
— *trattamenti su tutta la superficie*
lt 10-15 di UNIRAN 22 K/ha. Usare una quantità di acqua sufficiente a bagnare bene le erbe ed il terreno (almeno 700-800 lt/ha).
— *trattamenti localizzati*
lt 1-1,5 di UNIRAN 22 K in 100 lt di acqua. Bagnare bene le erbe ed il terreno sottostante.

Contro infestanti arbustive, cespugliose e legnose
lt 1-1,5 di UNIRAN 22 K in 100 lt di acqua. Bagnare bene le piante in tutte le loro parti, fino a sgocciolamento. Nel caso di piante dotate di particolare resistenza, irrorare bene anche il terreno sottostante, insistendo soprattutto intorno al ceppo o ai grossi fusti, per un diametro di circa 30-40 cm.

EPOCA DEL TRATTAMENTO

I trattamenti con UNIRAN 22 K possono essere fatti in qualsiasi periodo dell'anno, purché le piante da distruggere siano in fase di vegetazione attiva; in pratica, si può usare il diserbante dall'inizio della primavera al tardo autunno.
Se le piante arbustive o arboree hanno una chioma di modesto sviluppo è importante irrorare con la soluzione di UNIRAN 22 K anche il terreno sottostante, in modo che almeno una parte del prodotto venga assorbita per via radicale.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto può essere miscelato con gli erbicidi fenossiacetici, triazinici ed altri di uso comune. Si consiglia, comunque, di interpellare un tecnico di fiducia prima di procedere a miscele. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità
Il prodotto è altamente fitotossico per tutte le colture. Evitare, pertanto, i trattamenti in giornate ventose o di cattivo tempo per non danneggiare le culture limitrofe. Le attrezzature utilizzate per i trattamenti con l'UNIRAN 22 K non devono essere usate per applicazioni di altri antiparassitari, poiché anche i residui di prodotto possono danneggiare le colture.
Quando si intende diserbare canali, scoline, fossi e simili è necessario assicurarsi che le eventuali acque presenti o immesse a breve scadenza dal trattamento non vengano destinate all'irrigazione.

Rischi di nocività
Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

AVVERTENZE

Non impiantare nuove colture di graminacee su terreni trattati con UNIRAN 22 K prima di un anno. Prima di impiantare nuove colture provare su un piccolo appezzamento dopo almeno tre anni.
Tenere le confezioni ben chiuse.
Evitare il contatto del prodotto puro o diluito con gli occhi e con la pelle.
Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore.
Attenzione: da impiegare solo per gli usi previsti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO **lt 1-5**

Dicuran® Liquido

Diserbante selettivo per frumento e orzo.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
45 g chlortoluron tecnico al 97% di N-3-cloro-4-metilfenil-N', N'-dimetilurea pari a g 43,6 di sostanza attiva pura
q.b. a 100 g coformulanti.

CLASSE IV

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., *ORIGGIO (Va)*
Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*

Registrazione Ministero della Sanità n. 1757 del 30.5.74
® marchio depositato

Caratteristiche
DICURAN agisce sulle infestanti per via radicale e per via fogliare. E' attivo nei confronti delle infestanti graminacee provenienti da seme quali Alopecurus, Apera, Avena, Lolium e Poe. DICURAN agisce inoltre su dicotiledoni quali Capsella, Centaurea, Cerastium, Galeopsis, Lamium, Matricaria, Mercurialis, Polygonum, Raphanus, Sinapis, Stellaria.
Il migliore controllo delle infestanti a foglia larga si ottiene se il prodotto viene applicato prima della loro emergenza o al più tardi nello stadio compreso tra la seconda e la quarta foglia.

Dosi ed epoche d'impiego
pre-emergenza: Kg 4-5 per ettaro, secondo la natura del terreno, in 400-800 litri di acqua.
Il trattamento si effettua subito dopo la semina o nei primi giorni successivi e comunque ancora prima che inizi l'emergenza della coltura. Il terreno deve essere ben lavorato, sminuzzato e soprattutto accuratamente livellato per evitare ristagni d'acqua.
post-emergenza: Kg 2,5-3 per ettaro in 400-800 litri di acqua.
Il trattamento si effettua dalla 3a-4a foglia all'inizio dell'accestimento della coltura.

Avvertenza
Evitare superdosaggi ed accumuli della miscela erbicida.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto è miscibile con altri erbicidi quali FANERON (bromofenoxim), altri derivati dall'urea, triazine e fenossiderivati (es. Starox). « Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - Il trattamento non è consigliabile nei terreni molto sabbiosi, ghiaiosi ed in quelli facilmente soggetti a ristagni d'acqua nel periodo invernale. Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni di sofferenza della coltura; si tratta però di fenomeni transitori che in condizioni normali scompaiono in breve tempo e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione. La varietà di frumento DEMAR è sensibile al prodotto e pertanto in presenza di detta varietà il DICURAN non deve essere impiegato.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti almeno 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO It 1 - 5

1758

Caragard® Combi 5 G

Granulare

Erbicida per:
il diserbo selettivo della vite, pero, melo e agrumi – solo in colture specializzate
Il diserbo degli argini delle risaie
il diserbo totale di ale, bordi stradali, fossi aziendali, canali, aree industriali ed incolti in genere.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
3,4 g di GS 13529 tecnico al 96% di 2-terz. butilammino-4-cloro-6-etilammino-s-triazina pari a 3,3 g di sostanza attiva pura
1,8 g di GS 14259 tecnico al 96% di 2-terz. butilammino-4-etilammino-6-metossi-s-triazina pari a 1,7 g di sostanza attiva pura

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., *ORIGGIO (Va)*
Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*

Registrazione Ministero Sanità n. 1758 del 7.9.74
® marchio depositato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi di intossicazione (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi) Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione

Consigli terapeutici. *Data la non specificità dei sintomi, la terapia è sintomatica*

Caratteristiche
CARAGARD COMBI controlla la maggior parte delle infestanti annuali, mono e dicotiledoni e molte infestanti perennanti, quali Stoppione (Cirsium), Romice, Gramigna, Convolvolo, Artemisia.

Dosi e modalità d'impiego
Diserbo selettivo (piante adulte di vite, melo, pero e agrumi) solo in colture specializzate e cioè in assenza di sottocolture:
Kg 70/ha contro le infestanti annuali nei terreni leggeri
Kg 100/ha contro le infestanti annuali nei terreni pesanti
Kg 150/ha contro le infestanti perennanti nei terreni leggeri
Kg 200/ha contro le infestanti perennanti nei terreni pesanti.

Diserbo degli argini delle risaie
Kg 70- 80/ha negli argini nuovi
Kg 120-150/ha negli argini stabili.

Diserbo totale
Kg 200 /ha contro le infestanti annuali
Kg 400-500/ha contro le infestanti perennanti.

Il prodotto si distribuisce tal quale ed il trattamento si effettua in pre-emergenza o in post-emergenza precoce delle infestanti.

Avvertenze
Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture delle piante da frutto occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Impiegare il prodotto in assenza di sottoculture.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Da evitare la miscela con altri prodotti antiparassitari.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego e se utilizzato secondo le predette istruzioni, il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti al massimo alla post-emergenza delle infestanti

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **kg**

176

Insetticida-aficida in polvere solubile in acqua per il controllo di alcuni insetti dei fruttiferi, della vite, di ortaggi, fiori, colture arboree ed erbacee.
Si impiega in trattamenti liquidi contro Afidi, Tripidi, Tortrici, Tignole, Lepidotteri vari e Mosche minatrici.

Caratteristiche: l'ORTHENE è un insetticida organico che agisce per contatto e per azione sistemica locale.
L'ORTHENE è molto rapido nell'azione contro gli Afidi, ma può verso alcuni insetti (es. Larve ricamatrici protette dalle foglie), mostrare tutta la sua efficacia dopo qualche giorno dall'applicazione.

COMPOSIZIONE		
— Acefate puro	g	42,5
— Coadiuvanti ed Inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato Chevron Chem. Co. - USA

SIPCAM—Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
CHEMIA - SpA
S. Agostino (FE)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 1760 del 28.5.1974 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale.

POMACEE (Melo e Pero)
— contro Afidi e Orgya antigua : g 80-120
— contro Carpocapsa e Ricamatrici (Capua, Cacoecia, Eulia, Pandemis): g 120-150

DRUPACEE (Pesco, Ciliegio, Albicocco, Susino, Mandorlo)
— contro Afidi e Orgya antigua : g 80-120
— contro Anarsia e Cydia del Pesco e Ricamatrici: g 120-150

AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino, Mandarancio)
— contro Afidi : g 80-120
— contro Cocciniglie : g 100-150

VITE
— contro Tignole, Cicaline : g 80-120
— contro Nottue : g 120-150

OLIVO
— contro Mosca e Tignola : g 80-120
— contro Cocciniglie : g 100-150

FRAGOLA
— contro Afidi : g 80-120
— contro Tortrici : g 120-150

CULTURE ORTICOLE (Insalate; Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cavoli, Cavolfiore, Rapa, Ravanello, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero, Finocchio, Sedano, Prezzemolo, Carota, Spinacio, Bietola da orto, Carciofo)
— contro Afidi, Cavolaie, Tripidi, Aleurodidi: g 80-120
— contro Nottuidi e Mosche minatrici : g 120-150

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
— contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi : g 80-120
— contro Nottuidi e Mosche minatrici, Beghe del garofano: g 120-150

PATATA, TABACCO
— contro Afide verde : 0,8-1,2 Kg/ha

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
— contro Afide verde e Mosca : 0,8-1,2 Kg/ha
— contro Mamestre : 1,2-1,5 Kg/ha

MAIS
— contro Piralide e Nottue : 1,5-2,0 Kg/ha

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto nel totale quantitativo di acqua agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con le comuni poltiglie antiparassitarie di impiego primaverile-estivo, escluse quelle alcaline come Poltiglia bordolese e Polisolfuri.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: su colture fruttifere evitare di effettuare trattamenti con intervallo inferiore a 15 giorni. Su pesco effettuare gli interventi in prefioritura (bottoni rosa) e dopo l'indurimento del nocciolo.

Rischi di nocività: non impiegare in fioritura perchè tossico per le api. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta sulle colture indicate, ad eccezione delle Pomacee ed Olivo per le quali va rispettato un intervallo di 30 giorni.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Peso Kg.

DA NON VENDERSI SFUSO

1785

Gesaprim® S Liquido

Diserbante selettivo per la coltura del mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
22,6 g atrazina tecnica, purezza minima 97%, pari a g 21 di 2-cloro-4-etilammino-6-isopropil-ammino-s-triazina e g 1 di altre triazine erbicide
22,6 g simazina tecnica, purezza minima 97%, pari a g 22 di 2-cloro-4,6-bis-etilammino-s-triazina
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III

Attenzione:
manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)

Officina di produzione:
SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1785 del 27.2.75
® marchio depositato

Caratteristiche
Il prodotto agisce per assorbimento radicale ed in parte per via fogliare sulle infestanti allo stadio di germinello e di plantula. Controlla le più dannose infestanti graminacee e dicotiledoni provenienti da seme a germinazione primaverile-estiva, comprese la Setaria e la Digitaria, talora resistenti alla sola atrazina.
Le malerbe ad apparato radicale profondo, rizomatoso ed in genere perenni non risentono in misura determinante dell'azione del prodotto; in particolare risultano resistenti la Gramigna, il Convolvolo, il Sorgo selvatico, la Artemisia, nonché il Panicum dicothomiflorum fra le infestanti annuali.

Dosi e modalità d'impiego
Kg 4,5-5/ha in 500 litri o più di acqua
Eseguire i trattamenti preferibilmente subito dopo la semina del mais od al più tardi quando le malerbe sono in fase di emergenza. Applicazioni più ritardate possono risultare meno efficaci o rendere aleatorio l'esito del diserbo. Applicare il prodotto su terreni ben preparati, sminuzzati e possibilmente rullati dopo la semina.
Curare l'uniformità della distribuzione. Se dopo 4-5 giorni dal trattamento non piove a sufficienza ed il terreno non è sufficientemente umido per piogge precedenti è necessario intervenire con irrigazioni (preferibilmente a pioggia). Non utilizzare il prodotto nei terreni torbosi o comunque molto ricchi di humus.

Avvertenze
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco). Applicare il prodotto solo su colture specializzate e non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Risciacquare le irroratrici ed i recipienti utilizzati prima di destinarli ad altri trattamenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. « Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego e se impiegato secondo le predette istruzioni il prodotto non è fitotossico.
Entro certi limiti anche eventuali superdosaggi non hanno conseguenze negative sul mais, ma possono danneggiare gravemente le colture sensibili che seguono il mais.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **It. 1-5-20**

1786

Gesaprim® S 80 WP

Polvere bagnabile
Diserbante selettivo per la coltura del mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
41 g atrazina tecnica, purezza minima 97%, pari a g. 38 di 2-cloro-4-etilammino-6-isopropil-ammino-s-triazina e g. 2 di altre triazine erbicide
41 g simazina tecnica, purezza minima 97%, pari a g 40 di 2-cloro-4,6-bis-etilammino-s-triazina
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III

Attenzione:
manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)

Officina di produzione:
SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1786 del 22.10.74
® marchio depositato

Caratteristiche
Il prodotto agisce per assorbimento radicale ed in parte per via fogliare sulle infestanti allo stadio di germinello e di plantula. Controlla le più dannose infestanti graminacee e dicotiledoni provenienti da seme a germinazione primaverile-estiva, comprese la Setaria e la Digitaria, talora resistenti alla sola atrazina.
Le malerbe ad apparato radicale profondo, rizomatoso ed in genere perenni non risentono in misura determinante dell'azione del prodotto; in particolare risultano resistenti la Gramigna, il Convolvolo, il Sorgo selvatico, la Artemisia, nonché il Panicum dicothomiflorum fra le infestanti annuali.

Dosi e modalità d'impiego
Kg 3/ha in 500-1000 litri di acqua.
Eseguire i trattamenti preferibilmente subito dopo la semina del mais od al più tardi quando le malerbe sono in fase di emergenza. Applicazioni più ritardate possono risultare meno efficaci o rendere aleatorio l'esito del diserbo. Applicare il prodotto su terreni ben preparati, sminuzzati e possibilmente rullati dopo la semina.
Curare l'uniformità della distribuzione. Se dopo 4-5 giorni dal trattamento non piove a sufficienza ed il terreno non è sufficientemente umido per piogge precedenti è necessario intervenire con irrigazioni (preferibilmente a pioggia). Non utilizzare il prodotto nei terreni torbosi o comunque molto ricchi di humus.

Avvertenze
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco). Applicare il prodotto solo su colture specializzate e non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Risciacquare le irroratrici ed i recipienti utilizzati prima di destinarli ad altri trattamenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. « Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego e se impiegato secondo le predette istruzioni il prodotto non è fitotossico.
Entro certi limiti anche eventuali superdosaggi non hanno conseguenze negative sul mais, ma possono danneggiare gravemente le colture sensibili che seguono il mais.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg 1-10-25**

1800

Polvere bagnabile
Diserbante selettivo per la coltura del mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
51,5 g di ametrina tecnica, purezza minima 95%, pari a g 47,5 di 2-etilammino-4-isopropilammino-6-metiltio-s-triazina e g 2,5 di altre triazine erbicide.
q.b. a 100 coformulanti

CLASSE III

Attenzione:
manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (Va)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1800 del 13.7.74
® marchio depositato

Caratteristiche
GESAPAX 50 è un diserbante selettivo che agisce sia per assorbimento radicale, sia per assorbimento fogliare.
L'azione per via fogliare è rilevante ed il prodotto controlla tutte le infestanti del mais, comprese quelle più resistenti all'atrazina quali, Panicum dichotomiflorum, Setaria e Digitaria.

Modalità d'impiego
Il prodotto si applica dopo l'emergenza sia della coltura che delle infestanti e più precisamente quando la coltura ha raggiunto un'altezza minima di 25-30 cm o più e le infestanti un'altezza di 5-20 cm.
Poiché le foglie del Mais sono sensibili all'azione di contatto del Gesapax, il trattamento deve essere effettuato con particolari accorgimenti e cioè utilizzando ugelli schermati che permettono un'applicazione diretta sotto le foglie. Lo stelo del mais non è sensibile all'azione di contatto del GESAPAX 50.

Dosi di impiego
Kg 3-5 in 500-1000 litri di acqua per ettaro, a seconda la natura del terreno, il tipo e lo stadio delle infestanti. Le dosi maggiori nei terreni torbosi e contro le infestanti più sviluppate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego e se utilizzato secondo le predette istruzioni, il prodotto non è fitotossico. Occasionali sintomi di sofferenza delle colture hanno carattere transitorio e non recano alcun pregiudizio alla produzione.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg. 1-10-20**

182:

CLASSE IV

Zolfo 80 Micronizzato

Zolfo bagnabile micronizzato

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)	. . . . .	gr. 79,2
Adesivanti, bagnanti, sospensivanti ed inerti .	. q.b.a. .	gr. 100

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

ZOLFO 80 combatte l'Oidio della vite, l'Oidio del melo, del pero, del pesco e del pomodoro, l'Oidio delle piante floreali, l'Eriofide della vite, del pero.

ZOLFO 80 si impiega alle seguenti dosi per 100 litri di acqua: Viticoltura gr. 300-500; Frutticoltura gr. 500 800; Orticoltura e Floricoltura, in pieno campo o in serra, gr. 500-700.

Le dosi di impiego sono indicative e possono variare in base all'andamento stagionale.

Stemperare il prodotto in poca acqua e versare la poltiglia nel totale quantitativo di liquido richiesto agitando per qualche minuto.

Nell'effettuare il trattamento curare una uniforme irrorazione delle piante operando con getto ben nebulizzato, in modo che risultino completamente bagnate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci; non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.

Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: effettuare i trattamenti nelle ore meno calde della giornata preferibilmente nelle prime ore del mattino o in giornata con cielo coperto.

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

CUCURBITACEE - può essere fitotossico.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 5 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGRINDUSTRIA

Officina di produzione: AGRINDUSTRIA - ZONA IND. S. CIPRIANO PO (PAVIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1823 del 19-4-1975.

DA NON VENDERSI SFUSO.

PESO KG.

1827

TRI - MILTOX BIANCO

anticrittogamico, in polvere bagnabile, costituito da sali di: rame - zinco - manganese

Composizione
rame metallico gr. 8,34 (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
rame metallico gr. 2,43 (sotto forma di solfato tetraramico tricalcico)
rame metallico gr. 2,75 (sotto forma di carbonato basico di rame)
gr. 12,8 di mancozeb (etilenbisditiocarbamato di zinco e di manganese) puro (da p.a. tecnico all'80%)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici
- conservare la confezione ben chiusa
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- non operare contro vento
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
- Sintomi di intossicazione
  L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose può provocare irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
  In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
- Controindicazioni
  Alcool, oli e grassi

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	
Pomodoro (fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi	0,4-0,6% = gr 400-600

Versare lentamente il TRI-MILTOX BIANCO nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore, portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.

Intervenire secondo le necessità dettate dall'andamento stagionale e dalla biologia dei parassiti.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il TRI-MILTOX BIANCO è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ, ad eccezione del TIOTOX « 50 ».
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio TRI-MILTOX BIANCO + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di TRI-MILTOX BIANCO da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del TRI-MILTOX BIANCO con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di TRI-MILTOX BIANCO già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

AVVERTENZA. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi per la fauna utile

E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 1827 del 3-7-1975 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO — **Contenuto netto kg.**

183

MAXIRON 1831

ovo-acaricida

Composizione

gr. 20,3 di zolfo al 99% di purezza, equivalenti a gr. 20 di zolfo metalloide (Selenio assente)
gr. 10,35 di dinocap tecnico al 78% di principio attivo, costituito da: 73% di 2,4-dinitro-6-(2', 3', 4'-ottil)-fenil crotonato e 2,6-dinitro-4-(2', 3', 4'-ottil)-fenil crotonato e 5% di nitro ottilfenoli (principalmente dinitro), equivalenti a gr. 8 di dinocap puro
gr. 8,5 di tetradifon tecnico (2, 4, 5, 4' tetraclorodifenilsulfone al 95% di purezza minima), equivalenti a gr. 8 di tetradifon puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

— *Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale e per assorbimento attraverso la pelle.*
— *Sintomi di intossicazione*
Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psicomotoria - tachicardia - dispnea - notevole ipertermia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici di massima e condizionati caso per caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% od iposolfito di sodio al 5% - Emetici e catarsici se il paziente è cosciente. **Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione.** Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda - Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale - Ossigeno, respirazione artificiale - E' controindicata l'atropina.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE
Registrazione n. 1831 del 3.7.1975 del Ministero della Sanità.

Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Acari: Ragno rosso e Ragno giallo	0,15 - 0,2% = gr. 150 - 200

Modalità di impiego

Versare lentamente il MAXIRON in poca acqua, agitando fortemente, sino ad ottenere una sospensione senza grumi; portare poi al volume desiderato, sempre agitando.
Intervenire alla prima apparizione degli Acari, bagnando accuratamente tutta la vegetazione.
Ripetere l'intervento, se necessario, dopo una decina di giorni.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il MAXIRON è miscibile con gli antiparassitari normalmente usati sulle colture ove viene impiegato lo stesso MAXIRON, ad eccezione degli oli minerali estivi ed invernali, degli insetticidi oleosi e dei prodotti fortemente alcalini (poltiglia bordolese, poltiglia solfocalcica).
Per la preparazione delle poltiglie miste con anticrittogamici e insetticidi in polvere bagnabile procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di MAXIRON da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo dell'antiparassitario prescelto, stemperato prima in poca acqua, sempre agitando.
Per la miscelazione del MAXIRON con gli insetticidi liquidi, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di MAXIRON, già pronta all'uso, rimescolando a fondo.

« AVVERTENZA »: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità

Il MAXIRON non è fitotossico per le colture sia di pieno campo che in serra; è bene però:

- non trattare rose in serra a temperature superiori ai 32°C.;
- lasciar trascorrere un intevallo di almeno 10-12 giorni fra il trattamento primaverile con oli e l'applicazione con MAXIRON;
- evitare, in piena estate, di eseguire i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Rischi di nocività

L'impiego del MAXIRON non comporta rischi per gli animali domestici, il bestiame, gli insetti utili. E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg. 1 - 5 - 10

1842

\

TRI - MILTOX EFFE

anticrittogamico, in polvere bagnabile, costituito da sali di:
rame - zinco - manganese

Composizione
rame metallico gr. 13,45 (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
rame metallico gr. 3,94 (sotto forma di solfato tetraramico tricalcico)
rame metallico gr. 4,45 (sotto forma di carbonato basico di rame)
gr. 20 di mancozeb (etilenbisditiocarbamato di zinco e di manganese) puro (da p.a. tecnico all'80%)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
  conservare la confezione ben chiusa.
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
- Sintomi di intossicazione
  L'ingestione provoca nausee, conati di vomito diarrea apatia irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose può provocare irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite ecc.)
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
  In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche inalazioni di camomilla cure generiche delle dermatiti.
- Controindicazioni
  Alcool, oli e grassi

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	
Pomodoro (fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi	0,25-0,4% = gr 250-400

Versare lentamente il TRI-MILTOX EFFE nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore, portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando

Intervenire secondo le necessità dettate dall'andamento stagionale e dalla biologia dei parassiti

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il TRI-MILTOX EFFE è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ, ad eccezione del TIOTOX « 50 »
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio TRI-MILTOX EFFE + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di TRI-MILTOX EFFE da solo soltanto che prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del TRI-MILTOX EFFE con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di TRI-MILTOX EFFE, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi per la fauna utile

E' tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 1842 del 22-12-1975 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

186

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

DACTHAL W 75

Diserbante selettivo per colture ortive, ornamentali e floreali

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 75 di Clortal Dimetile puro
Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un diserbante per la fragola, per colture ortive, ornamentali e floreali.

Il prodotto ha un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti sensibili impedendone lo sviluppo. Pertanto, non esplica nessuna azione sulle infestanti già nate o sui loro semi già germogliati.

E' efficace contro le seguenti erbe infestanti annuali provenienti da seme:

Digitaria sanguinalis (sanguinella) Amarantus retroflexus (amaranto) Chenopodium album (farinaccio) Setaria verticillata (panicastrella) Portulaca oleracea (erba porcellana), Stellaria media (centocchio) Erodium cicutarium (erba cicutaria) Beta vulgaris (barbabietola), Poa Annua, Papaver rhoeas (papavero).

Sono invece resistenti le infestanti perennanti come gramigna, cipero, vilucchio, stoppione (o cirsium) ed altre come: coda cavallina, capsella.

Inoltre sono poco sensibili al prodotto le poligonacee come: convolvolo, persicaria, correggiola (polygonum aviculare ecc.).

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Dose normale d'impiego kg. 15-18 per ha. in almeno 500 lt. di acqua. La dose più bassa va impiegata nei terreni sciolti o di medio impasto, la più alta nei terreni pesanti ed argillosi.

- Post-semina o post-trapianto delle colture:
  cipolle, agli, porri, cavoli, cavolfiori, finocchi, sedani, piselli;
- post-trapianto:
  lattuga, scarola, peperoni, melanzane.

Può anche essere impiegato su cetrioli, angurie e meloni, dopo che le piantine hanno superato la crisi del trapianto e su pomodoro, effettuando il trattamento da 4 a 6 settimane dopo il trapianto.

Fragole ed asparagi

Il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora per i nuovi impianti e, prima della ripresa vegetativa primaverile per i vecchi impianti.

Bulbose da fiori (Gladioli, Tulipani, Iris)

Il trattamento va eseguito dopo la messa a dimora dei bulbi, anche con piante già in fioritura.

Qualora dopo 60-70 gg. dal trattamento avesse luogo una nuova apparizione delle erbe infestanti, sarà sufficiente applicare altri 10 kg/ha. di prodotto avendo prima cura di erpicare e pulire bene il terreno.

Campi da golf. Prati all'inglese (Turf)
Il trattamento va eseguito alla dose di kg. 13 per ha. con 500-600 lt. di acqua all'inizio della primavera, prima della germinazione delle infestanti da combattere e dopo aver eseguito il taglio del tappeto erboso, quanto più raso possibile. Dopo il trattamento effettuare una abbondante irrigazione a pioggia, per facilitare la penetrazione del diserbante nel terreno.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il terreno, prima del trattamento deve essere **ben lavorato, ripulito da erbacce ed avere un sufficiente tenore di umidità** (l'umidità richiesta in genere è quella necessaria per mettere a dimora la coltura). Per la preparazione della miscela aggiungere alla dose occorrente di prodotto poca acqua, agitando a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea.

Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Distribuire la miscela acquosa uniformemente sulla superficie da disinfestare, usando normali pompe a mano o a motore.

Durante il trattamento mantenere la miscela acquosa in costante agitazione. In periodi di siccità, è opportuno mantenere il terreno umido per almeno una settimana dopo il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Evitare che, durante l'irrorazione, lo spruzzo giunga su altre colture vicine.

AVVERTENZE

Non effettuare il diserbo in terreni torbosi, perché il prodotto viene inattivato dalla sostanza organica.

Se le colture dovessero fallire per cause ambientali, si possono subito ripiantare le stesse colture per le quali il prodotto è selettivo.

Quando capita di seminare cereali che seguono, sullo stesso terreno, colture trattate con il prodotto nel periodo estivo, è prudente effettuare prima una buona aratura e lasciare il terreno a riposo per qualche tempo (15-20 gg.).

Lavare perfettamente dopo l'uso la pompa e i recipienti usati per l'irrorazione.

Effettuare il trattamento con tempo buono e senza vento.

Conservare il prodotto in locale asciutto.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 1862 Ministero della Sanità del 1-9-1975

10/84

1911

Propal-Riso

Diserbante selettivo per trattamenti post-emergenza
Specifico per la distruzione del Giavone delle risaie
LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

PROPANIL puro	g 35
Coformulanti	q.b.a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella PO (Rovigo)

Registrazione n. 1911 del Ministero della Sanità del 12-2-1977

Il **PROPAL-RISO** è un liquido emulsionabile diserbante selettivo per trattamenti in post-emergenza **contro il Giavone** del riso.
Il **PROPAL-RISO** agisce contro l'Echinocloa cruxgalli (giavone). L'azione diserbante viene esercitata per assorbimento fogliare e, limitatamente, per assorbimento radicale. Il prodotto viene traslocato sulla pianta infestante impedendone il ricaccio e determinandone la morte.

MODALITA DI IMPIEGO
Il **PROPAL-RISO** agisce quando è impiegato su infestanti che si trovino nello stadio compreso tra la 1ª e la 4ª foglia.
Affinchè tutto il giavone della risaia cresca in modo non scalare è bene, dopo aver seminato il riso, mantenere l'acqua della risaia ad un livello di 10 cm circa. A partire dal momento in cui tutto il giavone ha emesso la 2ª foglia si toglie l'acqua dalla risaia per 24-36 ore quindi sulle piante asciutte si eseguirà un trattamento con **PROPAL-RISO.** È importante usare mezzi in grado di bagnare uniformemente e completamente tutta la vegetazione presente; l'azione diserbante — che è selettiva nei confronti del riso — avrà inizio immediatamente dopo. Lasciare asciutta la risaia per 24 ore dopo il diserbo; immettere quindi l'acqua e tenerla, per una settimana circa, al livello più alto possibile; dopo di ciò normalizzare il livello stesso.

DOSI DI IMPIEGO
- per giavoni allo stadio di 1-3 foglie: 9,5-10 Kg di Propal-Riso per ettaro, usando non meno di 400-500 litri d'acqua;
- per giavoni allo stadio di 3-4 foglie: 11,5-12,5 Kg di Propal-Riso per ettaro, usando non meno di 450-500 litri d'acqua;
- per giavoni che abbiano 4 foglie e fino all'accestimento: 18-20 Kg di Propal-Riso per ettaro, usando sempre non meno di 500 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: il **PROPAL-RISO va usato da solo.** Distanziare il diserbo da un precedente o successivo trattamento antiparassitario o fertilizzante di almeno 5 giorni. Non trattare nell'immediato avvicinarsi di una pioggia.
FITOTOSSICITA: evitare che la soluzione diserbante venga a contatto con altre colture quali: piante da frutto, viti, fagioli, piselli, trifoglio, medica.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del prodotto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg

1926

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ZEAVIT LIQUIDO

Diserbante selettivo del mais

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
G. 44,4 Atrazina tecnica (purezza 95%) pari a gr. 42,18 di prodotto puro.
Coformulanti quanto basta a 100.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. n. 1926 Ministero Sanità del . . .10.4.76. . . . .

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Lo ZEAVIT LIQUIDO è un erbicida selettivo del mais a base di atrazina.
Rispetto ai formulati atrazinici in polvere bagnabile, possiede i seguenti vantaggi:
a) nella preparazione della poltiglia non si verifica la formazione di polvere e conseguente inalazione della stessa;
b) consente un più agevole e rapido dosaggio del prodotto;
c) si distribuisce rapidamente ed uniformemente nell'acqua dell'irrorazione;
d) evita occlusioni degli ugelli dell'irroratrice, grazie all'estrema finezza delle sue particelle;
e) è di più facile miscibilità con altri prodotti.

Controlla le principali infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali: giavoni, amaranti, farinaccio, persicaria, poa, ortica, erba porcellana, stellaria, capsella, erba morella, geranio, mercurella, veronica, piantaggine, matricaria.
Sono resistenti: Artemisia vulgaris, Panicum dichotomiflorum, Sorghum halepense.
Poco sensibile la Digitaria sanguinalis.
Agisce per contatto, ma soprattutto per assorbimento radicale.
La sua azione è favorita e resa più immediata da un giusto grado di umidità del terreno o da opportune irrigazioni nei casi di prolungata siccità.

DOSI PER ETTARO

- Trattamento in pre-semina con interramento: litri 4-5, distribuiti con 400-600 litri d'acqua.
- Trattamento in pre-emergenza della coltura: litri 4, distribuiti con 600-1000 litri d'acqua.
- Trattamento in post-emergenza della coltura, quando le infestanti hanno uno sviluppo massimo di 5-8 cm. indipendentemente dallo sviluppo del mais: litri 3,5 (con eventuale aggiunta di kg. 10 di olio bianco 80%), distribuiti con non meno di 1000 litri d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la dose di ZEAVIT LIQUIDO nel serbatoio dell'irroratrice già riempito d'acqua e mescolare affinché il prodotto si distribuisca rapidamente ed uniformemente.

MODALITA' D'IMPIEGO

Impiegare comuni irroratrici a pressione costante munite di agitatore meccanico.
Stabilire con esattezza il volume d'acqua da irrorare per assicurare una uniforme distribuzione ed una buona penetrazione dell'erbicida nel terreno.
Eseguire le applicazioni di preferenza su terreno già umido o che potrà ricevere la necessaria acqua da piogge o irrigazioni.
Prima del trattamento, per ottenere buoni risultati, è necessario che il terreno sia ben preparato e non zolloso.
Le eventuali sarchiature meccaniche per la rimozione della crosta superficiale del terreno, non dovranno superare i 4-5 cm. di profondità per conservare l'effetto erbicida residuo.
Tale effetto si protrae per tutto il periodo del ciclo colturale del mais, qualora non si intervenga con rincalzature.
La scarsità o il ritardo di piogge richiede, in misura maggiore nel periodo estivo, l'ausilio delle irrigazioni per ottenere il miglior effetto erbicida.
L'efficacia dello ZEAVIT LIQUIDO è ridotta dalla presenza di sostanza organica in quantità molto elevata: non è consigliabile trattare su terreni torbosi in pre-semina e in pre-emergenza.
Lavorare il terreno con aratura profonda (30-35 cm.) all'epoca della raccolta del mais, prima di far seguire le colture di avvicendamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con olio bianco, con erbicidi quali Alachlor e 2,4 D.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi consigliate, il prodotto non è fitotossico sulla coltura.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento ed almeno di 10 mesi per le altre colture (esempio: bietole e tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

1927

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

HERBIDAL MAIS LIQUIDO

Diserbante selettivo del mais

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
G. 44,4 Atrazina tecnica (purezza 95%) pari a gr. 42,18 di prodotto puro.
Coformulanti quanto basta a 100.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Ravit

Reg. n. 1927 Ministero Sanità del . .13.4.76. . . . . .

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'HERBIDAL MAIS LIQUIDO è un erbicida selettivo del mais a base di atrazina. Rispetto ai formulati atrazinici in polvere bagnabile, possiede i seguenti vantaggi:

a) nella preparazione della poltiglia non si verifica la formazione di polvere e conseguente inalazione della stessa;
b) consente un più agevole e rapido dosaggio del prodotto;
c) si distribuisce rapidamente ed uniformemente nell'acqua dell'irrorazione;
d) evita occlusioni degli ugelli dell'irroratrice, grazie all'estrema finezza delle sue particelle;
e) è di più facile miscibilità con altri prodotti.

Controlla le principali infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali: giavoni, amaranti, farinaccio, persicaria, poa, ortica, erba porcellana, stellaria, capsella, erba morella, geranio, mercurella, veronica, plantaggine, matricaria.
Sono resistenti: Artemisia vulgaris, Panicum dichotomiflorum, Sorghum halepense.
Poco sensibile la Digitaria sanguinalis.
Agisce per contatto, ma soprattutto per assorbimento radicale.
La sua azione è favorita e resa più immediata da un giusto grado di umidità del terreno o da opportune irrigazioni nei casi di prolungata siccità.

DOSI PER ETTARO

- Trattamento in pre-semina con interramento: litri 4-5, distribuiti con 400-600 litri d'acqua.
- Trattamento in pre-emergenza della coltura: litri 4, distribuiti con 600-1000 litri d'acqua.
- Trattamento in post-emergenza della coltura, quando le infestanti hanno uno sviluppo massimo di 5-8 cm. indipendentemente dallo sviluppo del mais: litri 3,5 (con eventuale aggiunta di kg. 10 di olio bianco 80%), distribuiti con non meno di 1000 litri d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la dose di HERBIDAL MAIS LIQUIDO nel serbatoio dell'irroratrice già riempito d'acqua e mescolare affinché il prodotto si distribuisca rapidamente ed uniformemente.

MODALITA' D'IMPIEGO

Impiegare comuni irroratrici a pressione costante munite di agitatore meccanico.
Stabilire con esattezza il volume d'acqua da irrorare per assicurare una uniforme distribuzione ed una buona penetrazione dell'erbicida nel terreno.
Eseguire le applicazioni di preferenza su terreno già umido o che potrà ricevere la necessaria acqua da piogge o irrigazioni.
Prima del trattamento, per ottenere buoni risultati, è necessario che il terreno sia ben preparato e non zolloso.
Le eventuali sarchiature meccaniche per la rimozione della crosta superficiale del terreno, non dovranno superare i 4-5 cm. di profondità per conservare l'effetto erbicida residuo.
Tale effetto si protrae per tutto il periodo del ciclo colturale del mais, qualora non si intervenga con rincalzature.
La scarsità o il ritardo di piogge richiede, in misura maggiore nel periodo estivo, l'ausilio delle irrigazioni per ottenere il miglior effetto erbicida.
L'efficacia dell'HERBIDAL MAIS LIQUIDO è ridotta dalla presenza di sostanza organica in quantità molto elevata: non è consigliabile trattare su terreni torbosi in pre-semina e in pre-emergenza.
Lavorare il terreno con aratura profonda (30-35 cm.) all'epoca della raccolta del mais, prima di far seguire le colture di avvicendamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con olio bianco, con erbicidi quali Alachlor e 2,4 D.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi consigliate, il prodotto non è fitotossico sulla coltura.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento ed almeno di 10 mesi per le altre colture (esempio: bietole e tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

1930

Estamine® - MCPA

Erbicida ormonico per il diserbo selettivo dei cereali

Composizione

100 g di prodotto contengono:
59,5 g sali di ammine dell'MCPA (acido-4-cloro-2-metilfenossiacetico) pari a g 43,4 di acido equivalente puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., *ORIGGIO (VA)*

Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*

Registrazione Ministero della Sanità n. 1930 del 7.7.75

® marchio e brevetto della « Green Cross Products », Divisione della « CIBA-GEIGY Canada Ltd. »

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni
È sconsigliata la digitale.

Caratteristiche
ESTAMINE-MCPA è una nuova formulazione brevettata e consiste in una miscela di sali amminici che, tuttavia, subito dopo l'applicazione, non cristallizza come le comuni formulazioni.
Ciò evita dispersioni di prodotto e quindi una migliore utilizzazione della sostanza attiva che penetra più facilmente nelle infestanti e quindi esplica una migliore efficacia.

Indicazioni
ESTAMINE-MCPA è indicato nella lotta contro le infestanti a foglia larga per il diserbo selettivo dei cereali (frumento, orzo, segale, avena, riso). ESTAMINE-MCPA non possiede attività erbicida contro le infestanti graminacee.

Dosi e modalità d'impiego
Frumento, Orzo, Segale, Avena, Riso
Kg 2 - 2,5 in 400 litri o più di acqua per ettaro, in relazione alla temperatura ambiente ed al grado di sviluppo delle infestanti. Il trattamento si effettua nel periodo compreso tra l'accestimento e la levata della coltura, ma prima dell'inizio della fase di « botticella ».
Le temperature relativamente elevate favoriscono l'azione del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. « Avvertenza »: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità
In condizioni normali di ambiente e d'impiego e se utilizzato secondo le istruzioni, il prodotto non è fitotossico.
Il prodotto può danneggiare colture sensibili adiacenti, quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e floreali in genere.

Rischi di nocività
Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere il trattamento almeno 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **It 1-5**

1963

Polvere bagnabile
Diserbante selettivo dei cereali invernali (frumento e orzo), a largo spettro d'azione per trattamenti di post-emergenza

Composizione

100 g di prodotto contengono:
25 g bromophenoxim (3,5-dibromo-4-idrossi-benzaldossima, 0-(2', 4'-dinitrofenil)-etere) puro pari a g 27 di prodotto tecnico al 93% di purezza
40 g chlortoluron (N-3-cloro-4-metilfenil-N', N'-dimetilurea) puro pari a g 41,2 di prodotto tecnico al 97% di purezza
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (Va)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1963 del 3.7.75

® marchio depositato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione complementare e cioè l'una ad azione graminicida e l'altra ad azione specifica contro le infestanti dicotiledoni.
DICURAN S è pertanto un prodotto a largo spettro d'azione che controlla sia le infestanti graminacee quali Alopecurus, Apera, Lolium, Poa, sia le infestanti a foglia larga quali Papavero, Matricaria, Poligoni, Rafano, Senape, Stellaria, Veccia, Centaurea, Galeopsis, Fumaria.
DICURAN S agisce sia come erbicida ad azione residua nel terreno, sia come erbicida fogliare di contatto.

Modalità d'impiego
Il prodotto si impiega dopo l'emergenza delle infestanti e quando la coltura ha superato lo stadio della 4ª foglia ed inizia od è in corso la fase di accestimento. Le infestanti, specie le graminacee, sono più sensibili nei primi stadi di sviluppo.
I migliori risultati si ottengono quando le infestanti graminacee non hanno superato lo stadio di 3-5 foglie e le infestanti a foglia larga lo stadio di 4-6 foglie.

Dose d'impiego
Kg 3 in 500 litri o più di acqua per ettaro.

« Avvertenze » - Evitare superdosaggi ed accumuli della miscela erbicida.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Non è prevista la miscela con altri prodotti erbicidi.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e d'impiego e se utilizzato secondo le predette istruzioni, il prodotto non è fitotossico. Occasionalmente, sintomi di sofferenza delle colture hanno carattere transitorio e non recano alcun pregiudizio alla produzione.
Il prodotto è fitotossico sulle varietà di frumento DEMAR 4.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **kg 1 - 5**

Faneron® MCPP

Polvere bagnabile
Erbicida per il diserbo selettivo del frumento e di altri cereali (orzo, segale, avena)

Composizione

100 g di prodotto contengono:
21,5 g bromofenoxim tecnico al 93% di 3,5-dibromo-4-idrossi-benzaldossima,0-(2',4'-dinitrofenil)-etere, pari a 20 g di prodotto puro
35 g Mecoprop o MCPP (acido metilclorofenossipropionico), sale sodico all'86% pari a g 30 di acido equivalente
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni
È sconsigliata la digitale.

È un prodotto selettivo per le colture dei cereali e del frumento e con un vasto campo d'azione che praticamente comprende quasi tutte le più comuni infestanti a foglia larga quali Bifora, Camomilla, Canapa selvatica, Capsella, Fiordaliso, Fumaria, Papavero, Poligoni, Rafano, Stellaria, Senape, Ranuncoli, Veccia, Galium, Lamium, Convolvolo, Romice, Cirsium, Artemisia.
FANERON MCPP non ha azione contro le infestanti graminacee.

Dosi e modalità d'impiego
Kg 4 in 400-500 litri d'acqua per ettaro. Il trattamento si effettua durante l'accestimento e la levata della coltura, ma prima dell'inizio della fase di botticella. Le temperature relativamente elevate favoriscono l'azione del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. « Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (Va)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1965 del 3.9.75

® marchio registrato

DA NON VENDERSI SFUSO

1987

Neoron® 25

Soluzione emulsionabile
Acaricida selettivo

Composizione
100 g di prodotto contengono:
25 g bromopropilato (GS 19851 puro) = estere isopropilico dell'acido 4,4-dibromobenzilico, pari a g 28 di prodotto tecnico all'88% di purezza minima.
q.b. a 100 g coformulanti.

CLASSE IV

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)

Officina di produzione:
SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1987 del 9.12.75

® marchio depositato

NEORON 25 raggiunge i due obiettivi fondamentali della lotta contro gli Acari fitofagi: distruzione del Ragno rosso, del Ragno giallo, degli altri Tetranichidi, degli Eriofidi, con azione simultanea sulle uova, le larve, gli adulti; completa selettività a protezione degli insetti utili (predatori, api).

Modalità d'impiego
Dose: 150-200 g in 100 litri di acqua.
Diluire la dose necessaria in poca acqua e versare l'emulsione ottenuta nel residuo quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

NEORON 25 presenta azione ovicida, larvicida ed adulticida sulle specie di acaro infestanti le colture frutticole (melo, pero, pesco, vite, agrumi), floreali (garofani, rose, ortensie ed altre piante ornamentali, anche in serra), ortive ed industriali. Data l'azione di contatto del prodotto, per ottenere il massimo rendimento, si raccomanda di irrorare accuratamente entrambe le pagine delle foglie e tutte le altre porzioni infestate.

NEORON 25 si impiega nel periodo primaverile-estivo, all'inizio o nel corso delle infestazioni, e si può adoperare anche in prossimità del raccolto. Si raccomanda un trattamento contro l'ultima generazione estiva del Ragno rosso per evitare la deposizione delle uova d'inverno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - NEORON 25 è compatibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici ad eccezione di quelli a reazione nettamente alcalina (polisolfuri). « Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - In condizioni normali di ambiente e di impiego e se impiegato secondo le predette istruzioni il prodotto non è fitotossico.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti, non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO It 1-5-10

1995

TETRARAM

POLVERE BAGNABILE A BASE DI OSSICLORURO DI RAME

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraminico)	gr 50
Disperdenti e coadiuvanti q.b. a	gr 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Dosi e modalità d'impiego: Il TETRARAM si usa contro la ticchiolatura del melo e del pero, la gommosi e la bolla del pesco e del susino, la peronospora della vite e le malattie fungine del pomodoro e delle cucurbitacee, la peronospora della patata e della bietola.
Le dosi di impiego variano da gr 700-900 per q.le di acqua nei trattamenti autunno-invernali alle piante da frutta a gr 300-400 nei trattamenti prefiorali e si riducono a gr 100-200 nei trattamenti post-florali. Contro la peronospora della vite la cercospora della bietola e le malattie fungine delle piante orticole la dose va da 300 a 600 grammi per ettolitro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il TETRARAM è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA

Su pesco, susino e varietà di melo (+) e di pero (++) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(+) = Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonatham, Rome Beauty, Morgentuft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

(++) = Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B. C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.

« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali ».

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207

Stabilimento di produzione: S.C.A.M. S.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena
Registrazione N. 1995 del 13 aprile 1976 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO PESO KG 5

1996

ID 573C

1996

ATTIVAR® 90

FUNGICIDA ORGANICO

Caratteristiche: anticrittogamico acuprico con efficacia iniziale ed azione residua.
Malattie combattute: Bolla, Corineo, Cancro dei rametti del pesco, Ticchiolatura, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi.
Colture protette e dosi d'impiego:

Drupacee: trattamenti primaverili-estivi	gr. 150-250/hl
trattamenti autunnali e fine inverno	gr. 400-500/hl
Pomacee:	gr. 200-250/hl
Ortaggi:	gr. 150-250/hl
Colture industriali di piante ornamentali e floreali	gr. 150-250/hl

Epoche d'impiego: trattamenti preventivi autunno-invernali e primaverili-estivi.
Modalità d'impiego: le dosi indicate sono valide per l'impiego e volume normale. Con atomizzatori a basso volume, aumentare la concentrazione in rapporto alla minor quantità d'acqua distribuita.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari con l'avvertenza di usare le miscele subito dopo la loro preparazione. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto.
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

III CLASSE

Composizione:

ZIRAM puro .		gr. 84,6
Coformulanti .	q.b. a	gr. 100,0

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/2 - Telex 511046

Registrazione n. 1996
del 31-10-1975
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
di OZZANO EMILIA (BO)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

VERCHIM ASTERIAS

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi d'intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.*
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: *Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*
Controindicazioni: *alcool, olii, grassi.*

AVVERTENZA: *consultare un Centro antiveleni.*

1149/VA/E/02

ANTHIO 33

Insetticida liquido a base di formotione ad azione endoterapeutica e di contatto

Composizione

gr. 33 di formotione (0,0-dimetil S-(N-formil-N-metilcarbamoilmetil)-ditiofosfato) puro, pari a gr. 35,5 di formotione tecnico al 93% di purezza minima
solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

— *Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo*
— *Sintomi di intossicazione*
Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.
— *Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso*
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore - iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari. Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
— *Alcune controindicazioni*
Morfina - vitamina B1 - coramina - latte - grassi.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 2004 del 3-7-1975 Ministero della Sanità.

Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Mosca delle olive, Tignola dell'olivo	0,1 - 0,15% = gr. 100 - 150
Mosca delle ciliege	0,075 - 0,12% = gr. 75 - 120
Altiche, Cleono, Mosca delle bietole	0,1 - 0,12% = gr. 100 - 120 (con un consumo di litri 1000 di poltiglia per ettaro)
Afidi, Cicadelle, Iponomeute, Tentredini	0,1 - 0,15% = gr. 100 - 150
Aleurodi, Carpocapsa, Anarsia, Mosca delle frutta	0,15% = gr. 150

Modalità di impiego

Versare il quantitativo necessario di ANTHIO 33 direttamente nell'acqua, agitando energicamente.
In linea del tutto generale i trattamenti con ANTHIO 33 devono essere eseguiti alla prima comparsa dei diversi parassiti e ripetuti, secondo necessità e secondo la biologia dei parassiti stessi.
Per la lotta contro: Mosca delle olive, Mosca delle ciliege e Mosca delle frutta seguire i consigli dei Tecnici delle zone interessate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

L'ANTHIO 33 è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione Sandoz. Per la preparazione delle poltiglie miste diluire l'ANTHIO 33 in poca acqua prima di aggiungerlo alla poltiglia prescelta.
Usare possibilmente la poltiglia nello stesso giorno della sua preparazione.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Utilizzato secondo le modalità indicate non vi sono pericoli di fitotossicità da parte dell'ANTHIO 33; non usare le dosi più elevate in colture di cetrioli e tabacco.

Rischi di nocività

Non trattare durante la fioritura degli alberi e delle sottocolture in quanto il prodotto è dannoso alle api. E' tossico per i pesci.
Durante il trattamento e per i 7 giorni susseguenti lo stesso non introdurre animali domestici e di bassa corte nelle colture trattate.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta per ortofrutticoli e 21 giorni per l'olivo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

2005

DOSANEX

Diserbante per la lotta contro le Graminacee avventizie e le Dicotiledoni annuali infestanti colture di grano e di orzo a semina autunnale e di carote

Composizione

gr. 82 di metoxuron tecnico (N-(3 cloro-4 metossifenil)-N',N' dimetil urea) al 97,5% di purezza minima, equivalenti a gr. 80 di metoxuron puro, disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 2005 del 2.7.1975 del Ministero della Sanità.

Caratteristiche

Il DOSANEX è efficace contro **Alopecurus myosuroides** (Erba codina), **Amaranthus retroflexus** (Amaranto), **Anagallis arvensis** (Anagallide), **Apera spica venti** (Spica venti), **Avena spp.** (Avene selvatiche), **Capsella bursa-pastoris** (Borsa pastore), **Centaurea cyanus** (Fiordaliso), **Chenopodium album** (Farinaccio), **Galeopsis tetrahit** (Canapa selvatica), **Galinsoga parviflora** (Galinsoga), **Galium aparine** (Attaccamano), **Lamium purpureum** (Falsa ortica), **Lolium spp.** (Logli), **Matricaria chamomilla** (Camomilla), **Mercurialis annua** (Mercurella), **Panicum spp.** (Panici), **Papaver rhoeas** (Papavero), **Poa spp.** (Poe), **Polygonum aviculare** (Coreggiola), **Polygonum convolvulus** (Convolvulo), **Polygonum persicaria** (Persicaria), **Raphanus raphanistrum** (Rafanistro), **Senecio vulgaris** (Erba calderina), **Sinapis arvensis** (Senape), **Solanum nigrum** (Erba morella), **Stellaria media** (Centocchio).

Dosi e modalità di impiego

- **Cereali**

  Dosi di impiego: su **grano e orzo** a semina autunnale kg. 4-5 di DOSANEX per ettaro.
  Momento applicativo: fra lo stadio delle 3 foglie e quello dell'accestimento compreso del cereale. Trattare il più presto possibile, vale a dire non appena il terreno è sufficientemente rassodato per permettere il passaggio dei mezzi irroratori e quando la massima parte delle malerbe si trova nei primi stadi vegetativi. In particolare per le Avene selvatiche intervenire prima del loro accestimento. Evitare di trattare su terreno gelato; le piante devono essere asciutte.

- **Carote**

  Dosi di impiego: nei terreni leggeri kg. 4 di DOSANEX per ettaro;
  nei terreni a medio impasto, forti e umiferi kg. 5 di DOSANEX per ettaro.

  Momento applicativo:
  - pre-emergenza: intervenire al più tardi una settimana dopo la semina;
  - post-emergenza: nei terreni a medio impasto, forti e umiferi intervenire dallo stadio delle 2 foglie (quando cioè tutte le carote hanno sviluppato almeno 2 foglie); nei terreni leggeri intervenire dallo stadio delle 3-4 foglie.

Preparazione e applicazione della poltiglia

Stemperare il quantitativo necessario di DOSANEX in poca acqua sino ad ottenere una sospensione senza grumi, versare questa poltiglia concentrata nel rimanente quantitativo di acqua, agitando energicamente.
Quantità di poltiglia da distribuire per ettaro: litri 600-1000.
Distribuire la poltiglia il più uniformemente possibile.
Trattare solamente colture sane e che abbiano superato bene l'inverno.
Evitare che la nebbia della poltiglia raggiunga o si distribuisca sulla coltura confinante.
Non seminare miscugli di foraggere dopo il diserbo.
Dopo l'uso lavare bene il mezzo irroratore.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il prodotto può essere usato in miscela o contemporaneamente con altri erbicidi solo se espressamente consigliato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Su colture sane per le quali viene consigliato, in normali condizioni di ambiente e di impiego. Il prodotto non ha dimostrato fitotossicità. In caso di dubbio e di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di interpellare la casa produttrice o di eseguire preventive prove parcellari. Evitare di diserbare la varietà di grano DEMAR 4.

Rischi di nocività

Il prodotto non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

20:(

Classe III

Diserbante selettivo per le erbe non graminacee del grano

ATTENZIONE

manipolare con prudenza

Composizione:
100 gr. di prodotto contengono:
gr. 32,2 di 2,4-D acido puro (da estere isottilico)
q.b. a gr. 100 di solventi ed emulsionanti
Contiene Xilolo

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

Dosi e modalità d'impiego:
Il trattamento deve essere effettuato nel periodo che intercorre fra la fine dell'accestimento e l'inizio della fase di «botticella», quando le infestanti sono in accrescimento. Le dosi d'impiego variano da kg. 0,400 a kg. 1,400 per ettaro a seconda dello sviluppo vegetativo delle infestanti, della loro età e della resistenza al diserbante. Il prodotto va diluito in 4-6 q.li di acqua per irrorare un ettaro di superficie. L'ES 44 può anche essere impiegato nel diserbo selettivo del granoturco e di prati permanenti di graminacee.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli aventi reazione nettamente alcalina.

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Il prodotto può danneggiare colture sensibili, quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc.; evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori, a causa del vento.

Nocività
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti.
Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S. p. A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - CARRARA AVENZA (MS)

Reg. N. 2031 del 30-7-75 del Min. Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso kg.

2032

DIUCISAR

Erbicida in polvere bagnabile per il diserbo chimico selettivo del melo, pero, vite, agrumi, olivo, asparago e medica in produzione.

CLASSE III 2032

ATTENZIONE

manipolare con prudenza

Composizione

100 gr. di prodotto contengono:
24,5 gr. di DIURON puro
24,5 gr. di CHLORPROPHAM puro
q. b. a 100 di bagnanti o disperdenti

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA: *Consultare un Centro Antiveleni.*

Il DIUCISAR è una miscela erbicida che agisce per prevalente assorbimento radicale durante le prime fasi germinative ed i primi stadi di sviluppo della pianta. La presenza del CHLORPROPHAM conferisce alla miscela un attività contro le Poligonacee in genere, la Portulaca e la Veronica. È attivo contro le infestanti annuali e biennali, nonché contro diverse specie perennanti. Nell'ambito delle graminacee annuali, il DIUCISAR controlla Alopecuro, Avena, Poa, Lolium, Giavone, Setaria, Digitaria. Fra le Dicotiledoni annuali e biennali controlla il Poligono convolvolo, P. aviculare, P. persicaria, Amaranto, Farinaccio, Erba morella, Atriplex, Anagallide, Capsella, Senape, Rafano, Ranuncolo, Erba storna, Lamium, Galeopsis, Spergula, Stellaria, Marcorella, Sonco, Camomilla, Calepina, Portulaca, Papavero, Euforbia, Thlapsi e Romici.

Sono resistenti al DIUCISAR la Plantago, Fumaria, Taraxacum, Senecio e le infestanti perenni Stoppione, Vilucchio, nonché le graminacee perenni, mentre Artemisia e Agropyrum sono fortemente danneggiate quando vengono impiegati dosaggi elevati di DIUCISAR.

Dosi e modalità d'impiego

DISERBO MELO E PERO: effettuare il trattamento alla dose di 8-10 Kg./ha alla fine dell'autunno o all'inizio della primavera, preferibilmente su terreno lavorato e privo di infestanti molto sviluppate. In impianti giovani si consiglia l'impiego di 4-6 Kg./ha.

DISERBO OLIVETO: eseguire il trattamento con 6-8 Kg./ha di DIUCISAR alla fine settembre - metà ottobre, su terreno lavorato e privo di infestanti molto sviluppate.

DISERBO AGRUMI: impiegare 8-10 Kg./ha in autunno, su terreno lavorato. Ripetere il trattamento in primavera, alla stessa dose.

DISERBO VIGNETO: impiegare 8-10 Kg./ha a fine autunno o all'inizio della primavera, su terreno lavorato e privo di infestanti ad elevato sviluppo.

DISERBO ASPARAGI: in impianti con meno di 2 anni di età, impiegare 4-6 Kg./ha su terreno privo di infestanti, subito dopo le lavorazioni primaverili. Su asparagi di più vecchio impianto la dose d'impiego può essere elevata a 8-10 Kg./ha.

DISERBO MEDICA IN PRODUZIONE: su medicai di almeno 2 anni di impianto impiegare 4-6 Kg./ha di prodotto all'inizio o alla fine dell'inverno, in ogni caso prima della ripresa vegetativa dell'erba medica.
Evitare il trattamento su vegetazione bagnata o gelata.

Da non applicare con mezzi aerei.

Il DIUCISAR si impiega senza l'aggiunta di altri prodotti.

È fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti.
Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Officina di produzione e sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1

Registrazione Ministero della Sanità n. 2032 del 4-9-1975

DA NON VENDERSI SFUSO

20

Turbofal® liquido

Anticrittogamico per la vite.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
21,15 g folpet puro
10,6 g rame puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE IV

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Sintomi di intossicazione
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia:
lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

CIBA-GEIGY S.p.A. - Origgio (VA)
Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2048 del 9-12-1975
® marchio depositato

Caratteristiche
TURBOFAL è un fungicida cupro-organico in forma liquida per la lotta contro la peronospora e la muffa grigia (botrite) della vite.
La sua formulazione liquida facilita l'impiego ed assicura adesività e resistenza al dilavamento.

Epoche d'impiego
Non si deve trattare durante la fioritura.

contro la peronospora:
Il TURBOFAL si impiega regolarmente in funzione delle condizioni ambientali, dei fattori pluviometrici e dello sviluppo vegetativo.
La normale frequenza dei trattamenti antiperonosporici permette di limitare e di frenare la muffa grigia (botrite).

contro la botrite:
si rendono necessari almeno tre trattamenti nei seguenti stadi di sviluppo:
— alla fine dell'allegagione
— alla chiusura del grappoli
— all'invaiatura.

Dosi d'impiego
— contro la peronospora: 350 g/hl d'acqua (pari a 250 cc/hl)
— contro la botrite: 600 g/hl d'acqua (pari a 420 cc/hl)
Per la distribuzione si utilizzano quantitativi di miscela sufficienti ad assicurare una copertura completa della vegetazione fino al limite dello sgocciolamento.
Per i trattamenti a basso volume aumentare la concentrazione di TURBOFAL in rapporto inverso al minor quantitativo di acqua utilizzata.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: TURBOFAL è compatibile con AUROCOL® (zolfo colloidale), SUPRACID®, NUVACRON®, NOGOS®, PARIDOL®.
« Avvertenza »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili. E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto per le uve da tavola e 40 giorni prima per le uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

It

2049

Faneron combi 50 WP

Polvere bagnabile
Diserbante di post-emergenza selettivo dei cereali invernali (frumento, orzo)

Composizione

100 g di prodotto contengono:
33 g bromofenoxim puro (3,5-dibromo-4-idrossi-benzaldossima-0-(2', 4'-dinitrofenil) etere) pari a g 35,5 di prodotto tecnico al 93% di purezza
17 g GS 13529 puro (terbutilazina = 2-terz. butilammino-4-cloro-6-etilammino-s-triazina) pari a g 17,5 di prodotto tecnico al 96% di purezza
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., *ORIGGIO (VA)*
Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*

Registrazione Ministero Sanità n. 2049 del 9.12.75
® marchio depositato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi d'intossicazione (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione
Consigli terapeutici. Data la non specificità dei sintomi, la terapia è sintomatica

Caratteristiche
Agisce come erbicida fogliare di contatt oed in misura minore come erbicida ad azione residua nel terreno.
Controlla la maggior parte delle infestanti annuali a foglia larga (quali Bifora, Camomilla, Canapa selvatica, Capsella, Fiordaliso, Fumaria, Papavero, Poligoni, Rafano, Stellaria, Senape, Ranuncoli, Veccia ed anche — ma solo nei primi stadi di sviluppo — alcune graminacee annuali (quali Alopecurus, Poa). Sono invece resistenti le malerbe provenienti da organi di propagazione vegetativa (stoloni, cespi), quali Stoppione, Romice, Artemisia.

Epoca dei trattamenti
Il prodotto si impiega solo in post-emergenza, cioè dopo l'emissione della 4ª foglia della coltura ed alla comparsa delle infestanti.
Non impiegare il prodotto quando lo sviluppo della coltura è tale da impedire una sufficiente bagnatura delle infestanti.
L'epoca d'impiego, pertanto, normalmente coincide con la fase di accestimento e fino alla fase di «levata» della coltura.

Dosi d'impiego
Kg 1,5-2 in 500 litri o più d'acqua per ettaro.
Utilizzare le dosi più elevate quando le infestanti sono più sviluppate oppure nei terreni più ricchi di sostanza organica.

Avvertenze
Dal trattamento erbicida alla semina di successive colture sensibili occorre un intervallo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Impiegare il prodotto solo su colture specializzate.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - La miscela con altri prodotti non è prevista; il prodotto, comunque, non dà luogo a fenomeni di incompatibilità. «Avvertenza». In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici.

Fitotossicità - Dopo l'applicazione del prodotto possono occasionalmente manifestarsi sintomi di sofferenza della coltura; si tratta, però, di fenomeni transitori che in condizioni normali scompaiono in breve tempo, e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione.

Rischi di nocività - Il prodotto, a seguito dei trattamenti non è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg 1-5-10

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ORDRAM E

Diserbante selettivo, specifico nella lotta contro i Glavoni in risaia

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 72 di Ordram puro (purezza 95-97%) pari a gr. 75,79-74,23 di prodotto tecnico.
Diluenti inerti quanto basta a 100.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2077 Ministero della Sanità del 15.12.75

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

L'ORDRAM E è un diserbante selettivo liquido ed emulsionabile, per il riso, ad azione specifica contro i Glavoni (Panicum spp.).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Usare lt/ha 5,5-7 di Ordram E con quantitativi d'acqua non inferiori agli 800-1000 lt/ha.
Diluire la quantità di Ordram E necessaria in un volume doppio o triplo d'acqua, versare tale « miscela » nell'apparecchio di distribuzione e portare al volume voluto agitando.

L'ORDRAM E può essere impiegato:

in pre-semina: su terreno asciutto, già lavorato e concimato, pronto per la semina. Immediatamente dopo la distribuzione, o nelle prime ore che seguono il trattamento; incorporare con un normale erpice a dischi od altro attrezzo, ad una profondità di 8-10 cm. L'immissione dell'acqua è bene avvenga il più presto possibile.
L'Ordram E si può impiegare su risaie da semina, da trapianto e su vivai di riso.
La semina può essere effettuata in qualsiasi momento dopo la sommersione.

In post-semina: mantenendo l'acqua della risaia e distribuendo la miscela erbicida sull'acqua stessa. Il normale ricambio d'acqua verrà ripristinato dopo 7-8 giorni dal trattamento.

In post-emergenza della coltura e delle infestanti: l'applicazione verrà effettuata allorché le infestanti e il riso avranno raggiunto lo stadio di 2-4 foglie (30-40 giorni dopo la semina), dopo aver interrotto l'immissione dell'acqua nella risaia, irrorando uniformemente la sospensiosne erbicida su tutta la superficie da trattare.
Il normale ricambio verrà ripristinato dopo 7-8 giorni dal trattamento. Per accelerare la morte delle piante di giavone più sviluppate sarà buona norma mantenere, successivamente al trattamento, un livello d'acqua consistente (20-30 cm.) per 15-20 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi e con le modalità d'impiego consigliate, il prodotto non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è innocuo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

2109

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

CLORMEFOS RAVIT DOTAN 5 GRANULARE

Insetticida del terreno
in forma granulare protetta

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 4,95 di Clormefos puro
Sostanze inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
In caso di evidente ipossia con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti 0,2 - 1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2109 Ministero della Sanità del 30-12-1975

E/2

CARATTERISTICHE

Il DOTAN 5 GRANULARE è un insetticida in formulazione granulare indicato per la lotta contro gli insetti del terreno come gli Elateridi (Agriotes spp.) le Grillotalpa, le larve di Tipula, ed i Miriapodi (Blaniulus guttulatus e Scutigerella immaculata).

Il DOTAN 5 GRANULARE va sparso sul terreno e quindi incorporato prima od al momento della semina delle colture (barbabietole da zucchero, mais), esclusivamente con mezzi meccanici.

Può essere applicato anche nei solchi di semina.

Agisce per contatto e possiede una moderata persistenza (qualche mese)

Non trasmette odori e sapori alle colture trattate.

L'efficacia del DOTAN 5 GRANULARE è ridotta nei terreni ricchi di sostanza organica.

Dosi

a) su tutta la superficie del terreno dose normale d'impiego Kg. 60/Ha.
In caso di forte infestazione, la dose può essere elevata fino a Kg. 80/Ha.

b) nei solchi di semina, per metri lineari 100:
- barbabietola da zucchero gr. 30
- mais gr. 50-60.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

21:

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

CLORMEFOS BPD
GEODAN 5 GRANULARE

Insetticida del terreno
in forma granulare protetta

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 4,95 di Clormefos puro
Sostanze inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti 0,2 - 1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.19.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 2110 Ministero della Sanità del 30-12-1975

E/2

CARATTERISTICHE

Il **GEODAN 5 GRANULARE** è un insetticida in formulazione granulare indicato per la lotta contro gli insetti del terreno come gli Elateridi (Agriotes spp.) la Grillotalpa, le larve di Tipula, ed i Miriapodi (Blaniulus guttulatus e Scutigerella immaculata.

Il **GEODAN 5 GRANULARE** va sparso sul terreno e quindi incorporato prima od al momento della semina delle colture (barbabietole da zucchero, mais), esclusivamente con mezzi meccanici.

Può essere applicato anche nei solchi di semina.

Agisce per contatto e possiede una moderata persistenza (qualche mese).

Non trasmette odori e sapori alle colture trattate.

L'efficacia del **GEODAN 5 GRANULARE** è ridotta nei terreni ricchi di sostanza organica.

Dosi

a) su tutta la superficie del terreno dose normale d'impiego Kg. 60/Ha.
   In caso di forte infestazione, la dose può essere elevata fino a Kg. 80/Ha.

b) nei solchi di semina, per metri lineari 100:
   - barbabietola da zucchero gr. 30
   - mais gr. 50-60.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

2111

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

COBEXAL*

Erbicida selettivo per colture ortive e girasole
Emulsione

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 25 Dinitramina pura
Conformulanti q.b. a 100.

* MARCHIO REGISTRATO DALLA BORAX

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **COBEXAL** è un diserbante selettivo delle colture di pomodoro, radicchio, indivia, peperone, melanzana, finocchio, girasole e carota, per la lotta contro numerose infestanti monocotiledoni e dicotiledoni.

a) INFESTANTI SENSIBILI:

- **Monocotiledoni:** Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Panicum dichotomiflorum, Poa annua, Setaria viridis, Setaria glauca, Sorghum halepense.
- **Dicotiledoni:** Amarantus retroflexus, Chenopodium album e polyspermum, Lamium purpureum, Papaver rhoeas, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Spergula arvensis, Stellaria media, Veronica sp.

b) INFESTANTI MEDIO RESISTENTI:

- Matricaria chamomilla, Mercurialis annua, Poligonum aviculare, convolvulus e persicaria, Viola tricolor.

c) INFESTANTI RESISTENTI:

- Anthemis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Cyperus esculentus, Galinsoga parviflora, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Urtica urens.

Agisce sui semi delle infestanti al momento della loro germinazione. Non ha effetti residui sulle colture successive impiantate su terreni ben preparati.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 2111 Ministero della Sanità del 13-4-76

E/1

MODALITA' D'IMPIEGO

Il **COBEXAL** va applicato per irrorazione sul terreno:

a) prima della semina del radicchio, finocchio, girasole e carota;
b) prima del trapianto del pomodoro, radicchio, indivia, peperone, melanzana e finocchio;
c) **dopo l'emergenza del pomodoro seminato.** Intervenire prima del diradamento, quando le piantine di pomodoro hanno almeno 5-6 foglie, bagnando uniformemente il terreno tra le file.
d) **dopo il trapianto del pomodoro, peperone e melanzana.** Intervenire quando le piantine hanno superato la crisi di trapianto (dopo 30-40 giorni dal trapianto) e dopo la sistemazione definitiva del terreno.

Nel caso delle applicazioni di **post-emergenza** e di **post-trapianto**, le eventuali infestanti presenti al momento del trattamento devono essere eliminate con l'incorporazione meccanica.

Nelle suddette applicazioni, se il terreno al momento del trattamento è privo di infestanti, l'incorporazione meccanica può essere sostituita con l'irrigazione.

Al momento del trattamento il terreno deve essere libero da infestanti, fresco e finemente lavorato.

Entro 24 ore dal trattamento si deve effettuare una superficiale incorporazione (2-4 cm) del prodotto, nel terreno, mediante idonea attrezzatura. Dopo di che il terreno non deve essere lavorato, fatta eccezione per le normali operazioni di semina o di trapianto.

DOSI D'IMPIEGO PER ETTARO

— terreni leggeri	litri 1,5
— terreni di medio impasto	litri 2
— terreni pesanti	litri 2,5-3

distribuiti con 150-200 litri d'acqua, avendo cura di effettuare il trattamento subito dopo la preparazione della miscela.

Mettere la quantità necessaria di **COBEXAL** in un recipiente. Diluire in un volume doppio o triplo d'acqua. Versare la miscela così ottenuta nell'apparecchio di distribuzione in corso di riempimento. Portare a volume agitando.

Durante il trattamento è necessaria una leggera agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZE

Non si consiglia l'impiego del prodotto per il diserbo delle colture protette (serre, tunnels).

Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

• **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato •.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

21

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

COBEX*

Erbicida selettivo per colture ortive e girasole
Emulsione

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 25 Dinitramina pura
Conformulanti q.b. a 100.

* MARCHIO REGISTRATO DALLA BORAX

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **COBEX** è un diserbante selettivo delle colture di pomodoro, radicchio, indivia, peperone, melanzana, finocchio, girasole e carota, per la lotta contro numerose infestanti monocotiledoni e dicotiledoni.

a) **INFESTANTI SENSIBILI:**
- **Monocotiledoni:** Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Panicum dichotomiflorum, Poa annua, Setaria viridis, Setaria glauca, Sorghum halepense.
- **Dicotiledoni:** Amarantus retroflexus, Chenopodium album e polyspermum, Lamium purpureum, Papaver rhoeas, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Spergula arvensis, Stellaria media, Veronica sp.

b) **INFESTANTI MEDIO RESISTENTI:**
- Matricaria chamomilla, Mercurialis annua, Poligonum aviculare, convolvulus e persicaria, Viola tricolor.

c) **INFESTANTI RESISTENTI:**
- Anthemis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Cyperus esculentus, Galinsoga parviflora, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Urtica urens.

Agisce sui semi delle infestanti al momento della loro germinazione. Non ha effetti residui sulle colture successive implantate su terreni ben preparati.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2113 Ministero della Sanità del 5-4-76

E/1

MODALITA' D'IMPIEGO

Il **COBEX** va applicato per irrorazione sul terreno:

a) prima della semina del radicchio, finocchio, girasole e carota;

b) prima del traplanto del pomodoro, radicchio, indivia, peperone, melanzana e finocchio;

c) **dopo l'emergenza del pomodoro seminato.** Intervenire prima del diradamento, quando le piantine di pomodoro hanno almeno 5-6 foglie, bagnando uniformemente il terreno tra le file.

d) **dopo il traplanto del pomodoro, peperone e melanzana.** Intervenire quando le piantine hanno superato la crisi di traplanto (dopo 30-40 giorni dal traplanto) e dopo la sistemazione definitiva del terreno.

Nel caso delle applicazioni di **post-emergenza** e di **post-traplanto**, le eventuali infestanti presenti al momento del trattamento devono essere eliminate con l'incorporazione meccanica.

Nelle suddette applicazioni, se il terreno al momento del trattamento è privo di infestanti, l'incorporazione meccanica può essere sostituita con l'irrigazione.

Al momento del trattamento il terreno deve essere libero da infestanti, fresco e finemente lavorato.

Entro 24 ore dal trattamento si deve effettuare una superficiale incorporazione (2-4 cm.) del prodotto, nel terreno, mediante idonea attrezzatura. Dopo di che il terreno non deve essere lavorato, fatta eccezione per le normali operazioni di semina o di traplanto.

DOSI D'IMPIEGO PER ETTARO

— terreni leggeri	litri 1,5
— terreni di medio impasto	litri 2
— terreni pesanti	litri 2,5-3

distribuiti con 150-200 litri d'acqua, avendo cura di effettuare il trattamento subito dopo la preparazione della miscela.

Mettere la quantità necessaria di **COBEX** in un recipiente. Diluire in un volume doppio o triplo d'acqua. Versare la miscela così ottenuta nell'apparecchio di distribuzione in corso di riempimento. Portare a volume agitando.

Durante il trattamento è necessaria una leggera agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZE

Non si consiglia l'impiego del prodotto per il diserbo delle colture protette (serre, tunnels).

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

2114

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CEPONE

Diserbante selettivo della cipolla
Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 54,52 Chlorthal puro (purezza 75%) pari a gr. 72,7 di prodotto tecnico
Gr. 13,65 Chlorpropham puro (purezza 98%) pari a gr. 13,93 di prodotto tecnico
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi)

Sintomi d'intossicazione:
nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici:
lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specilmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

— Il **CEPONE** è un erbicida selettivo di pre-emergenza per la cipolla dotato di ampio spettro di attività.
Possiede un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti sensibili impedendone lo sviluppo. Pertanto non esplica azione sulle infestanti già nate o sui loro semi già germogliati.

Spettro d'azione
a) **infestanti sensibili:**
monocotiledoni: Alopecurus, Digitaria sanguinalis, Poa annua, Setaria verticillata;
dicotiledoni: Amarantus retroflexus, Anagallis arvensis, Ajuga chamaepitis, Beta vulgaris, Chenopodium album, Chenopodium vulvaria, Convolvulus arvensis, Capsella, Erodium cicutarium, Fumaria officinalis, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica, Viola tricolor.
b) **medio resistenti:** Euphorbia peplus
c) **resistenti:** infestanti perenni.

Il **CEPONE** va distribuito immediatamente dopo la semina della coltura, alla dose di Kg. 11 per ettaro, distribuiti con almeno 500 litri di acqua.

Il terreno, prima del trattamento, dev'essere ben lavorato, ripulito da erbacce, ed avere un sufficiente tenore di umidità.

Per la preparazione della miscela aggiungere alla dose occorrente di **CEPONE** poca acqua, agitando fino ad ottenere una poltiglia omogenea.

Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua per ottenere la voluta concentrazione

Distribuire la miscela uniformemente sulla superficie da diserbare, usando normali pompe a mano o a motore.

Durante il trattamento mantenere la miscela in costante agitazione.

Effettuare il trattamento con tempo buono e senza vento.

Non impiegare il prodotto su terreni torbosi, perché viene inattivato dalla sostanza organica.

In periodi di siccità è opportuno mantenere il terreno umido per almeno una settimana dopo il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Evitare, durante l'irrorazione, che lo spruzzo giunga su altre colture vicine. Se la coltura dovesse fallire per cause ambientali, si può subito riseminare.

Quando capita di seminare cereali che seguono, sullo stesso terreno, colture trattate con **CEPONE** nel periodo estivo, è prudente effettuare prima una buona aratura, e lasciare poi il terreno a riposo per qualche tempo (15-20 giorni).

Lavare perfettamente dopo l'uso la pompa ed i recipienti usati per l'irrorazione.

NOCIVITA'

Il **CEPONE** è velenoso per il bestiame, i pesci, gli animali domestici e gli insetti utili. Non contaminare acque pescose o destinate all'abbeveramento del bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n 2114 **Ministero della Sanità del** . 5.4.76 . . . .

211

I CLASSE

VELENO

phorate cyanamid

THIMET* 5-G

geodisinfestante sistemico
granulare protetto

Presidio Sanitario
Reg. Min. Sanità n. 2117 del 22-1-1976

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Phorate puro	g 4,5
— supporti inerti	q.b. a 100

* Marchio registrato AMERICAN CYANAMID COMPANY, WAYNE, New Jersey (USA)

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255

AVVERTENZE

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici * Conservare la confezione ben chiusa * Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto * Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua * Non operare contro vento e non respirare i vapori nebulizzati e le polveri * Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti * Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi * Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone * Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva) * In caso di intossicazione ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Il THIMET*phorate 5-G è un granulare sistemico provvisto di azione per contatto, asfissia ed ingestione che, **distribuito all'epoca delle semine e dei trapianti**, assicura la difesa delle piantine per tutto il primo e più delicato periodo di vegetazione proteggendole sia dai parassiti delle radici e del colletto (Agrotidi, Atomarie, Blaniuli Elateridi, Grillotalpe, Maggiolini, Mosche e Punteruoli delle radici, Scutigerelle, Tipule e Nematodi dei generi Meloidogyne e Pratylenchus) sia dai precoci attacchi di parassiti delle foglie e degli steli (Afidi, Altiche, Casside, Mosche minatrici, Ragno rosso, Tripidi).
Oltre che per **geodisinfestazione totale** alla dose di **40-60 Kg/Ha** il THIMET*phorate 5-G è idoneo per la **distribuzione localizzata** da effettuare con idonei microgranulatori opportunamente tarati in modo da assicurare la giusta ed uniforme distribuzione unitamente al necessario incorporamento nel terreno. Per tale distribuzione, che, a seconda delle colture e delle attrezzature disponibili, può essere effettuata nei solchi di semina o ai lati delle file, sono consigliabili le seguenti dosi:

10-12 kg/Ha su BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
18-22 kg/Ha su MAIS, PATATA, POMODORO, TABACCO
20-24 kg/Ha su ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO O IN SERRA ed ORTICOLE (Carota, Cavoli, Fagiolo, Melanzana, Peperone, Pisello, Sedano, Zucchino)
8-10 g/mq su VIVAI DI ORNAMENTALI

Nei casi in cui l'interramento del prodotto non sia assicurato dalla tecnica di distribuzione provvedervi mediante leggera lavorazione od irrigazione. Su terreni fortemente alcalini o ad alto contenuto di sostanza organica è consigliabile aumentare di circa 1/3 le dosi suggerite.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Non è comunque garantita la compatibilità con i formulati di altre Ditte.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Per le colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari in funzione delle specifiche microcondizioni ambientali.

NOCIVITA'
E' tossico verso insetti utili, bestiame, animali domestici e pesci. Non trattare durante la fioritura - Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del prodotto stesso.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIETATA LA VENDITA ALLO STATO SFUSO

contenuto **Kg.**

CYANAMID ITALIA S.p.A. - Divisione Fitofarmaci - Roma
Sussidiaria dell'AMERICAN CYANAMID COMPANY, WAYNE, New Jersey (USA)
Officina di produzione: S.I.L.I.A. - S.p.A. - Via Tor Sapienza 172 - ROMA

Codice

Lotto

2141

Anticercosporico in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

Fentin acetato puro g 18

Bagnanti, disperdenti q.b a g 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D P R 3 agosto 1968, n 1255

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Evitare di respirarne i vapori - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi - Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p es interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva) - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione Cefalea occipitale o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale Terapia sintomatica

AVVERTENZA consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

Il **VERTOX 20** è una polvere bagnabile fungicida a base di fentin acetato avente azione contro la Cercosporiosi della barbabietola da zucchero *(Cercospora beticola)* Il suo impiego consente di ottenere dalla coltura utili incrementi produttivi oltre ad un aumento di tenore zuccherino delle barbabietole da zucchero

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Contro la Cercosporiosi della barbabietola da zucchero *(Cercospora beticola)* g 220-350 di prodotto per hl di acqua con una distribuzione di 5-6 ettolitri per ha, pari a Kg 1,2-2 di **VERTOX 20** per ha Eseguire da 2 a 3 trattamenti cominciando al primo apparire delle infezioni e continuando secondo l'andamento stagionale e l'intensità delle infezioni Disperdere la dose di **VERTOX 20** in poca acqua e mescolare sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea Versare questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto agitando ripetutamente

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il **VERTOX 20** può essere miscelato con altri insetticidi specialmente in polvere bagnabile per la lotta simultanea contro gli insetti parassiti della bietola

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificssero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il **VERTOX 20** è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Prodotto negli stabilimenti della Società ANICARICOLTURA
Unità di Carrara-Avenza (MS)

Registrazione del Ministero della Sanità n 2141 del 10 Aprile 1976

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

2

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

VENZAR®

Erbicida a base di Lenacil
Diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero e da Foraggio e per lo spinacio.
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 Lenacile puro
Ingredienti inerti quanto basta a 100.

Marchio registrato dalla E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **VENZAR** è una polvere bagnabile per il diserbo della barbabietola da zucchero e da foraggio e degli spinaci.

Il **VENZAR** agisce prevalentemente per assorbimento radicale nei confronti delle infestanti annuali nate da seme, nonché per assorbimento fogliare nelle primissime fasi di sviluppo.

Il **VENZAR** alle dosi consigliate, in relazione al tipo di terreno ed in condizioni di umidità favorevoli, controlla la maggior parte delle infestanti annuali quali Anagallis, Alopecurus, Anthemis, Atriplex, Brassica, Capsella, Chenopodium, Chrysanthemum, Fumaria, Galeopsis, Lamium, Linaria, Matricaria chamomilla, Myosotis, Poligonum convolvulus e persicaria, Poa, Papaver, Ronunculus arv., Raphanus, Senecio, Sinapis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Spergula, Stellaria, Silene, Stachys, Thlaspi, Urtica urens, Veccia.

Risultano meno sensibili o resistenti: Amaranthus, Avena fatua, Centaurea cyanus, Euphorbia, Galinsoga, Galium, Poligonum aviculare, Veronica e tutte le perennanti.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Diserbo barbabietola da zucchero e da foraggio

Pre-semina con incorporazione: preparare accuratamente il terreno, distribuire uniformemente e regolarmente il prodotto alle dosi sotto indicate, facendone seguire l'incorporazione nel terreno per una profondità di 2-3 cm. a mezzo di un erpice leggero snodato che non produca uno spostamento del terreno.

Terreni di medio impasto Kg. 0,80 per ettaro, terreni pesanti Kg. 1 per ettaro.

La semina della bietola può essere fatta subito dopo l'applicazione del prodotto o qualche giorno dopo.

Pre-emergenza: preparare accuratamente il terreno, provvedere alla semina della bietola e subito dopo, oppure nei giorni immediatamente successivi, comunque prima della germinazione del seme, effettuare il diserbo alle seguenti dosi:

Terreni di medio impasto Kg. 0,6 per ettaro, terreni pesanti Kg. 0,7 per ettaro.

L'efficacia più costante si ottiene con il diserbo in pre-semina con incorporazione.

Diserbo spinacio

Pre-semina con incorporazione: Terreni medio impasto Kg. 0,75 per ettaro, terreni pesanti Kg. 1 per ettaro.

Pre-emergenza

Terreni medio impasto Kg. 1 per ettaro, terreni pesanti Kg. 1,5 per ettaro.

Eseguire il diserbo subito dopo la semina oppure nei giorni immediatamente successivi e comunque prima che il seme inizi a germinare.

PRECAUZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento può essere effettuato su tutta la superficie oppure localizzato sulle file di semina.

I trattamenti localizzati possono essere fatti solo se in possesso di una attrezzatura irrorante adatta, curando il calcolo delle dosi, che devono essere rapportate alla superficie realmente trattata, tenendo conto della larghezza della striscia e della distanza tra le file.

La quantità d'acqua da usarsi per ottenere una buona uniformità di applicazione è di 500-1.000 litri per ettaro.

Per ottenere i migliori risultati, è bene osservare che:
— nei trattamenti di pre-semina e pre-emergenza il terreno sia ben preparato, amminutato e libero da zollosità e da residui vegetali;
— che il terreno si trovi ad un giusto grado di umidità: una pioggia che cada entro 8-10 giorni dal trattamento, in quantità sufficiente ad approfondire il prodotto negli strati sottosuperficiali del terreno, ne favorisce l'azione.

In caso contrario è consigliabile intervenire con una irrigazione a pioggia;

Nel corso dell'esecuzione del trattamento occorre mantenere la poltiglia costantemente agitata: utilizzare quindi attrezzature munite di agitatore meccanico.

Assicurarsi del perfetto funzionamento degli ugelli.

Mantenere costante la velocità di avanzamento nel campo ed evitare gli sgocciolamenti.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Disperdere la dose occorrente di **VENZAR** in poca acqua, agitando vigorosamente fino a formare una poltiglia semiliquida senza grumi. Versare la poltiglia nel volume totale di acqua, tenendo costantemente in funzione l'agitatore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Non eseguire il diserbo in terreni sabbiosi o sciolti ed in quelli ricchi di scheletro dove il prodotto potrebbe provocare dei fenomeni secondari nei confronti della coltura.

Al momento del trattamento è necessario mettere le bietole nelle migliori condizioni di sviluppo, evitando assolutamente infezioni fungine e infestazioni da parassiti animali, in quanto, le stesse provocano rallentamenti di sviluppo o indebolimenti delle piantine che risultano più suscettibili alle manifestazioni fitotossiche. In particolari condizioni ambientali possono verificarsi lievi rallentamenti di sviluppo o clorosi delle nervature fogliari; si tratta di fenomeni passeggeri che rapidamente scompaiono nel giro di una-due settimane, senza alcun pregiudizio per la produzione.

Un terreno trattato, in caso di forzata risemina, può essere riseminato solo con barbabietole, facendo precedere la semina da una nuova lavorazione.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

AVVERTENZE

Il prodotto può causare irritazioni alle mucose ed agli occhi; in tal caso lavarsi abbondantemente con acqua pura.

Il **VENZAR** non è volatile, non è corrosivo, non è infiammabile.

Nei terreni fortemente organici ed in quelli torbosi si può avere un esito soltanto parziale anche adottando le dosi più elevate di impiego.

Lavare accuratamente il macchinario usato per la distribuzione del diserbante. Non immagazzinare il prodotto a contatto con insetticidi, fungicidi e sementi.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette o animali domestici e bestiame.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2149 Ministero della Sanità del 10-4-1976

2151

Nuvacron® 20

Insetticida agricolo per frutticoltura, viticoltura, agrumicoltura, ortocoltura, floricoltura, colture industriali, piante legnose e forestali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
14 g monocrotophos puro
q.b. a 100 g coformulanti

contiene cicloesanone

ATTENZIONE!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I•

VELENO

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2151 del 26-3-76
® marchio registrato

Natura del rischio — Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali — Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirare i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego, usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico — *Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.* **Sintomi di intossicazione:** *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici — *In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.*
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni — *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

Caratteristiche
Insetticida fosfo-organico sistemico con un largo spettro di attività che comprende sia insetti succhiatori (psilla in particolare), sia altri insetti quali tentredini, tortricidi (carpocapsa compresa) minatori, nottuidi.
Il prodotto è altresì attivo contro gli acari comprese le razze resistenti ai fosfo-organici.

Dosi d'impiego
130 g/hl contro le psille.
200 g/hl nella generalità dei casi contro afidi, insetti minatori (Cemiostoma), cicaline della vite, tignola degli agrumi, tortricidi (tignole della vite, verme delle mele, Capua, Eulia, Cacoecia), nottuidi, cossidi (Zeuzera, Cossus).
200-260 g/hl secondo il grado di infestazione, contro gli acari.
1,7-2,2 kg/ha contro gli insetti della barbabietola (afidi, cleono, altica, lixus, tignola).

Da non impiegarsi con mezzi aerei.

Compatibilità — Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a carattere spiccatamente alcalino. « Avvertenza »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità — In particolari condizioni il NUVACRON 20 può essere fitotossico su alcune varietà di melo Golden e Stark Delicious e su alcune varietà di ciliegio quali le Marasche.

Rischi di nocività — Il NUVACRON 20, è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 75 giorni prima del raccolto per gli agrumi, 30 giorni per le altre colture.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, per non meno di 30 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

HERBIDAL E 30

Erbicida selettivo a base di MCPA per la distruzione delle erbe infestanti del riso e del grano

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 30 acido MCPA puro sottoforma di sale potassico (purezza minima MCPA tecnico 85%) equivalente a gr. 35,8 di sale potassico).
Coformulanti quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 216 Ministero Sanità del 13.4.1976 . . . . .

Natura del rischio:
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- **Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

— **Sintomi d'intossicazione:**
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - fibrillazione ventricolare - convulsioni - coma.

— **Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:**
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

— **Controindicazioni:**
E' sconsigliata la digitale.

DOSI E MODO D'IMPIEGO

In risaia: Nelle risaie da traplanto trattare circa 25 giorni dopo il trapianto.

In ogni caso non effettuare trattamenti nel periodo che intercorre tra la fase che precede immediatamente la formazione della botticella e la maturazione delle cariossidi.

Dosi: Da kg. 1 a kg. 2,5 per ettaro. Le dosi più basse si impiegano quando tra le infestanti da distruggere prevale lo Scirpus mucronatus. Le dosi più alte quando prevale lo Scirpus Maritimus. Tuttavia, quando l'infestazione di Scirpus maritimus è preoccupante, si consiglia l'impiego del diserbante Herbidal Riso MP.
Nelle risaie da trapianto impiegare **Herbidal E 30.**

Modo d'impiego: Durante il trattamento, portare il livello dell'acqua a meno di 5 cm. onde mettere allo scoperto il più possibile le malerbe. Ridare acqua 24 ore dopo l'operazione e mantenerla a livello elevato, per favorire la decomposizione delle infestanti trattate.

Il trattamento può essere effettuato con un quantitativo di acqua variabile da 200 a 600 litri per ettaro, a seconda del tipo di irroratrice impiegata.

Nel grano: Praticare il trattamento diserbante nel periodo compreso tra la fase di accestimento e l'inizio della formazione della botticella, non oltre, impiegando kg. 1,8-4 per ettaro. Le dosi alte si impiegano quando le erbe infestanti sono molto sviluppate e numerose e la temperatura è bassa. Il volume di acqua da distribuire con apparecchi a getto nebulizzato può essere in media di 200 litri per ettaro, può scendere fino ad un minimo di 50 litri se si dispone di apparecchi di distribuzione ad atomizzazione e raggiungere anche 800 litri/ha con apparecchi ad erogazione abbondante.

Contro il Romice dei prati: effettuare un trattamento con una soluzione all'1,5-2% localizzando su ogni pianta di romice da 30 a 60 cc. di soluzione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con altri erbicidi secondo suggerimenti dei tecnici di zona e, comunque, dopo averne saggiato il comportamento.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».
Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi e con le modalità d'impiego consigliate il prodotto non è fitotossico.

Evitare che il vento trasporti la soluzione nebulizzata su colture sensibili (vite, fruttiferi, leguminose, bietole). Irrorare in giornate senza vento e con temperatura non troppo elevata (meno di 25° in pieno campo). In caso di giornate calde effettuare il trattamento verso la fine della giornata. Risciacquare accuratamente i recipienti dopo l'uso evitando di gettare i residui di soluzione nell'acqua d'irrigazione.

NOCIVITA'

Se impiegato secondo le istruzioni e con le precauzioni consigliate, il prodotto non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

2179

TOXER TOTAL

DISERBANTE – DISSECCANTE

COMPOSIZIONE

— Paraquat (1,1-Dimetil-4,4-dipiridilio) puro . (sotto forma di dicloruro)	gr. 17,86
— Tensioattivi	q. b. a gr. 100

— CONTIENE UNA SOSTANZA EMETICA ED UNA REPELLENTE

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto cutaneo.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Il formulato contiene una sostanza emetica di sintesi.

Attenzione: I sintomi dell'intossicazione qualunque sia la via di introduzione nell'organismo possono non comparire subito ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).

L'introduzione nell'organismo **anche di poche gocce** del prodotto può essere fatale: **non attendere la comparsa dei sintomi** per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perchè sia praticata l'emodialisi.

Nel frattempo nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.

Intossicazione per ingestione e per inalazione: i primi sintomi sono epistassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola.

Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epatorenali.

L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave sino alla morte per insufficienza respiratoria.

L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di Paraquat nel sangue.

Intossicazione per contatto: Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore). Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole. Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta.
Terapia sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico. In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del Paraquat e sulla terapia possono essere richieste direttamente alla Società produttrice di questo presidio sanitario.

Avvertenza: Sentire un Centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il TOXER TOTAL è un diserbante-disseccante liquido con azione rapida, agisce per contatto, indicato per le colture arboree per combattere le infestanti delle varie epoche: pre-emergenza, pre-semina, pre-trapianto. Contro le infestanti delle colture ortive, floreali ed industriali e luoghi incolti.

Il TOXER TOTAL agisce sulle parti epigee delle piante colpite dal trattamento con disseccamento delle stesse senza intaccare le parti legnose.

Il TOXER TOTAL non ha alcuna residua azione nel trattamento essendo assorbito rapidamente dalle infestanti, sfugge all'azione dilavante della pioggia ed è soprattutto indicato contro le graminacee infestanti.

Diserbo delle colture arboree: nel vigneto, frutteto, agrumeto, oliveto e colture arboree in genere, a seconda dello sviluppo delle erbe infestanti si impiegano Kg. 2-4 di TOXER TOTAL per ettaro.

Diserbo controllato delle colture arboree: Il TOXER TOTAL si impiega alla dose di Kg. 2-4 per ettaro iniziando i trattamenti in primavera e ripetendoli due-tre o più volte all'anno a seconda della necessità.

Diserbo interfilare delle colture ortive: Alla dose di Kg. 3-4 per ettaro.

Contro i Giavoni in risaia: Il trattamento va effettuato nel momento in cui dopo la distribuzione dell'acqua nelle camere, la maggior parte delle piante di Giavone è germinata ed inizia la fase dello sviluppo. La semina del riso può essere effettuata dopo circa 2-4 giorni senza preventivo lavaggio delle camere: la dose di impiego da 5 a 10 Kg. per ettaro.

Miglioramento dei pascoli: Usato alla dose di Kg. 8-15 per ettaro.

Diserbo dei canali e dei fossi: Il TOXER TOTAL si impiega da 5 a 10 Kg. per ettaro.

Diserbo dei luoghi incolti: Impiegato alla dose di Kg. 3-5 per ettaro a seconda dello sviluppo delle infestanti.

Diserbo dei medicai: Contro Cuscuta concentrando il trattamento contro la macchia cuscutata ed almeno oltre un metro dal suo perimetro esterno, ma vi è il divieto di impiego diretto sui foraggi.

"DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI".

Compatibilità: Il TOXER TOTAL è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Usare il prodotto in giornate senza vento in quanto può provocare danni alle colture adiacenti, evitando che il liquido diserbante venga a contatto delle foglie delle piante coltivate, in quanto provocherebbe il disseccamento di tali foglie. **E' VIETATO L'IMPIEGO DIRETTO SUI FORAGGI.**

Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.

L'intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta è di 30 (trenta) giorni.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. 2179 del 23-3-1976 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

2182

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

GRAMITOX

Diserbante per la lotta alle graminacee infestanti
Polvere solubile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 85 di Dalapon puro (purezza minima del prodotto tecnico 85%) pari a gr. 100 di sale sodico dell'acido 2,2 dicloropropionico.
Caolino quanto basta a 100.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

CARATTERISTICHE

Il Gramitox è specifico per la lotta alle infestanti graminacee, sia annuali che perennanti.

Il Gramitox esplica la sua efficacia attraverso le foglie delle infestanti con un'azione sistemica e non di contatto.

Una volta infatti entrato in circolo nelle piante, determina l'arresto dello sviluppo delle stesse che subiscono un progressivo e graduale ingiallimento delle foglie prima, e dello stelo poi.

L'erbicida colpisce anche l'apparato radicale, rizomi e stoloni che, oltre a cessare di svilupparsi, diventano necrotici e marciscono nel giro di 2-3 settimane.

MODALITA' E EPOCHE D'IMPIEGO

Il diserbo deve essere effettuato in giornate soleggiate e quando le infestanti si trovano nel pieno della ripresa vegetativa (primavera-autunno) dopo le prime piogge.

Indispensabile per ottenere la migliore efficacia del trattamento è l'aggiunta in tutte le applicazioni del Bagnante Adesivo Liquido 2.

Nell'eseguire il diserbo di colture di piante legnose (frutteti di pero e di melo, agrumeti), si consiglia di bagnare le infestanti evitando lo sgocciolamento della soluzione diserbante sul terreno.

Evitare inoltre di bagnare le foglie delle piante in coltura.

La quantità di acqua pertanto non deve superare i 7-10 q.li/ha.

DOSI D'IMPIEGO

Il Gramitox è un erbicida per il controllo delle graminacee, ma esplica la sua azione anche verso altre infestanti. In particolare esso agisce contro Cynodon Dactylon (Gramigna), Agropyrum repens (Gramigna), Poa pratensis (Gramigna dei prati), Echinochloa crusgalli (Giavone), Digitaria Sanguinalis (Sanguinella), Lolium perenne (Loglierella), Lolium Italicum (Loglio Italico), Avena Fatua (Avena selvatica) Setaria glauca (Pesarone), Setaria viridis (Falso Panico).

Le dosi d'impiego del GRAMITOX variano a seconda delle applicazioni, e precisamente:

Per il diserbo di piante da frutto: (frutteti di pero e melo, vigneti, oliveti, agrumeti). La dose d'impiego è di kg. 5-8 sciolti in 7-8 q.li d'acqua per ettaro.

Le colture non devono avere meno di 5 anni di vita e bisogna evitare di colpire le parti verdi di esse. Se ne sconsiglia l'uso in terreni sabbiosi.

Per il diserbo di medicai e trifogliai: il diserbante s'impiega dosi di kg. 4-5 per ettaro a partire dal secondo anno, prima della ripresa vegetativa o subito dopo gli sfalci estivi, con la stessa quantità di acqua su raccomandata.

N.B.: In presenza di forti infestazioni, piuttosto che ricorrere all'impiego delle dosi alte, è consigliabile effettuare due trattamenti distanziati di 15-20 giorni a dosi dimezzate.

Per il diserbo colza: Contro Panico, Setaria, Coda di topo, usare il Gramitox alla dose di kg. 2-2,5/ha in almeno 300 lt. d'acqua da quando la Colza ha un minimo di 2-3 foglie e fino al momento della levata.

Per la preparazione dei terreni: Nella lotta contro le graminacee che infestano i terreni destinati alla semina di colture erbacee o all'impianto di frutteti usare il Gramitox alla dose di kg. 10-15/ha in 600-800 lt. di acqua.

N.B.: E' indispensabile lavorare il terreno 1 mese dopo il trattamento. La semina e l'impianto dovranno essere effettuati dopo almeno 3 mesi dal trattamento.

Per il diserbo nel settore Urbano-Industriale: (bordi stradali, aie, campi sportivi, aeroporti, sedi ferroviarie, piazzali e viali di Stabilimenti industriali) la dose può variare da kg. 20-30/ha a seconda della natura delle infestanti e del grado di infestazione.

Per il diserbo canali, Bacini idrici. Con un solo trattamento in genere si eliminano le infestanti monocotiledoni (Canna, Tifa, Giunco) per più di un anno. In qualche caso sarà opportuno effettuare sui ricacci un secondo trattamento localizzato.

Le dosi di impiego del prodotto, varianti con il tipo di infestazione, oscillano fra i kg. 25 e 35/ha in 2.000-3.000 lt. di acqua.

Le dosi massime devono essere usate su malerbe di altezza superiore al m. 2, su vegetazione molto fitta e rigogliosa o contro Fragmites e Tifa.

Per la lotta contemporanea contro infestanti dicotiledoni si può effettuare il trattamento miscelando il Gramitox con Herbidal Riso MP oppure Heribdal L.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con altri erbicidi secondo suggerimenti dei tecnici di zona e, comunque, dopo averne saggiato il comportamento.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il **Gramitox** non è volatile e, dato secondo le avvertenze riportate, non presenta pericolo per le colture vicine.

Al fine di non colpire le parti verdi delle piante utili, effettuare il trattamento in giornate senza vento.

Evitare il più possibile lo sgocciolamento della soluzione erbicida sul terreno.

Nel diserbo di piante da frutto cercare di limitarsi ad effettuare il trattamento sulle chiazze di infestanti graminacee da distruggere.

NOCIVITA'

Il prodotto è innocuo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

AVVERTENZE

Cercare di effettuare il trattamento in giornate soleggiate.
Lavare accuratamente con acqua e soda le pompe ed i recipienti usati per il diserbo prima di destinarli ad altri impieghi.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n2182 Ministero Sanità del . 1.3.4.1976 . . . . .

2220

CLASSE I

FLAVINA SANDOZ

VELENO

Olio minerale attivato per il trattamento invernale a meli, peri e ciliegi.

Per applicazioni su altre essenze richiedere il parere dei tecnici della zona

Composizione

gr. 85 di olio minerale attivato con residuo insolfonabile del 70% - gr. 2,65 di DNOC (dinitro-ortocresolo) tecnico al 95% di purezza minima, equivalenti a gr. 2,5 di DNOC (dinitro-ortocresolo) puro - emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici
— conservare la confezione ben chiusa
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
— evitare di respirarne i vapori
— non operare contro vento
— evitare il contatto con la pelle e gli occhi
— durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
— rendere inutilizzabili dopo l'uso le confezioni che contenevano il prodotto interrandole in fosse profonde almeno un metro lontane da ruscelli e sorgenti
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni per il medico

— **Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale e per assorbimento attraverso la pelle.**
— **Sintomi di intossicazione**
Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psicomotoria - tachicardia - dispnea - notevole ipertermia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. *Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale*

— **Controindicazioni**
Atropina

Parassiti combattuti

Cocciniglie, uova di Afidi, larve e crisalidi

Dosi di impiego in litri 100 di acqua

3-4% di FLAVINA SANDOZ (kg 3-4 di FLAVINA SANDOZ per litri 100 di acqua)
La dose più elevata va usata solo in caso di forti infestazioni

Modalità di impiego

Il trattamento deve essere eseguito durante il periodo di riposo vegetativo (passati i forti freddi invernali) e deve essere ultimato entro il rigonfiamento delle gemme
Meglio operare su piante asciutte

Preparazione dell'emulsione

Pesare la quantità di FLAVINA SANDOZ occorrente e versarla agitando in un volume di acqua circa tre volte maggiore rispetto a quello della FLAVINA SANDOZ e diluire sino al volume desiderato oppure versare la quantità di FLAVINA SANDOZ occorrente sotto buona agitazione direttamente in tutta l'acqua del serbatoio della pompa irroratrice
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Date le caratteristiche del prodotto ed il suo momento di impiego non è frequente l'esigenza di poltiglie miste; nel caso si volessero miscelare prodotti cuprici (ossicloruri di rame, ossiduli di rame) stemperare a parte in poca acqua il prodotto cuprico prescelto ed aggiungere questa poltiglia concentrata all'emulsione di FLAVINA SANDOZ prima di portare quest'ultima a volume, sempre agitando

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità

Sulle colture indicate la FLAVINA SANDOZ non è fitotossica
Durante il trattamento delle piante fare attenzione di non bagnare sottocolture delicate (fragole, ortaggi)

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SAÑDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE
Registrazione n. 2220 del 6.4.76 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto kg. *

2242

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZA
FOLPET 5 P SOLPLANT può essere irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi. In soggetti particolarmente sensibili, si possono verificare manifestazioni anche vistose, ma transitorie e non preoccupanti dato che presenta un rischio trascurabile per l'uomo.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione. Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni

RISCHI DI NOCIVITA
Il prodotto è tossico per gli insetti utili e per i pesci.
Su uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti. Su uve da tavola e sulle altre colture sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

FOLPET 5 P SOLPLANT

Fungicida polverulento a base di FOLPET

COMPOSIZIONE

Folpet puro	g 5
Adesivanti, disperdenti, inerti	q.b. a g 100

CLASSE IV

CAMPI DI IMPIEGO
Viticoltura: contro **Peronospora** e **Muffa grigia** (Botrytis). Contro la Muffa grigia si devono effettuare da 3 a 4 trattamenti, alle seguenti epoche:
— alla fine della fioritura;
— subito prima della chiusura dei grappoli;
— a intervalli di 15 giorni.

Nota bene: Poichè la Botrytis si insedia su ferite causate da avversità atmosferiche o provocate da parassiti è indispensabile prevenire od eliminare ogni lesione, affinchè il FOLPET 5 P SOLPLANT possa soddisfare appieno.

Colture ortive (spinacio, lattuga, sedano, cucurbitacee, melanzana, pomodoro, fagiolo, carota, cipolla, patata) **e floreali** (in pieno campo e in serra): contro **Peronospora, Antracnosi, Cercospora, Alternariosi, Septoriosi, Ticchiolatura, Ruggini.** Contro l'**Oidio** delle rose.

DOSI DI IMPIEGO
Le dosi variano da 5 a 20-30 kg/ha.
Il quantitativo da distribuire è in rapporto con lo stadio di sviluppo della coltura da proteggere: si useranno pertanto le dosi più basse su colture in inizio vegetazione e le dosi più elevate su piante molto sviluppate.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA
Può essere miscelato con insetticidi e con prodotti a base di zolfo, per la lotta contemporanea contro gli insetti e contro l'oidio.
La miscela va fatta con prodotti in polvere.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurazza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
Laboratori Chimici "CIFA" - Caravaggio (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2242 del 28-5-1976

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

2253

Usi
Per la eliminazione di erbe a foglia espansa e graminacee, con trattamenti di pre-emergenza e post-emergenza.

Modalità e dosi d'impiego
Il prodotto viene diluito nell'acqua mediante agitazione. Nel caso di acque particolarmente dure è consigliabile l'aggiunta di un addolcificatore ed evitare la formazione del deposito terroso che potrebbe otturare ugelli e filtri.

Il **trattamento pre-emergenza** deve essere fatto dopo la semina, prima della emergenza delle piantine dal terreno.
I terreni piuttosto umidi e bene assestati favoriscono i migliori risultati. Nel caso di trattamenti fatti nel corso di prolungati periodi di siccità ed a temperature piuttosto basse una irrigazione a pioggia è consigliabile per favorire l'efficacia del trattamento stesso.

Il **trattamento post-emergenza** deve essere fatto dopo che le piantine sono emerse dal terreno, quando le erbe infestanti sono ancora allo stato di germinazione, cercando di fare le applicazioni in giornate calde ed assolate, quando il fogliame della coltura principale è perfettamente asciutto.
Usare macchine irroratrici a bassa pressione (2-3 atmosfere).
I risultati migliori, con minor consumo di prodotto, si ottengono quando il trattamento viene effettuato a temperature da 20 a 30°; evitare comunque di fare le applicazioni con temperature superiori ai 30° o che li possano raggiungere 24 ore dopo l'applicazione stessa.
Le dosi più alte dovranno naturalmente, essere adoperate nei casi di trattamenti a temperature inferiori ai 20° o per combattere graminacee annuali.
Il prodotto può causare delle bruciature alle foglie della coltura principale, ma l'inconveniente è solo temporaneo.
A risparmio di prodotto e di mano d'opera è possibile effettuare il trattamento localizzato anzichè su tutto l'appezzamento l'irrorazione viene effettuata solamente su una striscia di 30-40 cm. sulla fila su cui si è seminato.
FAGIUOLI — Pre-emergenza: lt. 23-28 (Kg. 26-31) per ha. in 250-300 litri di acqua al momento della semina o immediatamente dopo questa. E' consigliabile non usare il PG 53 su terreni molto sabbiosi e poveri di materia organica.
Emergenza: lt. 9,3-14 (Kg. 10,5-16) per ha in almeno 250-300 lt di acqua. E' preferibile effettuare il trattamento nell'imminenza della emergenza o durante l'emergenza, quando le piantine sono allo stadio di « uncino ».
PATATE — Pre-emergenza: lt. 9,3-18,6 (Kg 10,5-21) per ha. in 250-350 lt di acqua. L'applicazione deve essere fatta prima della emergenza delle patate. Si può comunque dilazionare a 10-14 giorni dopo la semina quando le erbe infestanti sono germinate, prima però della emergenza delle patate.
Le infestanti devono essere giovani ed avere almeno due foglie.
In giornate molto calde e assolate si può ottenere la eliminazione di erbe infestanti a foglia espansa con una dose di lt. 4,7 (Kg. 5,3) di PG 53.
GRANOTURCO — Pre-emergenza: lt. 23-28 (Kg. 26-31) per ha. in 300 lt. di acqua, al momento della semina o immediatamente dopo questa.
Post-emergenza: lt. 9,3-14 (Kg. 10,5-16) per ha. in 300 lt. di acqua. Effettuare le applicazioni quando il granoturco non è oltre lo stadio di 2 foglie.
PISELLI — Pre-emergenza: lt. 18,6-28 (Kg. 21-31) per ha. in almeno 350 lt. di acqua, al momento della semina o immediatamente dopo questa.
Post-emergenza: lt. 4,7-7 (Kg. 5,3-8) per ha. in almeno 350 lt. di acqua.
I piselli devono avere raggiunto un'altezza di 10-20 cm.
GRANO, AVENA, ORZO seminati da soli o infraseminati con una leguminosa: Post-emergenza: lt. 3,5-4,7 (Kg. 4-5,3) per ha. in 300-350 lt. di acqua, quando la coltura principale è alta 8-15 cm.
ERBA MEDICA, MELILOTO, TRIFOGLIO PRATENSE, GINESTRINA — Post-emergenza: lt. 3,5-4,7 (Kg. 4-5,3) per ha. in almeno 350 lt. di acqua quando la leguminosa ha due o più vere foglie.
NARCISI, TULIPANI e PIANTE BULBOSE SIMILARI, seminate in autunno — Pre-emergenza: lt. 9,3-18,6 (Kg. 10,5-21) per ha. in almeno 350 lt. di acqua. L'applicazione deve essere fatta in autunno avanzato, dopo la nascita delle infestanti.
GLADIOLI — Pre-emergenza: lt. 23-32,7 (Kg. 26-37) per ha. in almeno 350 lt. di acqua. E' preferibile effettuare l'applicazione immediatamente dopo la emergenza.
ERBA MEDICA, FRAGOLE — lt. 4,7-9,4 (Kg. 5,3-10,5) per ha. in almeno 350 lt. di acqua. Applicazioni di tardo autunno e principio inverno.
Il trattamento deve essere effettuato quando la temperatura è fra i 10 ed i 18° quando le piantine utili sono in attivo accrescimento.
Per ottenere una completa eliminazione delle erbe infestanti molto resistenti, può rendersi necessario un secondo trattamento.
Sulle fragole, particolarmente nell'Italia Settentrionale, i trattamenti all'inizio della primavera o subito dopo il raccolto sono molto utili. Dosi da usare lt. 9,4-14 (Kg. 10,6-16) per ha.

Da non applicarsi con mezzi aerei.

E' preferibile l'impiego del PG 53 senza l'aggiunta di altri prodotti.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

ERBICIDA

Composizione

100 gr. di prodotto contengono

31 gr. di DINOSEB puro ottenuto con 53 parti di sali alcanolaminici della serie etanolica e isopropanolica
q.b. a 100 gr. di diluenti

I CLASSE

VELENO

Officina di produzione e Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro 1

Registrazione n. 2253 del 10-6-1976 Minist. Sanità

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione per ingestione con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave. In luogo i
bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione b
fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non cc
colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respi
Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gl
la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed
tivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione l
mente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso
pia idonei (per esempio interrando in fosse profonde piu e
spargendo di calce viva) le confezioni che contenevano il p
di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etiche

Informazioni per il medico

Intossicazione per inalazione, ingestione accidenta bimento attraverso la pelle.

Sintomi di intossicazione

Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazio - tachicardia - dispnea - notevole ipertermia - c delle sclere - la morte consegue ad edema cer respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bia all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici paziente è cosciente. Non procedere a lavanda spettano lesioni all'esofago, molto frequenti nel *Combattere l'ipertermia con bagni freddi o este cazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d' sfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di sol isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. racile per ridurre il metabolismo basale. Os*

2263

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

PREMERGE

Diserbante a base di Dinoseb

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 51 Dinoseb puro (purezza 95%) pari a gr. 53,68 di prodotto tecnico.
Ingrediente inerte quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. n. 2263 **Ministero della Sanità del** . 9.7.76 . . .

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Intossicazione per inalazione, per ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.**

— **Sintomi d'intossicazione:**

Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psico motoria - tachicardia - dispnea - notevole ipertermia - colorazione gialla delle sclere - la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

— **Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:**

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% od iposolfito di sodio al 5% - emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. *Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda - trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale - ossigeno, respirazione artificiale.*

— **Controindicazioni:**

E' controindicata l'atropina.

GENERALITA'

Il **PREMERGE** è un erbicida che si può impiegare sia in pre-emergenza, sia in post-emergenza a seconda delle varie colture. Agisce per contatto sui semi delle infestanti prima e durante il germogliamento (azione anti-germinativa), e sulle piantine fino a quando hanno raggiunto un'altezza di cm. 10.

I terreni più adatti per l'impiego sono quelli di medio impasto e argillosi preventivamente livellati, sminuzzati e inumiditi; discreti risultanti si possono ottenere nei terreni sciolti purché siano stati letamati e concimati.

Nei terreni torbosi il diserbo con **PREMERGE** si effettua soltanto in post-emergenza con le dosi massime.

COLTURE CHE SI POSSONO DISERBARE CON PREMERGE

Colture	Pre-emergenza dose: lt/ha	Post-emergenza dose: lt/la	Annotazioni
Pisello	—	5-7	Il diserbo si può effettuare dalla formazione del 1° palco fogliare del pisello fino a quando le piantine hanno raggiunto un'altezza di cm 10.
Fagiolo	21-24	9-14	Il diserbo in post-emergenza deve essere effettuato quando il fagiolo ha formato le prime due foglie vere. E' opportuno effettuare il trattamento nel tardo pomeriggio, quando le foglie del fagiolo sono in « posizione di sonno » e cioè a 45° rispetto al suolo.
Arachide	15-20	7-10	Il diserbo in post-emergenza si può effettuare dall'emergenza fino a quando le piantine di arachide hanno raggiunto una altezza di cm 5.
Patata	10-14	—	Il trattamento va effettuato 2-3 giorni prima della nascita delle piantine di patate.
Fragola	—	—	Il diserbo si può effettuare: 1) dopo la raccolta del prodotto con 4-5 lt/ha; 2) nel tardo autunno o prima della ripresa vegetativa con 10-14 lt/ha.
Gladiolo	20-25	—	Il diserbo si effettua 1 o 2 giorni prima dell'emergenza della coltura.
Medica-Trifoglio Ladino e Pratense	—	3-5	Il diserbo si effettua nell'anno dell'impianto quando le plantule delle leguminose hanno almeno 2 foglie trilobate. Nei medicai di 2 o più anni il diserbo si effettua prima della ripresa vegetativa, alla dose di kg. 7-10.
Mais	22-24	10-14	Il trattamento in post-emergenza dovrà essere effettuato quando il mais non ha ancora emesso la 2ª foglia e le infestanti si trovano allo stadio di germinello. Esso, a volte, può causare al mais lievi bruciature, che non compromettono lo sviluppo della coltura.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Il **PREMERGE** deve essere diluito in 300-500 litri di acqua. Si sconsigliano quantitativi superiori, specialmente in post-emergenza, perché la soluzione risulterebbe troppo diluita.
La temperatura ottimale per l'applicazione è sui 20-25 gradi; però il prodotto è già attivo a 10 gradi.
A temperature superiori ai 15 gradi si dovrà adottare la dose minima consigliata per ogni coltura; a temperature inferiori ai 15 gradi si dovrà invece adottare la dose massima.
Si raccomanda di non diserbare con foglie bagnate e a temperature inferiori ai 10 gradi e superiori ai 30 gradi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare che la irrorazione raggiunga le colture vicine.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Avvertenza:
Tenere il prodotto lontano dal calore e dalla fiamma viva.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

2281

Lumacrusk 5 Granuli

Antilumaca in pellets

Composizione
100 gr. di prodotto contengono:
5 gr. di Metaldeide acetica pura
q. b. a 100 di supporti e coadiuvanti.

CLASSE III

ATTENZIONE:
manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione:
violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate, con noradrenalina - diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e derivati in caso di torpore.

Avvertenza:
Consultare un Centro Antiveleni.

Dosi e modalità d'impiego
Il LUMACRUSK 5 GRANULI è efficace nella lotta contro le lumache e le limacce che danneggiano le piante coltivate.
Negli orti, come pure nelle serre e nei semenzai, è sufficiente 1 gr. per mq. di superficie oppure distribuire il prodotto a piccoli mucchietti regolarmente distanziati fra loro.
In pieno campo, normalmente, bastano Kg. 6-8 di LUMACRUSK 5 GRANULI per ettaro, uniformemente distribuiti.

Da non applicare con mezzi aerei

Non è previsto abbinamento con altri prodotti.

Il prodotto è tossico per i pesci, animali domestici, bestiame e insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S. p. A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
ENOTRIA S.p.A. - S.S. 193 Km. 8° - MELILLI (SR)

Registrazione n. 2281 del 5-7-1976 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso 200 g**

2293

ARIOTOX

Granuli cilindrici antilumaca a base di metaldeide, attrattivi resistenti alla pioggia, insensibili alle muffe, di lunga durata
per la lotta contro: Lumache (Arionidi e Limacidi) e Chiocciole (Elicidi) infestanti le diverse colture

COMPOSIZIONE

gr. 5,1 di metaldeide tecnica al 98% di purezza minima, equivalenti a gr. 5 di metaldeide pura
supporti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Non operare contro vento;
— conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— *Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.*
— *Sintomi di intossicazione:*
Violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio.
— *Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:*
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina - diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e derivati in caso di torpore.

METODI DI IMPIEGO

Distribuire uniformemente da 10 a 15 granuli di ARIOTOX per metro quadrato o circa gr. 100 per 100 metri quadrati sui terreni delle colture infestate. Intensificare lo spargimento vicino alle piante particolarmente minacciate. Sulle grandi superfici distribuire i bastoncini con una pala.

EPOCA DI IMPIEGO

Eseguire il primo spargimento all'apparizione delle Lumache e delle Chiocciole in primavera; ripetere gli interventi, se necessario, 2 o 3 volte, ad intervalli di 3 settimane circa l'uno dall'altro. Se il pericolo d'invasione proviene dai campi vicini si proceda ad uno spargimento di sbarramento di circa gr. 150 di ARIOTOX per ogni 100 metri quadrati su un bordo di m. 2 lungo la coltura da proteggere.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

L'ARIOTOX non è miscibile con altri antiparassitari data la sua formulazione in granuli.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per i pesci, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 2293 del 9.7.1976 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: Kg.

2304

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

CIPONET

Diserbante selettivo della cipolla
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr 54,52 Chlorthal puro (purezza 75%) pari a gr. 72,7 di prodotto tecnico
Gr. 13,65 Chlorpropham puro (purezza 98%) pari a gr. 13,93 di prodotto tecnico
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi)

Sintomi d'intossicazione:
nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici:
lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi cccessive di atropina, specilmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

- Il **CIPONET** è un erbicida selettivo di pre-emergenza per la cipolla dotato di ampio spettro di attività.

Possiede un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti sensibili impedendone lo sviluppo. Pertanto non esplica azione sulle infestanti già nate o sui loro semi già germogliati.

Spettro d'azione

a) **Infestanti sensibili:**

monocotiledoni: Alopecurus, Digitaria sanguinalis, Poa annua, Setaria verticillata;

dicotiledoni: Amarantus retroflexus, Anagallis arvensis, Ajuga chamaepitis, Beta vulgaris, Chenopodium album, Chenopodium vulvaria, Convolvulus arvensis, Capsella, Erodium cicutarium, Fumaria officinalis, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica, Viola tricolor.

b) **medio resistenti:** Euphorbia peplus.

c) **resistenti:** infestanti perenni.

Il **CIPONET** va distribuito immediatamente dopo la semina della coltura, alle dose di Kg. 11 per ettaro, distribuiti con almeno 500 litri di acqua.

Il terreno, prima del trattamento, dev'essere ben lavorato, ripulito da erbacce, ed avere un sufficiente tenore di umidità.

Per la preparazione della miscela aggiungere alla dose occorrente di **CIPONET** poca acqua, agitando fino ad ottenere una poltiglia omogenea.

Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua per ottenere la voluta concentrazione.

Distribuire la miscela uniformemente sulla superficie da diserbare, usando normali pompe a mano o a motore.

Durante il trattamento mantenere la miscela in costante agitazione.

Effettuare il trattamento con tempo buono e senza vento.

Non impiegare il prodotto su terreni torbosi, perché viene inattivato dalla sostanza organica.

In periodi di siccità è opportuno mantenere il terreno umido per almeno una settimana dopo il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Evitare, durante l'irrorazione, che lo spruzzo giunga su altre colture vicine. Se la coltura dovesse fallire per cause ambientali, si può subito riseminare.

Quando capita di seminare cereali che seguono, sullo stesso terreno, colture trattate con **CIPONET** nel periodo estivo, è prudente effettuare prima una buona aratura, e lasciare poi il terreno a riposo per qualche tempo (15-20 giorni).

Lavare perfettamente dopo l'uso la pompa ed i recipienti usati per l'irrorazione.

NOCIVITA'

Il **CIPONET** è velenoso per il bestiame, i pesci, gli animali domestici e gli insetti utili. Non contaminare acque pescose o destinate all'abbeveramento del bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 2304 **Ministero della Sanità del** 1[illegible].[illegible].1976

Contenuto netto Kg.

2306

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

FITODEL 90

Anticrittogamico organico per la lotta contro la Ticchiolatura del melo, del pero, del nespolo e contro malattie fungine del ciliegio, della cipolla, della fragola, della rosa e del garofano.

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 90 di Dodina pura (purezza minima 98%) pari a gr. 91,84 minimo di prodotto tecnico.
Sostanze inerti e coadiuvanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei resistenti alle terapie a causa della fitosensibilizzazione. Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il FITODEL 90 è un anticrittogamico organico dotato di efficacia contro la Ticchiolatura del melo e del pero.
Possiede non soltanto un'azione preventiva, ma anche un'azione curativa della malattia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

In frutticoltura

Contro la Ticchiolatura del melo, pero e nespolo:
- trattamenti preventivi: gr. 50-60 per hl. di acqua;
- trattamenti curativi (entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante): gr. 90 per hl. di acqua;
- trattamenti eradicanti (con macchie di Ticchiolatura già presenti): gr. 110 per hl. di acqua.

Contro la Cilindrosporiosi e l'Antracnosi del ciliegio, trattamenti preventivi a gr. 50 per hl. di acqua.

In orticoltura

Contro la Peronospora della cipolla:
- trattamenti preventivi: gr. 60 per hl. di acqua;
- trattamenti eradicanti: gr. 110 per hl. di acqua.

Contro la Botrytis della fragola, trattamenti preventivi a gr. 70-80 per ettolitro di acqua.

In floricoltura

Contro la Ticchiolatura della rosa:
- trattamenti preventivi: gr. 50-60 per hl. di acqua;
- trattamenti curativi: gr. 70-90 per hl. di acqua.

Contro la Fusariosi del garofano:
- trattamenti preventivi: gr. 60-80 per hl. di acqua.
- trattamenti curativi gr. 110 per hl. di acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Aggiungere alla dose occorrente di FITODEL 90 poca acqua, agitando la miscela, fino ad ottenere una poltiglia omogenea.
Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il FITODEL 90 è miscelabile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piú lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piú tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il FITODEL 90, può causare, in certe condizioni, qualche rugginosità su mele Golden Delicious.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 2306 Ministero della Sanità del 18.8.1976

Peso netto kg.

2309

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

SUMIFOS

Insetticida fosfo-organico

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Fenitrothion puro (purezza 95-97%) pari a gr. 52,63-51,55 di prodotto tecnico.
Emulsionanti e bagnanti quanto basta a 100

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Ravit

Reg. n. 2309 Ministero Sanità del 18.8.76 . . . . . .

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed il caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersioni con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

CARATTERISTICHE

Il Sumifos è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione.

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

In frutticoltura: contro Psille resistenti, Afidi, Carpocapsa, Rhagoletis e Zeuzera a gr. 120-160 per ettolitro; contro le minatrici delle foglie a gr. 200 per ettolitro.
In orticoltura: contro Afidi e Tripidi a gr. 120-160 per ettolitro.
In olivicoltura: contro il Dacus Oleae a gr. 150 per ettolitro.
In viticoltura: contro Tignola, Sigaraio a gr. 120-160 per ettolitro.
In floricoltura: contro Afidi e Mosche delle colture floricole e ornamentali a gr. 100-120 per ettolitro.
In bieticoltura: contro coleotteri parassiti (Cleono) alla dose di Kg. 2-2,5 per ettaro.
In risaia: contro Coppette e Chironomi alla dose di Kg. 1 per ettaro.

MODALITA' D'USO

IL SUMIFOS può essere versato direttamente nel quantitativo di acqua necessaria, avendo cura di agitare bene durante la preparazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SUMIFOS è miscibile con tutti gli anticrittogamici e insetticidi della nostra gamma di produzione; non è compatibile con la Poltiglia Bordolese e solfocalcica; calce e arseniato di calce e zinco.

« Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».
Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego consigliate, il prodotto non è fitotossico per le colture.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2312

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

TRIPARDOL

Insetticida fosfo-organico
Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
G. 20 Carbophenothion tecnico (purezza 98%) pari a gr. 19,60 di prodotto puro.
Sostanze solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 2312 Ministero della Sanità del 18.8.1976

Natura del rischio
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:
scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni
Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

CARATTERISTICHE

Il Tripardol è un estero fosforico a lunga persistenza di azione, per combattere principalmente gli Afidi; possiede inoltre una collaterale azione acaricida; buona la sua azione di choc contro gli adulti dei lepidotteri minatori e contro le larve del Cemiostoma.

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

IN FRUTTICOLTURA: Contro l'Afide verde delle pomacee (Aphis pomi) e gli altri Afidi, Carpocapsa, adulti dei lepidotteri minatori, larve del Cemiostoma: gr. 120-150 per ettolitro.

IN ORTICOLTURA E FLORICOLTURA: Contro gli Afidi (pidocchi) gr. 130-150.

IN BIETICOLTURA: Contro Altiche kg. 2-2,5 per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il Tripardiol va preferibilmente irrorato da solo; può tuttavia miscelarsi con antiparassitari della nostra gamma, sempre che non abbiano reazione alcalina.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».
Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non se ne consiglia l'uso con attrezzature idonee per trattamenti a basso volume.
Il Tripardol va impiegato quando la pianta ha raggiunto il massimo sviluppo fogliare e non su vegetazione tenera. Nel caso si debba ripetere il trattamento con Tripardol, l'intervallo tra i due trattamenti deve essere di almeno 10 giorni.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

2345

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

RISAL E-30

Erbicida selettivo a base di MCPA per la distruzione delle erbe infestanti del riso e del grano

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 30 acido MCPA puro (da sale Potassico)
Conformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per la dermatosi.

Controindicazioni:
E' sconsigliata la digitale.

DOSI E MODO D'IMPIEGO

In risaia: epoca: si consiglia di effettuare il trattamento nel periodo in cui dovrebbe essere praticata la monda a mano. Nelle risaie da trapianto trattare circa 25 giorni dopo il trapianto. In ogni caso non effettuare trattamenti nel periodo che intercorre tra la fase che precede immediatamente la formazione della botticella e la maturazione delle cariossidi.

Dosi: Da kg. 1 a kg. 2,5 per ettaro. Le dosi più basse si impiegano quando tra le infestanti da distruggere prevalgono Scirpus mucronatus e Alisma. Le dosi più alte quando prevalgono Scirpus Maritimus, Tyfa o Cyperus. Tuttavia, quando l'infestazione di Scirpus Maritimus è preoccupante, si consiglia l'impiego del diserbante Scirpex MP alla dose di kg. 2-2,3 per ettaro. Nelle risaie da trapianto impiegare kg. 1 per ettaro.

Modo d'impiego: Durante il trattamento, portare il livello dell'acqua a meno di 5 cm. onde mettere allo scoperto il più possibile le malerbe. Ridare acqua 24 ore dopo l'operazione e mantenerla a livello elevato, per favorire la decomposizione delle infestanti trattate.

IL trattamento diserbante può essere effettuato con un quantitativo di acqua variabile da 200 a 600 litri per ettaro, a seconda del tipo di irroratrice impiegato.

Nel grano: Praticare il trattamento diserbante nel periodo compreso tra la fase di accestimento e l'inizio della formazione della botticella, non oltre, impiegando kg. 1,8-4 di prodotto per ettaro. Le dosi alte si impiegano quando le erbe infestanti sono molto sviluppate e numerose e la temperatura è bassa. Il volume di acqua da distribuire con apparecchi a getto nebulizzato può essere in media di 200 litri per ettaro, può scendere fino ad un minimo di 50 litri se si dispone di apparecchi di distribuzione ad atomizzazione e raggiungere anche 800 litri/ha con apparecchi ad erogazione abbondante.

Contro il Romice dei prati: effettuare un trattamento con una soluzione all'1,5-2% localizzando su ogni pianta di romice da 30 a 60 cc. di soluzione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con altri erbicidi secondo suggerimenti dei tecnici di zona e, comunque, dopo averne saggiato il comportamento.

« **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il vento trasporti la soluzione nebulizzata su colture sensibili (vite, fruttiferi, leguminose, bietole).

E' fitotossico per l'erba medica.

Effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima di eseguire la semina.

AVVERTENZE

Rispettare rigorosamente le dosi di impiego. Irrorare in giornate senza vento e con temperatura non troppo elevata (meno di 25° in pieno campo). In caso di giornate calde effettuare il trattamento verso la fine della giornata.

Risciacquare accuratamente i recipienti dopo l'uso, evitare di gettare i residui di soluzione nell'acqua d'irrigazione.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 2345 **Ministero della Sanità del** 13.10.80

E 2

2346

CLASSE I

ECATOX «20» LIQUIDO

Insetticida a base di paratione che agisce per contatto, ingestione e asfissia contro innumerevoli parassiti delle coltivazioni erbacee e arboree

Composizione

gr. 20 di paratione (0,0-dietil 0-p-nitrofenil tiofosfato) tecnico al 98% di purezza minima, equivalenti a gr. 19,6 di paratione puro
solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100. Contiene xilolo

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— evitare di respirarne i vapori;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
— durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, sotterrandole, dopo averle accuratamente vuotate, in una fossa scavata lontano da corsi d'acqua e da sorgenti;
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni per il medico

— **Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo**
— **Sintomi di intossicazione:**
Lacrimazione - miosi - scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - bradicardia - ipotensione - fibrillazioni muscolari - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che e presente la cianosi
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina - teofillina - aminifillina - coramina - latte - olio e grassi
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata

Parassiti combattuti	**Dosi di impiego in litri 100 di acqua**
Afidi, Carpocapsa, Psille, Tentredini, Tingidi, Tignole	0,05 - 0,1 % = gr. 50 - 100
Pidocchio lanigero, Cocciniglie	0,1 - 0,2 % = gr 100 - 200
Mosca delle olive	0,15 - 0,25% = gr. 150 - 250

Modalità di impiego

Versare la quantità occorrente di ECATOX «20» LIQUIDO nell'acqua o nella poltiglia antiparassitaria alla quale si vuole aggiungere, agitando energicamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

L'ECATOX «20» LIQUIDO è miscibile con antiparassitari già in uso sulle stesse colture (ad es. MILTOX, RAME BLEU «50», RAME SANDOZ, SANDOZIR, SANDOZOLFO, TIOVIT, Z 72, ZINEB SANDOZ).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 2346 del 20-12-1976 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

2348

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

PREMIDAL L

Diserbante a base di Dinoseb

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 51 Dinoseb puro (purezza 95%) pari a gr. 53,68 di prodotto tecnico.
Ingrediente inerte quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 2348. Ministero della Sanità del . 20.12.1976 .

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Intossicazione per inalazione, per ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.**

— **Sintomi d'intossicazione:**

Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psico motoria - tachicardia - dispnea - notevole ipertermia - colorazione gialla delle sclere - la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

— **Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:**

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% od iposolfito di sodio al 5% - emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. *Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda - trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale - ossigeno, respirazione artificiale.*

— **Controindicazioni:**

E' controindicata l'atropina.

GENERALITA'

Il **Premidal L** può essere usato in applicazioni di pre o post-emergenza per la lotta contro le erbe a foglia espansa o contro le graminacee.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **Premidal L** è un erbicida che si puo impiegare sia in pre-emergenza, sia in post-emergenza a seconda delle varie colture. Agisce per contatto sui semi delle infestanti prima e durante il germogliamento (azione anti-germinativa), e sulle piantine fino a quando hanno raggiunto un'altezza di cm. 10.

I terreni più adatti per l'impiego sono quelli di medio impasto e argillosi preventivamente livellati, sminuzzati e inumiditi; discreti risultanti si possono ottenere nei terreni sciolti purché siano stati letamati e concimati.

Nei terreni torbosi il diserbo con **Premidal L** si effettua soltanto in post-emergenza con le dosi massime.

COLTURE CHE SI POSSONO DISERBARE CON PREMERGE

Colture	Pre-emergenza dose: lt/ha	Post-emergenza dose: lt/ia	Annotazioni
Pisello	—	5-7	Il diserbo si può effettuare dalla formazione del 1° palco fogliare del pisello fino a quando le piantine hanno raggiunto un'altezza di cm 10.
Fagiolo	21-24	9-14	Il diserbo in post-emergenza deve essere effettuato quando il fagiolo ha formato le prime due foglie vere. E' opportuno effettuare il trattamento nel tardo pomeriggio, quando le foglie del fagiolo sono in «posizione di sonno» e cioè a 45° rispetto al suolo.
Arachide	15-20	7-10	Il diserbo in post-emergenza si può effettuare dall'emergenza fino a quando le piantine di arachide hanno raggiunto una altezza di cm 5.
Patata	10-14	—	Il trattamento va effettuato 2-3 giorni prima della nascita delle piantine di patate.
Fragola	—	—	Il diserbo si può effettuare: 1) dopo la raccolta del prodotto con 4-5 lt/ha; 2) nel tardo autunno o prima della ripresa vegetativa con 10-14 lt/ha.
Gladiolo	20-25	—	Il diserbo si effettua 1 o 2 giorni prima dell'emergenza della coltura.
Medica-Trifoglio Ladino e Pratense	—	3-5	Il diserbo si effettua nell'anno dell'impianto quando le plantule delle leguminose hanno almeno 2 foglie trilobate. Nei medicai di 2 o più anni il diserbo si effettua prima della ripresa vegetativa, alla dose di kg. 7-10.
Mais	22-24	10-14	Il trattamento in post-emergenza dovrà essere effettuato quando il mais non ha ancora emesso la 2ª foglia e le infestanti si trovano allo stadio di germinello. Esso, a volte, può causare al mais lievi bruciature, che non compromettono lo sviluppo della coltura.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Il **Premidal L** deve essere diluito in 300-500 litri di acqua. Si sconsigliano quantitativi superiori, specialmente in post-emergenza, perché la soluzione risulterebbe troppo diluita.
La temperatura ottimale per l'applicazione è sui 20-25 gradi; però il prodotto è già attivo a 10 gradi.
A temperature superiori ai 15 gradi si dovrà adottare la dose minima consigliata per ogni coltura; a temperature inferiori ai 15 gradi si dovrà invece adottare la dose massima.
Si raccomanda di non diserbare con foglie bagnate e a temperature inferiori ai 10 gradi e superiori ai 30 gradi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la irrorazione raggiunga le colture vicine.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Avvertenza:
Tenere il prodotto lontano dal calore e dalla fiamma viva.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

2349

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

CERCOSTAN

Fungicida
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 19 Fentin acetato puro (da p.a. tecnico al 90-95%)
Sostanze diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Nocivo per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

— **Sintomi d'intossicazione:**
Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi.

— **Consigli terapeutici di massima e condizioni al caso**
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale. Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE

Il CERCOSTAN, è dotato di attività fungicida ed è indicato nella lotta contro le malattie crittogamiche delle bietole.

IMPIEGHI

Contro Cercospora e altre crittogame delle bietole.
Dose: kg. 1,2-1,8 in 3-6 ettolitri d'acqua per ettaro.
Effettuare un trattamento all'apparire delle prime manifestazioni della malattia, ripetendolo una o due volte, se necessario, a distanza di 15-20 giorni l'uno dall'altro.
Stemperare il quantitativo occorrente di CERCOSTAN in pochi litri d'acqua. Aggiungere quindi alla poltiglia ottenuta la restante quantità di acqua necessaria per ottenere la concentrazione voluta.
Irrorare la miscela così preparata sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscelabile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.
Avvertenza: in caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 2349 **Ministero Sanità del** . 24.3.1977. . .

E/2

2358

® MOZALINE 50

polvere bagnabile

CLASSE IV

Diserbante selettivo per: asparagi, frutteti, gladioli, mais, oliveti, rosai, vigneti e vivai forestali.
Diserbante totale per aree industriali, argini di risaia, piazzuole per raccolta olive, aree non agricole.

COMPOSIZIONE: Simazina pura g 47,5, coformulanti quanto basta a 100.

NORME PRECAUZIONALI

— conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di produzione CIFA - Caravaggio (Bergamo)
Registrazione n. 2358 del 19.3.77 del Ministero della Sanità

® Marchio registrato della Procida S.A. - Marsiglia

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

MODALITA D'IMPIEGO

Per il diserbo selettivo diluire la dose di MOZALINE 50 in 600-1000 litri di acqua in funzione delle caratteristiche delle macchine usate.
Il terreno, al momento del trattamento, deve essere ben lavorato e privo di zolle. Si dovrà quindi distribuire il prodotto in modo uniforme. Una pioggia od una irrigazione, qualche settimana dopo l'intervento, sono necessarie per la penetrazione dell'erbicida nel suolo.
Lavare accuratamente, al termine delle operazioni, con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili utilizzati per la diluizione e l'impiego del prodotto. E' raccomandato, se ciò è possibile, l'impiego di un apparecchio eclusivamente riservato al diserbo.

USI PRINCIPALI

MOZALINE 50 è un erbicida che si applica con trattamenti su porzioni localizzate (filari) o sull'intera superficie; viene assorbito e traslocato per via fogliare ma prevalentemente per via radicale. Attivo sulle avventizie germinanti o comunque ad apparato radicale breve. Per il suo requisito di fissarsi nello strato superficiale del terreno (a causa della sua bassa solubilità in acqua) e di non raggiungere quindi le radici profonde delle piante coltivate, il prodotto viene impiegato per il diserbo selettivo di asparagiale, frutteti, gladioli, mais, oliveti, rosai, vivai di piante madri di viti americane, vivai forestali di conifere e latifoglie (esclusi la betulla, il frassino, il larice, il pioppo, il tiglio e comunque i semenzai).
Viene impiegato anche per il diserbo totale nelle aree industriali, argini di risaia, piazzole per la raccolta delle olive come pure per i diserbi dei vivai e di altre aree non agricole.

EPOCA DEL TRATTAMENTO E DOSI D'IMPIEGO

Diserbi selettivi: Asparagi: di almeno due anni di impianto ed in piena produzione, subito dopo la rincalzatura o prima della emergenza dei turioni oppure dopo la raccolta di questi alle dosi rispettive di 4 e 2 kg/ha. - **Gladioli:** uno o due giorni dopo la semina con 4 kg/ha. - **Rosai:** impianti di almeno due anni, generalmente in primavera, dopo un'accurata lavorazione del terreno oppure anche in autunno, con 3 kg/ha nei terreni sciolti e 4 kg/ha in quelli pesanti. - **Piante madri di viti:** 4 kg/ha prima del germogliamento delle piante. - **Vivai forestali:** ad esclusione delle essenze sopra nominate, 1-3 kg/ha a secondo che il terreno sia sciolto, di medio impasto o pesante, e dopo che le piante hanno superato la crisi del trapianto. - **Frutteti, oliveti e vigneti:** trattamento possibile nei vari casi dopo gli anni indicati dall'impianto. **Frutteti:** meleti terzo anno 5 kg/ha, agrumeti e pescheti quarto anno 4-6 kg/ha, pereti quarto anno 4-5 kg/ha - **Oliveti:** (su tutta la superficie) sesto anno 5-6 kg/ha - **Vigneti:** secondo anno 2-3 kg/ha, terzo anno 5-7 kg/ha.
In ogni caso il trattamento si esegue a fine inverno-primavera, prima dell'emergenza delle malerbe. Nell'anno del trattamento si consiglia di non lavorare il terreno, limitandosi, ove necessario a sarchiature non profonde più di 4 cm per non portare semi di malerbe in superficie. Le dosi massime consigliate corrispondono a quelle dei terreni pesanti.
Su agrumi, peschi irrigati, peri innestati su cotogno, olivi, si consiglia di ridurre le dosi d'impiego particolarmente nei terreni molto sabbiosi e privi di humus.
Mais e Sorgo: MOZALINE 50 si impiega generalmente in miscela con TAZALON 50 (Atrazina) nelle proporzioni desiderate, particolarmente nei terreni infestati da Panico americano e selvatico e da Sanguinella.
Diserbo totale: prima che abbia inizio la ripresa vegetativa e con dosi variabili secondo la natura del terreno, delle infestazioni e della destinazione (generalmente da 6 a 40 kg/ha).
Aree industriale e non agricole: 10-20 kg/ha per il trattamento iniziale e 6-10 kg/ha per gli anni successivi, impiegando rispettivamente 2.000 e 1.000 litri di acqua per ha.
Argini di risaia: 8-10 kg/ha.
Piazzole per la raccolta delle olive: 6-10 kg/ha, con pompa a getto unico, calcolando di usare il prodotto allo 0,5-1%.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA

MOZALINE 50 è miscibile con TAZALON 50 (Atrazina) o altri formulati a base di amitrole.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare il contatto della polvere o della soluzione con altre colture e curare che non si verifichi trasporto per vento o scorrimento dell'erbicida nei terreni contigui non coltivati a mais. I terreni trattati con l'erbicida non possono essere consociati ad altre colture (fagioli, zucche, cocomeri). Non ripetere il trattamento prima di dodici mesi.
Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di sette mesi per il frumento e di almeno dodici mesi per le altre colture.

**ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.**

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.984 KG

2360

OLIO PARATIONE SANDOZ

CLASSE I

VELENO

Olio minerale emulsionabile attivato con paratione per trattamenti in frutticoltura

Composizione

gr. 5 di paratione (0.0 dietil-0-p-nitrofenil tiofosfato) al 98% di purezza minima, equivalenti a gr. 4,9 di paratione puro; gr. 80 di olio minerale paraffinico attivato con residuo insolfonabile minimo del 95%
solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici,
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto,
- non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua,
- evitare di respirarne i vapori;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
- durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi,
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone,
- rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, sotterrandole, dopo averle accuratamente vuotate, in una fossa scavata lontano da corsi d'acqua e da sorgenti;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni per il medico

- **Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo;**
- **Sintomi di intossicazione**
  Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore; iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Alcune controindicazioni

Morfina - vitamina B - coramina - latte e grassi

Parassiti combattuti	**Dosi di impiego in litri 100 di acqua**
Cocciniglie Uova di Psille	
Uova di Afidi Larve di Lepidotteri	
Larve di Tortrici ricamatrici delle frutta	1 - 1,5% = kg 1 - 1,5

La dose più elevata va usata solo in caso di forti infestazioni di Aspidiotus perniciosus (Cocciniglia di S. Josè)

Modalità di impiego

Il trattamento deve essere eseguito durante il riposo vegetativo delle piante, al momento del rigonfiamento delle gemme, poco prima della loro apertura.
Durante il trattamento delle piante fare attenzione di non inquinare eventuali sottocolture (fragole, ortaggi)

Preparazione della poltiglia

Pesare il necessario quantitativo di OLIO PARATIONE SANDOZ ed aggiungerlo al volume totale di acqua nel serbatoio della motopompa, tenendo l'agitatore in funzione.
Oppure: versare l'OLIO PARATIONE SANDOZ in poca acqua agitando energicamente fino ad ottenere una emulsione lattea, omogenea, senza macchie di olio in superficie: diluire poi con acqua sino al volume desiderato.

Da non applicare con mezzi aerei.

Miscibilità

L'OLIO PARATIONE SANDOZ è miscibile con MILTOX, RAME BLEU « 50 », RAME SANDOZ e TIOTOX « 50 » per i trattamenti invernali combinati. Per la preparazione di poltiglie miste approntare, come sopra precisato, l'emulsione di OLIO PARATIONE SANDOZ, diluire a circa 3/4 del volume previsto.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Utilizzato secondo le modalità indicate non vi sono pericoli di fitotossicità da parte dell'OLIO PARATIONE SANDOZ

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 2360 del 23.10.1976 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

2361

Insetticida a base di metilparathion

Composizione

gr. 20 di metilparathion (0,0-dimetil-0-p-nitrofenil tiofosfato) tecnico al 95% di purezza minima, equivalenti a gr. 19 di metilparathion puro solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100. Contiene xilolo

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua,
— evitare di respirarne i vapori;
— non operare contro vento,
— evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
— durante la preparazione e l'impiego usare tute guanti, maschere ed occhiali protettivi,
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, sotterrandole, dopo averle accuratamente vuotate, in una fossa scavata lontano da corsi d'acqua e da sorgenti,
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni per il medico
— **Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo**
— **Sintomi di intossicazione:**
Lacrimazione - miosi - scialorrea vomito dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali dispnea bradicardia - ipotensione - fibrillazioni muscolari - convulsioni - edema polmonare

Consigli terapeutici
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0 2 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico

Controindicazioni
Morfina - teofillina - aminifillina coramina latte - olio e grassi
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata

Parassiti combattuti	**Dosi di impiego in litri 100 di acqua**
Afidi, Carpocapsa, Tingidi, Tentredini, Tignole della vite	0.08 - 0,1 % = gr. 80 - 100
Cydia molesta, Afide verde	0.12 - 0.15% = gr. 120 - 150
Coccinglie, Tortrice (Bega) del garofano, Mosca delle olive	0.2 - 0.3 % = gr 200 - 300

Per trattamenti invernali, in aggiunta ad oli minerali (OLIO BIANCO SANDOZ), nella dose dello 0,2-0,3%

Modalità di impiego
Versare la quantità occorrente di ECATOX METIL nell'acqua o nella poltiglia antiparassitaria alla quale si vuole aggiungere, agitando energicamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'ECATOX METIL è miscibile con antiparassitari già in uso sulle stesse colture (ad es MILTOX, RAME BLEU « 50 », RAME SANDOZ, SANDOZIR, SANDOZOLFO, TIOVIT, Z 72, ZINEB SANDOZ)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 2361 del 23 - 12 - 1976 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

ECATOX «15»
POLVERE BAGNABILE

CLASSE I VELENO

Insetticida a base di paratione che agisce per contatto, ingestione ed asfissia contro innumerevoli parassiti delle coltivazioni erbacee ed arboree

Composizione
gr. 15,3 di paratione (0,0-dietil 0-p-nitrofenil tiofosfato) tecnico al 98% di purezza minima, equivalenti a gr. 15 di paratione puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— evitare di respirarne i vapori;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
— durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, bruciandole con l'avvertenza di stare sopra vento e di non respirarne il fumo; interrare le ceneri;
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
— **Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo;**
— **Sintomi di intossicazione**
Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per gli adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore; iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Alcune controindicazioni
Morfina - vitamina B_1 - coramina - latte e grassi.

Parassiti combattuti	**Dosi di impiego in litri 100 di acqua**
Afidi, Carpocapsa, Psille, Tentredini, Tingidi, Tignole	0,06 - 0,120% = gr. 60 - 120
Pidocchio lanigero, Cocciniglie	0,12 - 0,250% = gr. 120 - 250

Modalità di impiego
Versare la quantità occorrente di ECATOX « 15 » POLVERE BAGNABILE in poca acqua, rimescolando energicamente onde ottenere una sospensione senza grumi; diluire, in seguito, aggiungendo acqua fino al volume desiderato oppure versare la poltiglia concentrata nella rimanente acqua nel serbatoio della motopompa, facendo funzionare l'agitatore.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'ECATOX « 15 » POLVERE BAGNABILE è miscibile con antiparassitari già in uso sulle stesse colture (ad es. MILTOX, RAME BLEU « 50 », RAME SANDOZ, SANDOZIR, SANDOZOLFO, TIOVIT, Z 72, ZINEB SANDOZ).
Per la preparazione di poltiglie miste aggiungere l'ECATOX « 15 » POLVERE BAGNABILE, stemperato in poca acqua, nella poltiglia anticrittogamica prescelta, sempre agitando.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Utilizzato secondo le modalità indicate non vi sono pericoli di fitotossicità da parte dell'ECATOX « 15 » POLVERE BAGNABILE.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 2373 del 13-12-1976 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

2390

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

COCCIFOS 10

Insetticida agricolo
Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 10 Parathion puro (purezza 97-98%) pari a gr. 10,30-10,20 di prodotto tecnico.
Gr. 40 olio minerale bianco R.I. 90%.
Sostanze emulsificanti e bagnanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. 2390 Ministero Sanità del 22.6.1977

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:
scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni
Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

DOSI D'IMPIEGO

Il COCCIFOS 10 va impiegato, durante la vegetazione, contro i seguenti insetti, alle dosi accanto indicate:
- Cocciniglia bianca cotonosa degli agrumi e della vite; Biancarossa degli agrumi; Cocciniglia a virgola degli agrumi: gr. 500-600 in 100 lt. d'acqua.
- Cocciniglia bianca del gelso (Diaspis pentagona); Cocciniglia di S. Josè: gr. 200-300 in 100 lt. d'acqua.
- Afidi o pidocchi delle piante; Tripidi (delle piante ornamentali): gr. 200 in 100 lt. d'acqua.
- Mosca della frutta; Mosca delle ciliege: gr. 200 in 100 lt. d'acqua.

Per la lotta contro la mosca della frutta eseguire due o tre trattamenti ad intervalli di 15-20 giorni dall'inizio della maturazione dei frutti.
Contro la mosca delle ciliege è in genere sufficiente un solo trattamento da eseguirsi alla prima comparsa dell'insetto.

NORME D'IMPIEGO

Sciogliere la dose richiesta di COCCIFOS 10 in una uguale quantità di acqua ed agitare fino ad ottenere una emulsione omogenea.
Aggiungere quindi la emulsione ottenuta alla restante quantità di acqua necessaria per portare a volume.
Per esempio per ottenere un ettolitro di soluzione allo 0,5% si sciolgono prima 500 gr. di COCCIFOS 10 in mezzo litro d'acqua e dopo accurata agitazione, si aggiunge la emulsione ai restanti 99 lt. d'acqua.
Per le irrorazioni sulle piante adoperare le comuni pompe a spalla od a motore.
Per il trattamento di fine inverno si scelgano giornate serene e possibilmente tiepide. In ogni caso le piante al momento del trattamento devono essere perfettamente asciutte.
Il trattamento di fine inverno va eseguito durante il riposo invernale delle piante — e cioè a gemme chiuse — e comunque non oltre il primo inizio del rigonfiamento delle gemme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il COCCITOS 10 non è miscibile con prodotti a base di zolfo e con Karathane. E' consigliabile che i trattamenti con zolfo e Karathane vengano effettuati separatamente ad un intervallo di almeno 15 giorni dall'applicazione di COCCIFOS 10.
Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2391

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

FOSFOIL

Insetticida agricolo a base di olio bianco di paraffina e parathion per trattamenti invernali e primaverili ai fruttiferi e colture ornamentali.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
3,5 Parathion puro (purezza (97-98%) pari a gr. 3,60-3,57 di prodotto tecnico.
Gr. 83 olio minerale bianco R.I. 90%.
Sostanze disperdenti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n2391 **Ministero Sanità del** 22.6.77 . . . .

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN FRUTTICOLTURA:
Pomacee e drupacee al risveglio vegetativo: contro l'Aspidiotus Perniciosus parzialmente contro la Diaspis Pentagona, contro le uova svernanti di Afidi e Lepidotteri a Kg. 1,3-1,5 per hl.
Drupacee nel periodo estivo: contro la Diaspis Pentagona in corrispondenza della fuoriuscita delle Neanidi di prima e seconda generazione a gr. 400-700 per hl.

IN VITICOLTURA:
Al risveglio vegetativo contro le Cocciniglie a kg. 1,3-1,5/hl.

IN AGRUMICOLTURA:
Contro le Cocciniglie in genere nel periodo maggio-agosto a Kg. 1 per hl.

IN FLORICOLTURA:
Contro le Cocciniglie (Aspidiotus Hederae, Parlatoria Pergandei, la Bianca Rossa, l'Aonidiella Perniciosa, l'Aulacaspis rosae e la Cocciniglia bianca) a Kg. 1,5-2 per hl.

MODALITA' D'IMPIEGO

La poltiglia di FOSFOIL si prepara sciogliendo il prodotto in poca acqua indi si porta a volume aggiungendo la rimanente acqua e tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il FOSFOIL non è miscibile con prodotti a base di zolfo e con Karathane. E' consigliabile che i trattamenti con zolfo e Karathane vengano effettuati separatamente e ad un intervallo di almeno 15 giorni dall'applicazione di FOSFOIL.
Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

• Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti Ogni altro uso è pericoloso •.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

2404

2404 ®

M I L C O Z E B E

Anticrittogamico, in polvere bagnabile, a base di mancozeb

Composizione
gr. 80 di mancozeb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

Informazioni per il medico
— Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)
— Terapia
In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora, Antracnosi, Marciume nero	0,2 % = gr 200
	Escoriosi	0,35% = gr 350
Pomacee	Ticchiolature	0,15-0,2 % = gr 150-200
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Antracnosi	0,2-0,3 % = gr 200-300
Tabacco	Peronospora	0,2 % = gr 200
Pioppo	Marssonina brunnea	0,4-0,5 % = gr 400-500
Garofano in pieno campo	Ruggine	0,2-0,3 % = gr 200-300
Concia semi di		
• grano	Carie e Fusariosi	gr 150 per q.le di seme
• riso	Piricularia, Elmintosporiosi, Fusariosi	gr 200-250 per q.le di seme
• mais	Carbone, Fusariosi, Gibberella, Elmintosporiosi	gr 250-300 per q.le di seme
• barbabietola da zucchero	Phoma, Fusariosi, Rizoctonia, Cercospora	gr 600 per q.le di seme
• sementi orticole	Fusariosi, Rizoctonia, Pythium	gr 250-600 per q.le di seme
Cereali in campo	Ruggini, Septoriosi	kg 2-2,5 per ettaro

In generale gli interventi con MILCOZEBE dipendono dalle condizioni ambientali e dalla biologia dei parassiti, attenersi comunque ai calendari dei trattamenti suggeriti in zona.
Contro l'Escoriosi della vite intervenire alla ripresa vegetativa con due trattamenti da eseguirsi nella fase della gemma cotonosa e dell'uscita delle prime foglie.
Nei riguardi della «concia dei semi» provvedere a mescolare accuratamente ed omogeneamente il MILCOZEBE con la semente da trattare. Inoltre per le sementi orticole, aumentare la dose con il diminuire della dimensione del seme.
Per la preparazione della poltiglia versare la quantità necessaria di MILCOZEBE nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non impiegare in serra.

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il MILCOZEBE è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ; è incompatibile con la poltiglia solfo-calcica, il permanganato di potassio.
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio MILCOZEBE + TIOVIT procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di MILCOZEBE da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del MILCOZEBE con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di MILCOZEBE, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.
«AVVERTENZA»: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si deve evitare di trattare le varietà di pero sensibili, quali Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna. Su pomodori è bene evitare trattamenti con MILCOZEBE miscelato a concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. MILANO
Dipartimento Agro

SANDOZ

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 2403 del 23-12-1978 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

• MILCOZEBE è marchio registrato dalla Rhom and Haas Co. Philadelphia USA

242

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

TRITHION 25 W

Insetticida fosfo-organico
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
G. 25 Carbophenothion tecnico (purezza 98%)
pari a gr. 24,50 di prodotto puro.
Ingredienti inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- — Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- — Conservare la confezione ben chiusa.
- — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- — Evitare di respirarne i vapori.
- — Non operare contro vento.
- — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- — Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- — Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospergendo con calce viva).
- — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.

Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2425 **Ministero della Sanità del** 27.12.76

Il **Trithion 25 W**, polvere bagnabile, è un estere fosforico a lunga persistenza di azione, per combattere principalmente gli Afidi; possiede inoltre una collaterale azione acaricida; buona la sua azione di choc contro gli adulti dei lepidotteri minatori e contro le larve del Cemiostoma.

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

IN FRUTTICOLTURA: Contro l'Afide verde delle pomacee (Aphis pomi) e gli altri Afidi, Carpocapsa, adulti dei lepidotteri minatori, larve del Cemiostoma; gr. 120-150 per ettolitro.

IN ORTICOLTURA E FLORICOLTURA: Contro gli Afidi (pidocchi) gr. 130-150.

IN BIETICOLTURA: Contro Altiche kg. 2-2,5 per ettaro.

MODALITA' D'IMPIEGO

La poltiglia si prepara stemperando il prodotto in poca acqua, indi portando a volume ed agitando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **Trithion 25 W** va preferibilmente irrorato da solo; può tuttavia miscelarsi con antiparassitari sotto forma di polvere bagnabile, sempre che non abbiano reazione alcalina.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il **Trithion 25 W** non va impiegato mai in miscela con sostanze oleose o con liquidi emulsionabili. Non se ne consiglia l'uso con attrezzature idonee per trattamenti a basso volume.

Il **Trithion 25 W** va impiegato quando la pianta ha raggiunto il massimo sviluppo fogliare e non su vegetazione tenera. Nel caso si debba ripetere il trattamento con Trithion, l'intervallo tra i due trattamenti deve essere di almeno 10 giorni.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici i pesci ed il bestiame.

Nel corso di trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

2426

Polvere Bagnabile

Insetticida agricolo per frutticoltura, agrumicoltura, orticoltura, floricoltura e colture industriali.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
20 g di metidation tecnico al 95% di 0,0-dimetil-S-(2-metossi)-1,3,4-tiadiazol-5 (4H)-onil-(4)-metil)-ditiofosfato, pari a g 19 di prodotto puro
q.b. a 100 g coformulanti

Attenzione!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I^a

VELENO

CIBA-GEIGY S.p.A. ORIGGIO (VA)
Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2426 **del** 7.9.77
® marchio registrato

Natura del rischio — Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali — Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Evitare di respirarne i vapori
Non operare contro vento
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
Durante la preparazione e l'impiego, usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva)
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni per il medico — *Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e contatto cutaneo.*

Sintomi di intossicazione — *Scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso — *Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg 1-2 per gli adulti e mg 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti, fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione; può essere continuata per 24-48 ore.*
Iniezioni endovenose lente di PAM (g 0,50 ogni 3 ore fino a g 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Alcune controindicazioni: *morfina, vitamina B 1, coramina, latte e grassi.*

Caratteristiche
SUPRACID 20 Polvere Bagnabile agisce per contatto e ingestione e penetra nei tessuti vegetali uccidendo gli insetti annidati nei frutti (es. Carpocapsa, Rhagoletis) o riparati nelle foglie accartocciate (es. Afidi, Cecidomie, Cacoecia). Pertanto il SUPRACID 20 Polvere Bagnabile risulta particolarmente efficace nella lotta contro i seguenti parassiti:
Cocciniglie (Diaspis pentagona, Aspidiotus sp. Coccus oleae, Chrysomphalus dictyospermi, Pseudococcus sp);
Lepidotteri tortricidi (Cacoecia rosana, Cacoecia pronubana, Capua reticulana);
Lepidotteri minatori (Cemiostoma, Nepticula). Altri Lepidotteri (Carpocapsa pomonella, Tignole):
Psille (P. pyrisuga, P. pyricola);
Ditteri fitofagi (Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi);
Coleotteri: Dorifora (Leptinotarsa decemlineata). Cleono (Cleonus mendicus), Lixus junci, Altiche;
Afidi verdi e lanigeri (Aphis pomi, Macrosiphum solani).

Dosi d'impiego
160-300 g in 100 litri di acqua a seconda dei parassiti.
Diluire il SUPRACID 20 Polvere Bagnabile, in poca acqua, alle dosi sopra indicate e versare la sospensione ottenuta nella restante quantità d'acqua, mescolando accuratamente.

Da non impiegarsi con mezzi aerei.

Compatibilità — Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a carattere spiccatamente alcalino.
« Avvertenza » - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero intossicazioni informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità — Si sconsigliano trattamenti al pesco dopo la ripresa vegetativa per la sensibilità riscontrata in alcune varietà.

Rischi di nocività — Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, per non meno di 20 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg 1**

Gesatop® Z 80 WP

Polvere bagnabile
Diserbante selettivo per agrumi

Composizione
100 g di prodotto contengono:
41 g simazina tecnica al 97% di 2-cloro-4,6-bis-etilammino-s-triazina pari a g 40 di prodotto puro
41 g ametrina tecnica al 95% di 2-etilammino-4-isopropilammino-6-metil tio-s-triazina pari a g 39 di prodotto puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)
Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2433 **del** 18.1.77
® marchio depositato

Caratteristiche
Deriva dall'associazione di due triazine con caratteristiche diverse e complementari.
La simazina agisce solo per assorbimento radicale sulle infestanti in fase di germinazione, mentre l'ametrina completa questa attività con una pronunciata azione per via fogliare.
Il prodotto ha pertanto una attività erbicida sia sulle infestanti in fase di emergenza sia in quelle già sviluppate.
Il prodotto è efficace contro la maggior parte delle infestanti annuali, sia graminacee che dicotiledoni, ed in parte anche contro alcune infestanti perennanti.

Dosi e modalità d'impiego
Kg 3-6/ha secondo la natura del terreno e lo stadio di sviluppo delle infestanti.
Il trattamento si effettua dopo l'emergenza delle infestanti impiegando un quantitativo di acqua sufficiente a bagnare le stesse ed a permettere che il prodotto giunga a contatto del suolo.
Dopo il trattamento è necessario che nel terreno vi sia un sufficiente grado di umidità perché il prodotto possa esercitare tutta la sua azione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. « Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità - Il prodotto si impiega solo su colture specializzate cioè in assenza di sottocolture.
Dal trattamento erbicida all'eventuale semina di sottocolture occorre un intervallo minimo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Durante il trattamento evitare che il liquido erbicida giunga a contatto delle foglie degli agrumi. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg 1**

2435

I CLASSE TOSSICOLOGIA

VELENO

NEMAFOS RAVIT 10 GRANULARE

Nemocida granulare da impiegarsi tal quale nel terreno; evita o riduce a livelli insignificanti l'azione nociva di molte specie di Nematodi e consente quindi di ottenere un incremento produttivo delle colture.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 10 Tionazin tecnico (purezza 90%) pari a gr. 9 di prodotto puro.
Coadiuvanti e supporti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. n. 2435 **Ministero della Sanità del** 19.3.77

E/2

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:
sclalorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,5C g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni
Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

DOSI D'IMPIEGO

Barbabietola: kg. 40-60/ha, con trattamenti localizzati a ciascun lato delle file ed effettuati circa un mese dopo la semina. Oppure kg. 40/ha con trattamento localizzato effettuato alla semina e ripetendo con kg. 20/ha, dopo un mese circa.
Pomodoro, tabacco, patata e piante erbacee in genere coltivate a fila kg. 40-60/ha con trattamenti localizzati effettuati al trapianto e semina. Oppure: kg. 40/ha al trapianto o semina e kg. 20/ha dopo 20-40 giorni circa.
Garofani, colture floreali ed orticole kg. 60-120/ha con trattamenti effettuati, al trapianto e alla semina, sull'intera superficie. Oppure: kg. 60/ha al trapianto o semina e kg. 30-60/ha dopo 20-40 giorni circa.

MODALITA' D'IMPIEGO

Distribuire il prodotto uniformemente sull'intera superficie da disinfestare oppure localizzato sulle file; incorporarlo successivamente nei primi cinque centimetri dello strato superficiale del terreno con un lavoro leggero di zappatura o meccanicamente; far seguire una irrigazione se non piovesse, dopo l'interramento del prodotto e l'impianto della coltura.
I trattamenti debbono effettuarsi al momento delle semine e dei trapianti, oppure, ove è possibile, anche durante lo sviluppo delle colture.
Nell'intervento localizzato, effettuato subito dopo le semine o i trapianti, trattare una breve striscia di terreno a ciascun lato del solco o della fila, interrando e, se necessario, irrigando. Spesso (nei terreni leggeri e permeabili) la sola irrigazione effettuata in ciascun lato della fila, consente la sufficiente penetrazione del prodotto nel terreno.
Il trattamento localizzato può essere eseguito anche nel solco di semina o di trapianto al momento stesso o prima di tali operazioni.
I trattamenti a coltura in atto devono essere effettuati su ciascun lato della fila di piante, interrando il prodotto e irrigando se necessario.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il NEMAFOS RAVIT 10 GRANULARE è compatibile con le polveri insetticide usualmente impiegate per la disinfestazione dei terreni e con i concimi. E' sconsigliabile effettuare trattamenti in terreni eccessivamente alcalini.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, i volatili ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 50 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

244[illegible]

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Esca granulata per la lotta contro chiocciole e limacce

COMPOSIZIONE

Metaldeide pura	g 4,9
coadiuvanti e supporti inerti.	q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Stab. BIMEX S.p.A. - Isola Vicentina (VI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2442 del 29-1-1977

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Kg 5-10 per ettaro per infestazioni normali
Kg 10-15 per ettaro per forti infestazioni
Spargere lo SLIM preferibilmente di sera su tutta la superficie della coltura infestata, oppure intorno alle piante da difendere. Questa ultima modalità di applicazione è particolarmente indicata per colture di carciofi e cavoli.

Non danneggia la vegetazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto viene distribuito da solo.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione.

Violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio.

Consigli terapeutici

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (g 5 per litro di acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina - diuretici - barbiturici - anfetamina e derivati in caso di torpore.

2446

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Diserbante selettivo per la coltura del mais, efficace contro le infestanti piú dannose comprese seteria e digitaria
Diserbante totale degli argini di risaia
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 25 Atrazina pura (purezza 95-97%) pari a gr. 26,31-25,77 di prodotto tecnico.
Gr. 37,5 Simazina pura (purezza 95%) pari a gr. 39,47 di prodotto tecnico.
Sostanbe inerti quanto basta a 100.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevante o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Lo **ZEAVIT-S** agisce sulle infestanti per contatto e soprattutto per assorbimento radicale. La sua azione è favorita e resa piú immediata da un giusto grado di umidità del terreno o da opportune irrigazioni nei casi di prolungata siccità.

Lo **ZEAVIT S** è attivo contro le principali infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali: giavoni ed altre graminacee (setaria, digitaria sanguinalis) amaranti, farinaccio, persicaria, poa, ortica, erba porcellana, stellaria, capsella, erba morella, geranio, mercurella, veronica, plantaggine, matricaria.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO

Per il diserbo selettivo del mais: il trattamento va effettuato in primavera, in pre-emergenza della coltura, alla dose di kg. 4 di **ZEAVIT-S** per ettaro, distribuiti con 400-1000 litri di acqua per ettaro.

Per il diserbo totale degli argini delle risaie: kg. 6-8 di **ZEAVIT-S** per ettaro, pari a gr. 300-400 sciolti in litri 100 di acqua, irrorati su 500 metri quadrati di superficie.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare lo **ZEAVIT-S** in poca acqua, versare la poltiglia nel serbatoio dell'irroratrice e indi aggiungere l'acqua occorrente agitando energicamente.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Per il diserbo del mais impiegare comuni irroratrici a pressione costante munite di agitatore meccanico: il liquido erbicida deve essere sempre ben agitato per evitare depositi.

Stabilire con esattezza il volume di acqua da distribuire che non deve mai essere inferiore a lt. 400 per ettaro, per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona penetrazione dell'erbicida nel terreno.

Eseguire le applicazioni in preferenza su terreno già umido o che potrà ricevere la necessaria acqua da pioggie o irrigazioni.

Il trattamento può anche effettuarsi localizzato sulle file di semina per una larghezza di cm. 30 riducendo di 1/3 la dose di prodotto. Tale trattamento potrà farsi in terreni non soggetti a forti inerbimenti.

Prima del trattamento di **ZEAVIT-S**, per ottenere buoni risultati erbicidii, occorrerà che il terreno sia ben preparato e non zolloso.

Le eventuali sarchiature meccaniche per la rimozione della crosta superficiale del terreno non dovranno superare i 4-5 cm. di profondità per conservare l'effetto erbicida residuo.

Tale effetto residuo si protrae per tutto il periodo del ciclo colturale del mais, qualora non si intervenga con rincalzature.

La scarsità o il ritardo di pioggia richiede in misura maggiore, nel periodo estivo, l'ausilio delle irrigazioni per ottenere il miglior effetto erbicida.

L'umidificazione del terreno è determinante perché l'erbicida possa essere assorbito dalle radici delle infestanti e quindi esplicare la sua azione: **per cui, se non si verificano pioggie entro le due settimane seguenti il trattamento,** occorre intervenire **con opportune e tempestive irrigazioni.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con olio bianco, con erbicidi quali Alachlor e 2,4 D.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piú lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piú tossici

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive al mais occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture (esempio: bietole e tabacco).

I terreni coltivati a mais trattati con **ZEAVIT-S non consentono** la consociazione con colture ortive, da foraggio, od arboree (legumi, crucifere, pioppi).

Non impiegare dosi di **ZEAVIT-S** superiori a quelle consigliate che potrebbero compromette colture in rotazione.

Evitare passaggi ripetuti della irroratrice su porzioni di terreno.
Lavorare il terreno con aratura profonda (30-35 cm.) all'epoca della raccolta del mais, prima di far seguire le colture di avvicendamento.

Non è necessario periodo di carenza, in quanto il prodotto viene impiegato in pre-emergenza.

AVVERTENZA

L'efficacia dello **ZEAVIT-S** è ridotta dalla presenza di sostanza organica in quantità molto elevata: non è consigliabile trattare su terreni torbosi.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2446 **Ministero della Sanità del** 24.3.77

Contenuto netto Kg.

2

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CLONEL

Erbicida selettivo del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 49,5 isoproturon puro
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo per il diserbo del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, contro infestanti annuali, graminacee e dicotiledoni più comuni.

Infestanti sensibili:

a) graminacee: Agrostis, Alopecurus, Avena fatua, Avena ludoviciana, Lolium, Poa, Falaris;

b) dicotiledoni: Alchemilla arvensis, Centaurea cyanus, Cerastium arvense, Fumaria, Matricaria, Polygonum aviculare, Ranunculus arvensis.

La sensibilità del Polygonum convolvulus e della Sinapis è irregolare.

Infestanti resistenti:

Galium aparine, Lamium purpurem, Lithospermum officinale, Raphanus raphanistrum, Scandix, Veronica, Viola tricolor.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 2460 del Ministero della Sanità del 7-2-1977

7/83

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato durante il periodo dell'accestimento del frumento (da un culmo ben sviluppato alla fine dell'accestimento).
Soltanto nel caso che l'infestazione sia costituita prevalentemente da Avena a nascita autunnale si consiglia di intervenire in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, anziché in post-emergenza.
L'azione erbicida è favorita da una buona umidità del terreno.
Per la distruzione dell'Alopecurus e dell'Agrostide non ha importanza lo stadio vegetativo delle infestanti.
Per la distruzione delle Avene, del Lolium e della Falaris, è necessario intervenire entro lo stadio di due-quattro foglie delle infestanti.
Se le levate sono scalari, si dovrà tener conto delle prime nascite.
a) contro Agrostide, Alopecurus, Poa annua, Kg. 3/ha.
b) contro Avena, Lolium, e Falaris: Kg. 4/ha.
Se il terreno è ricco di calcare la dose non deve superare Kg. 3,6 per ettaro.
Distribuire il prodotto con 400-600 litri d'acqua per ettaro.
Solamente nel caso che l'infestazione sia costituita prevalentemente da graminacee a nascita autunnale, si consiglia di intervenire in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, anziché in post-emergenza.
Il trattamento di pre-emergenza non ha un'interessante efficacia sulle dicotiledoni.

Non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscelabile con ACTRIL M.
Si consiglia tale miscela nelle applicazioni di post-emergenza, per completare lo spettro erbicida contro le dicotiledoni. Impiegate 600-800 litri d'acqua per ettaro.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulanti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

2461

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

CLONEL A

Erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale
Crema emulsionabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 21,5 Isoproturon tecnico (purezza 99%) pari a gr. 21,28 di prodotto puro;
g. 18 Dinoterb tecnico (purezza 95%) pari a gr. 17,10 di prodotto puro.
Coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, per ingestione o per assorbimento attraverso la pelle.

— Sintomi d'intossicazione:

Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psico motoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia, colorazione gialla delle sclere, la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% od iposolfito di sodio al 5%, emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda, trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale, ossigeno, respirazione artificiale. E' controindicata l'atropina.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

CARATTERISTICHE

Il **Clonel A** è un erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, **contro le infestanti annuali graminacee e dicotiledoni più comuni.**

Infestanti sensibili:

a) graminacee: Avena fatua e ludoviciana, Lolium, Agrostis, Alopecurus, Poa annua.

b) dicotiledoni: tutte le più comuni, comprese il Galium aparine e la Veronica.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato dopo il periodo delle forti gelate, prima della fine dell'accestimento dei cereali.

Per la distruzione delle Avene e Lolium è necessario intervenire entro lo stadio di due-quattro foglie delle infestanti.

Se le levate sono scalari, si dovrà tener conto delle prime levate.

Contro Avena Fatua e Ludoviciana, Lolium, Agrostis, Alopecurus, Poa annua: Kg. 8,5/ha, distribuiti con 600-800 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Agitare la dose di prodotto consigliata per ben omogeneizzare la formulazione, senza aggiunta di acqua. Indi immettere il prodotto direttamente nel serbatoio dell'irroratrice già riempita d'acqua. Tenere agitata la poltiglia durante il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, i pesci, gli animali domestici e per il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 2461 **Ministero della Sanità del** 16-2-1977

Peso netto Kg.

2

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

TOLKAN A

Erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale
Crema emulsionabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 21,5 Isoproturon tecnico (purezza 99%) pari a gr. 21,28 di prodotto puro;
g. 18 Dinoterb tecnico (purezza 95%) pari a gr. 17,10 di prodotto puro.
Coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, per ingestione o per assorbimento attraverso la pelle.

— Sintomi d'intossicazione:
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psico motoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia, colorazione gialla delle sclere, la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% od iposolfito di sodio al 5%, emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda, trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale, ossigeno, respirazione artificiale. E' controindicata l'atropina.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2463 **Ministero della Sanità del** 16.2.77

CARATTERISTICHE

Il **Tolkan A** è un erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, **contro le infestanti annuali graminacee e dicotiledoni più comuni.**

Infestanti sensibili:
a) graminacee: Avena fatua e ludoviciana, Lolium, Agrostis, Alopecurus, Poa annua;
b) dicotiledoni: tutte le più comuni, comprese il Galium aparine e la Veronica.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato dopo il periodo delle forti gelate, prima della fine dell'accestimento dei cereali.

Per la distruzione delle Avene e Lolium è necessario intervenire entro lo stadio di due-quattro foglie delle infestanti.

Se le levate sono scalari, si dovrà tener conto delle prime levate.

Contro Avena Fatua e Ludoviciana, Lolium, Agrostis, Alopecurus, Poa annua: Kg. 8,5/ha, distribuiti con 600-800 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Agitare la dose di prodotto consigliata per ben omogeneizzare la formulazione, senza aggiunta di acqua. Indi immettere il prodotto direttamente nel serbatoio dell'irroratrice già riempita d'acqua. Tenere agitata la poltiglia durante il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, i pesci, gli animali domestici e per il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2481

Primagram® S

Diserbante di pre-emergenza per il mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
27 g di metolachlor puro
19,6 g di atrazina pura
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III **Attenzione: manipolare con prudenza**

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sostanza nociva per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.

Terapia: *sintomatica.*

CIBA-GEIGY S.p.A. - Origgio (Varese)
Officina di produzione:
S.I.L.I.A., Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2481 del 15-2-1977
® marchio registrato

Caratteristiche
Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme sia graminacee quali Giavone, Poa, Digitaria, Setaria, Panico americano (Panicum dicothomiflorum), Sorghetta da seme (Sorghum halepense) sia dicotiledoni quali Amaranto, Farinaccio, Persicaria, Ortica, Erba porcellana, Stellaria, Borsa Pastore, Erba morella, Gerani, Mercurella, Veroniche, Matricaria.
Il prodotto non è efficace sulle malerbe perennanti per rizomi, bulbi, stoloni quali Gramigna, Convolvolo, Sorghetta, Stoppione, Artemisia. Il prodotto agisce essenzialmente per assorbimento radicale sul seme delle infestanti in germinazione o sulle stesse infestanti alla fase di plantula.

Dosi e modalità d'impiego
Il prodotto si impiega subito dopo la semina o qualche giorno dopo, ma prima della nascita delle infestanti.
Le dosi consigliate sono:
lt 5 per ettaro - nella generalità dei casi
lt 6 per ettaro - in presenza di Panicum dicothomiflorum
lt 7 per ettaro - in presenza di Sorghum halepense (sorghetta da seme).
Eseguire le applicazioni su terreno di preferenza già umido o che verrà bagnato da successive piogge o irrigazioni. La umidificazione del terreno è determinante per l'assorbimento radicale dell'erbicida per cui, non verificandosi pioggia entro le due settimane successive al trattamento, occorre sopperirvi con opportune irrigazioni.
Le eventuali sarchiature eseguite dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno non interessato dall'erbicida.

Avvertenza - dal trattamento alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi. Impiegare il prodotto solo su colture specifiche. Lavorare il terreno con aratura profonda dopo il raccolto del mais, prima di seminare le successive colture.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri antiparassitari. « **Avvertenza** » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

lt

248

Gesagram®

Diserbante di pre-emergenza per il mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
22,5 g di metolachlor puro
23,1 g di atrazina pura e g 1,5 di altre triazine erbicide
q.b. a 100 g coformulanti
(contiene etilenglicole)

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sostanza nociva per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.

Terapia: *sintomatica.*

CIBA-GEIGY S.p.A. - Origgio (Va)

Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*

Registrazione Ministero della Sanità n. 2482 del 15.2.1977
® marchio registrato

Caratteristiche
Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme sia graminacee quali Giavone, Poa, Digitaria, Setaria, Panico americano (**Panicum dicothomiflorum**), Sorghetta da seme (**Sorghum halepense**) sia dicotiledoni quali Amaranto, Farinaccio, Persicaria, Ortica, Erba porcellana, Stellaria, Borsa Pastore, Erba morella, Gerani, Mercurella, Veroniche, Matricaria.
Il prodotto non è efficace sulle malerbe perennanti per rizomi, bulbi, stoloni quali Gramigna, Convolvolo, Sorghetta, Stoppione, Artemisia. Il prodotto agisce essenzialmente per assorbimento radicale sul seme delle infestanti in germinazione o sulle stesse infestanti alla fase di plantula.

Dosi e modalità d'impiego
Il prodotto si impiega subito dopo la semina o qualche giorno dopo, ma prima della nascita delle infestanti.
Le dosi consigliate sono:
Kg 4 per ettaro - nella generalità dei casi
Kg 5 per ettaro - nelle infestazioni miste con prevalenza di graminacee resistenti all'atrazina (Digitaria, Setaria)
Kg 6 per ettaro - in presenza di **Panicum dicothomiflorum**
Eseguire le applicazioni su terreno di preferenza già umido o che verrà bagnato da successive piogge o irrigazioni. La umidificazione del terreno è determinante per l'assorbimento radicale dell'erbicida per cui, non verificandosi pioggia entro le due settimane successive al trattamento, occorre sopperirvi con opportune irrigazioni.
Le eventuali sarchiature eseguite dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno non interessato dall'erbicida.

Avvertenza - dal trattamento alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi. Impiegare il prodotto solo su colture specifiche. Lavorare il terreno con aratura profonda dopo il raccolto del mais, prima di seminare le successive colture.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri antiparassitari. **«Avvertenza»** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO It

1 litro di prodotto è uguale a Kg 1,1

2488

ERBICIDA IN FORMULAZIONE PASTA
PER IL DISERBO SELETTIVO DEL MAIS

Composizione gr 100 contengono: ATRAZINA pura gr 44,1 - Bagnanti, Adesivanti e Sospesivanti gr 54.

CLASSE III **ATTENZIONE: manipolare con prudenza**

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: IN CASO DI INTOSSICAZIONE CHIAMARE IL MEDICO PER I CONSUETI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO.

MODALITA' D'IMPIEGO: La ZEAMINA P combatte le infestanti Graminacee e Dicotiledoni provenienti da seme e che germinano nel periodo Primaverile-Estivo (Giavone - Farinaccio - Amaranto - Centocchio - Le Persicarie - L'erba Porcellana - Bursa Pastoris). Agisce per assorbimento Radicale e per assorbimento Fogliare. Tra le infestanti scarsamente sensibili al prodotto ricordiamo: Gramigna, Panichum, Dichotomiflorum, Artemisia, Sorgo Selvatico, Convolvolo e, in genere, tutte quelle infestanti rizomatose e perenni che, a causa del loro profondo apparato radicale, sfuggono all'azione del prodotto. La ZEAMINA P si impiega alla dose di Kg 4-5 per ettaro diluiti in 600-1000 litri di acqua. Il trattamento va eseguito subito dopo la semina od al massimo quando le infestanti hanno raggiunto i 4-6 cm di altezza. Affinché il prodotto possa espletare efficacemente la sua azione il trattamento deve essere eseguito su terreno ben preparato e rullato; viene inoltre raccomandata l'uniformità nella distribuzione, evitando di soffermarsi sullo stesso punto o di ripassare su di una superficie già trattata. Evitare la lavorazione del terreno dopo il trattamento o, limitare la lavorazione ad uno strato di 2-3 cm. Si raccomanda di usare le dosi più basse in terreni sciolti o di medio impasto, quelle più alte in terreni compatti o ricchi di sostanza organica. Nei terreni molto ricchi di humus sconsigliamo l'impiego del prodotto. Per l'impiego della ZEAMINA P in Post-Emergenza consigliamo di impiegare la dose di Kg 5 per ettaro con l'aggiunta di Kg 15 per ettaro di VALOIL (olio Bianco).

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalina. - AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. - Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, evitare quindi che venga a contatto con le colture vicine.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al Mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il Frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. Bietole, Tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Reg. N. 2488 del 18-3-77 del Min. della Sanità

B I M E X S . p . A .
ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 8
TELEFONI N.: (0444)

officina di produzione DIACHEM S.p.A.
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

BAVISTIN

Fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Carbendazim puro	g. 50
Coformulanti q.b. a	g. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - MILANO

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen/Rhein
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N. 2503 del 4-4-1977

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' D'AZIONE

Il BAVISTIN è un fungidica organico, in polvere bagnabile, ad azione preventiva e curativa, efficace contro le malattie crittogamiche delle piante coltivate sottoindicate.

L'attività sistemica, seppur limitata, che consiste nella capacità di diffondersi parzialmente all'interno delle piante erbacee trattate, conferisce al BAVISTIN non solo una valida azione preventiva ma anche una efficacia curativa soprattutto per le malattie di detti vegetali.

EPOCHE, MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI (per 100 litri di acqua)

Melo e Pero

Ticchiolatura, Oidio
Trattamenti pre-fiorali: 80-100 cc
Trattamenti post-fiorali: 50-100 cc
Trattamenti ogni 7 giorni nella fase primaverile e successivamente ad intervalli più ampi. Irrorazioni curative 48-72 ore dall'inizio delle piogge infettanti.
Gleosporium: trattamenti di pre-raccolta: 80-100 g
Trattamenti di post-raccolta (per immersione o aspersione dei frutti per non oltre 30 secondi): 100-130 g.
I trattamenti di post-raccolta dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazione meccanizzate, che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo-conservazione.
La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da Ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

Pesco, Albicocco, Susino e Mandorlo: 50 g

— Monilia dei rami e dei fiori: 2 irrorazioni all'inizio e durante la fioritura (intervallo di 8-12 giorni).
— Monilia dei frutti: 2 trattamenti rispettivamente ca. 30 e 15 giorni prima della probabile epoca di raccolta.

Vite: Botrytis: 50-100 g

4 trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, chiusura del grappolo, invaiatura, 2-3 settimane prima della raccolta.
Su varietà di vite a maturazione precoce possono essere sufficienti 3 trattamenti: inizio fioritura, chiusura del grappolo e 2-3 settimane prima della raccolta. In presenza di condizioni meterologiche favorevoli allo sviluppo della malattia bisognerà aumentare il numero dei trattamenti.
Il BAVISTIN manifesta una discreta attività antioidica.
Il BAVISTIN non influisce sulla fermentazione.

Frumento: 0,5-0,6 kg/ha
Trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso fra la levata e la spigatura.

Rosa ed altre piante ornamentali: Oidio e Botrytis: 100 g
Trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni. In periodi caratterizzati da intensa attività vegetativa e da elevata umidità e su varietà sensibili, ridurre l'intervallo a 7-10 giorni.
Il BAVISTIN può essere associato vantaggiosamente al BASF-Mehltaumittel alle seguenti dosi:
— Colture sotto serra: 50 g BAVISTIN + 80 g BASF-Mehltaumittel.
— Colture in piena aria: 50 g BAVISTIN + 120 g BASF-Mehltaumittel.

Gladioli, Tulipani ed altre bulbose: Marciumi dei bulbi da Fusarium, Botrytis, Penicillium e Sclerotinia: 300 g.
Trattamento per immersione della durata di 20-30 minuti.

Garofano: Phialophora

Trattamenti pre-trapianto: 200 g
Immersione delle talee per 8-12 ore
Trattamenti post-trapianto: 1-2 g/mq
Irrorazioni con 2-10 litri di acqua/mq secondo lo sviluppo della pianta., ad intervalli di 20-30 giorni, per tutta la durata del ciclo vegetativo. Iniziare l'applicazione 2-3 giorni dopo la messa a dimora del garofano se non è stato effettuato il trattamento per immersione e 15 giorni dopo se questo è stato eseguito.
Il BAVISTIN possiede una valida sospensibilità, ma per ottenere una poltiglia omogenea è utile stemperare il prodotto in poca acqua, prima di versarlo nel serbatoio dell'irroratrice.
L'aggiunta di insetticidi dovrà essere fatta immediatamente prima dell'applicazione.

Avvertenza: L'impiego del prodotto è consentito solo per le colture indicate in etichetta.
Per limitare l'insorgenza di ceppi fungini resistenti si consiglia di non usare il BAVISTIN da solo in modo continuativo ma di intervallare i trattamenti con altri fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione o di usarlo in miscela con i suddetti fungicidi.
Nelle zone o località ove si rilevi la presenza di ceppi resistenti ai benzimidazolici va evitato l'impiego di tali prodotti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il ®BAVISTIN è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi attualmente in commercio.
Il ®BAVISTIN è miscibile anche con urea, fertilizzanti fogliari quali Basfoliar 34, Hakaphos e Fetrilon-Combi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le porme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL FRUMENTO, PER LE ALTRE COLTURE 15 GIORNI PRIMA. MELO E PERO IN POST-RACCOLTA 15 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

2508

Graminon®

Diserbante selettivo dei cereali (frumento tenero e orzo)

Composizione
100 g di prodotto contengono:
45 g isoproturon (1(4-isopropil-fenil)-3,3-dimetilurea) puro pari a g 47 di prodotto tecnico al 96% di purezza
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III

**Attenzione:
manipolare con prudenza**

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2508 **del** 16.6.77
® marchio depositato

Caratteristiche
Agisce sulle infestanti per contatto fogliare e per assorbimento radicale.
È particolarmente efficace contro le più importanti infestanti graminacee, quali Avena selvatica, Alopecurus, Lolium, Poe, Apera e contro alcune infestanti dicotiledoni quali Matricaria e Stellaria.
È moderatamente efficace contro l'infestante Phalaris. Numerose infestanti dicotiledoni, invece, quali Papavero, Vicia, Sinapis, Raphanus, Veronica, Fumaria, Poligoni sono scarsamente sensibili.

Indicazioni
È indicato nelle applicazioni di post-emergenza per il diserbo chimico selettivo del frumento tenero e dell'orzo

Dosi e modalità d'impiego
kg 2,5 - 3 per ettaro, nella generalità dei casi
kg 4 per ettaro, in caso di notevoli infestazioni di Avena
Il prodotto va diluito in un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una uniforme distribuzione (normalmente 400 litri o più per ettaro).
Il trattamento si effettua in post-emergenza ossia nel periodo compreso tra la 3ª-4ª foglia e l'accestimento della coltura.
I trattamenti precoci, ossia quando le infestanti sono nei primi stadi di sviluppo, sono più efficaci.
In presenza di infestanti scarsamente sensibili, cioè la maggior parte delle dicotiledoni, è consigliabile la miscela con derivati ormonici (es. STAROX alla dose di 3-4 kg per ettaro).
Evitare superdosaggi ed accumuli della miscela erbicida.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il prodotto è miscibile con altri derivati ureici (es. Dicuran) e con derivati ormonici. « AVVERTENZA »: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità - I grani duri sono normalmente sensibili e pertanto se ne sconsiglia l'impiego. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg 5**

Paridol® T 20

Insetticida in soluzione emulsionabile. Agisce per asfissia, per contatto diretto e per ingestione su tutti gli stadi di sviluppo (adulti, larve ed uova) della maggior parte degli insetti dannosi alle piante da frutto, alla vite, alle colture orticole e floreali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
16 g metilparathion (0,0-dimetil 0-p-nitrofenil tiofosfato) puro
q.b. a 100 g coformulanti
« Contiene Xilolo »

Attenzione!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I•

VELENO

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)
Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2509 del 7-5-1977
® marchio registrato

Natura del rischio — Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali — Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego, usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico — *Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.*

Sintomi di intossicazione — *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici — *In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia;*
iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni — *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

Dosi d'impiego
100-125 g in 100 litri di acqua contro afidi, psille, tentredini, tingidi, tignole dell'uva, verme delle mele, capua.
150-200 g in 100 litri di acqua contro cydia molesta (tignola orientale del pesco), cocciniglie, tortricide o bega del garofano, larve di minatori (cemiostoma, nepticula), mosca della frutta.
250-300 g in 100 litri di acqua nei trattamenti di fine inverno alle piante da frutto in miscela con polisolfuri od olii minerali e contro le cocciniglie degli agrumi.

Da non impiegarsi con mezzi aerei

Compatibilità — Il PARIDOL T 20 è miscibile con Coprantol®, Cuman®, Aurocol®, olii minerali e polisolfuri. Le miscele con i polisolfuri sono poco stabili e pertanto devono essere adoperate subito dopo la loro preparazione.
« Avvertenza » - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero intossicazioni informale il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività — Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, per non meno di 20 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VERDERSI SFUSO

2574

I CLASSE TOSSICOLOGICA

CLASSE I^a

VELENO

COCCIFOS 20

Insetticida agricolo

Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Parathion tecnico (purezza 97-98%) pari a g. 19,40-19,60 di prodotto puro.
Gr. 35 olio minerale bianco R I. 90°%.
Sostanze emulsificanti e bagnanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 2574 **Ministero Sanità del** . [illegible] . . . . .

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

DOSI D'IMPIEGO

Il COCCIFOS 20 va impiegato, durante la vegetazione, contro i seguenti insetti, alle dosi accanto indicate:
— Cocciniglia bianca cotonosa degli agrumi e della vite; Biancarossa degli agrumi; Cocciniglia a virgola degli agrumi: gr. 250-300 in 100 lt. d'acqua.
— Cocciniglia bianca del gelso (Diaspis pentagona); Cocciniglia di S. José: gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua.
— Afidi o pidocchi delle piante; Tripidi (delle piante ornamentali): gr. 100 in 100 lt. d'acqua.

NORME D'IMPIEGO

Sciogliere la dose richiesta di COCCIFOS 20 in una uguale quantità di acqua ed agitare fino ad ottenere una emulsione omogenea.
Aggiungere quindi l'emulsione ottenuta alla restante quantità di acqua necessaria per portare a volume.
Per esempio per ottenere un ettolitro di soluzione allo 0,25% si sciolgono prima 250 gr. di COCCIFOS 20 in mezzo litro di acqua e dopo accurata agitazione, si aggiunge l'emulsione ai restanti 99 litri di acqua.
Per le irrorazioni sulle piante adoperare le comuni pompe a spalla o a motore.
Il trattamento di fine inverno va eseguito durante il riposo invernale delle piante — e cioè a gemme chiuse — comunque non oltre il primo inizio del rigonfiamento delle gemme.
Per il trattamento di fine inverno si scelgano giornate serene e possibilmente tiepide. In ogni caso le piante, al momento del trattamento, devono essere perfettamente asciutte.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il COCCIFOS 20 non è miscibile con prodotti a base di zolfo e con Karathane.
E' consigliabile che i trattamenti con zolfo e Karathane vengano effettuati separatamente e ad un intervallo di almeno 15 giorni dall'applicazione di COCCIFOS 20.
Avvertenza: in caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2581

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

BETACIL

Diserbante per barbabietola da zucchero e da foraggio

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 6,3 Lenacile (*) puro (purezza 98%) pari a gr. 6,42 di prodotto tecnico.
Gr. 37,5 Cicloato puro (purezza 98%) pari a gr. 38,26 di prodotto tecnico.
Sostanze inerti quanto basta a 100.

(*) Lenacil è il principio attivo del Venzar, prodotto dalla E.I. du PONT de NEMOURS Co. (Inc).

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

— Sintomi d'intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

— Consigli terapeutici:
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini.
Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

CARATTERISTICHE

Il BETACIL è un diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio, in grado di controllare le principali infestanti dicotiledoni e graminacee.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 2581 . Ministero Sanità del . 22.6.1977 . . .

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Dosi d'impiego: Kg. 8 per ettaro distribuiti con litri 600-800 di acqua per ettaro.

Impiegare la dose di Kg. 6 per ettaro nel caso di terreni filtranti (sabbiosi).

Il trattamento va effettuato **prima della semina della barbabietola**, su terreno ben preparato, sminuzzato, libero da zollosità e da residui vegetali.

Immediatamente dopo l'esecuzione del trattamento procedere all'incorporazione del prodotto nel suolo.

La migliore efficacia diserbante è legata ad un buon interramento.

L'interramento del prodotto deve essere effettuato alla profondità di cm. 5-7.

Per effettuare tale operazione è indicato l'impiego di un erpice. Fra i vari tipi di erpici consigliamo l'erpice a denti flessibili, oppure l'erpice a denti rigidi unito ad un erpice a denti snodati. Può essere altresí impiegato un erpice a denti effettuando 2-3 passaggi incrociati; oppure una zappa rotativa, facendo però attenzione che con tale attrezzatura il prodotto non venga interrato a profondità eccessiva.

Se possibile, effettuare la distribuzione dell'erbicida e l'interramento simultaneamente.

La semina della barbabietola può essere effettuata lo stesso giorno o essere ritardata di alcuni giorni.

E' preferibile effettuare la semina lo stesso giorno del trattamento al fine di evitare rischi connessi all'andamento stagionale avverso.

Nel corso dell'esecuzione del trattamento occorre mantenere la poltiglia costantemente agitata: utilizzare quindi attrezzature munite di agitatore meccanico.

Assicurarsi del perfetto funzionamento degli ugelli; mantenere costante la velocità di avanzamento nel campo ed evitare gli sgocciolamenti.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Disperdere la dose occorrente di BETACIL in poca acqua agitando vigorosamente fino a formare una poltiglia semiliquida senza grumi; versare la poltiglia nel volume totale di acqua, tenendo costantemente in funzione l'agitatore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Un terreno trattato, in caso di forzata risemina entro 4 mesi dall'esecuzione del trattamento erbicida, può essere riseminato solo con barbabietola.

AVVERTENZE

Lavare accuratamente il macchinario usato per la distribuzione del diserbante.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2582

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

DACOSTAR

Fungicida cupro-organico per colture ortive
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 19,8 rame metallico (sottoforma di ossicloruro tetraramico)
gr. 20 Clortalonil puro
Sostanze inerti q.b. a gr. 100

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gi indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **DACOSTAR** è un fungicida cupro-organico indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle piante. In sostituzione dei tradizionali sali e poltiglie rameiche (ossicloruro di rame, poltiglia bordolese).

Dosi d'impiego: gr. 400 per ettolitro d'acqua contro i seguenti parassiti:
— pomodoro: contro peronospora, alternariosi e septoria;
— patate: contro peronospora e alternaria;
— bietola: contro cercospora;
– septoria del sedano.

Per la preparazione della poltiglia stemperare la dose di prodotto in poca acqua sino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con: Karathane, Endofene, Zolone 25, Lannate 25, Redran PB 25, Dafene, Fosfene, Parafene, Kelthane MF.

Per quanto riguarda la miscela con Benlate o Sumifene, onde ottenere la migliore compatibilità è necessaria l'aggiunta del Bagnante Etaldyn.

Allo scopo si consigliano le seguenti modalità:

stemperare in acqua il **DACOSTAR**, indi versare nell'irroratrice già riempita per metà; aggiungere Etaldyn a gr. 50/hl, aggiungere il Benlate o Sumifene e portare a volume agitando.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2582 Ministero della Sanità del 7-5-1977

E/2

2584

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

R 6 ERRESEI DAC 60-8

Fungicida cupro-organico per la vite, fruttiferi,
olivo, colture industriali ortive e floreali.
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 60 Ossicloruro tetraramico al 50% di rame attivo (purezza 99%) pari a gr. 29,7 di rame puro.
Gr. 8 di Clortalonil puro (purezza 95-96%) pari a gr. 8,42-8,33 di prodotto tecnico.
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

L'**R 6 ERREREI DAC 60-8** è un fungicida cupro-organico indicato per la lotta contro malattie crittogamiche delle piante, in sostituzione dei tradizionali sali e poltiglie rameiche (ossicloruro di rame, poltiglia bordolese).

Dosi d'impiego: gr. 400 per ettolitro d'acqua contro i seguenti parassiti: peronospora della vite; occhio di pavone e lebbra dell'olivo; ticchiolatura del melo e del pero; bolla e vaiolo del pesco e del mandorlo; peronospora, alternariosi e septoria del pomodoro; peronospora e alternaria delle patate; cercospora della bietola; septoria del sedano; ramulariosi e ruggine del garofano; mal secco e allupatura degli agrumi.

Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose di **R 6 ERRESEI DAC 60-8** in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua corrente.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 2584 **Ministero Sanità del** 22.6.77 . . . .

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi formulati in polvere bagnabile.

Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide. Non si consiglia l'impiego di bagnanti adesivanti.

Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piú lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piú tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo. (Abbondanza « Belford » - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Goolden Delicious - Gravenstein - Jonathan) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2585

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

FOSFOIL 20

Insetticida agricolo
Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Parathion tecnico (purezza 97-98%) pari a g. 19,40-19,60 di prodotto puro.
Gr. 35 olio minerale bianco R.I. 90%.
Sostanze emulsificanti e bagnanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2585 **Ministero della Sanità del** 22.6.77

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

DOSI D'IMPIEGO

Il FOSFOIL 20 va impiegato, durante la vegetazione, contro i seguenti insetti, alle dosi accanto indicate:
- Cocciniglia bianca cotonosa degli agrumi e della vite; Biancarossa degli agrumi; Cocciniglia a virgola degli agrumi: gr. 250-300 in 100 lt. d'acqua.
- Cocciniglia bianca del gelso (Diaspis pentagona); Cocciniglia di S. José: gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua.
- Afidi o pidocchi delle piante; Tripidi (delle piante ornamentali): gr. 100 in 100 lt. d'acqua.

NORME D'IMPIEGO

Sciogliere la dose richiesta di FOSFOIL 20 in una uguale quantità di acqua ed agitare fino ad ottenere una emulsione omogenea.
Aggiungere quindi l'emulsione ottenuta alla restante quantità di acqua necessaria per portare a volume.
Per esempio per ottenere un ettolitro di soluzione allo 0,25% si sciolgono prima 250 gr. di FOSFOIL 20 in mezzo litro di acqua e dopo accurata agitazione, si aggiunge l'emulsione ai restanti 99 litri di acqua.
Per le irrorazioni sulle piante adoperare le comuni pompe a spalla o a motore.
Il trattamento di fine inverno va eseguito durante il riposo invernale delle piante — e cioè a gemme chiuse — comunque non oltre il primo inizio del rigonfiamento delle gemme.
Per il trattamento di fine inverno si scelgano giornate serene e possibilmente tiepide. In ogni caso le piante, al momento del trattamento, devono essere perfettamente asciutte.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il FOSFOIL 20 non è miscibile con prodotti a base di zolfo e con Karathane.
E' consigliabile che i trattamenti con zolfo e Karathane vengano effettuati separatamente ed un intervallo di almeno 15 giorni dall'applicazione di FOSFOIL 20.

Avvertenza: in caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

COCCIFOS 3

Insetticida agricolo a base di olio bianco di paraffina e parathion per trattamenti invernali e primaverili ai fruttiferi e colture ornamentali.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 3 Parathion puro (purezza (97-98%) pari a gr. 3,09-3,06 di prodotto tecnico.
Gr. 83 olio minerale bianco R.I. 90%.
Sostanze disperdenti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n2586 **Ministero Sanità del** 22.6.1977 . . . . .

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN FRUTTICOLTURA:
Pomacee e drupacee al risveglio vegetativo: contro l'Aspidiotus Perniciosus parzialmente contro la Diaspis Pentagona, contro le uova svernanti di Afidi e Lepidotteri a Kg. 1,3-1,5 per hl.
Drupacee nel periodo estivo: contro la Diaspis Pentagona in corrispondenza della fuoriuscita delle Neanidi di prima e seconda generazione a gr. 400-700 per hl.

IN VITICOLTURA:
Al risveglio vegetativo contro le Cocciniglie a kg. 1,3-1,5/hl.

IN AGRUMICOLTURA:
Contro le Cocciniglie in genere nel periodo maggio-agosto a Kg. 1 per hl.

IN FLORICOLTURA:
Contro le Cocciniglie (Aspidiotus Hederae, Parlatoria Pergandei, la Bianca Rossa, l'Aonidiella Perniciosa, l'Aulacaspis rosae e la Cocciniglia bianca) a Kg. 1,5-2 per hl.

MODALITA' D'IMPIEGO

La poltiglia di COCCIFOS 3 si prepara sciogliendo il prodotto in poca acqua indi si porta a volume aggiungendo la rimanente acqua e tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il COCCIFOS 3 non è miscibile con prodotti a base di zolfo e con Karathane.
E' consigliabile che i trattamenti con zolfo e Karathane vengano effettuati separatamente e ad un intervallo di almeno 15 giorni dall'applicazione di COCCIFOS 3.
Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

• **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti Ogni altro uso è pericoloso •.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

2587

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

FITOFOS

Insetticida agricolo
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 15 Parathion puro (purezza 97-98%) pari a gr. 15,48 - 15,30 di prodotto tecnico
Sostanze inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici

Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.

Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n 2587 Ministero Sanità del 22.6.1977

PRINCIPALI IMPIEGHI

Dosi: gr. 300-450 per ettolitro d'acqua.

IN FRUTTICOLTURA
Contro Antonomo, Tingidi, Carpocapsa, Cydia, Lepidotteri minatori, Afidi, Cocciniglia di S. Josè, Mosca della frutta, Diaspis pentagona (generazioni estive).

IN VITICOLTURA:
Contro Piralide, Tignole dell'uva, Altica, Cocciniglia bianca cotonosa.

IN OLIVICOLTURA:
Contro Tignola, Cocciniglie, Fleotribo, Cotonello, Rinchite, Cimice.

IN ORTICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI
Contro Afidi, Tripidi, Altiche, Meligete del colza, Coleotteri fillofagi.

IN AGRUMICOLTURA
Contro Afidi, Cocciniglie, Mosca, Tripidi, Tignola, Cicalina.

IN FLORICOLTURA
Contro Afidi, Tripidi, Mosche bianche, Bega del garofano.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il FITOFOS, nella dose occorrente, va versato in poca acqua, agitando la miscela con un bastone; si aggiunge quindi altra acqua, sempre agitando, fino al volume richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscelabile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

2588

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

LUMACHICIDA GRANULARE 5

Specifico per la lotta contro le lumache

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 5 Metaldeide pura (purezza 97-98%) pari a gr. 5,15-5,05 di prodotto tecnico.
Sostanze organiche quanto basta a 100.

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle..

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— *Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.*
— Sintomi d'intossicazione:
Violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio.
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina - diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e derivati in caso di torpore.

CARATTERISTICHE

Il LUMACHICIDA GRANULARE 5 agisce contro tutte le lumache (con o senza guscio).

Il LUMACHICIDA GRANULARE 5 è appetito dai molluschi dei quali provoca la morte anche se ingerito in piccole quantità; esso presenta inoltre il vantaggio di facile e pratico impiego.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Gr. 300 ogni 100 mq. su terreni molto infestati e in genere negli orti, giardini, serre.

Gr. 100 ogni 100 mq. in pieno campo e in genere su terreni poco infestati. Distribuire il prodotto uniformemente a spaglio su tutta la superficie da disinfestare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto viene impiegato da solo.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 2588 **Ministero della Sanità del** 22.6.1977

Contenuto netto Kg.

2589

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

LUMACHICIDA GRANULARE B.P.D.

SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LE LUMACHE

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 7 Metaldeide pura (purezza 97-99%) pari a gr. 7,21-7,07 di prodotto tecnico.
Sostanze organiche quanto basta a 100.

NATURA DEL RISCHIO: Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— *Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.*

— Sintomi d'intossicazione:
Violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto di latte cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate e glucosate con noradrenalina - diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e derivati in caso di torpore.

CARATTERISTICHE

Il LUMACHICIDA GRANULARE B.P.D. agisce contro tutte le lumache (con o sena guscio).

Il LUMACHICIDA GRANULARE B.P.D. è appetito dai molluschi dei quali provoca la morte anche se ingerito in piccole quantità; esso presenta inoltre il vantaggio di facile e pratico impiego.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Gr 200 ogni 100 mq. su terreni molto infestati e in genere negli orti, giardini, serre.

Gr. 80 ogni 100 mq. in pieno campo e in genere su terreni poco infestati. Distribuire il prodotto uniformemente a spaglio su tutta la superficie da disinfestare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto viene impiegato da solo

Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 2589 **Ministero della Sanità del** 22.6.1977

Contenuto netto Kg.

2591

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

DELFOS 25 PB

Insetticida polivalente a base di Metil-Parathion contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore.
Agisce per ingestione, contatto ed asfissia
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 25 Metilparathion tecnico (purezza minima 95%) pari a gr. 23,75 minimo di prodotto attivo puro.
Sostanze coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n.2591 Ministero Sanità del . 22.6.1977 . . . . .

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:
scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare.

Consigli terapeutici
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti e 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Iniezioni endovenose lente di PAM (0,50 g. ogni 3 ore fino a 3 g.) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni
Morfina - Vitamina B. 1 - Coramina - Latte e grassi.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN FRUTTICOLTURA:
Contro Psilla, Carpocapsa, Cydia molesta, Lepidotteri minatori, Antonomo, Tingidi, Afidi in genere, Tentredini, Mosca della frutta, Cocciniglia di S. Josè, Diaspis Pentagona (Generazioni estive), Zeuzera, Cossus.

IN VITICOLTURA:
Tignola dell'uva, Altica della vite, Cocciniglia Cotonosa.

IN OLIVICOLTURA:
Contro le Tignole, il Cotonello, il Rinchite, la Cocciniglia, il Fleotribo (tarlo) la Cimice.

IN AGRUMICOLTURA:
Contro gli Afidi, le Cocciniglie, lo Pseudococco, la Mosca della frutta Tripidi, le Tignole, la Cicalina.

IN ORTICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI:
Contro Afidi, Tripidi, Altiche delle crocifere, Meligete del colza, Coleotteri fillofagi.

IN FLORICOLTURA:
Contro Afidi, Tripidi, Bega del garofano.
Dosi: gr. 200-300 per ettolitro di acqua.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il **DELFOS 25 PB** può essere versato direttamente nel quantitativo di acqua necessario, avendo cura di agitare bene durante la preparazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il **DELFOS 25 PB** è miscibile con tutti gli anticrittogamici e insetticidi della nostra gamma di produzione: non è compatibile con Poltiglia Bordolese e Solfocalcica e Arsenati di calce e zinco.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api, gli animali domestici, i pesci, i volatili, la selvaggina ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2615

VITAVAX - 30T®

FUNGICIDA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI

CLASSE III

ATTENZIONE! Manipolare con prudenza

Composizione: gr 100 di prodotto contengono

- Carboxin puro gr 30
- Thiram puro gr 30
- Bagnanti, disperdenti q.b. a 100

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Evitare di respirare i vapori

Avvertenza: Durante la manipolazione del prodotto si dovranno usare occhiali protettivi date le proprietà irritanti

Informazioni per il medico:

Sintomi d'intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite

Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite ecc.)

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente, se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per la irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

Caratteristiche:

Il VITAVAX-30T è un fungicida sistemico impiegato per la concia delle sementi di cereali: frumento, orzo, avena, mais, sorgo. Il prodotto unisce all'azione sistemica dovuta alla carboxina quella per contatto dovuta al thiram. Il VITAVAX-30T è particolarmente efficace nei confronti del carbone volante del frumento (*Ustilago tritici*), dell'orzo (*U. nuda*), dell'avena (*U. avenae*) e di tutte le altre specie di carboni che attaccano i semi dei cereali. Il prodotto risulta efficace contro tutte le varie specie di carie del frumento (*Tilletia tritici, T. foetida, T. controversa*) e di altri cereali, e contro l'*Helminthosporium gramineum* dell'orzo e l'*H. maydis* del mais.

Il VITAVAX-30T permette anche un controllo soddisfacente nei confronti del *Fusarium graminearum* dei cereali.

Dosi e modalità d'impiego:

Per 100 Kg di seme si impiegano le seguenti dosi:

- frumento, orzo, sorgo, mais gr 250 - 300
- avena gr 150 - 200

Il trattamento può essere effettuato a secco, mescolando direttamente la polvere con il seme da conciare nel modo più uniforme, oppure con il sistema « slurry ». In questo secondo caso, al prodotto si aggiunge la quantità di acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: Il VITAVAX-30T è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di nocività: È nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. È tossico per i pesci.

« Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ». Il seme trattato deve essere impiegato esclusivamente per la semina, non deve essere quindi riutilizzato per l'alimentazione dell'uomo, degli animali domestici, del bestiame e della selvaggina.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

UNIROYAL

UNIROYAL CHIMICA S.p.A.
Via delle Industrie, 40
04013 LATINA SCALO

REGISTRAZIONE N. 2615 DEL 2 LUGLIO 1977 DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Officina di produzione: S.A.R.I.A.F. - Via S. Silvestro, 1 FAENZA

*** Marchio Registrato Soc. UNIROYAL INC. - New York (USA)**

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO DELLA CONFEZIONE: KG 0,125**

261

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

DACONIL* 75

Fungicida organico per fruttiferi, vite, grandi colture, colture ortive, colture ornamentali.
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 75 di Clortalonil puro (pari a gr. 78,95-78,3 di prodotto tecnico al 95-96%)
Sostanze inerti quanto basta a 100.

* Marchio registrato dalla DIAMOND SHAMROCK CHEMICAL Co. - Cleveland - Ohio - U.S.A.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il DACONIL 75 è un efficace fungicida organico ad ampio campo d'azione, dotato di resistenza al dilavamento ed attività residua.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

FRUTTIFERI: contro Ticchiolatura e Oidio del pero, del melo e del pesco, alla dose di gr. 100-150 per ettolitro; contro Bolla, Corineum, Cancro dei rametti del pesco, alla dose di gr. 200-250 per ettolitro; contro Botrytis, Sclerotina, Monilia dei fruttiferi alla dose di gr. 200 per ettolitro.

VITE: contro Peronospora, Botrytis, Oidio, alla dose di gr. 150-250 per ettolitro.

COLTURE ORTIVE: Cavoli, contro Peronospora e Alternaria kg. 1,6-1,7 per ha.; carote, contro Alternaria e Cercospora kg. 1,6-2,2 per ettaro; cetrioli, contro Antracnosi e Peronospora kg. 1,6-2,2 per ettaro, contro Alternaria, Ticchiolatura, Oidio kg. 2,2-3,3 per ettaro, contro Rizoctonia kg. 3,3 per ettaro; meloni, contro Antracnosi e Peronospora kg. 1,6-2,2 per ettaro, contro Alternaria, Cercospora, Ticchiolatura, Oidio kg. 2,3-3,3 per ettaro; sedano, contro Septoria, Cercospora, Rizoctonia, kg. 2,2-3,3 per ettaro.

POMODORO: contro Stemphilium, Alternaria, Peronospora kg. 1,6-2,2 per ettaro; contro Antrocnosi kg. 2,2-3,3 per ettaro; contro Septoria, Rizoctonia, Botrytis kg. 3,3 per ettaro.

PATATA: contro Alternaria, Septoria, Botrytis 1,1-1,6 per ettaro.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora kg. 1,6-2,2 per ettaro.

MAIS: contro Helmintosporium, kg. 1,6-2,2 per ettaro.

ARACHIDI: contro Cercospora, Ruggine, kg. 1,6 per ettaro.

COLTURE ORNAMENTALI: contro Ruggini, Black spot della rosa, Botrytis: dose gr. 200 per hl. Contro Oidio: dose gr. 300 per hl.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Aggiungere al prodotto un volume doppio o triplo di acqua mescolando sino ad ottenere una pasta omogenea. Aggiungere acqua sino a rendere abbastanza fluida tale pasta: versarla nel serbatoio dell'irroratrice e, continuando a mescolare, portare a volume.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

IL DACONIL 75 è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi formulati in polvere bagnabile. Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide.

Non si consiglia l'impiego di bagnanti adesivanti.

Avvertenza: in caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per varietà di melo del gruppo Golden e per alcune altre a buccia rossa (Stark Delicious, Red Delicious, Imperatore) sulle quali può produrre rugginosità.

Non trattare le colture floreali durante la fioritura: su quelle più delicate, eseguire saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Conservare il prodotto nell'imballo originale chiuso, in luogo asciutto e fresco.

Tenere lontano dal fuoco.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Peso netto Kg.

Reg. n. 2618 **Ministero della Sanità del** 2.7.77

2635

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ROUNDUP® RAVIT

Diserbante per frutteti (meli e peri), vigneti, agrumenti, stoppie di cereali ed incolti (ripe, scoline, strade, sedi ferroviarie, depositi ed impianti industriali), efficace su malerbe annuali e perennanti.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30,4 **GLIPHOSATE** acido puro
(da sale isopropilamminico)
Inerti q. b. a 100

Il contenuto di **GLIPHOSATE** acido equivalente è corrispondente a 360 gr./litro ed è pari a gr. 41 di **GLIPHOSATE** sale isopropilamminico per 100 gr. di prodotto.

Marchio depositato Monsanto Co. (U.S.A.)

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gl indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un diserbante di post-emergenza efficace sulle infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali e perenni (Gramigna, Sorghetta, Cipero, Vilucchio). Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennati, che vengono pure devitalizzati.

Il **ROUNDUP - RAVIT** è rapidamente disattivato a contatto con il terreno; quindi, la presenza del prodotto nel terreno non causa alcun danno alle colture perenni come meli, peri, viti e agrumi.

Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è necessario prima o dopo il trattamento con il **ROUNDUP - RAVIT**, intervenire con un erbicida ad azione persistente sul terreno (es. Simazina, Diuron), per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del **ROUNDUP - RAVIT**.

L'effetto visivo dell'azione del **ROUNDUP - RAVIT** consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduali che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali e logicamente è caratterizzata da una certa lentezza dovuta all'azione svolta in profondità dall'erbicida.

MODALITA D'IMPIEGO

Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo circa 300-500 litri di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare inutili perdite per gocciolamento.

Diserbo selettivo della vite, del melo, del pero e degli agrumi:

I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.

Le dosi di impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione delle specie delle infestanti presenti:
3-5 lt/ha: contro la maggior parte delle erbe annuali,
4-5,5 lt/ha: contro Sorghum halepense, Apropyrum repens, Ranunculus spp.;
5,5-7 lt/ha: contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris, Pontetilla spp. Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp. e Felci.

Contro il **Cyperus rotundus** per ottenere un risultato più duraturo si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5,5 lt/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 lt/ha;

8-10 lt/ha: contro **Convolvolus arvensis** ben sviluppato (inizio fioritura), **Cynodon dactylon, Urtica spp., Daucus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannucce** (alte 50-80 cm. preferibilmente durante la fioritura);

10-12 lt/ha: contro **Convolvolus arvensis** all'inizio dello sviluppo lungo almeno 30 cm.)

NOTE IMPORTANTI

Impiegare pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di dimensioni grosse. Evitare durante i trattamenti formazione di deriva e di goccioline polverizzate, che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.

Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante.

Non bagnare il tronco, specialmente se non ben lignificato o con ferite.

Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi, che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se si irrorano viti o fruttiferi con forme di allevamento basse.

Il trattamento con erbicida residuale integrativo contro erbe provenienti da seme va eseguito

in vigneti e frutteti (meli e peri): in autunno o in primavera;

negli agrumenti: in inverno o prima dell'irrigazione estiva, su terreno privo di infestanti o lavorato.

Si possono impiegare Simazina, Diuron alle dosi prescritte.

Non impiegare il prodotto in miscela con l'erbicida residuale.

Diserbo delle stoppie di cereali. Impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia dopo una coltura (in estate o in autunno), sia prima della coltura (in primavera); in questo secondo caso la lavorazione del terreno e la semina possono essere effettuate 2-3 settimane dopo il trattamento. Su Sorghetta alta 30-40 cm. usare una dose di 5,5 lt/ha, mentre se l'infestante è all'inizio della fioritura usare 4 lt/ha di **ROUNDUP - RAVIT.**

Diserbo totale degli incolti (ripe, scoline, strade, sedi ferroviarie, depositi ed impianti industriali): le dosi e le modalità di impiego sono quelle precedentemente indicate per ogni specie di erba infestante. Per ottenere anche un duraturo controllo delle infestanti provenienti da seme è necessario far seguire in autunno-inverno o su terreno privo di infestanti, l'uso di un diserbante residuale (es. Simazina, Diuron). Nel caso la vegetazione da distruggere fosse molto alta e densa, usare sino a 1000 lt/ha di acqua, evitando sempre la deriva e che l'irrorato giunga su colture vicine.

Avvertenze:
le piogge, che cadono entro sei ore dall'applicazione, riducono l'efficacia del prodotto. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria, facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto, purché le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento, alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura od in uno stadio più avanzato.

Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo.

Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2-3 settimane, prima di procedere a lavorazione del terreno. Fra trattamenti con erbicidi residuali ed applicazioni del prodotto lasciar intercorrere almeno 1-2 settimane.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare la confezione prima dell'uso. Diluire in poca acqua a parte la dose prestabilita di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

Avvertenze:
non impiegare per la conservazione, miscelazione o distribuzione del prodotto contenitori galvanizzati (es. zincati) o di acciaio, non protetti da apposite vernici: si potrebbe sviluppare un gas molto infiammabile, pericoloso in presenza di fiamma (es. sigaretta accesa). Non lasciare a lungo nelle irroratrici la miscela preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non aggiungere bagnanti o prodotti antischiuma. Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto di tutte le colture agricole. Irrorare il prodotto con pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere), evitare formazione di deriva e, se si irrorano vigneti o frutteti allevati bassi, usare ugelli schermati da coni o apparati protettivi. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe ed i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

mali domestici e bestiame
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, ani-

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato »

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2635 Ministero della Sanità del 2-7-1977

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto litri

E/2

264

Supracid® 20 E

Soluzione Emulsionabile
Insetticida agricolo per frutticoltura, agrumicoltura, orticoltura, floricoltura e colture industriali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
19 g metidathion (0,0-dimetil-S-(2-metossi)-1,3,4-tiadiazol-5 (4H)-onil-(4)-metil)-ditiofosfato) puro
q.b. a 100 g coformulanti (contiene xilolo)

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I•

VELENO

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2644 del 7-9-1977
® marchio registrato

Natura del rischio — Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali — Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego, usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico — Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione — Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici — In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia;
iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Assciare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni — Morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

Caratteristiche
SUPRACID 20 E agisce per contatto e ingestione e penetra nei tessuti vegetali uccidendo gli insetti annidati nei frutti (es. Carpocapsa, Rhagoletis) o riparati nelle foglie accartocciate (es. Afidi, Cecidomie, Cacoecia).
Pertanto il SUPRACID 20 E risulta efficace nella lotta contro i seguenti parassiti:
Cocciniglie (Diaspis pentagona, Aspidiotus sp., Coccus oleae, Chrysomphalus dictyospermi, Pseudococcus, sp.);
Lepidotteri tortricidi (Cacoecia rosana, Cacoecia pronubana, Capua reticulana);
Lepidotteri minatori (Cemiostoma, Nepticula). Altri Lepidotteri (Carpocapsa pomonella, Tignole);
Psille (P. pyrisuga, P. pyricola);
Ditteri fitofagi (Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi);
Coleotteri; Dorifora (Leptinotarsa decemlineata); Cleono (Cleonus mendicus), Lixus junci, Altiche;
Afidi verdi e lanigeri (Aphis pomi, Macrosiphum solani).

Dosi d'impiego

160-300 g in 100 litri di acqua a seconda dei parassiti.
Diluire il SUPRACID 20 E in poca acqua, alle dosi sopra indicate e versare l'emulsione ottenuta nella restante quantità d'acqua, mescolando accuratamente.

Da non impiegarsi con mezzi aerei.

Compatibilità — Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a carattere spiccatamente alcalino. «Avvertenza»: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità — Si sconsigliano trattamenti al pesco dopo la ripresa vegetativa per la sensibilità riscontrata in alcune varietà.

Rischi di nocività — Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, per non meno di 20 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

2653

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ZEAVIT

Diserbante selettivo per il mais
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 Atrazina pura (purezza 95-97%) pari a gr. 52,63-51,54 di prodotto tecnico.
Sostanze inerti quanto basta a 100.

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Lo **ZEAVIT** agisce sulle infestanti per contatto e soprattutto per assorbimento radicale. La sua azione è favorita e resa piú immediata da un giusto grado di umidità del terreno o da opportune irrigazioni nei casi di prolungata siccità.

Lo **ZEAVIT** è attivo contro le principali infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali: giavoni, amaranti, farinaccio, persicaria, poa, ortica, erba porcellana, stellaria, capsella, erba morella, geranio, mercurella, veronica, piantaggine, matricaria.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato in primavera, in pre-emergenza della coltura, alla dose di kg. 4 di **ZEAVIT** per ettaro, distribuiti con 400-1000 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare lo **ZAVIT** in poca acqua, versare la poltiglia nel serbatoio dell'irroratrice e indi aggiungere l'acqua occorrente agitando energicamente.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Impiegare comuni irroratrici a pressione costante munite di agitatore meccanico: il liquido erbicida deve essere sempre ben agitato per evitare depositi.

Stabilire con esattezza il volume di acqua da distribuire che non deve mai essere inferiore a lt. 400 per ettaro, per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona penetrazione dell'erbicida nel terreno.

Eseguire le applicazioni in preferenza su terreno già umido o che potrà ricevere la necessaria acqua da pioggie o irrigazioni.

Il trattamento può anche effettuarsi localizzato sulle file di semine per una larghezza di cm. 30 riducendo il 1/3 la dose di prodotto. Tale trattamento potrà farsi in terreni non soggetti a forti inerbimenti.

Prima del trattamento di **ZEAVIT**, per ottenere buoni risultati erbicidi, occorrerà che il terreno sia ben preparato e non zolloso.

Le eventuali sarchiature meccaniche per la rimozione della crosta superficiale del terreno non dovranno superare i 4-5 cm. di profondità per conservare l'effetto erbicida residuo.

Tale effetto residuo si protrae per tutto il periodo del ciclo colturale del mais, qualora non si intervenga con rincalzature.

La scarsità o il ritardo di piogge richiede in misura maggiore, nel periodo estivo, l'ausilio delle irrigazioni per ottenere il miglior effetto erbicida.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con olio bianco con erbicidi quali Alachlor e 2,4 D.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piú lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piú tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento ed almeno di 10 mesi per le altre colture (esempio: bietole e tabacco).

Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

I terreni coltivati a mais e trattati con **ZEAVIT**, non consentono la consociazione con colture ortive, da foraggio, od arboree (legumi, crucifere, pioppi).

Non impiegare dosi di **ZEAVIT** superiori a quelle consigliate che potrebbero compromettere colture in rotazione.

Evitare passaggi ripetuti della irroratrice su porzioni di terreno.

Lavorare il terreno con aratura profonda (30-35 cm.) all'epoa della raccolta del mais, prima di far seguire le colture di avvicendamento.

Non è necessario periodo di carenza in quanto il prodotto viene impiegato in pre-emergenza.

AVVERTENZA

L'efficacia dello **ZEAVIT** è ridotta dalla presenza di sostanza organica in quantità molto elevata: non è consigliabile trattare su terreni torbosi.

Nel caso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2653 **Ministero della Sanità del** 10.8.78

Contenuto netto Kg.

26

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

MITEX F

Acaricida
Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr 29,70 Fenson puro
Gr 19,20 Protoato puro
Sostanze solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione, contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Scialorrea, vomito, dolori addominali, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsione, edema polmonare.

Consigli terapeutici:
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg per adulti e 0,2 - 1 mg per bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione;
una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersioni con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

TERAPIA SINTOMATICA RIANIMATORIA.

Alcune controindicazioni:
La morfina, l'alcool, sostanze grasse, latte e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

CARATTERISTICHE

Il **MITEX F** è efficace contro uova estive, ninfe e adulti di tutte le specie di acari che infestano: piante da frutto (meli, peri, peschi), viti, agrumi, cotone, pomodori, piante ortive (carciofo, cipolla, aglio, porro, asparago, cavolo, cavolfiore, cocomero, cetriolo, zucchino, fragola, insalate (lattuga, indivia, radicchio), bieta, patata, pisello, fagiolo, fagiolino, fava, peperone, melanzana, sedano, carota, finocchio, spinacio e melone), fiori in pieno campo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Dosi d'impiego: gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua.
Aggiungere il **MITEX F** nella dose occorrente, a poca acqua e, dopo aver agitato, versare l'emulsione ottenuta nella quantità di acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.
Irrorare l'emulsione sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore curando una perfetta nebulizzazione, in modo da bagnare entrambe le pagine delle foglie.
E' consigliabile l'aggiunta di 10-20 gr. di Bagnante Adesivo Liquido 2 per ettolitro di emulsione pronta per l'uso.
Alla dose di gr. 150 in 100 lt. d'acqua il **MITEX F** agisce anche contro gli afidi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscelabile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

Reg. n. 2674 **Ministero della Sanità del** 7.6.1982

E/2

2675

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

FITOFOS POLVERE

Insetticida agricolo per trattamenti a secco

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 2 Parathion puro (purezza 97-98%) pari a gr. 2,06 - 2,04 di prodotto tecnico.
Sostante diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Evitare di respirarne i vapori.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.

Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).

In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

Il FITOFOS POLVERE a base di Parathion agisce contro gli insetti per azione di contatto, di ingestione e di asfissia. Esso è indicato per la lotta contro Afide verde del melo, Afide verde farinoso del pesco e del susino, Afide lanigero o pidocchio sanguigno, altri afidi delle piante arboree ed erbacee.

Tripidi (delle piante ornamentali e dell'olivo), Mosca delle ciliege, Mosca della frutta, Cimici delle piante, Apione dei medicai, Tignole della vite, Altica del lino, Altica e Cassida delle bietole.

MODALITA' D'IMPIEGO

Applicare la polvere insetticida sulle piante infestate a mezzo di comuni soffietti o solforatrici (a mano, a zaino, a motore), distribuendo gr. 200-400 di insetticida per ara (100 mq).

Scegliere per i trattamenti giornate non ventose e aver cura che la polvere insetticida rivesta di un sottile velo tutte le parti delle piante da difendere o disinfestare dai parassiti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscelabile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

Reg. N. 2675 - Ministero Sanità del 10.8.1978

E/2

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ACTRIL® M

Erbicida selettivo per cereali

® marchio registrato della

Societè des Usines Chimiques

Rhone - Poulenc - Paris

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 11,7 Ioxynil puro.
gr. 29,2 Mecoprop puro da sale sodico.
Emulsionanti e bagnanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccesibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione e contatto cutaneo.

SINTOMATOLOGIA

Casi lievi
Calore, sudorazione intensa, vasodilatazione, volto arrossato, astenia.

Casi gravi
Astenia, sudorazione profusa, ipersclalorrea, vomito, cianosi labiale, iperpiressia, tremori, disturbi del ritmo cardiaco, ipotensione, cefalea, vertigini, irrequietezza, convulsioni, edema polmonare.

Terapia

In caso di contatto lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone. Se presente forma eczematosa applicare pomate al cortisone. In caso di ingestione: lavanda gastrica con carbone assorbente. La lavanda gastrica è controindicata se esistono convulsioni; in tale caso, se si vuole praticare la lavanda gastrica, il paziente va intubato e va iniziata la terapia a base di anticonvulsivanti. Ossigeno al bisogno. In caso di iperpiressia non somministrare antipiretici ma raffreddare il paziente senza mezzi farmacologici. Eseguire ECG ed eventuale correzione del disturbi del ritmo.

Eseguire controllo degli elettroliti e pH ematico per una eventuale correzione. Se presenti convulsioni iniziare il trattamento con sedativi (clorazepam); qualora non si ottenessero risultati somministrare Na-thiopental 2,5% e.v.

Somministrare liquidi e.v. per facilitare l'escrezione del prodotto. Nel casi gravi ricovero urgente in Centro di rianimazione.

APPLICAZIONE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Sensibilità delle malerbe: **ACTRIL M** agisce in post-emergenza per contatto e per sistemicità sui germogli delle Dicotiledoni annuali, tra cui: Borsa di pastore, Cerastio, Feccia, Dolcimele, Migliarino, Camomilla comune, Papavero, Ranuncolo strisciante, Stella d'oro, Renaiolo, Budellina, Centocchio, Paperina, Veccia, Cristantemo, Bifora, Fumaria.

Dosi: sui cereali (frumento tenero e duro, orzo segale avena) primaverili e invernali dallo stadio di accestimento (4-5 foglie) fino all'inizio della levata (massimo 2 nodi), alla dose di 2,5-3 litri per ettaro, distribuiti con almeno 500 litri di acqua.

Preparazione della miscela: **ACTRIL M** si scioglie istantaneamente nell'acqua: agitare per qualche minuto onde rendere la soluzione omogenea.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con TOLKAN.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo ».

« Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è tossico per le colture Dicotiledoni annuali e perennanti sensibili (per esempio tabacco, pomodoro, fagiolo, vite). Perciò effettuare il trattamento in modo da evitare che lo spruzzo raggiunga le stesse colture attigue ai cereali.

Per evitare che il prodotto produca danni alle colture più sensibili (viti, alberi da frutta, colture orticole, vivai, lino, colza, tabacco, leguminose) debbono essere osservate le seguenti precauzioni:
— Adoperare pompe irroratrici a bassa o media pressione.
— Trattare con aria ferma, senza vento.
— A lavoro ultimato lavare gli utensili usati con acqua calda e soda e risciacquare con acqua.

NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e per il bestiame.

AVVERTENZE

Trattare in presenza di luce e con temperatura superiore a 10 gradi.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 30 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 2680 Ministero della Sanità del 18-10-1977

Contenuto netto litri

7/82

2685

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

ERBOGIL S

Permette di diserbare i cereali da quando hanno emesso la terza, quarta foglia, fino alla fine della levata

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 20 di Dinoterb tecnico (purezza 95% pari a gr. 19 di prodotto puro).
emulsionanti e disperdenti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. N.2685: Ministero Sanità del .18.10.77. . . .

E/1

Natura dei rischi:
Rischio d'intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva)
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, per ingestione o per assorbimento attraverso la pelle.

— Sintomi d'intossicazione:
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psico motoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia, colorazione gialla delle sclere, la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% od iposolfito di sodio al 5%, emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda, trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale, ossigeno, respirazione artificiale. E' controindicata l'atropina.

CARATTERISTICHE

Si impiega su tutti i cereali, anche quelli sensibili ai diserbanti ormonici grano, orzo, avena, segale
Distrugge tutte le infestanti dicotiledoni annuali, comprese quelle resistenti al 2,4 D ed MCPA anche in fase di avanzato sviluppo. Camomilla, Stellaria, Margherita delle messi, Fumaria, Geranio, Caglio, Canapeccio, Viola, Falso convolvolo, Poligono comune.
E' di facilissimo impiego perché si diluisce rapidamente in acqua.
Permette una migliore utilizzazione dei fertilizzanti eliminando la concorrenza delle infestanti.

MODALITA' ED EPOCA D'IMPIEGO

Mettere la quantità necessaria di Erbogil S in un recipiente.
Diluire in un volume doppio o triplo d'acqua.
Versare la miscela così ottenuta nell'apparecchio di distribuzione in corso di riempimento. Portare a volume agitando.
Tanto in semina autunnale, quanto primaverile le applicazioni possono essere fatte dal momento in cui i cereali sono alla terza foglia fino alla fine della levata. Anche con infestanti in stadio avanzato di sviluppo.
Eseguire il trattamento in giornate tiepide, prive di vento, quando non c'è pericolo di piogge imminenti, in ogni caso su vegetazione asciutta.
Nel caso di cereali che servano di copertura alle leguminose, trattare almeno 15 gg. prima della semina delle leguminose stesse osservando sempre le condizioni generali di impiego.
Non trattare cereali se presentano radici scoperte (terreni mal livellati). In questo caso procedere ad una rullatura e, non meno di 15 gg. dopo procedere al diserbo. Non trattare mai dopo un rullaggio, un'erpicatura o dopo le nitratature (le concimazioni possono farsi immediatamente dopo il trattamento).
Variare la pressione della pompa e la quantità d'acqua in rapporto allo sviluppo maggiore o minore della vegetazione.

DOSI E CONDIZIONI D'IMPIEGO

Tanto per i cereali a semina autunnale, quanto per i cereali a semina primaverile, applicare l'Erbogil S alla dose di 3,5-4,5 kg/ha con un quantitativo d'acqua variante fra i 500/800 lt/ha.
Le dosi superiori, sia di prodotto che d'acqua devono essere impiegate quando il prodotto viene applicato su infestanti più sviluppate o su cereali in fase di levata.
L'Erbogil S si impiega nel periodo di sviluppo del cereale, che va dalla emissione della 3/4 foglia, alla levata compresa.

DISTRUZIONE DELLA CUSCUTA NELLE LEGUMINOSE

Contro le infestazioni di Cuscuta, falciare in primavera le zone infestate con un margine di 2 metri intorno alla zona stessa. Trattare impiegando ogni 100 mq. litri 30 di una poltiglia contenente kg. 1 di Erbogil Super per ettolitro di acqua. Trattare soltanto le leguminose impiantate da almeno un anno.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con altri erbicidi della nostra gamma che verranno indicati di volta in volta.

Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

TOLKAN V

Erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale
Crema emulsionabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 20 Isoproturon tecnico (purezza 99%) pari a gr. 19,80 di prodotto puro;
gr. 20 Dinoterb tecnico (purezza 95%) pari a gr. 19 di prodotto puro.
Conformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:

Rischio d'intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, per ingestione o per assorbimento attraverso la pelle.

— Sintomi d'intossicazione:
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psico motoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia, colorazione gialla delle sclere, la morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% od iposolfito di sodio al 5%, emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda, trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale, ossigeno, respirazione artificiale. E' controindicata l'atropina.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 2696 **Ministero Sanità del** . 23.11.77. . . .

E/1

CARATTERISTICHE

Il **Tolkan V** è un erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, contro le infestanti annuali graminacee e dicotiledoni più comuni.

Infestanti sensibili:
a) **graminacee:** Agrostis, Alpecurus, Poa annua.
b) **dicotiledoni:** tutte le più comuni, comprese il Galium aparine e la Veronica.

DOSI E MODALITA' D'USO

Il trattamento va effettuato dopo il periodo delle forti gelate, prima della fine dell'accestimento dei cereali.

L'azione erbicida è favorita da una buona umidità del terreno.

Per la distruzione dell'Alopecurus e dell'Agrostide non ha importanza lo stadio vegetativo delle infestanti.

Se le levate sono scalari, si dovrà tener conto delle prime levate.

Contro Argostide, Alopecurus, Poa annua e contro le dicotiledoni: Kg. 7,5/ha. Distribuire il prodotto con 600-800 litri d'acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Agitare la dose di prodotto consigliata per ben omogeneizzare la formulazione, senza aggiunta di acqua. Indi immettere il prodotto direttamente nel serbatoio dell'irroratrice già riempita d'acqua. Tenere agitata la poltiglia durante il trattamento.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOSSITICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, i pesci, gli animali domestici e per il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2697

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

CLONEL V

Erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale

Crema emulsionabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 19,8 Isoproturon puro
gr. 19 Dinoterb puro
Coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

Sintomi d'intossicazione:

Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici:

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere la ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.

Controindicazioni:

Atropina.

CARATTERISTICHE

Il CLONEL V è un erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, **contro le infestanti annuali graminacee e dicotiledoni più comuni.**

Infestanti sensibili:

a) **graminacee:** Agrostis, Alopecurus, Poa annua.
b) **dicotiledoni:** tutte le più comuni, comprese il Galium aparine e la Veronica.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato dopo il periodo delle forti gelate, prima della fine dell'accestimento dei cereali.

L'azione erbicida è favorita da una buona umidità del terreno.

Per la distruzione dell'Alopecurus e dell'Agrostide non ha importanza lo stadio vegetativo delle infestanti.

Se le levate sono scalari, si dovrà tener conto delle prime levate.

Contro Agrostide, Alopecurus, Poa annua e contro le dicotiledoni: Kg. 7,5/ha.

Distribuire il prodotto con 600-800 litri d'acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Agitare la dose di prodotto consigliata per ben omogeneizzare la formulazione, senza aggiunta di acqua. Indi immettere il prodotto direttamente nel serbatoio dell'irroratrice già riempita d'acqua. Tenere agitata la poltiglia durante il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, i pesci, gli animali domestici e per il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 2697 **Ministero della Sanità del** 3.7.1981
E/2

272

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

BUTRAN

Diserbante per il Mais

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 44,12 di Butylate puro
gr. 14,28 di Atrazina pura
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito.
Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

CONTROINDICAZIONI: *alcool, olii, grassi.*

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto è un erbicida in polvere bagnabile per il **diserbo del mais**: agisce per assorbimento radicale.
L'associazione all'Atrazina del principio attivo Butylate, permette di ottenere un ampio spettro d'azione; con questo erbicida infatti vengono colpite le graminacee annuali resistenti all'Atrazina.

ANTIPARASSITARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 - ROMA
Via G. Nais, 16 - Tel. 63.81.344/5
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 2729 Ministero della Sanità del 21-2-1978

10/84

Spettro d'azione:

a) **Infestanti sensibili:** combatte le infestanti annuali monocotiledoni (Giavone, Poa) e dicotiledoni (Amaranto, Poligono persicaria e aviculare, Ortiche, Portulaca, Stellaria, Solanum nigrum, Gerani, Mercuriale, Veronica, Piantaggine, Matricarie).

b) **Infestanti medio-resistenti:** infestanti perenni ed apparato radicale profondo (Gramigna, Sorgo selvatico, Digitaria, Convolvolo).

Il prodotto possiede una persistenza d'azione piuttosto limitata; pertanto è particolarmente indicato per il mais di secondo raccolto in quanto permette la semina autunnale del frumento o di qualunque altra coltura in successione.

Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Dosi: Kg. 7-8 per ettaro distribuiti con 6-8 hl. d'acqua.

Il trattamento va effettuato su terreno ben preparato e fresco, prima della semina, con incorporazione immediata (entro 2-3 ore) del prodotto nel terreno mediante fresatrice, erpice e dischi, oppure con passaggio incrociato con erpice a denti. Dopo la semina è bene effettuare una rullatura.

Per la preparazione della miscela, diluire il prodotto in poca acqua, mescolando fino ad ottenere una pasta omogenea; indi versare nella macchina e portare a volume agitando.

Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la distribuzione e l'impiego del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con altri erbicidi solo se espressamente consigliato.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare in medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In caso di varietà nuove e poco diffuse, si consiglia di eseguire saggi, preliminari.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture diverse da quelle indicate in etichetta (Mais). Evitare quindi che venga a contatto con colture vicine ai campi trattati.

AVVERTENZA

Avvertenze: Non impiegare il prodotto su terreni molto ricchi di sostanza organica o torbosi.

Se possibile, impiegare una pompa adibita solo al diserbo.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

2732

GOLTIX

MICROGRANULARE IDROSOLUBILE

Diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Goltix contengono:
g 70 di metamitron puro;
sospensivanti, bagnanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero, contro le principali infestanti, comprese Chenopodium album, Amarantus sp., Solanum nigrum, Polygonum sp., Matricaria sp., Veronica sp., Stachis annua, Diplotaxis erucoides, Capsella bursa pastoris, Alopecurus myosuroides, Poa annua, Phalaris sp.

PERIODI, DOSI E MODO D'IMPIEGO

Bietole a semina primaverile
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

a) Pre-semina anticipata (autunno-inverno)
5-7 kg/ha in 600 lt d'acqua, applicando il prodotto dopo la preparazione del terreno, avendo cura di eliminare le eventuali infestanti già presenti.

b) Pre-semina
5-7 kg/ha in 600 lt d'acqua, provvedendo all'interramento.

N.B. Usare la dose maggiore in terreni pesanti. I risultati più costanti, indipendentemente dall'andamento stagionale, si ottengono effettuando il trattamento in autunno.

c) Post-emergenza
5 kg/ha in miscela con 4 kg di Betanal in 300-400 lt d'acqua, intervenendo quando le barbabietole da zucchero hanno 2-4 foglie vere. In caso di trattamento più tardivo: 3-4 kg/ha in miscela con 5-6 kg di Betanal e aggiungere lt 1,5-2 di Oliocin. In presenza di forte infestazione di Amarantus elevare la dose del Goltix a 6 kg/ha.

Eventuali miscele:

a) Pre-semina anticipata (autunno-inverno)
Se necessario, completare l'azione contro tutte le crucifere e combattere anche Anagallis, Mercurialis, Euphorbia: è consigliabile la miscela Goltix 6 kg/ha + Ganon S 2-4 kg/ha, riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.

b) Pre-semina
In caso di forti infestazioni di graminacee e soprattutto Echinochloa, Digitaria e Setaria, è consigliabile aggiungere al Goltix il TCA Bayer alla dose di 7-10 kg/ha.

Avvertenze: effettuare il trattamento preferibilmente in giornate senza vento, avendo cura di distribuire la soluzione su tutta la superficie da trattare.
Per ottenere migliori risultati è necessario che il terreno sia ben sminuzzato.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto può essere miscelato in caso di necessità con i diserbanti consigliati (Ganon S, TCA Bayer, Betanal).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: effettuare solo le miscele consigliate: evitare di irrorare colture adiacenti. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. A lavoro ultimato lavare accuratamente le pompe ed i recipienti usati, prima di utilizzarli per altri antiparassitari.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: SILIA - Società Italiana Lavorazioni Industriali Aprilia (LT)

Registrazione Ministero Sanità n. 2732 del 16-1-1978

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Controlumaca Caffaro

Esca granulare per la lotta contro le lumache

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

— Metaldeide puro . g 5
— Cruscami di cereali . q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: *violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato), shock, midriasi, ipotermia, convulsioni, obnubilazione del sensorio.*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (g 5 per litro d'acqua), riscaldare il paziente, cardiotonici, fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina, diuretici, barbiturici, anfetamina e derivati in caso di torpore.*

caffaro S.p.A. - Milano

0704

CAFFARO

Stabilimento di BRESCIA

Registrazione n. 2741 del 19-4-1978 del Ministero della Sanità

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Il **CONTROLUMACA CAFFARO** è un'esca granulare preparata ed appositamente realizzata per la lotta contro le limacce (lumache senza guscio) e le chiocciole (lumache con guscio), che danneggiano le colture in pieno campo, negli orti e nelle serre.
Il **CONTROLUMACA CAFFARO** è resistente all'azione degli agenti atmosferici, può quindi essere impiegato in qualunque periodo dell'anno. Si impiega alla dose di 10-15 kg per ettaro avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie. Se si tratta di colture ortive, può risultare conveniente distribuirlo a mucchietti attorno alle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il **CONTROLUMACA CAFFARO** va impiegato da solo, ma comunque è compatibile con gli altri prodotti impiegati in agricoltura.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il **CONTROLUMACA CAFFARO** è nocivo per i pesci, gli animali domestici ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 10

2763

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

MITIFOS

Acaricida Insetticida

Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono

gr. 35 Fenson puro (pari a gr. 35,71-35,35 di prodotto tecnico al 98-99%).

gr. 15 Parathion puro (pari a gr. 15,45-15,30 di prodotto tecnico al 97-98%).

Solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 2763 **Ministero della Sanità del** 2.12.1978

E/2

Natura del rischio:

Rischio d'intossicazione mortale per **inalazione**, **per ingestione o per contatto** con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirarne i vapori
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e., interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva)
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

CARATTERISTICHE

Il **Mitifos** è di azione persistente contro i ragnetti rossi che infestano Agrumi, Meli, Peri, Viti, Cotone, Pomodori, Piante da fiori e ornamentali e combatte, nel contempo, altri insetti dannosi quali Afidi, Tripidi, Psille.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Dose: gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua.

Il **Mitifos** va impiegato solo in trattamenti primaverili-estivi.

Per ottenere una durevole disinfestazione delle piante dai Ragnetti rossi possono essere sufficienti due trattamenti; il primo da eseguirsi contro gli adulti schiusi dalle uova invernali e il secondo a distanza di 10-12 giorni dal primo.

Aver cura di bagnare le foglie su ambedue le pagine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **Mitifos** può essere miscelato con insetticidi — preferibilmente emulsionabili, con zolfi bagnabili e con fungicidi organici (carbamati).

Non è miscibile con la poltiglia bordolese.

Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è resposabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2770

Caragard® Combi Liquido

Erbicida per:
Il diserbo selettivo della vite, del melo e degli agrumi - solo in colture specializzate e con piante adulte (almeno 5 anni).
Il diserbo degli argini delle risaie.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
22,2 g di terbutilazina tecnica al 96% di 2-terz. butilammino-4-cloro-6-etilammino-s-triazina pari a 21,3 g di prodotto puro
22,2 g di terbumeton tecnico al 96% di 2-terz. butilammino-4-etilammino-6-metossi-s-triazina pari a 21,3 g di prodotto puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., *ORIGGIO (Va)*

Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*

Registrazione Ministero della Sanità n. 2770 del 19-4-78

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi d'intossicazione: (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.

Consigli terapeutici: Data la non specificità dei sintomi, la terapia è sintomatica.

Modalità d'impiego
Il CARAGARD controlla la grande maggioranza delle infestanti annuali, mono e dicotiledoni, provenienti da seme e molte infestanti perennanti, quali: Stoppione (Cirsium), Romice, Agropiro, Convolvolo, Artemisia.

Dosi d'impiego
Diserbo della vite, melo e agrumi (solo in colture specializzate e cioè in assenza di sottocolture)
Kg 15-20/ha in terreni forti, argillosi con elevato potere adsorbente.
Kg 13-15/ha in terreni di medio impasto.
Kg 10-12/ha in terreni leggeri.
Volendo ottenere un controllo delle sole infestanti annuali, i dosaggi possono essere dimezzati. Nell'anno successivo al primo trattamento, intervenire, solo se necessario, a dosaggi dimezzati. Non utilizzare il prodotto in terreni eccezionalmente permeabili.

Diserbo degli argini delle risaie
Kg 5-7/ha contro le infestanti annuali (argini nuovi)
Kg 7-15/ha contro le infestanti negli argini stabili.
Il trattamento si effettua in pre-emergenza o, al più tardi, in post-emergenza precoce delle infestanti, cioè più comunemente alla fine dell'inverno o all'inizio della primavera.
Nel diserbo della vite, delle piante da frutto il trattamento può effettuarsi anche nel periodo autunnale e invernale.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere una uniforme distribuzione.

Avvertenze
Il trattamento si effettua in assenza di sottocolture.
Dal trattamento erbicida alla semina di eventuali sottocolture occorre un intervallo minimo di 12 mesi. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Risciacquare le irroratrici e i recipienti utilizzati prima di destinarli ad altri trattamenti.
Il prodotto non è infiammabile nè corrosivo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. «Avvertenza» In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Rischi di nocività - Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI AL MASSIMO ALLA POST-EMERGENZA DELLE INFESTANTI

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

2774

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

SPINTOX

Acaricida di efficacia e di lunga persistenza
Distrugge uova, larve e adulti dei ragni rossi

Composizione
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 7 Tetradifon puro (pari a gr. 7,07 di prodotto tecnico al 99%);
gr. 18 Dicofol puro (pari a gr. 20,68 di prodotto tecnico all'87%).
Solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. N. 2774 **Ministero Sanità del** . 29.4.78 . . . .

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione
Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).
Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.
Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.
Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni
Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

APPLICAZIONI

Acaricida specifico contro tutte le forme di acari delle pomacee, drupacee, vite, colture orticole e floricole.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Per ottenere la massima efficacia con lo SPINTOX è consigliabile effettuare il trattamento con grande accuratezza cercando di bagnare bene tutte le parti della pianta onde colpire le uova di schiusura.

Preferire trattamenti separati con solo SPINTOX evitando le ore più calde.

Dose gr. 200 per hl. di acqua.

Aggiungere la dose occorrente di SPINTOX a poca acqua e dopo aver agitato, versare l'emulsione ottenuta nella quantità di acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Lo SPINTOX è miscibile con le nostre emulsioni antiparassitarie quali Parafene, Metilon, Zitiol.

Non è miscibile con poltiglie contenenti calce. E' dubbia la compatibilità con gli zolfi bagnabili.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si consiglia l'impiego del prodotto su colture di melanzane.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

277

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ZOLONE® P.B. 25

Insetticida Acaricida

®marchio registrato della

Société des Usines Chimiques
Rhône-Poulenc - Paris

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 24 Phosalone puro (purezza 96%) pari a gr. 25 di prodotto tecnico.
Eccipienti e bagnanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

CARATTERISTICHE

Lo **Zolone P.B. 25** è un insetticida che possiede le seguenti caratteristiche:
- Polivalenza d'azione sui parassiti sottoelencati
- buona efficacia immediata e persistenza di 2-3 settimane
- azione frenante sugli acari

Agisce per contatto ed ingestione.

APPLICAZIONI E DOSI

Fruttiferi (pomacee, drupacee, agrumi) contro Afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cydia, Antonomo, Oplocampa a gr. 200-250/hl.

Vite contro Tignole, a gr. 200-250/hl.

Cereali contro Afidi Kg. 2 per ettaro.

Colture ortive ed ornamentali
Contro Afidi, Criocera, Nottue, Aleurodidi, Tripidi, a gr. 200-250/hl.

Colture industriali
Contro Afidi, Nottue, Casside, Piralide, Dorifora, Fitonomo, Tripidi, Cimici, a gr. 200-250/hl.

Contro Altica, Cleono e Pegonia della barbabietola, a Kg. 1,7/ha.

Contro Afidi neri della favetta a Kg. 2,5/ha.

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire la quantità di prodotto in pochi litri d'acqua, versare nel serbatoio dell'irroratrice, agitando. Trattare alla primissima comparsa dei parassiti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli alcalini calce, polisolfuri).

Avvertenze:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
E' nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere il trattamento 21 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

sodirodia S.p.A.
Divisione Agricola
Via G.G. Winckelmann, 2
Tel. 42.46 - 20145 MILANO

Stab.: RAVIT - Paganica (AQ)

Reg. N. 2778 **Ministero Sanità del** . . 18.1.78. . . .

E/1

2779

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ZOLONE®
LIQUIDO 25

Insetticida Acaricida

®marchio registrato della

Société des Usines Chimiques
Rhône-Poulenc - Paris

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 24 Phosalone puro (purezza 96%) pari a gr. 25 di prodotto tecnico.
Bagnanti e solventi quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

sodirodia S.p.A.
Divisione Agricola
Via G.G. Winckelmann, 2
Tel. 42.46 - 20145 MILANO
Stab.: RAVIT - Paganica (AQ)

Reg. N. 2779 **; Ministero Sanità del** 18.1.78
E/1

Natura dei rischi:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

CARATTERISTICHE

Lo **Zolone liquido 25** è un insetticida che possiede le seguenti caratteristiche:
- Polivalenza d'azione sui parassiti sottoelencati
- buona efficacia immediata e persistenza di 2-3 settimane
- azione frenante sugli acari

Agisce per contatto ed ingestione.

APPLICAZIONI E DOSI

Fruttiferi (pomacee, drupacee, agrumi) contro Afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cydia, Antonomo, Oplocampa a cc. 200-250/hl.
Vite contro Tignole, a cc. 200-250/hl.
Cereali contro Afidi litri 2 per ettaro.

Colture ortive ed ornamentali
Contro Afidi, Criocera, Nottue, Aleurodidi, Tripidi, a cc. 200-250/hl.

Colture industriali
Contro Afidi, Nottue, Casside, Piralide, Dorifora, Fitonomo, Tripidi, Cimici, a cc. 200-250/hl.
Contro Altica, Cleono e Pegonia della barbabietola, a litri 1,7/ha.
Contro Afidi neri della favetta a litri 2,5/ha.

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire la quantità di prodotto in pochi litri d'acqua, versare nel serbatoio dell'irroratrice, agitando. Trattare alla primissima comparsa dei parassiti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli alcalini calce, polisolfuri).

Avvertenze:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
E' nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere il trattamento 21 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto litri

278

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

KILVAL SODIRODIA

Aficida sistemico con azione acaricida secondaria

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 37,5 Vamidothion puro (pari a gr. 39,47 di prodotto tecnico al 95%)
Solventi ed emulsionanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

®marchio registrato della

Société des Usines Chimiques
Rhône-Poulenc - Paris

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. n. 2780 **Ministero della Sanità del** 29.4.78
E/1

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

— Sintomi d'intossicazione:
Scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (mg. 1-2 per adulti e mg. 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Iniezioni endovenose lente di PAM (gr. 0,50 ogni 3 ore fino a gr. 3) o similari.
Se vi è stato contatto cutaneo, detersione con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

— Controindicazioni:
Morfina, Vitamina B1, Coramina, latte e grassi.

Il **Kilval** è un insetticida sistemico dotato di una persistenza superiore a tre settimane (e molto spesso a quattro o cinque settimane).

Il **Kilval** è efficace:
— Contro **varie specie di ragnetti rossi** parassiti degli alberi fruttiferi, della vite, delle colture floricole e contro l'**acaro giallo della vite.**
— Contro tutti gli afidi particolarmente **l'afide lanigero.**

DOSE D'IMPIEGO PER 100 LT. D'ACQUA

Alberi fruttiferi: con pompe irroratrici a vol. normale: 125 cc.; con atomizzatori a basso volume aumentare in rapporto alla minor quantità di acqua impiegata.

Vite, ornamentali: con pompe irroratrici a vol. normale: 100-125 cc.; con atomizzatori a basso volume circa un litro per ettaro.

Bietole, patate: con pompe irroratrici a vol. normale: 125-150 cc.; con atomizzatori a basso volume circa un litro per ettaro.

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire la quantità sopra indicata di **Kilval** in pochi litri d'acqua. Versare in seguito, sempre agitando, nella botte della pompa irroratrice precedentemente riempita d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non miscelare con sostanze alcaline (poltiglia bordolese, polisolfuri, permanganato di potassio).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto litri

2806

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
Conservare la confezione ben chiusa;
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
Non operare contro vento;
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto (inibitore della colinesterasi).
***Sintomi di intossicazione:* nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.**
***Consigli terapeutici:* lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (2 mg) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.**
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini.

Nei casi gravi e sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

ICI Solplant SpA

'SEVISOL' 50

Insetticida polivalente in polvere bagnabile a base di carbaryl

COMPOSIZIONE

Carbaryl puro (esente da β-naftolo)	g 49
Disperdenti e coadiuvanti	q b a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione
VERCHIM ASTERIAS S p A - Ozzano Emilia (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2806 del 29-4-1978
'SEVISOL' - Trade Mark - ICI Solplant S p A

'SEVISOL' 50 ha un ampio spettro di azione, in quanto combatte una vasta gamma di insetti.
CAMPI D'IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 litri di acqua)
Frutticoltura: melo e pero g 120-150 contro Carpocapsa, larve Ricamatrici (Cacoecia, Eulia, Capua); **pesco** g 200-300 contro Tignole (Cydia, Anarsia).
Viticoltura: g 150-200 contro Tignole (Polychrosis, Clysia) e larve Ricamatrici (Eulia, Cacoecia).
Orticoltura (patata, carciofo, brassicacee): g 150 contro Dorifora della patata, Cavolaia, Nottue (Mamestra); g 200-250 contro Depressaria e altri lepidotteri del carciofo.
Fragolicoltura: g 150-200 contro larve Ricamatrici (Pandemis, Ancylis, Argyroploce).
Floricoltura in campo: g 200 contro Bega del garofano.
Agrumicoltura: g 150-200 contro Tignola; g 200-250 contro Saissetia oleae (Mezzograno di pepe).
Olivicoltura: g 150-200 contro Tignola; g 200-250 contro Saissetia oleae (Mezzograno di pepe).
Nocciuolicoltura: g 120-150 contro Carpocapsa.
Preparazione della poltiglia.
Mescolare bene la prevista dose di prodotto con un po' di acqua, fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Indi diluire con la restante quantità di acqua, ancora agitando.
Da non applicare con mezzi aerei.
COMPATIBILITA'
'SEVISOL' 50 è compatibile con la maggior parte dei fungicidi ed insetticidi di uso comune. Non è compatibile con la poltiglia bordolese. La miscela con Albolineum, ossicloruri di rame e Colloidox va fatta con cautela.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
È nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON VENDERSI SFUSO Kg

2810

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

BIETONET

Diserbante per barbabietola da zucchero e da foraggio

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 6,3 Lenacile (*) puro (purezza 98%) gr. 6,42 di prodotto tecnico.
Gr. 37,5 Cicloato puro (purezza 98%) pari a gr. 38,26 di prodotto tecnico.
Sostanze inerti quanto basta a 100.

(*) Lenacil è il principio attivo del Venzar, prodotto dalla E.I. du PONT de NEMOURS Co. (Inc).

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

— Sintomi d'intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

— Consigli terapeutici:
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini.
Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

CARATTERISTICHE

Il **BIETONET** è un diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio, in grado di controllare le principali infestanti dicotiledoni e graminacee.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 2810. **Ministero Sanità del** 10.8.78. . . .

E/1

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Dosi d'impiego: Kg. 8 per ettaro distribuiti con litri 600-800 di acqua per ettaro.
Impiegare la dose di Kg. 6 per ettaro nel caso di terreni filtranti (sabbiosi).
Il trattamento va effettuato **prima della semina della barbabietola**, su terreno ben preparato, sminuzzato, libero da zollosità e da residui vegetali.
Immediatamente dopo l'esecuzione del trattamento procedere all'incorporazione del prodotto nel suolo.
La migliore efficacia diserbante è legata ad un buon interramento.
L'interramento del prodotto deve essere effettuato alla profondità di cm. 5-7.
Per effettuare tale operazione è indicato l'impiego di un erpice. Fra i vari tipi di erpici consigliamo l'erpice a denti flessibili, oppure l'erpice a denti rigidi unito ad un erpice a denti snodati. Può essere altresì impiegato un erpice a denti effettuando 2-3 passaggi incrociati; oppure una zappa rotativa, facendo però attenzione che con tale attrezzatura il prodotto non venga interrato a profondità eccessiva.
Se possibile, effettuare la distribuzione dell'erbicida e l'interramento simultaneamente.
La semina della barbabietola può essere effettuata lo stesso giorno o essere ritardata di alcuni giorni.
E' preferibile effettuare la semina lo stesso giorno del trattamento al fine di evitare rischi connessi all'andamento stagionale avverso.
Nel corso dell'esecuzione del trattamento occorre mantenere la poltiglia costantemente agitata: utilizzare quindi attrezzature munite di agitatore meccanico. Assicurarsi del perfetto funzionamento degli ugelli; mantenere costante la velocità di avanzamento nel campo ed evitare gli sgocciolamenti.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Disperdere la dose occorrente di BIETONET in poca acqua agitando vigorosamente fino a formare una poltiglia semiliquida senza grumi; versare la poltiglia nel volume totale di acqua, tenendo costantemente in funzione l'agitatore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Un terreno trattato, in caso di forzata risemina entro 4 mesi dall'esecuzione del trattamento erbicida, può essere riseminato solo con barbabietola.

AVVERTENZE

Lavare accuratamente il macchinario usato per la distribuzione del diserbante.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2821

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CEPONE 70

Diserbante selettivo della cipolla
Polvere bagnabile

Composizione
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 60 di Clorthal-metil puro (purezza 97-98%):
pari a gr. 61,85-61,22 di prodotto tecnico;
gr. 10 di Chlorpropham puro (purezza 98%)
pari a gr. 10,20 di di prodotto tecnico.
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

— Sintomi d'intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

— Consigli terapeutici:
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini.
Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO:

Il CEPONE 70 è un erbicida selettivo di pre-emergenza per la cipolla dotato di ampio spettro di attività.
Possiede un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti sensibili impedendone lo sviluppo. Pertanto non esplica azione sulle infestanti già nate o sui loro semi già germogliati.

SPETTRO D'AZIONE

a) **Infestanti sensibili:**
monocotiledoni: Alopecurus, Digitaria sanguinalis, Poa annua, Setaria verticillata;
dicotiledoni Amaranthus retroflexus Anagallis arvensis, Ajuga chamaepitis, Beta vulgaris, Chenopodium album, Chenopodium vulvaria, Convolvulus arvensis, Caspella, Erodium cicutarium, Fumaria officinalis, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Portulaca olcracca, Solanum nigrum Stellaria media, Veronica, Viola tricolor

b) **medio resistenti:** Euphorbia peplus

c) **resistenti:** Infestanti perenni (Convolvolus arvensis)

Il CEPONE 70 va distribuito immediatamente dopo la semina della coltura alla dose di Kg 12-14 per ettaro, distribuiti con almeno 500 litri di acqua
Il terreno, prima del trattamento, dev'essere ben lavorato, ripulito da erbacce, ed avere un sufficiente tenore di umidità
Per la preparazione della miscela aggiungere alla dose occorrente di CEPONE 70 poca acqua, agitando fino ad ottenere una poltiglia omogenea
Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua per ottenere la voluta concentrazione
Distribuire la miscela uniformemente sulla superficie da diserbare, usando normali pompe a mano o a motore
Durante il trattamento mantenere la miscela in costante agitazione
Effettuare il trattamento con tempo buono o senza vento
Non impiegare il prodotto su terreni torbosi, perché viene inattivato dalla sostanza organica
In periodi di siccità è opportuno mantenere il terreno umido per almeno una settimana dopo il trattamento

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Evitare, durante l'irrorazione, che lo spruzzo giunga su altre colture vicine
Se la coltura dovesse fallire per cause ambientali, si può subito riseminare
Quando capita di seminare cereali che seguono, sullo stesso terreno, colture trattate con CEPONE 70 nel periodo estivo, è prudente effettuare prima una buona aratura, e lasciare poi il terreno a riposo per qualche tempo (15-20 giorni).
Lavare perfettamente dopo l'uso la pompa ed i recipienti usati per l'irrorazione

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso »

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato »

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 2821 **Ministero Sanità del** 30.5.78
E/1

2834

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione

Vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 g di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questo insetticida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1 -0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

La morfina l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina.
Inoltre: latte, olio di ricino e grassi in genere.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'AGROCIDE' INODORO GRANULARE

Insetticida granulare per la disinfestazione del terreno destinato alla coltura di barbabietole da zucchero alla semina.

COMPOSIZIONE

Lindano puro	g 2,92
Sostanze inerti	q.b.a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
DIACHEN S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2834 del 27-11-1979
'AGROCIDE' - Trade Mark - Imperial Chemical Industries PLC

'AGROCIDE' INODORO GRANULARE è un insetticida per la disinfestazione del terreno destinato alla coltura di barbabietole da zucchero alla semina per la lotta contro gli insetti: atomarie, elateridi, maggiolini, grillotalpa.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di 30-35 kg/ha e va distribuito a tutto campo prima della semina, facendo seguire un'opportuna incorporazione al terreno.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo oppure miscelato con concimi.

RISCHI DI NOCIVITÀ

È nocivo per gli animali domestici, i pesci, il bestiame e gli insetti utili.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg

2843

SANDOCAR

Insetticida in polvere bagnabile

Composizione

gr. 50di Carbaryl tecnico al 99% di purezza minima, equivalenti a gr. 49,5 di Carbaryl puro - esente da β-naftolo - disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua;
— evitare di respirarne i vapori;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto interrandole in buche lontane da corsi d'acqua;
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni per il medico

— Avvelenamento acuto per ingestione o contatto (inibitore della colinesterasi)
— Sintomi di intossicazione.
nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM Contrathion ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi

Modalità di impiego

Parassiti combattuti	**Dosi di impiego in litri 100 di acqua**	
Carpocapsa pomonella	0,12 - 0,15‰ -	gr 120 - 150
Tignole (vite, olivo, agrumi)	0,15 - 0,2 ‰	gr. 150 - 200
Tortrici (Bega del garofano, Eulia, Cacoecia) Cavolaia, Dorifora, Fitonomo		
Cydia molesta	0,2 - 0,25‰	gr 200 - 250
Saissetia oleae (Cocciniglia mezzo grano di pepe)	0,25 - 0,3 ‰ -	gr 250 - 300

Versare il quantitativo necessario di SANDOCAR in poca acqua, agitando, aggiungere in seguito acqua sino al volume desiderato, sempre rimescolando.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il SANDOCAR è miscibile con gli antiparassitari di uso comune sulle colture per le quali è indicato ad eccezione dei prodotti alcalini, come poltiglia bordolese, arseniato di calcio, polisolfuri

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Per evitare la morte delle api non eseguire irrorazioni durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n 2843 del 9.3.1973 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

CLASSE I

NICOTOX SANDOZ

Insetticida bagnante a base di nicotina

VELENO

COMPOSIZIONE

gr. 20 di nicotina tecnica al 98% di purezza minima (equivalenti a gr. 19,6 di nicotina pura)
diluenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— evitare di respirarne i vapori;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
— durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— rendere inutilizzabili dopo l'uso le confezioni che contenevano il prodotto, interrandole in fosse profonde almeno un metro, lontane da ruscelli e sorgenti;
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

— **Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle;**

— **Sintomi di intossicazione**

Veleno del sistema nervoso - violenti dolori addominali - vomito - diarrea - cefalea violenta - vertigini - disturbi della vista e dell'udito - convulsioni tetaniformi - eccitazione - tachicardia con aritmia - seguono astenia - depressione - collasso cardiocircolatorio.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavare le superfici contaminate con acqua fredda - riscaldare il malato - borsa di ghiaccio sul capo - in caso d'ingestione provocare il vomito - lavanda gastrica con acido tannico 0,5% o permanganato di potassio 1:5000 (oppure somministrare infuso concentrato di tè) - ossigenoterapia - cloropromazine - analettici.

Controindicazioni

Morfina e narcotici.

Parassiti combattuti

Su pomacee in pre-fioritura e post-fioritura, contro gli adulti dei Microlepidotteri (Litocollete, Cemiostoma) allo 0,25-0,3% (gr. 250-300 di NICOTOX SANDOZ in litri 100 di acqua).

Modalità di impiego

Versare la quantità occorrente di NICOTOX SANDOZ nell'acqua, agitando energicamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il NICOTOX SANDOZ è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ.
Per la preparazione di poltiglie miste, basta aggiungerlo alla poltiglia prescelta già pronta all'uso, mescolando il tutto a fondo.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

AVVERTENZA

Da usarsi solo su pomacee.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta, quando viene impiegato in post-fioritura.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 2062 del [illegible] del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto gr.

2865

Olicron®

Insetticida sistemico idrosolubile per la lotta contro la Mosca delle olive

Composizione
100 g di prodotto contengono:
18 g di fosfamidone puro
q.b. a 100 g coformulanti
« contiene etilglicole »

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

I CLASSE

VELENO

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: VERCHIM-ASTERIAS, Ozzano Emilia (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2865 del 4.10.1978
® marchio registrato

Natura del rischio: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego, usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva)
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico: *Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.*

Sintomi di intossicazione: *Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.*
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di Ossime come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi*

Avvertenza: *Consultare un centro antiveleni*

OLICRON è un prodotto appositamente formulato per l'impiego contro gli insetti parassiti dell'olivo ed in particolare per la lotta contro la mosca delle olive (Dacus oleae).
OLICRON agisce contro le larve della mosca già presenti dentro le olive e protegge altresì la pianta, per diverso tempo, dagli attacchi successivi.
OLICRON è efficace anche contro altri insetti parassiti dell'olivo, come la tignola (Prays oleellus), il pidocchio nero o tripide (Liothrips oleae), il cotonello (Euphyllura olivina).

Epoca e frequenza dei trattamenti
I trattamenti si iniziano in corrispondenza della ovodeposizione effettuata dalla mosca e si proseguono ad intervalli d'un mese o più finchè non si verificano nuovi attacchi. Più comunemente sono richiesti due trattamenti (settembre-ottobre) ed a volte anche uno solo.

Dosi d'impiego
0,3% (300 cc in 100 litri d'acqua) nei trattamenti normali (settembre-ottobre) e contro la generazione carpofaga della tignola.
0,15% (150 cc in 100 litri d'acqua) nei trattamenti precoci e contro gli altri insetti dell'olivo.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con COPRANTOL®, CUMAN®, AUROCOL®, e tutti gli altri antiparassitari a reazione neutra. Non è invece miscibile con i prodotti a reazione alcalina quali la poltiglia bordolese e la poltiglia solfocalcica **« Avvertenza »**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: OLICRON è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati, direttamente o accidentalmente per non meno di 20 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO R

Olicron®

Insetticida sistemico idrosolubile per la lotta contro la Mosca delle olive

Composizione
100 g di prodotto contengono:
18 g di fosfamidone puro
q.b. a 100 g coformulanti
« contiene etilglicole »

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

I CLASSE

VELENO

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2865 del 4.10.1978
marchio registrato

Natura del rischio: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego, usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva)
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico: *Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.*

Sintomi di intossicazione: *Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.*
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di Ossime come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

Avvertenza: *Consultare un centro antiveleni.*

OLICRON è un prodotto appositamente formulato per l'impiego contro gli insetti parassiti dell'olivo ed in particolare per la lotta contro la mosca delle olive (Dacus oleae)
OLICRON agisce contro le larve della mosca già presenti dentro le olive e protegge altresì la pianta, per diverso tempo, dagli attacchi successivi.
OLICRON è efficace anche contro altri insetti parassiti dell'olivo, come la tignola (Prays oleellus), il pidocchio nero o tripide (Liothrips oleae), il cotonello (Euphyllura olivina).

Epoca e frequenza dei trattamenti
I trattamenti si iniziano in corrispondenza della ovodeposizione effettuata dalla mosca e si proseguono ad intervalli d'un mese o più finchè non si verificano nuovi attacchi. Più comunemente sono richiesti due trattamenti (settembre-ottobre) ed a volte anche uno solo.

Dosi d'impiego
0,3% (300 cc in 100 litri d'acqua) nei trattamenti normali (settembre-ottobre) e contro la generazione carpofaga della tignola.
0,15% (150 cc in 100 litri d'acqua) nei trattamenti precoci e contro gli altri insetti dell'olivo

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con COPRANTOL®, CUMAN®, AUROCOL®, e tutti gli altri antiparassitari a reazione neutra. Non è invece miscibile con i prodotti a reazione alcalina quali la poltiglia bordolese e la poltiglia solfocalcica **« Avvertenza »**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: OLICRON è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati, direttamente o accidentalmente per non meno di 20 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO R

Coprantol®

Rame adesivo CIBA-GEIGY
Prodotto in polvere bagnabile per trattamenti preventivi contro malattie crittogamiche delle piante coltivate.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
30 g di rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SIPCAM, Salerano s/Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2881 del 1.8.1978
® marchio registrato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Impiego e dosi (per 100 litri di acqua)
Viticoltura: 0,4-0,5% Peronospora

Grandi colture: 4 Kg/ha Cercospora della bietola
4-5 Kg/ha Peronospora ed Alternaria della patata
0.5% Peronospora, Alternaria, Septoria e Cladosporio del pomodoro

Frutticoltura: Trattamenti invernali: 1%
Trattamenti pre-fiorali (pomacee): 0,3%
Trattamenti primaverili-estivi: 0,2-0,3%

Preparazione della sospensione
Cospargere il COPRANTOL su una uguale quantità di acqua e lasciarlo depositare. Rimestare poi energicamente fino ad ottenere una pasta omogenea ed aggiungere la quantità di acqua necessaria.

Da non applicare con mezzi aerei

Miscibilità
Il COPRANTOL è miscibile con gli usuali insetticidi e con gli zolfi bagnabili. Non mescolare con la poltiglia solfo-calcica.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo (+) e di pero (++) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(+) = Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

(++) = Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg 1**

2885

BLAGAL

III CLASSE

Attenzione: **manipolare** **con prudenza**

Erbicida a base di Bladex ed MCPA, per la lotta contro le erbe infestanti dei cereali, con l'esclusione d'impiego in risaia

Il BLAGAL, oltre a colpire le malerbe controllate dall'MCPA, è efficace anche contro specie particolarmente resistenti, quali Stellaria, Poa, Veronica, Fumaria, Galium, Lamium, Poligonum, Galeopsis, Matricaria, Bifora, Senape, Artemisia.

COMPOSIZIONE IN PESO

pp.aa.:

cyanazina, prodotto puro	. . . .	g 5,5
MCPA, prodotto puro	. . . .	g 21,9
coadiuvanti, solventi ed emulsionanti:	quanto basta a	g 100,0

BLAGAL è un marchio Shell.

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Evitare di respirarne i vapori;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio, interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva);
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
depressione, letargia, respirazione rapida e affannosa, vasodilatazione generalizzata.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di ingestione accidentale provocare subito il vomito somministrando acqua salata; lavanda gastrica.
In caso di grave contaminazione cutanea lavare molto bene le parti colpite con acqua e sapone e tenere il paziente a riposo e al caldo.
Terapia sintomatica in base al controllo del bilancio idrico ed elettrolitico, della respirazione e della pressione arteriosa.
Consultare un centro antiveleni.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità N. 2885 del 5.08.1978

MODALITA' D'IMPIEGO

Epoca di applicazione

Le applicazioni sono da effettuarsi con infestanti già emerse ed in uno stadio giovanile, il che corrisponde normalmente nel Sud-Italia allo stadio di inizio accestimento - fine accestimento del grano e nel Centro-Nord-Italia, allo stadio di pieno accestimento - raddrizzamento del grano.

Dosi di applicazione

Usare 3-3,5 kg di formulato per ettaro, in una quantità d'acqua di 300-500 litri per ettaro, impiegando le normali motopompe.

Modalità d'azione

Il BLAGAL agisce sulle erbe infestanti per via fogliare e radicale. L'MCPA, contenuto nella miscela, interferisce, quale fenossi-composto, sul metabolismo delle malerbe, mentre il Bladex è un inibitore della fotosintesi.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

Compatibilità

Non si consiglia di miscelare il formulato con altri prodotti diserbanti.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

E' fitotossico per l'erba medica. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Attenzione: «da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

«DA NON VENDERSI SFUSO»

Contenuto netto:

2888

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Non inghiottire od inalare proteggendo accuratamente bocca, naso ed occhi.
Non maneggiare il concentrato con le mani nude.
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di contaminazione degli indumenti toglierli subito.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Attenzione: i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).
L'introduzione nell'organismo **anche di poche gocce** del prodotto può essere fatale: **non attendere la comparsa dei sintomi** per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perchè sia praticata l'emodialisi.
Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.

Intossicazione per ingestione e per inalazione

I primi sintomi sono: epistassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola.
Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato-renali. L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare **grave**, sino alla morte per insufficienza respiratoria.
L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di Diquat nel sangue.

Intossicazione per contatto

Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva di vescicole.
Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta.
Terapia sintomatica da praticarsi esclusivamente dal medico.
In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del Diquat e sulla terapia possono essere richieste **direttamente** alla Società produttrice di questo presidio sanitario.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'DIQUAZIN'

Diserbante in formulazione "col" ad azione immediata e prolungata per trattamenti in vigneti, frutteti, oliveti, noccioleti, superfici arborate in genere e per diserbi di argini (risaia), scoline, canali, diserbi industriali.

COMPOSIZIONE

Diquat puro (sotto forma di dibromuro monoidrato)	g 7,5
Simazina pura	g 26,3
Additivi e diluenti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione: ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2888 del 5-8-1978
'DIQUAZIN' - marchio registrato ICI Solplant S.p.A.

APPLICAZIONI AGRICOLE

Vigneti, Frutteti (agrumi, pomacee): Kg 8-10/ha; in primavera su erbe nei primi stadi di sviluppo (circa 10 cm); in autunno-inverno per tenere pulite le colture sino alle lavorazioni primaverili.
Oliveti: Kg 8-10/ha su erbe comparse nelle piazzuole (circa 5 cm) o sulla superficie da tenere pulita.
Nocciuolo: Kg 8-10/ha su erba non molto sviluppata (circa 10 cm).
Avvertenze:
Aggiungere sempre 500-600 g di 'Agral' per 100 l di acqua. Impiegare la dose inferiore in terreni tendenti al leggero. Usare 'Diquazin' **una volta all'anno**, alla dose consigliata.
'Diquazin' sulle colture sopradescritte di età compresa tra i 2 e i 3 anni, deve essere impiegato a dosi ridotte, Kg 7-8/ha e non in terreni leggeri. Irrorare uniformemente evitando la sovrapposizione.
Non intervenire in presenza di drupacee.
Fragola: Kg 6-6,5/ha su infestanti non molto sviluppate (5-10 cm) Aggiungere 500-600 g di 'Agral' per 100 l di acqua.
Avvertenze:
Intervenire nei mesi di Agosto-Settembre dopo l'impianto della fragola localizzando l'intervento nell'interfila della coltura pacciamata. Impiegare irroratrici schermate (tipo campana) al fine di non irrorare le piante di fragola. Non intervenire in terreni leggeri.
E vietato intervenire direttamente sui foraggi.

Da non applicare con mezzi aerei.

APPLICAZIONI NON AGRICOLE

Argini, risaia: Kg 7-8/ha per infestanti di circa 10 cm.
Canali, scoline, aree industriali: Kg 12-13/ha in presenza di piante arboree adulte; Kg 18-21/ha in assenza di piante arboree da solo o in miscela ad altri principi attivi.
Avvertenze:
Nei canali, scoline di campi destinati a colture (mais) o in presenza di colture (vigneti, frutteti) la dose di impiego non deve superare i 13 Kg per ha. Aggiungere 500-600 g di 'Agral' per 100 l di acqua.

SI CONSIGLIA:

1. Agitare bene prima dell'uso, per disporre di una sospensione omogenea.
2. Per ottenere buoni risultati procedere al trattamento all'inizio o durante un periodo piovoso per favorire l'assorbimento della Simazina.
3. Evitare l'uso di atomizzatori.
4. Lavare e risciacquare accuratamente recipienti ed irroratrici dopo il loro impiego.

COMPATIBILITA': E sconsigliabile la miscela con insetticidi e fungicidi. Miscelare con altri erbicidi solo se indispensabile e dopo aver consultato un tecnico di fiducia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Impiegarlo solo per i casi consigliati. Non colpire le colture limitrofe o comunque sensibili.
Attenzione: dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili occorre un intervallo di almeno 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture (es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Da impiegare su colture specializzate.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura [illegible] epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. C[illegible] impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivant[illegible] uso improprio del preparato.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

DA NON VENDERSI SFUSO

g

2942

FLORBARIO ESSE

CLASSE II

Polisolfuro di bario contenente zolfo puro, preparazione direttamente solubile in acqua

Composizione
Polisolfuro di bario tecnico minimo gr. 99
(corrispondente a gr. 45 di zolfo attivo)
Coformulanti q. b. a gr. 100

II CLASSE

Natura del rischio: Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei (per esempio, interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva) le confezioni che contenevano il prodotto. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

Sintomi d'intossicazione:

avvelenamento acuto orale - nausea - vomito - coliche addominali - diarrea profusa - crampi muscolari - convulsioni - bradicardia - dispnea (la morte avviene in piena coscienza per paralisi respiratoria).

Consigli terapeutici:

lavanda gastrica con solfato di sodio o magnesio - analettici cardiorespiratori - spasmolitici, fleboclisi con aspartato di potassio (1-3 mEq : K flebo).

Avvertenza: *Consultare un Centro Antiveleni.*

Azione anticrittogamica: Un trattamento di FLORBARIO ESSE sul finire dell'inverno è indicato per la lotta contro la Gommosi e la Bolla delle drupacee (pesco, ciliegio), la Ticchiolatura delle pomacee (melo, pero), l'Occhio di pavone e la Fumaggine dell'olivo.

Azione insetticida: Contro le Cocciniglie delle pomacee, delle drupacee e dell'olivo (Aspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona, Saissetia oleae); il FLORBARIO ESSE può essere usato su piante delicate (pesco, susino) senza pericolo di ustioni.

Dosi e modalità d'impiego: Il FLORBARIO ESSE si può usare benissimo da solo (5-6%), ottenendo un risultato contro le Cocciniglie, senza però alcuna azione ovicida.

Miscele consigliate:

melo e pero		**pesco, susino, ciliegio**	
FLORBARIO ESSE	kg. 6	FLORBARIO ESSE	kg. 4-5
Sariafos 20 E	gr. 200-250	Sariafos 20 E	gr. 200-250
acqua	lt. 94	acqua	lt. 96-95

La preparazione della poltiglia di FLORBARIO ESSE è istantanea. Per la sua preparazione, il FLORBARIO ESSE consente una rapida preparazione della poltiglia.
Basta versare direttamente la quantità voluta di FORBARIO ESSE nel recipiente contenente l'intero quantitativo d'acqua, agitando brevemente: la poltiglia è subito pronta per l'uso.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è incompatibile con oli bianchi, VITAM, VITAM AZZURRO, VITAM SARIAF, TIODITAM, POLTIGLIA BORDOLESE, CUPROSARIAF od altri prodotti contenenti rame.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

**Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti.
Ogni altro uso è pericoloso.**

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Registrazione Ministero della Sanità N.2942 del 4-12-1979

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

294

FLORBARIO

CLASSE II

Polisolfuro di bario con zolfo attivo

Composizione
Polisolfuro di bario tecnico minimo gr. 94
(corrispondente a gr. 40 di zolfo attivo)
Coformulanti q. b. a gr. 100

II CLASSE

Natura del rischio: Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei (per esempio, interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva) le confezioni che contenevano il prodotto. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
Sintomi d'intossicazione:

avvelenamento acuto orale - nausea - vomito - coliche addominali - diarrea profusa - crampi muscolari - convulsioni - bradicardia - dispnea (la morte avviene in piena coscienza per paralisi respiratoria).

Consigli terapeutici:

lavanda gastrica con solfato di sodio o magnesio - analettici cardiorespiratori - spasmolitici, fleboclisi con aspartato di potassio (1-3 mEq : K flebo).

Avvertenza: *Consultare un Centro Antiveleni.*

Modalità d'impiego
Azione anticrittogamica: Un trattamento di FLORBARIO sul finire dell'inverno è indicato per la lotta contro: Gommosi e Bolla delle drupacee (pesco, ciliegio), Ticchiolatura delle pomacee (melo, pero), Occhio di pavone e Fumaggine dell'olivo.

Azione insetticida: Contro le Cocciniglie delle pomacee, delle drupacee e dell'olivo (Aspidiotus perniciosus, Diaspis pentagona, Saissetia oleae); il FLORBARIO può essere usato su piante delicate (pesco, susino) senza pericolo di ustioni.

Miscele consigliate:

melo e pero		**pesco, susino, ciliegio**	
FLORBARIO	kg. 6-7	FLORBARIO	kg. 5-6
Sariafos 20 E	gr. 200-250	Sariafos 20 E	gr. 200-250
acqua	lt. 94-93	acqua	lt. 95-94

Il FLORBARIO si può benissimo usare da solo (5-6%) ottenendo un ottimo risultato contro le Cocciniglie, senza alcuna azione ovicida.

Preparazione: Per la sua composizione il FLORBARIO consente una rapida preparazione della poltiglia. Versare la quantità voluta di FLORBARIO in un recipiente contenente una quantità equivalente di acqua, agitando energicamente.
Dopo alcuni minuti versare la poltiglia così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, agitando brevemente. La soluzione è così pronta per l'uso.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è incompatibile con AGRUMOL, ALBOS 3, 5 e prodotti oleosi in genere, VITAM, VITAM AZZURRO, VITAM SARIAF, TIODITAM, POLTIGLIA BORDOLESE, CUPROSARIAF ed altri prodotti contenenti rame.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Evitare irrorazioni nei frutteti dove siano coltivati ortaggi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Registrazione Ministero della Sanità N. 2943 del 10-11-1978

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

2961

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

KELTHANE* W 35

Acaricida agricolo di uso generale ed a lunga attività residua, ed efficace anche nella stagione estiva

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 35 Dicofol puro (da p.a. tecnico all'82%).
Sostanze inerti, adesivanti e bagnanti quanto basta a 100.

* Marchio reg. Rohm & Haas - Philadelphia, U.S.A.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 2961 . **Ministero Sanità del** . 23.4.79. . .

E/1

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il KELTHANE W 35 è efficace nel controllo di vari acari che attaccano i fruttiferi e le colture agrarie in genere. Esso ha un alto potere abbattente ed un lungo effetto residuo. Il KELTHANE W 35 è efficace contro ragnetti rossi, gialli, nonché altri acari.

Trattare, bagnando accuratamente ed abbondantemente le piante quando appaiono i primi acari.

L'aggiunta di gr. 50-80 di Etaldyn per ettolitro di poltiglia, aumentando la bagnabilità, potenzia l'azione del KELTHANE W 35 stesso. L'aggiunta di Etaldyn è indispensabile dovendosi trattare piante o frutti ricchi di pruina o comunque difficilmente bagnabili.

Il KELTHANE W 35 si può impiegare su tutte le colture: fruttifere, erbacee, ornamentali.

FRUTTIFERI:
Per controllare gli acari, usare da 120 a 150 gr. di KELTHANE W 35 per 100 litri di acqua.

VITE:
Contro i ragnetti gialli e rossi, impiegare gr. 120-150 di KELTHANE W 35 per 100 lt. d'acqua, iniziando i trattamenti, se necessario, in primavera, quando i getti sono lunghi cm. 2-5. In tale periodo avviene la fuoriuscita degli adulti. Nei trattamenti estivi, iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti sulle foglie.

FRAGOLE ED ORTAGGI VARI:
Iniziare i trattamenti al primo comparire degli acari, impiegando gr. 120-150 di KELTHANE W 35 per 100 litri d'acqua.

PIANTE ORNAMENTALI:
Per il controllo degli acari sulle rose, azalee, astri, ciclamini, crisantemi e varie altre piante ornamentali, usare da 120 a 150 gr. di KELTHANE W 35 per 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il KELTHANE W 35 è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.

Non è compatibile con i polisolfuri, la poltiglia bordolese ed altri materiali fortemente alcalini.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non applicare KELTHANE W 35 su melanzane e peperone: tali colture possono essere danneggiate.

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

2962

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MITEX E 50

Acaricida

Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 Fenson puro (da p.a. tecnico al 98-99%).
gr. 20 Bopardoll puro (da p.a. tecnico al 95-96%.
Sostanze solventi, emulsionanti e coadiuvanti q.b. a 100.

Contiene Xilolo

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N2962 : Ministero Sanità del . 16.6.1979. . .
E/2

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Il Mitex E-50 è composto da un estere fosforico con clororganico, sostanze chimiche aventi meccanismi tossicologici diversi.
Si presume che l'intossicazione sia clinicamente dominata dall'estere fosforico, però, nel caso di ingestione, in un secondo tempo potrebbe manifestarsi anche una sintomatologia da clorganici.

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

— Sintomi d'intossicazione:
Scialorrea, vomito, dolori addominali, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione miosi, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

— Consigli terapeutici:
Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia, iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per adulti e 0,2-1 mg per bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima con etil solfato (contrathion) per iniezione endovenosa lenta. Se vi è stato contatto cutaneo, detersioni con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

— Alcune controindicazioni:
La morfina e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool e sostanze grasse.

DOSI D'IMPIEGO

Il MITEX E 50 è efficace contro uova, ninfe e adulti di acari che infestano: piante da frutto (meli, peri, peschi), viti, agrumi, cotone, pomodori, piante ortive, fiori.

Dosi d'impiego: gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua.

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere il MITEX E 50, nella dose occorrente a poca acqua e, dopo aver agitato, versare l'emulsione ottenuta nella quantità di acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Irrorare l'emulsione sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore curando una perfetta nebulizzazione, in modo da bagnare entrambe le pagine delle foglie.

E' consigliabile l'aggiunta di 10-20 gr. di Bagnante Adesivo L/2 per ettolitro di emulsione pronta per l'uso.

Il MITEX E 50 agisce anche contro gli afidi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

2965

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

OVICIDA ESTIVO

Specifico per la lotta contro le uova d'estate e le larve degli Acari

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 20 Fenson puro (da p.a. tecnico al 98-99%).
Bagnanti e disperdenti quanto basta a 100.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).
Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.
Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.
Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

CARATTERISTICHE

L'**Ovicida Estivo** è una polvere bagnabile che si impiega per la distruzione delle uova estive e delle larve degli Acari di varie specie (Ragno Rosso).

MODALITA' D'IMPIEGO

Su fruttiferi, vite, colture orticole, ornamentali i trattamenti vanno eseguiti quando si nota la prima apparizione delle uova estive e vanno di solito ripetuti alla distanza di 10-15 giorni alla dose di gr. 150-200 per ettolitro d'acqua. Il trattamento deve essere effettuato avendo cura di colpire le uova sulle due pagine delle foglie.

PREPARAZIONE

Sciogliere il prodotto in poca acqua e diluirlo in seguito alla quantità voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'**Ovicida Estivo** non è miscibile con poltiglia bordolese o altri prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

Attenzione:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 2965 **Ministero Sanità del** . 4.1.79. . . .

E/1

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

HERBIDAL RISO S

Diserbante selettivo di post-emergenza contro il Giavone del riso

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 35 di Propanil puro (pari a gr. 38,04 di prodotto tecnico al 92%).
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. N. 2968 : Ministero Sanità del 4.4.1980 . . . .
E/2

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'Herbidal Riso S è un erbicida selettivo per prevalente azione di contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e dell'infestante.

ISTRUZIONI PER L'USO

L'Herbidal Riso S viene impiegato per la lotta contro il Giavone (Echinocla crusgalli) e qualche altra specie infestante della risaia nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto può essere applicato con le comuni attrezzature, diluito in quantità di acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere.

Epoche di intervento

L'applicazione del prodotto va effettuata quando il Giavone si trova nello stadio compreso tra la 1ª e 3ª foglia; in questa fase presenta la massima sensibilità. In linea di massima il Giavone si presenta allo stadio di 2ª-3ª foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina del riso; l'oscillazione è in rapporto alla temperatura e alle condizioni della risaia. Allo scopo di ottenere la massima contemporaneità di nascita del Giavone si consiglia di tenere **un livello d'acqua molto basso** (al massimo 8-10 cm) dopo la semina del riso. In questo modo si avrà la gran parte del giavone allo stesso stadio di sviluppo al momento del trattamento e la quasi totale eliminazione delle nascite successive dell'infestante.

DOSI D'IMPIEGO

In normali condizioni di vegetazione, cioè con temperatura elevata e Giavone succulento in attiva crescita, le dosi sono le seguenti:

a) Giavone con 2-3-4 foglie, **ma in prevalenza sulla 3ª foglia**: kg. 13 per ha;

b) Giavone 3ª-4ª foglia e **qualche** pianta all'inizio dell'accestimento: kg. 16 per ha;

c) Giavone dalla 3a-4a foglia all'accestimento che comprende, come massimo, piante con due germogli secondari: kg. 19-20 per ha.

La valutazione dello stadio delle piantine deve essere fatta accuratamente ed al massimo il giorno prima del trattamento. In particolare bisogna stabilire il dosaggio in relazione allo stadio delle piantine che si trovano sulle parti di terreno più alte e che quindi sono le più avanzate.

Per combattere il Giavone «invecchiato», cioè cresciuto con andamento climatico caratterizzato da basse temperature e quindi dotato di apparato radicale molto robusto e profondo in rapporto all'apparato fogliare, aumentare le dosi d'impiego come segue in relazione agli stadi vegetativi sopra riportati:

a) kg. 15 per ha
b) kg. 18 per ha
c) kg. 22 per ha

MODALITA' D'IMPIEGO

L'Herbidal Riso S va diluito in un quantitativo di acqua variabile a seconda del mezzo di distribuzione impiegato:

— con motopompe a barra munite di ugelli: lt. 300-400/ha

— con pompe a spalla: lt. 400-500/ha

Nel caso di impiego delle dosi massime (inizio accestimento) è consigliabile aumentare il quantitativo d'acqua a 600-700 lt/ha. La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile, e cioè a circa 50 cm da terra.

L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutte le piante di Giavone, in modo da conseguire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina dell'infestante. **La distribuzione dell'erbicida va eseguita con risaia in asciutta,** per la qual cosa è sufficiente, di norma, togliere l'acqua dalle camere 24-36 ore prima del trattamento.

Anche le piantine di Giavone dovranno essere asciutte. La risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24 ore, dopo di che si dovrà ridare l'acqua e mantenerla per 6-8 giorni al più alto livello possibile. Nel caso di riso trapiantato effettuare la distribuzione tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi a livello degli apici delle foglie del riso, per meglio colpire le piantine di Giavone che possono risultare protette dalla vegetazione del riso già abbastanza espansa.

Evitare di trattare nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza tre-sei ore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

L'**Herbidal Riso S** non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi o altri antiparassitari, non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi d'impiego più elevate l'**Herbidal Riso S** sotto particolari condizioni può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie del riso che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piantine di riso. Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti ed altre.

Non eseguire il trattamento oltre 6 settimane dal trapianto del riso e non impiegare più di Kg. 8 di ingrediente attivo di prodotto per ha. e per stagione.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Tenere lontano dal fuoco.

Dopo il trattamento lavare con acqua pura le attrezzature.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2969

MALITAL

INSETTICIDA

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di gr. 100:

Malathion puro	gr 47,50
Emulsionanti e solventi	q.b. a gr. 100
(Contiene Xilolo)	

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
CONSIGLI TERAPEUTICI: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

MALITAL dev'essere impiegato nelle proporzioni sottoindicate, diluendo le dosi utili nella quantità d'acqua prefissata. Rimescolare fino ad ottenere una miscela omogenea e, quindi, irrorare la stessa sulle colture infestate con pompe a ugelli nebulizzanti.

Riferendosi a 100 litri d'acqua, le dosi sono:

Frutticoltura (pomacee, drupacee, fragole, frutta a guscio):	
Afide verde, Afidi in genere	gr. 250-300
Tingidi, Perrisie, Tendredini, Monosteria del mandorlo	gr. 200-250
Olivicoltura:	
Tripide, Rinchite	gr. 200-300
Viticoltura:	
Oziorrinco della vite, Anomala	gr. 200-250
Agrumicoltura:	
Afidi, Tripidi, Cicalina	gr. 200-250
Cereali e Foraggere:	
Fitonomo, Sminturo della medica	gr. 200-250
Colture Orticole (ortaggi a foglia, a frutto, a radice; patata, cavolo, carciofo) e Ornamentali in pieno campo	
Afidi, Aleurodidi, Crisomela del pioppo, Tingide del platano	gr. 250-300

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: MALITAL può essere usato congiuntamente ad altri antiparassitari ad eccezione degli zolfi bagnabili e dei fungicidi a base di rame.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: MALITAL è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Officina di produzione: SARIAF S.p.A. - FAENZA

10095 GRUGLIASCO - TORINO - Via Cravero, 110
Società Prodotti Chimici
Reparto Agricoltura

Registrazione Ministero della Sanità N. 2969 del 2-2-1979

DA NON VENDERSI SFUSO. **PESO Kg.**

2970

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

KELTHANE* MF

Acaricida agricolo con una attività residua, ed una efficacia anche nella stagione estiva.

* Marchio reg. Rohm & Haas - Philadelphia, U.S.A.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 42 DICOFOL puro (da p.a. tecnico minimo all'82%)
Sostanze adesivanti, emulsionanti e solventi quanto basta a 100.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. N. 2970 . **Ministero Sanità del** . 25.5.79 . . .

E/1

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave. In luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione
Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).
Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.
Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.
Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.
Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni
Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

CARATTERISTICHE

Il KELTHANE MF è efficace nel controllo dei vari acari. Esso ha un potere iniziale abbattente ed un effetto residuo. E' efficace contro ragnetti rossi, gialli, allungati.

APPLICAZIONI

Su pomacee: gr. 125 per hl.
Su drupacee: gr. 100-125 per hl.
Su vite, agrumi, noce, nocciuolo, fragole, lampone, ortaggi: gr. 100-125 per hl.
Per il controllo degli acari sulle rose, azalee, cactus, astri, crisantemi, ciclamini, dalie, gigli, gardenia, gerani, gladioli, edera, ortensia, petunia, oleandri, usare da 60 a 120 gr. per 100 litri d'acqua. Sulle piante sensibili usare la dose più bassa, con forti attacchi si raccomanda di usare le dosi alte. Ripetere i trattamenti a seconda della necessità.
Trattare accuratamente le piante onde assicurare una completa copertura di tutte le foglie. Sulle foglie difficili a bagnarsi aggiungere l'Etaldyn.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il KELTHANE MF è compatibile con la maggior parte degli altri insetticidi e fungicidi e può essere usato da solo o in combinazione con Parathion., Malathion, Dithane, Karathane, zolfo ed olii.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare su melanzane: tale coltura può essere danneggiata.
Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Tenere lontano dal fuoco.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

2971

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SUTAN® 6 E

Erbicida contro le infestanti del mais
Emulsionabile per trattamenti liquidi

Contiene Xilolo

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 78,25 Butylate puro (pari a gr. 79,44 di prodotto tecnico al 98,5%).
Ingredienti incerti quanto basta a 100.

(R) Marchio reg. Stauffer Chemical Company New York

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **Sutan 6 E** è un erbicida selettivo per la lotta contro le erbe infestanti del mais.
Agisce sui semi in germinazione delle seguenti malerbe

Infestanti annuali sensibili: Echinochloa crusgalli, Digitaria spp., Setaria faberii, Setaria glauca, Setaria viridis, Eleusine indica, Sorghum halepense, Panicum dichotomiflorum.

Infestanti perenni sensibili: Cyperus rotundus, Cyperus esclulentus.

Il Sutan 6 E si impiega prima della semina del mais.

Per la preparazione della miscela, sciogliere la dose consigliata di **Sutan 6 E** in un volume doppio e triplo d'acqua; versare questa miscela nell'irroratrice e portare a volume.

Il trattamento va effettuato con i normali mezzi d'irrorazione su terreno uniforme, ben livellato, libero da zolle e da erbe, alla dose di Kg 6/ha, impiegando 600-800 litri di acqua per ettaro.

Immediatamente dopo il trattamento, si deve procedere all'incorporazione del prodotto nel terreno, alla profondità di cm. 5-7.

Per effettuare tale operazione è consigliabile l'impiego di un erpice a dischi seguito da un erpice a denti per pareggiare il terreno, possibilmente in un unico passaggio; con tali attrezzature non è necessario effettuare il lavoro incrociato a meno che il terreno non sia molto umido.

Può essere altresì impiegato un erpice a denti, effettuando 2-3 passaggi incrociati; oppure una zappa rotativa, facendo però attenzione che con tale attrezzatura il prodotto non venga interrato a profondità eccessiva.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con erbicidi a base di atrazina.
Per miscibilità con altri erbicidi o insetticidi si consiglia di effettuare saggi preliminari.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In caso di varietà di mais di cui non si conosce il comportamento verso questo diserbante, si consiglia di eseguire prime prove parcellari.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 2971 **Ministero Sanità del** . . 2.12.78. . .
E/1

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

KELTHANE* W

Acaricida agricolo con una attività residua, ed una efficacia anche nella stagione estiva.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 18.5 DICOFOL puro (da p.a. tecnico minimo all'82%)
Sostanze inerti, adesivanti e bagnanti quanto basta a 100

* Marchio reg. Rohm & Haas - Philadelphia, U.S.A.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

ISTRUZIONI

Il **KELTHANE W** è efficace nel controllo di vari acari che attaccano i frutteti e le colture agrarie in genere. Esso ha un potere abbattente ed un effetto residuo.

Il **KELTHANE W** è un acaricida selettivo il quale rispetta la maggior parte dei predatori degli acari. E' efficace contro ragnetti rossi, gialli.

Trattare, bagnando accuratamente ed abbondantemente le piante quando appaiono i primi acari.

L'aggiunta di gr. 20-30 di bagnante Adesivo Liquido/2 per hl. di poltiglia, aumentando la bagnabilità, potenzia l'azione del **KELTHANE W** stesso. L'aggiunta di Bagnante Adesivo Liquido/2 è indispensabile dovendosi trattare piante o frutti ricchi di pruina o comunque difficilmente bagnabili.

Il **KELTHANE W** si può impiegare su tutte le colture: fruttifere, erbacee, ornamentali.

FRUTTIFERI E AGRUMI:

Per controllare gli acari, usare da 200 a 250 gr. di **KELTHANE W** per 100 litri di acqua.

VITE:

Contro i ragnetti gialli e rossi, impiegare gr. 200-250 di **KELTHANE W** per 100 lt. di acqua, iniziando i trattamenti, se necessario, in primavera, quando i getti sono lunghi cm. 2-5. In tale periodo avviene la fuoriuscita degli adulti. Nei trattamenti estivi, iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti sulle foglie.

FRAGOLE ED ORTAGGI VARI:

Iniziare i trattamenti al primo comparire degli acari, impiegando gr 200-250 di **KELTHANE W** per 100 litri d'acqua.

PIANTE ORNAMENTALI:

Per il controllo degli acari sulle rose, azalee, astri, ciclamini, crisantemi e varie altre piante ornamentali, usare da 200 a 250 gr. di **KELTHANE W** per 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **KELTHAME W** è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.

Non è compatibile con i polisolfuri, la poltiglia bordolese ed altri materiali fortemene alcalini.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo i carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non applicare il **KELTHANE W** su melanzane: tale coltura può essere danneggiata.

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 2974. **Ministero Sanità del** .2.12.19.78 . . .

E/1

2982

A 11 Anticrittogamico

Polvere bagnabile
Fungicida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
60 g mancozeb puro
15 g zineb puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

Sintomi di intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).*

Terapia: *in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.*

In caso di ingestione lo Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e enemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

Indicazioni e dosi (per 100 litri d'acqua)
Peronospora della vite: 200-300 g

Ticchiolatura del melo e del pero: 200-300 g
Si impiega sia nei trattamenti pre-florali che in quelli post-florali. Non usare il prodotto sulle varietà di pero sensibili allo zineb (Coscia, Spadona, Scipiona, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Curato, Principessa di Gonzaga, Zucchermanna, Gentil Bianca, Gentilona, Spadoncina, Mora, Giardina, Spinacarpi, Armella, S. Maria, Decana del Comizio, Abate Fetel).

Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi del pomodoro (solo fino alla prima fioritura): 250-350 g

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA.

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo esclusi quelli alcalini, come poltiglia bordolese e polisolfuri.

« Avvertenza »: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CIBA-GEIGY S.p.A., ORIGGIO (VA)
Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*

Registrazione Ministero della Sanità n. 2982 dell'8-11-1978

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, LONTANO DALL'UMIDITÀ E DAL CALORE

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Oltre alle consuete norme igieniche, proteggere gli occhi quando si maneggia il prodotto concentrato, o lo si applica in ambienti chiusi.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

"NIMROD OIDIUMSTOP"

Fungicida liquido emulsionabile ad azione diretta per la difesa di melo, melone, pesco e rosa in pieno campo contro il mal bianco (oidio).

COMPOSIZIONE

Bupirimate puro . . . . g 25,6
Emulsionanti, diluenti, bagnanti . . . . q. b. a g 100
(contiene mesitilene)

CLASSE III

Attenzione: MANIPOLARE CON PRUDENZA

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità N° 2983 del 13-11-1978
'NIMROD' Marchio registrato della Imperial Chemical Industries PLC
'OIDIUMSTOP' Marchio depositato ICI Solplant S.p.A.

Il 'NIMROD OIDIUMSTOP' è un fungicida specifico contro l'oidio. Ha azione preventiva e curativa; manifesta attività fumigante. Si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini. L'assorbimento dei depositi del prodotto presenti sui germogli in accrescimento concorre alla difesa delle nuove foglie che si sviluppano su di essi. Stante la sua azione specifica il 'NIMROD OIDIUMSTOP' può essere preso in considerazione nei programmi di lotta integrata.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 l di acqua)

Melo : g 30 - 60
Melone: g 50 - 100
Pesco : g 50 - 100
Rosa : g 150 - 300

N.B. - salvo che nell'impiego su melo, si consiglia di unire all'emulsione pronta il bagnante 'Agral' in ragione dello 0,1%. Bagnare abbondantemente. Impiegare la dose più alta nel caso di forte infestazione.

EPOCA DI INTERVENTO

Melo : prefioritura (orecchiette di topo)
Rosa, Melone, Pesco : inizio comparsa della malattia

Successivamente: ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'andamento della malattia.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

È compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi impiegati in frutticoltura. **È compatibile anche con olio bianco.**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare il melo Imperatore (Morgenduft). Può risultare fitotossico anche per le cv. di melo Gravenstein e Idared.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:

— melo
— pesco 21 giorni
— melone

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO **It**

2993

T I O V I T

zolfo bagnabile micronizzato da usarsi in frutticoltura, viticoltura, orto-floricoltura contro oidi, ticchiolatura

Composizione

gr. 80 di zolfo tecnico al 99,9% di purezza minima, equivalenti a gr. 79,92 di zolfo puro; disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.
Esente da selenio.

CLASSE IV

Norme precauzionali

— *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;*
— *non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;*
— *dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Campi di impiego	**Dosi di impiego in litri 100 di acqua**
In viticoltura	0,4-0,2% = gr. 400-200 Nelle zone a clima particolarmente caldo diminuire la dose, nei trattamenti estivi, a 0,15-0,1%.
In frutticoltura	0,5-0,2% = gr. 500-200 Contro l'Oidio del melo trattare presto e a fondo in primavera con 0,75% di TIOVIT + 0,1% di SANDOVIT LIQUIDO (bagnante-adesivo).
In orto-floricoltura	0,5-0,15% = gr. 500-150

In tutti i campi di applicazione diminuire gradatamente le dosi di impiego con l'elevarsi della temperatura ambiente, non irrorare durante le ore di grande calore o di forte insolazione e neppure colture che soffrono per siccità.

Modalità di impiego

Stemperare il TIOVIT in poca acqua per ottenere una sospensione senza grumi, diluire poi fino alla concentrazione desiderata. Con le motopompe munite di un agitatore basta versare il TIOVIT durante il riempimento delle stesse, tenendo l'agitatore in moto.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il TIOVIT può essere usato da solo o in miscela con anticrittogamici, insetticidi e acaricidi di produzione SANDOZ e, in genere, con tutti gli antiparassitari normalmente consigliati per le colture sulle quali viene utilizzato lo stesso TIOVIT.

Non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano e ftalimidici in genere, con DDVP, con Binapacryl, Euparen.

AVVERTENZA: Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Per la preparazione delle poltiglie miste versare la sospensione concentrata di TIOVIT nella poltiglia antiparassitaria prescelta e già pronta all'uso, agitando bene.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Styman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 2923 del 11.11.78 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg. 1**

30

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NAFTIL 50 MICRONIZZATO

Insetticida agricolo.
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 49,5 Carbaryl puro (da p.a. tecnico al 99%) esente da beta-naftolo
Sostanze diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).**

— **Sintomi d'intossicazione:**
Nausea - vomito - diarrea - scialorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.

— **Consigli terapeutici:**
Lavaggio gastrico con bicarbonado di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno - Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini - Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive - Ossigenoterapia se vi è cianosi.

CARATTERISTICHE

Il NAFTIL 50 MICRONIZZATO è un insetticida polivalente a grande persistenza anche con andamento stagionale molto caldo e secco. La sua micronizzazione favorisce la preparazione della poltiglia, un'ottima sospensione, una perfetta adesività e l'impiego con tutti gli apparecchi distributori.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3041. **Ministero Sanità del** .23.4..79. . . .

E/1

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

Dose: gr. 150-250 per 100 litri di acqua.

IN FRUTTICOLTURA:
Contro la Carpocapsa del melo e del pero, le Tortrici del melo (Capua, Cacoecia), l'Antonomo, la Cocidomia delle foglie del pero, la Cydia del pesco, la Campa del mandorlo, il verme delle susine e delle albicocche, l'Antonomo e il verme del lampone, il verme delle noci, Tentredini, Falene e tignole varie; limita lo sviluppo delle minatrici delle foglie, degli afidi e delle psille.

IN VITICOLTURA:
Contro le tignole dell'uva, il sigaraio, la piralide e le cicaline della vite.

IN ORTICOLTURA:
Contro la dorifora della patata, altiche, nottue, cavolaie, piralidi, la tignola del porro, la depressaria e idroecia del carciofo e numerosi altri insetti degli ortaggi.

COLTURE INDUSTRIALI:
Contro la tignola dell'aglio, le casside, altiche, nottue, lixus e cleolo della barbabietola; il fitonomo, apion, misurino e sputacchine della medica e del trifoglio; antonomo, verme rosa e cicaline del cotone.

IN FLORICOLTURA:
Contro la bega del garofano, afidi e tentredini delle rose, tripidi e cetonie.

IN OLIVICOLTURA:
Contro la tignola dell'olivo e la cocciniglia Mezzograno di pepe.

IN AGRUMICOLTURA:
Contro le tignole degli agrumi, la piralide, la cocciniglia Mezzograno di pepe.

IN PIOPPICOLTURA:
Contro la Crisomela e gli insetti defogliatori dei pioppeti.

IN SELVICOLTURA:
Contro la Limantria e gli insetti defogliatori.

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare il NAFTIL 50 MICRONIZZATO in poca acqua e poi diluirlo al volume desiderato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il NAFTIL 50 MICRONIZZATO è generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Non è compatibile con poltiglia bordolese, borgognona e solfocalcica.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Sul melo (soltanto su quello) non impiegare il prodotto per 30 gg. dopo la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

3042

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ALLISAN* 50 PB

Fungicida organico per colture ortive e floreali.
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 Dicloran puro (da p.a. tecnico al 95-97%).
Ingredienti inerti quanto basta a 100

* Marchio registrato della BOOTS - NOTTINGHAM - ENGLAND
Riconfezionato e distribuito dalla RAVIT S.p.A. - Torino

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'ALLISAN 50 P.B. è specifico per combattere, mediante trattamenti al terreno o alla coltura, tutte le forme di marciumi provocati da Botrytis e Sclerotinia su colture ortive, floreali, frutticole.

Ha dimostrato altresì una certa efficacia contro altre forme di marciumi pedali o radicali provocati da funghi del terreno, quali ad es. « mal del colletto del garofano » da Rizottonia.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3042 **Ministero Sanità del** 6.4.79. . . . .

E/1

DOSI E NORME D'IMPIEGO

INSALATE, contro « marciumi del colletto » da Botrytis e Sclerotinia;

ORTAGGI (pomodori, melanzane, peperoni, agli, cipolle, basilico, carote) in serra o all'aperto, contro marciumi pedali e radicali.

Trattamenti al terreno (pre-semina o pre-trapianto) gr 150-250 di ALLISAN 50 P.B. sospesi in acqua e irrorati su mq. 100 di superficie. Dopo il trattamento, interrare a 1-2 cm. di profondità con un rastrello.

Trattamenti alla coltura: (in semenzaio o a dimora): irrorare le piante al colletto con gr. 150-200 di ALLISAN 50 P.B. sospesi in 100 litri di acqua. Effettuare 2-3 trattamenti, a seconda dell'andamento stagionale, a distanza di 2-3 settimane l'uno dall'altro.

Non trattare le piantine di insalata o altri ortaggi prima della comparsa delle prime due foglie vere (4 foglie totali) o prima che siano trascorsi almeno 14 giorni dal trapianto. Non trattare piantine appassite; non trattare in pieno sole e durante le ore calde della giornata.

AGLIO, contro Sclerozio: impolverare i bulbilli di semina con gr. 500 di ALLISAN 50 P.B. per q.le di bulbilli.

PIANTE ORNAMENTALI (tulipani, giacinti, iris, ciclamini, begonie, rose, crisantemi) per prevenire attacchi da Botrytis o altre muffe.

Trattamenti alla coltura: 1 o 2 irrorazioni sulle foglie e al colletto delle piante, con ALLISAN 50 P.B. alla dose di gr. 100-200 in 100 litri di acqua.

GLADIOLI, per controllare Botrytis e Sclerotinia.

Trattamenti al terreno: lungo il solco destinato a ricevere i bulbi, eseguire un trattamento, mediante irrorazione, con gr. 800 di ALLISAN 50 P.B. sospesi in 100 litri di acqua. Usare 5 litri c.a. di tale soluzione per 20 metri di solco.

GAROFANI ED ALTRI FIORI, contro il « mal del colletto » da Rizottonia del garofano ed altri marciumi petali di altri fiori.

Trattamenti al terreno: stesse dosi e modalità delle insalate.

Trattamenti alla coltura: stesse dosi e modalità delle insalate. Effettuare più trattamenti, a seconda dell'andamento stagionale, a 4 settimane l'uno dall'altro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'ALLISAN 50 P.B. è incompatibile con prodotti in formulazione oleosa e con i concimi fogliari. E' compatibile con gli altri antiparassitari RAVIT. Si consiglia comunque di usarlo da solo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della mscelazione computa.

AVVERTENZE

L'ALLISAN 50 P.B. non deve essere irrorato su piantine ancora giovani quando la temperatura è molto elevata: trattare nelle ore più fresche della giornata.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

CLASSE II

NOCIVO

BARIOVIT

Polisolfuro di Bario RAVIT 45% di zolfo attivo solubile.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 (Polisolfuro di bario tecnico al 90% gr. (corrispondente a gr. 45 di zolfo attivo)
Coformulanti quanto basta a 100.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N.3.060. **Ministero Sanità del** .23.4.79 . . .

E/1

Natura del rischio

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto orale - nausea - vomito - coliche addominali - diarrea profusa - crampi muscolari - convulsioni - bradicardia - dispnea (la morte avviene in piena coscienza per paralisi respiratoria).

Consigli terapeutici:
Lavanda gastrica con solfato di sodio o magnesio - analettici cardiorespiratori -spasmolitici, fleboclisi con aspartato di potassio (1-3 mEq K flebo).

CARATTERISTICHE

Il BARIOVIT (Polisolfuro di Bario Ravit) è un prodotto diaspicida ed anticrittogamico.
Il BARIOVIT (Polisolfuro di Bario Ravit) presenta un contenuto in zolfo solubile attivo e presenta inoltre le seguenti caratteristiche:
- da una soluzione in 100 litri di acqua di densità pari a 1° Bé ogni kg. di prodotto impiegato;
- si scioglie direttamente in acqua senza alcuna complicata manualità;
- può essere usato immediatamente senza preventiva decantazione;
- non causa ustioni alle piante trattate se applicato secondo le prescrizioni.

PRINCIPALI IMPIEGHI

Il BARIOVIT (Polisolfuro di Bario Ravit) si impiega in frutticoltura nei trattamenti invernali per combattere parassiti animali (insetti) e vegetali (crittogame) come:
L'ASPIDIOTUS PERNICIOSUS di tutti i fruttiferi.
La DIASPIS PENTAGONA delle Drupacee.
La gomma e la bolla del pesco, susino, ciliegio.
Le forme svernanti della ticchiolatura.

Su Pomacee, all'ingrossamento delle gemme: dose Kg. 4-6 per ettolitro di acqua.

Su Drupacee, all'ingrossamento delle gemme: dose kg. 3-5 per ettolitro di acqua.

Su Olivo, contro cocciniglie, Fumaggine, Occhio di Pavone, prima della fioritura. dose: kg. 1-1,5 per ettolitro di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« *Attenzione:* da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

3083

Insetticida liquido a base di formotione ad azione endoterapeutica e di contatto

Composizione

gr. 25 di formotione (0,0-dimetil S-(N-formil-N-metilcarbamoilmetil)-ditiofosfato) puro, (da formotione tecnico al 93% di purezza minima) solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.
Contiene xilolo

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

- Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo
- Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
  In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia;

  iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

  Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

  Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi
  Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
- Controindicazioni
  Morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3083 **del** 19.4.1979 **Ministero della Sanità.**

Parassiti combattuti	**Dosi di impiego in litri 100 di acqua**
Mosca delle olive, Mosca delle bietole	0,15 - 0,2% = gr. 150 - 200
Mosca delle ciliegie	0,1 - 0,15% = gr. 100 - 150
Mosca della frutta (Ceratitis capitata)	0,2% = gr. 200
Afidi, Psille, Iponomeute, Tentredini, Cicadelle, Maggiolini, Tortrici	0,15 - 0,2% = gr. 150-200
Larve minatrici	0,2% = gr. 200

L'ANTHIO distribuito per la lotta contro uno dei parassiti sopra ricordati, purchè nella dose dello 0,2%, è attivo anche contro la Carpocapsa pomonella.

Modalità di impiego

Versare il quantitativo necessario di ANTHIO direttamente nell'acqua, agitando energicamente.

In linea del tutto generale i trattamenti con ANTHIO devono essere eseguiti alla prima comparsa dei diversi parassiti e ripetuti, secondo necessità e secondo la biologia dei parassiti stessi.

Per la lotta contro: Mosca delle olive, Mosca delle ciliege e Mosca della frutta seguire i consigli dei Tecnici delle zone interessate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

L'ANTHIO è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione Sandoz. Per la preparazione delle poltiglie miste diluire l'ANTHIO in poca acqua prima di aggiungerlo alla poltiglia prescelta.

Usare possibilmente la poltiglia nello stesso giorno della sua preparazione.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non usare le dosi più elevate in colture di cetrioli.

Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta per ortofrutticoli e frutta. 21 giorni per l'olivo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali .

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

31

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

ARACIDE

Prodotto ovolarvicida per la lotta contro il Ragno Rosso sia nel periodo invernale che estivo

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 20 di Clorbenside puro (da p.a. tecnico al 97-99%).
Sostanze adesivanti e disperdenti quanto basta a 100.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevante o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intosicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologia contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

CARATTERISTICHE

L'ARACIDE è un prodotto destinato alla lotta delle uova sia invernali che estive del ragno rosso.

DOSI D'IMPIEGO

L'ARACIDE s'impiega alla dose di gr. 200 per ettolitro di acqua, sui fruttiferi, sulla vite, sulle colture ortive e floreali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

E generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3104 **Ministero Sanità del** 25.5. 1979

E/1

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

3107

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

NAFTIL MICRONIZZATO

a base di Metilcarbammato di Naftil
Insetticida contro la Carpocapsa del melo, del pero e numerosi altri insetti di seguito indicati

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 85 Carbaryl (esente β-naftolo) puro.
Sostanze adesivanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, e con i mezzi più idonei, le confezioni che contengono il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

- **Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).**
- **Sintomi d'intossicazione:**

Nausea - vomito - diarrea - scialorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno - Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini - Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive - Ossigenoterapia se vi è cianosi.

CARATTERISTICHE

IL NAFTIL MICRONIZZATO è un insetticida polivalente a buona persistenza, anche con andamento stagionale molto caldo e secco. La sua alta concentrazione ne consente l'utilizzo a basse dosi. La sua micronizzazione favorisce la preparazione della poltiglia, la sospensione, una buona adesività e l'impiego con tutti gli apparecchi distributori.

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

Il NAFTIL MICRONIZZATO si impiega alla dose di gr. 120-150 per hl.

IN FRUTTICOLTURA:
Contro la Carpocapsa del melo e del pero, le Tortrici del melo (Capua, Cacoecia, l'Antonomo, la Cecidomia delle foglie del pero, la Cydia del pesco, la Campa del mandorlo, il verme delle susine e delle albicocche, l'Antonomo e il verme del lampone, il verme delle noci, Tentredini, Falene e tignole varie; limita lo sviluppo delle minatrici delle foglie, degli afidi e delle psille.

IN VITICOLTURA:
contro le tignole dell'uva, il sigaraio, la piralide e le cicaline della vite.

IN ORTICOLTURA:
contro la dorifora della patata, altiche, nottue, cavolaie, piralidi, la tignola del porro, la depressaria e idroecia del carciofo.

COLTURE INDUSTRIALI:
Contro la tignola dell'aglio, le casside, altiche, nottue, lixus e Cleono della Barbabietola; il fitonomo, apion, misurino e sputacchine, della medica e del trifoglio; antonomo, verme rosa e cicaline del cotone.

IN FLORICOLTURA IN CAMPO:
Contro la bega del garofano, afidi e tentredini delle rose, tripidi e cetonie.

IN OLIVICOLTURA:
Contro la tignola dell'olivo e la cocciniglia Mezzograno di pepe.

IN AGRUMICOLTURA:
Contro le tignole degli agrumi, la piralide, la cocciniglia Mezzograno di pepe.

IN PIOPPICOLTURA:
Contro la crisomela e gli insetti defogliatori dei pioppeti.

IN SELVICOLTURA:
Contro la limantria e gli insetti defogliatori.

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare IL NAFTIL MICRONIZZATO in poca acqua e poi diluirlo al volume desiderato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

E' generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.
Non è compatibile con poltiglia bordolese, borgognona e solfocalcica.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su melo (soltanto su quello) non impiegare il prodotto per 30 gg. dopo la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 7 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA

Non trattare gli alberi da frutto durante la fioritura essendo il prodotto tossico per gli insetti utili.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3107 Ministero della Sanità del 25-5-79

E/1

311(

CLASSE I^a

VELENO

METILON

Insetticida agricolo polivalente
Per trattamenti polverulenti

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono.
gr. 1,5 di Metilparathion puro (da p.a. tecnico al 95%).
disperdenti e inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura dei rischi:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Evitare di respirarne i vapori.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.

Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi piú idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde piú di un metro cospargendo con calce viva).

In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. N. 3110. **Ministero Sanità del** .25.5.79. . . .

E/1

CARATTERISTICHE

Il METILON è un insetticida organico di sintesi a base di Metilparathion per trattamnti polverulenti da impiegarsi in agricoltura, floricoltura, orticoltura, viticoltura e frutticoltura.

E' particolarmente adatto nella lotta contro gli insetti delle piante ornamentali, dei fiori, dei giardini, degli orti e delle serre.

IMPIEGO

Il METILON è efficace contro gli insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore, Afidi, Afide Lanigero, Aleuroidi del cavolo e delle serre, Altiche, Antonomo delle fragole, Casside delle barbabietole e dei carciofi, Cavallette, Cleono delle bietole, Cetonie, Criocera dell'asparago, Forbicine, Formiche, Grillotalpe, larve defogliatrici in genere, larve minatrici delle foglie, larve delle Tignole della vite, larve di Elateridi e di Maggiolini, Meligete del colza, Tripidi.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il METILON si applica ricorrendo ai comuni soffietti, ai solforatori a spalla o ai polverizzatori per colture in pieno campo.

Eseguire il trattamento in giornata asciutta e senza vento, quando la rugiada o la pioggia siano asciugate. Contro gli insetti del terreno (larve di Elateridi, Maggiolino) si sparge il METILON in modo uniforme e lo si incorpora al terreno mediante una leggera erpicatura o zappatura.

Contro le Grillotalpe, le Formiche il METILON deve essere insufflato nei loro nascondigli o lungo le strade da essi percorse.

DOSI D'IMPIEGO

E' in relazione alle dimensioni ed alla fittezza delle piante trattate. Normalmente per piante basse impiegare 15-25 kg di METILON per ettaro. Contro gli insetti del terreno (larve di Elateridi e di Maggiolino, Nottue, Tipule) si deve mescolarlo al terreno nella dose di 15 gr. per mq.

Ripetere il trattamento a seconda del bisogno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

E generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalle zone persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

3111

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

KOLLOVIT

Zolfo colloidale bagnabile dotato di sospensività e finezza per trattamenti liquidi - combatte l'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle piante ornamentali

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 zolfo puro colloidale (da p.a. tecnico al 99% minimo).
Sostanze bagnanti e disperdenti quanto basta a 100.
Esente da Selenio.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE GENERALI

Il **KOLLOVIT** si sospende in acqua formando una miscela stabile. Possiede persistenza ed adesività. E' di facile ed immediato impiego. E' attivo anche a basse temperature.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITICOLTURA:
Se usato solo, per i primi trattamenti contro l'Oidio, gr. 100-120 per hl. d'acqua.
Se aggiunto a prodotti contro la Peronospora, gr. 80-100 per hl. d'acqua.

FRUTTICOLTURA:
Contro l'Oidio del melo e del pesco, gr. 100-120 per hl. d'acqua.

AGRICOLTURA:
Contro l'Oidio del tabacco e delle colture floreali, gr. 100-120 per hl. d'acqua.

Diluire bene il prodotto in una piccola quantità d'acqua (poco più di mezzo lt. per kg. di prodotto) e poi aggiungere il volume d'acqua totale agitando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il KOLLOVIT è miscibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi della nostra gamma. Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, Captano, DDPV, Bynapacryl, Euparen.

E' raccomandata la miscela con l'R6 Erresel Super Bleu in quanto costituisce una combinazione per combattere contemporaneamente la Peronospora e l'Oidio della vite.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il KOLLOVIT, come tutti gli zolfi colloidali, va usato con molta oculatezza. Effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio. Distanziare i trattamenti di KOLLOVIT da quelli a base di Captano o di olii minerali di almeno tre settimane.

Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

In alcune varietà di meli (Stayman, Commercio e sulla Golden Delicious dopo la fioritura) sostituire il **Kollovit** con gr. 80-90 di Karathane PB. Con prodotti ftalimidici il KOLLOVIT può produrre fitotossicità nelle Delicious rosse, Stayman e Winesap.

AVVERTENZE

Nel caso di trattamenti misti mescolare preferibilmente il **Kollovit** alla polvere insetticida o fungicida è poi procedere come per la preparazione di una poltiglia semplice

Se gli insetticidi sono liquidi, essi vanno aggiunti alla poltiglia di KOLLOVIT già pronta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontane dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

E/1
Reg. N. 3111 **Ministero Sanità del** 25.5.79. . . .

Peso netto Kg.

311

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

SOFRIL 80

Zolfo bagnabile micronizzato per la lotta contro l'Oidio della vite, dei fruttiferi, delle piante ortive e ornamentali

ESENTE DA SELENIO

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 Zolfo puro micronizzato (da p.a. tecnico al 99% minimo).
Sostanze bagnanti e sospensive quanto basta a 100.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN VITICOLTURA:
Contro l'Oidio o Mal Bianco dalla ripresa vegetativa al raccolto gr. 200-300 per hl. d'acqua.

IN FRUTTICOLTURA:
Contro l'Oidio del melo: gr. 500-600 per hl d'acqua nei trattamenti pre-florali; gr. 200-300 nei trattamenti post-florali.
Contro l'Oidio dell'albicocco: gr. 300 per hl. d'acqua durante il periodo vegetativo.
Contro l'Oidio del pesco: dalla fine della fioritura gr. 200 per hl. d'acqua più gr. 70 di etaldyn. Se la temperatura decorre calda preferire gr. 70-80 di Karathane.

IN ORTICOLTURA E FLORICOLTURA:
Contro l'Oidio e Mal Bianco del pomodoro, peperone, melanzana, gr. 200-300 per hl. d'acqua più gr. 50 di Etaldyn.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3113 **Ministero Sanità del** . 25.5.79. . .

E/1

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire bene il SOFRIL 80 in una piccola quantità d'acqua (poco più di mezzo lt. per kg. di prodotto) e poi aggiungere il volume d'acqua totale agitando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SOFRIL 80 è miscibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi della nostra gamma. Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, Captano, DDPV, Bynapacryl, Euparen.
E' raccomandata la miscela con l'R6 Erresel Super Bleu in quanto costituisce una combinazione per combattere contemporaneamente la Peronospora e l'Oidio della vite.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il SOFRIL 80, come tutti gli zolfi colloidali, va usato con molta oculatezza. Effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio. Distanziare i trattamenti di SOFRIL 80 da quelli a base di Captano o di olii minerali di almeno tre settimane.
Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

In alcune varietà di meli (Stayman, Commercio e sulla Golden Delicious dopo la fioritura) sostituire il Sofril 80 con gr. 80-90 di Karathane PB.
Con prodotti ftalimidici il SOFRIL 80 può produrre fitotossicità nelle Delicious rosse, Stayman e Winesap.

AVVERTENZE

Nel caso di trattamenti misti mescolare preferibilmente il SOFRIL 80 alla polvere insetticida o fungicida e poi procedere come per la preparazione di una poltiglia semplice.
Se gli insetticidi sono liquidi, essi vanno aggiunti alla poltiglia di SOFRIL 80 già pronta.
Nel corso dei trattamenti tenere lontane dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

3120

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

OSSICLORURO DI RAME BPD 35

Anticrittogamico.
Polvere Bagnabile per trattamenti liquidi.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 35 Rame metallico (sottoforma di Ossicloruro tetraramico)
Sostanze diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande e corsi d acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

L'OSSICLORURO DI RAME BPD 35 può essere impiegato contro le malattie crittogamiche delle piante alle dosi di seguito indicate:
Peronospora della vite: Dose gr. 400-700 in 100 lt. d'acqua.
Ticchiolatura del melo e del pero: Dose gr. 300-700 in 100 lt. d'acqua in trattamenti pre-florali; gr. 300-350 in trattamenti post-florali.
Sulle varietà sensibili al rame, nel corso della vegetazione, impiegare acuprici.
Bolla e Vaiolo del pesco e del mandorlo: dose gr. 1000 in 100 lt. d'acqua, alla caduta delle foglie ed a fine inverno.
Peronospora e Nebbia della patata e del pomodoro. Antracnosi del pisello: Dose gr. 500-700 in 100 lt. d'acqua.
Cercospora delle bietole: Dose gr. 500-800 in 100 lt. d'acqua.
Occhio di pavone e Lebbra dell'olivo: Dose gr. 400-500 in 100 lt. d'acqua.

Dovendo eseguire trattamenti su piante difficilmente bagnabili (es. olivi) aggiungere alla miscela di Ossicloruro di rame BPD 35, pronta per l'uso, il Bagnante Adesivo Liquido/2 in ragione di gr. 20/hl.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 3120. Ministero Sanità del 25.5.1979

E/2

NORME PER LA PREPARAZIONE E L'IMPIEGO DELLA MISCELA

Aggiungere l'OSSICLORURO DI RAME BPD 35, nella dose occorrente, in poca acqua, e, dopo aver agitato, versare la poltiglia ottenuta nella quantità di acqua necessaria per raggiungere la voluta concentrazione.
La miscela così preparata va irrorata uniformemente sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'OSSICLORURO DI RAME BPD 35 può essere impiegato in miscela ad insetticidi acaricidi (Ovomitex) per la lotta contemporanea contro le malattie crittogamiche, insetti e ragnetti rossi nonché in miscela a zolfi bagnabili (Sulfosol) per combattere anche oidio, mal bianco, nebbie.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
(*) - Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.
(**) - Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

OSSICLORURO DI RAME BPD 16

Anticrittogamico in polvere bagnabile per trattamenti liquidi.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 16 Rame metallico (sottoforma di Ossicloruro tetraramico)
Sostanze diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande e corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

L'OSSICLORURO DI RAME BPD 16 può essere impiegato contro le malattie crittogamiche delle piante alle dosi di seguito indicate:

Peronospora della vite: Dose gr. 1000-1500 in 100 lt. d'acqua.

Ticchiolatura del melo e del pero: Dose gr. 600-1500 in 100 lt. d'acqua nei trattamenti pre-florali, gr. 600 in 100 litri di acqua nei trattamenti post-florali, gr. 3000 in 100 litri di acqua nei trattamenti invernali.

Bolla e Vaiolo del pesco e del mandorlo: Dose gr. 3000 in 100 lt. d'acqua, in trattamenti al bruno.

Peronospora e Nebbia delle patate e del pomodori. Antracnosi del pisello: Dose gr. 1500-2000 in 100 lt. d'acqua.

Cercospora delle bietole: Dose gr. 1500-2000 in 100 lt. d'acqua.

Occhio di pavone e Lebbra dell'olivo: Dose gr. 1000-1500 in 100 lt. d'acqua.

Dovendo eseguire trattamenti su piante difficilmente bagnabili (es. olivi) aggiungere alla miscela di Ossicloruro di rame BPD 16, pronta per l'uso, il Bagnante Adesivo Liquido/2 in ragione di gr. 20/hl.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 3121 . Ministero Sanità del 25.5.1979 . .

E/2

NORME PER LA PREPARAZIONE E L'IMPIEGO DELLA MISCELA

Aggiungere l'OSSICLORURO DI RAME BPD 16, nella dose occorrente, in poca acqua e, dopo aver agitato, versare la poltiglia ottenuta nella quantità di acqua necessaria per raggiungere la voluta concentrazione.

La miscela così preparata va irrorata uniformemente sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'OSSICLORURO DI RAME BPD 16 è miscelabile con insetticidi acaricidi (Ovomitex) e zolfi bagnabili (Sulfosol).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.

Su pesco, e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) - Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

(**) - Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

3140

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

WETTION

Zolfo bagnabile per la lotta contro l'Oidio della vite, dei fruttiferi, delle piante ortive e ornamentali

Composizione:
Gr 100 di prodotto contengono:

gr. 60 Zolfo attivo puro (da p.a. tecnico al 99% minimo).

Sostante disperdenti e bagnanti quanto basta a 100.

ESENTE DA SELENIO

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il WETTION è un prodotto disperdibile in acqua dotato di adeguata sospensività.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN VITICOLTURA:
Contro l'Oidio o Mal Bianco nei trattamenti iniziali primaverili gr. 500-600 per hl. Nei trattamenti successivi gr. 300-400 per hl.

IN FRUTTICOLTURA:
Contro l'Oidio del Melo: gr. 500-600 per hl. d'acqua nei trattamenti pre-floreali, gr. 250-300 nei trattamenti post-florali.
Contro l'Oidio dell'Albicocco: gr. 300 per hl. d'acqua durante il periodo vegetativo. Contro l'Oidio del pesco: dalla fine della fioritura gr. 300 per hl. d'acqua.

IN ORTICOLTURA E FLORICOLTURA:
Contro l'Oidio e Mal Bianco del pomodoro, peperone, melanzana: gr. 300-400 per hl. d'acqua.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3140. **Ministero Sanità del** . . . 25.5.79. .

E/1

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire bene il prodotto in una piccola quantità di acqua (poco più di mezzo lt. per kg. di prodotto) e poi aggiungere il volume d'acqua totale agitando accuratamente

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il WETTION è miscibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi della nostra gamma. Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, Captano, DDPV, Bynapacryl, Euparen.

E' raccomandata la miscela con l'R6 Erresei Super Bleu in quanto costituisce una combinazione per combattere contemporaneamente la Peronospora e l'Oidio della vite.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il WETTION, come tutti gli zolfi colloidali, va usato con molta oculatezza. Effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio. Distanziare i trattamenti di WETTION da quelli a base di Captano o di olii minerali di almeno tre settimane.

Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

In alcune varietà di meli (Stayman, Commercio e sulla Golden Delicious dopo la fioritura) sostituire il **Wettion** con gr. 80-90 di Karathane PB.
Con prodotti ftalimicidi il WETTION può produrre fitotossicità nelle Delicious rosse, Stayman e Winesap.

AVVERTENZE

Nel caso di trattamenti misti mescolare preferibilmente il **Wettion** alla polvere insetticida o fungicida e poi procedere come per la preparazione di una poltiglia semplice.

Se gli insetticidi sono liquidi, essi vanno aggiunti alla poltiglia di **Wettion** già pronta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontane dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

3147

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

FITIOS

Insetticida Agricolo
Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 40 Metil-Etoato puro (da p.a. tecnico 95-96%)
Sostanze solventi ed emulsionanti q.b. a 100

CONTIENE XILOLO

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande e corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.
Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*
La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 3147 Ministero Sanità del . 5.6.1979 . . .

E/1

CARATTERISTICHE

Insetticida dotato di penetrazione, particolarmente attivo contro le mosche delle ciliege e della frutta. E' dotato inoltre di un'azione immediata di contatto.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Il FITIOS B/77 E 40 è efficace contro molti parassiti delle colture agrarie ed in particolare:

IN FRUTTICOLTURA:
Contro Mosca della frutta e degli aranci a gr. 125/hl; contro la Mosca delle ciliege a gr. 50/hl; contro Carpocapsa e Cydia a gr. 125/hl; contro Tortricidi e Tentredini delle susine a gr. 75/hl; contro la Zeuzera del pero a gr. 150/hl; contro il Cemiostoma, appena si notano le mine a gr. 125/hl; contro Pseudococcus citri a gr. 50-125/hl; contro Diaspis Pentagona a gr. 50/hl.

IN FLORICOLTURA:
Contro Mosca del garofano a gr. 75-100/hl; contro Tortrice (bega) a gr. 125/hl.

IN ORTICOLTURA:
Contro la Mosca del sedano e altre mosche delle colture ortive a gr. 100/hl.

IN BIETICOLTURA:
Contro la Mosca delle barbabietole a gr. 500-750/ha.

IN TUTTE LE COLTURE PREVISTE
Contro Afidi, Tripidi, Mosche, Oplocampe, Tingidi, Nottue, a gr. 50-125/hl.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:
Il FITIOS B/77 E 40 nella dose occorrente, va versato in poca acqua, agitando la miscela con un bastone; si aggiunge quindi altra acqua, sempre agitando, fino al volume richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il FITIOS B/77 E 40 è miscibile con prodotti della nostra gamma ad esclusione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili. E' nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione:
« Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

3148

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

DATHIOS PB

Insetticida a base di Endosulfan, dotato di azione per contatto e per ingestione

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 35 di Endosulfan puro (da p.a. tecnico al 98-99%)
Sostanze inerti e disperdenti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione
Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologia contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni
Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68

Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. N. 3148 **Ministero Sanità del** 5.6.79 . . . . .

E/2

CARATTERISTICHE

Il Dathios PB è un insetticida organo-clorurato persistente e polivalente che agisce per contatto e per ingestione contro molti insetti di colture diverse.
Il Dathios PB non altera né l'odore né il sapore dei frutti e delle piante trattate.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN FRUTTICOLTURA:
Contro la Psilla del pero gr 150-200/hl; Afide verde ed altri afidi gr. 100-150/hl, Litocollette e altri minatori fogliari delle pomacee gr. 150/hl; Eriofide del nocciolo gr 150/hl. Cicadelle, Tentredini del pero, melo e susino, Maggiolino gr 100-150/hl

IN ORTICOLTURA:
Contro la Dorifora della patata gr 200-400/hl. Tarsonemo e Antonomo della fragola gr 150/hl; Criocera dell'asparago, Altiche, Punteruoli, Pieridi, Tignole delle crucifere, Cavolaia, Afidi, Tripidi, Cimici, gr 150/hl.

Esche: Contro Nottue, impiegare gr 60 di **Dathios PB** per 10 Kg. di crusca, mescolare uniformemente con 6-8 litri di acqua e impiegare Kg. 40-50 per ettaro di esca così preparata.

IN FLORICOLTURA E PIOPPICOLTURA:
Contro Afidi, Tripidi, Tarsonemo del ciclamino, Cimici, Cicadelle gr 100-150/hl.

Contro: Maggiolino e Crisomela del pioppo gr. 750-900/ha

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare accuratamente la dose necessaria di DATHIOS PB in poca acqua. Ottenuta una poltiglia omogenea, portare a volume. Bagnare le piante con cura

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il DATHIOS PB non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
Il prodotto è miscelabile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGITARE PRIMA DELL'USO

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

3149

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ORDRAM GRANULARE

Diserbante selettivo, specifico nella lotta contro i Giavoni in risala

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 7,5 Molinate puro (purezza (95-97%) pari a gr. 7,89-7,73 di prodotto tecnico.
Supporti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

— Sintomi d'intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

— Consigli terapeutici:
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini.
Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

L'ORDRAM GRANULARE è un diserbante selettivo per il riso, ad azione specifica contro i Giavoni (Panicum spp.).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

L'Ordram Granulare si impiega alla dose di 40-70 kg/ha.

In pre-semina: su terreno asciutto, già lavorato e concimato, pronto per la semina. Immediatamente dopo la distribuzione, o nelle prime ore che seguono il trattamento, incorporare con un normale erpice a dischi od altro attrezzo, ad una profondità di 8-10 cm. L'immissione dell'acqua è bene avvenga il più presto possibile.

L'ORDRAM Granulare si può impiegare su risaie da semina, da trapianto e su vivai di riso.

La semina può essere effettuata in qualsiasi momento dopo la sommersione.

In post-semina: mantenendo ferma l'acqua della risaia e distribuendo l'erbicida sull'acqua stessa. Il normale ricambio d'acqua verrà ripristinato dopo 7-8 giorni dal trattamento.

In post-emergenza della coltura e delle infestanti: l'applicazione verrà effettuata allorché le infestanti e il riso avranno raggiunto lo stadio di 2-4 foglie (30-4 giorni dopo la semina), dopo aver interrotto l'immissione dell'acqua nella risaia, distribuendo uniformemente l'erbicida su tutta la superficie da trattare. Il normale ricambio verrà ripristinato dopo 7-8 giorni dal trattamento

Per accelerare la morte delle piante di giavone più sviluppate sarà buona norma mantenere, successivamente al trattamento, un livello d'acqua consistente (20-30 cm.) per 15-20 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. N. 3149. **Ministero Sanità del** 4.4.80 . . . .

Peso netto Kg.

E/2

3154

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Un volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi, se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi.
In caso di ingestione lo Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

ICI Solplant SpA

'PI 63'

Fungicida in polvere bagnabile a base di ossicloruro di rame e di zineb, per trattamenti in: viticoltura, pomacee, pomodoro (solo fino alla prima fioritura), floricoltura.

COMPOSIZIONE

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g 30
Zineb puro	g 13
Disperdenti e coadiuvanti	q b a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

'PI 63' è un fungicida cupro-organico costituito da una razionale associazione di Ossicloruro di rame e Zineb per la difesa contro malattie crittogamiche.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Dose: 250-300 g per 100 l di acqua
Vite: peronospora
Pomacee: ticchiolatura.
Pomodoro: (solo fino alla prima fioritura): peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi.
Garofano in campo: ruggine.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'
'PI 63' può essere miscelato con la massima parte dei più comuni insetticidi ed acaricidi di impiego primaverile-estivo, nonché con lo zolfo. Non è compatibile con la poltiglia bordolese. L'eventuale miscela con olii gialli va fatta con precauzione.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su ... varietà di **melo** (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgendult, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di **pero** (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione. in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di **pere** sensibili allo zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinocarpi, Zecchermanna

RISCHI DI NOCIVITA'
È nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. È tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Ozzano Emilia (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 3154 del 15/6/1979
'PI 63' - Trade Mark - ICI Solplant S.p.A.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg 25

3195

CLASSE III

SUV 50

Insetticida ·

Composizione

100 gr. di prodotto contengono:
49 gr. di Carbaryl (1-naftil-N-metilcarbammato) puro (esente da Beta naftolo)
q. b. a 100 di supporti e diluenti

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precazionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. · Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. · Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. · Non operare contro vento. · Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

Il SUV 50 è particolarmente efficace nella lotta contro: Carpocapsa, Capua, Eulia, Cacoecia del melo e del pero, Cidia del pesco, Dorifora della patata, Tignola della vite, Tignola dell'olivo, Bega del garofano, Cavolaia, Cocciniglia mezzo grano di pepe dell'olivo.

Dosi e campi d'impiego

Il SUV 50 viene usato alle seguenti dosi, per 100 litri di acqua:

melo e pero	— contro Carpocapsa, Capua, Eulia, Cacoecia	gr. 120-150
pesco	— contro Cidia	gr. 200-250
patata	— contro Dorifora	gr. 150
vite e olivo	— contro Tignola	gr. 150-200
olivo	— contro Cocciniglia mezzo grano di pepe	gr. 200-250
garofano	— contro Bega in pieno campo o in serra	gr. 200
cavolo	— contro Cavolaia	gr. 150

Il prodotto viene stemperato prima in poca acqua, poi diluito, sotto agitazione, fino all'opportuno volume.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il SUV 50 è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.).

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività

Il prodotto è nocivo per animali domestici, pesci, bestiame. È tossico per gli insetti utili: non trattare durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

Attenzione

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

S. p. A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - CARRARA AVENZA (MS)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3195 del 6-7-1979

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO 0,100

3225

AEROVAL

ANTIDERIVA/ANTIEVAPORANTE OBBLIGATORIO PER TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI IN VIGNETI E PIOPPETI

Composizione gr 100 di prodotto contengono: IDROSSIMETILCELLULOSA pura gr **30**; Alccol laurilico atossilato puro gr **20**; Coformulanti q.b. a gr **100**. **CLASSE IV**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico dei prodotti usati per la miscela mostrandogli le etichette.

ISTRUZIONI PER L'USO

GENERALITA': L'AEROVAL è un antideriva/antievaporante da impiegarsi per la preparazione di sospensione antiparassitaria idonea per i trattamenti con i mezzi aerei. Tale sospensione, a seconda delle apparecchiature di distribuzione, dello stadio vegetativo e di sviluppo della coltura, varia da 30 a 80 litri ettaro.
DOSI D'IMPIEGO: Impiegare kg 0,6-1 di AEROVAL ogni 100 litri di sospensione antiparassitaria tenedo presente che le dosi per ettaro e per coltura degli antiparassitari sono le seguenti: VITE kg/ha 3-4 di formulati a base di Mancozeb, Metiram, Propineb, Zireb, Zineb al 70/80 % di principio attivo (o quantità equivalenti in rapporto al titolo di principio attivo) o loro miscele; oppure kg/ha 4-5 di formulati a base di composti rameici al 40/50 % di rame metallo (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo); oppure kg/ha 4-5 di formulati misti a base di rame e prodotti organici sopra menzionati, al 40/50 % come somma totale delle percentuali dei principi attivi puri (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo).
I prodotti sopra indicati possono essere eventualmente impiegati associati con: kg/ha 2-3 di zolfo bagnabile micronizzato all'30/90 % (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo);
oppure kg/ha 1-1,5 di zolfo bagnabile colloidale all'80 % (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo).
PIOPPO kg/ha 4-5 di formulato a base di Maneb, Mancozeb, all'80 % di principio attivo.
PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE: L'AEROVAL viene disperso versandolo lentamente sotto buona e continua agitazione in circa il 50 % dell'acqua necessaria al trattamento, nel restante 50 % si disperde l'antiparassitario e quindi si miscelano le due sospensioni sempre sotto continua agitazione.
AVVERTENZA: Il prodotto deve essere utilizzato quando si effettuano trattamenti con mezzi aerei in miscela con fungicidi a base di Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, rameici, Zineb, Zireb, zolfi bagnabili e miscela dei suddetti principi attivi, previo consenso delle Autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo e solo per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti. Nel caso di miscela con più fungicidi devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. E' vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette ai lavori ed agli operatori, non adeguatamente equipaggiati e protetti durante l'intervallo di agibilità. Intervallo di agibilità del territorio trattato: 48 ore. Intervallo di sicurezza: quello del principio attivo con intervallo di sicurezza più lungo.
ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA (vigneti e pioppeti) NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per cautelarsi da danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. N. 3225 del 01-08-1979 del Ministero Sanità.

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

Officina di produzione: bimex s.p.a. - via cogolla, 5 - isola vicentina (vi)

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO kg

3233

SANDOVIT A

Antideriva-antievaporante obbligatorio per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti

Composizione

gr. 30 di idrossietilcellulosa pura
gr. 20 di alcool laurilico etossilato puro
coformulanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico dei prodotti usati per la miscela mostrandogli le etichette.

Istruzioni per l'uso

Generalità

Il SANDOVIT A è un antideriva-antievaporante da impiegarsi per la preparazione di sospensione antiparassitaria idonea per i trattamenti con mezzi aerei.
Tale sospensione, a seconda delle apparecchiature di distribuzione, dello stadio vegetativo e di sviluppo della coltura, varia da 30 a 80 litri/ettaro.

Dosi d'impiego:

Impiegare kg. 0,6-1 di SANDOVIT A ogni 100 litri di sospensione antiparassitaria, tenendo presente che le dosi per ettaro e per coltura degli antiparassitari sono le seguenti:

VITE

— kg./Ha 3-4 di formulati a base di Mancozeb, Metiram, Propineb, Zireb, Zineb al 70-80% di principio attivo (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo) o loro miscele;

oppure

— kg./Ha 4-5 di formulati a base di composti rameici al 40-50% di rame metallo (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo);

oppure

— kg./Ha 4-5 di formulati misti a base di rame e prodotti organici sopra menzionati, al 40-50% come somma totale delle percentuali dei principi attivi puri (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo).

I prodotti sopra indicati possono essere eventualmente impiegati associati con:

— kg./Ha 2-3 di zolfo bagnabile micronizzato all'80-90% (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo);

oppure

— kg./Ha 1-1,5 di zolfo bagnabile colloidale all'80% (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo).

PIOPPO

— kg./Ha 4-5 di formulato a base di Maneb, Mancozeb all'80% di principio attivo.

Preparazione della sospensione

Il SANDOVIT A viene disperso versandolo lentamente sotto buona e continua agitazione in circa il 50% dell'acqua necessaria al trattamento; nel restante 50% si disperde l'antiparassitario e quindi si miscelano le due sospensioni sempre sotto continua agitazione.

AVVERTENZA: il prodotto deve essere utilizzato quando si effettuano trattamenti con mezzi aerei in miscela con fungicidi a base di Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, rameici, Zineb, Zireb, zolfi bagnabili e miscele dei suddetti principi attivi, previo consenso delle Autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo e solo per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti.
Nel caso di miscela con più fungicidi devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico.

AVVERTENZA: è vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette ai lavori ed agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti durante l'intervallo di agibilità.
Intervallo di agibilità dell'appezzamento trattato: 48 ore.

Intervallo di sicurezza

Quello del principio attivo con intervallo di sicurezza più lungo.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura (vigneti e pioppeti) nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per cautelarsi da danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

SANDOZ

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3233 del 1-...-1979 ... del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg.

3235

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

ANTIDERIVA RAVIT

Antideriva/Antievaporante obbligatorio per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 di Idrossietilcellulosa pura
gr. 20 di Alcol laurilico etossilato puro .
Coformulanti quanto basta a 100

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico dei prodotti usati per la miscela mostrandogli le etichette

ISTRUZIONI PER L'USO

Generalità:
L'**Antideriva Ravit** è un antideriva/antievaporante da impiegarsi per la preparazione di sospensione antiparassitaria idonea per i trattamenti con i mezzi aerei.

Tale sospensione, a seconda delle apparecchiature di distribuzione, dello stadio vegetativo e di sviluppo della coltura, varia da 30 a 80 litri per ettaro.

DOSI D'IMPIEGO

Impiegare kg. 0.6-1 di **Antideriva Ravit** ogni 100 litri di sospensione antiparassitaria tenendo presente che le dosi per ettaro e per coltura degli antiparassitari sono le seguenti:

VITE

— kg./Ha 3-4 di formulati a base di Mancozeb, Metiram, Propineb, Zireb, Zineb al 70-80% di principio attivo (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo) o loro miscele.

oppure

— Kg./ha 4-5 di formulati a base di composti rameici al 40-50% di rame metallico (o quantità equivalenti in rapporto al titolo di principio attivo);

oppure

— kg./Ha 4 5 di formulati misti a base di rame e prodotti organici sopra menzionati, al 40-50% come somma totale delle percentuali dei principi attivi puri (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo).

I prodotti sopra indicati possono essere eventualmente impiegati associati con:

— kg./Ha 2-3 di zolfo bagnabile micronizzato all'80-90% (o quantità equivalenti in rapporto al titolo di principio attivo);

oppure

— kg./Ha 1-1.5 di zolfo bagnabile colloidale all'80% (o quantità equivalenti in rapporto al titolo di principio attivo);

PIOPPO

— kg./Ha 4-5 di formulato a base di Maneb, Mancozeb all'80% di principio attivo.

PREPARAZIONE ALLA SOSPENSIONE

L'**Antideriva Ravit** viene disperso versando lentamente sotto buona e continua agitazione in circa il 50% dell'acqua necessaria al trattamento, nel restante 50% si disperde l'antiparassitario e quindi si miscelano le due sospensioni sempre sotto continua agitazione.

AVVERTENZA:

Il prodotto deve essere utilizzato quando si effettuano trattamenti con mezzi aerei in miscela con fungicidi a base di Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, rameici, Zineb, Zireb, zolfi bagnabili e miscele dei suddetti principi attivi, previo consenso delle Autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo e solo per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti.

Nel caso di miscela con più fungicidi devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico.

È vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette ai lavori ed agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti, durante l'intervallo di agibilità.

INTERVALLO DI AGIBILITÀ dell'appezzamento trattato: 48 ore.

INTERVALLO DI SICUREZZA: quello del principio attivo con intervallo di sicurezza più lungo.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura (Vigneti e Pioppeti) nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3235 **Ministero Sanità del** 1.8.79

E/2

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

ANTIDERIVA BPD

Antideriva/Antievaporante obbligatorio per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 di idrossietilcellulosa pura
gr. 20 di Alcol laurilico etossilato puro
Coformulanti quanto basta a 100

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico dei prodotti usati per la miscela mostrandogli le etichette

ISTRUZIONI PER L'USO

Generalità:
L'**Antideriva BPD** è un antideriva/antievaporante da impiegarsi per la preparazione di sospensione antiparassitaria idonea per i trattamenti con i mezzi aerei.

Tale sospensione, a seconda delle apparecchiature di distribuzione, dello stadio vegetativo e di sviluppo della coltura, varia da 30 a 80 litri per ettaro.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 3233 Ministero della Sanità del . 1.8.1979 . . .

E/2

DOSI D'IMPIEGO

Impiegare kg. 0,6-1 di **Antideriva BPD** ogni 100 litri di sospensione antiparassitaria tenendo presente che le dosi per ettaro e per coltura degli antiparassitari sono le seguenti:

VITE
— kg./Ha 3-4 di formulati a base di Mancozeb, Metiram, Propineb, Zireb, Zineb al 70-80% di principio attivo (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo) o loro miscele.

oppure

— Kg./ha 4-5 di formulati a base di composti rameici al 40-50% di rame metallico (o quantità equivalenti in rapporto al titolo di principio attivo);

oppure

— kg./Ha 4-5 di formulati misti a base di rame e prodotti organici sopra menzionati, al 40-50% come somma totale delle percentuali dei principi attivi puri (o quantità equivalenti in rapporto al titolo in principio attivo).

I prodotti sopra indicati possono essere eventualmente impiegati associati con:
— kg./Ha 2-3 di zolfo bagnabile micronizzato all'80-90% (o quantità equivalenti in rapporto al titolo di principio attivo);

oppure

— kg./Ha 1-1,5 di zolfo bagnabile colloidale all'80% (o quantità equivalenti in rapporto al titolo di principio attivo);

PIOPPO
— kg./Ha 4-5 di formulato a base di Maneb, Mancozeb all'80% di principio attivo.

PREPARAZIONE ALLA SOSPENSIONE
L'**Antideriva BPD** viene disperso versando lentamente sotto buona e continua agitazione in circa il 50% dell'acqua necessaria al trattamento, nel restante 50% si disperde l'antiparassitario e quindi si miscelano le due sospensioni sempre sotto continua agitazione.

AVVERTENZA:
Il prodotto deve essere utilizzato quando si effettuano trattamenti con mezzi aerei in miscela con fungicidi a base di Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, rameici, Zineb, Zireb, zolfi bagnabili e miscele dei suddetti principi attivi, previo consenso delle Autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo e solo per trattamenti con mezzi aerei in vigneti e pioppeti.

Nel caso di miscela con più fungicidi devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico.

È vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette ai lavori ed agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti, durante l'intervallo di agibilità.

INTERVALLO DI AGIBILITÀ dell'appezzamento trattato: 48 ore.

INTERVALLO DI SICUREZZA: quello del principio attivo con intervallo di sicurezza più lungo.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura (Vigneti e Pioppeti) nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3240

I CLASSE TOSSICOLOGICA

VELENO

ENDOFENE PB

Insetticida a base di Endosulfan, dotato di azione per contatto e per ingestione

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 35 di Endosulfan puro (da p.a. tecnico al 98-99%)
Sostanze inerti e disperdenti quanto basta a 100

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologia contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

CARATTERISTICHE

L'ENDOFENE PB è un insetticida organo-clorurato persistente e polivalente che agisce per contatto e per ingestione contro molti insetti di colture diverse.
L'Endofene PB non altera nè l'odore nè il sapore dei frutti o delle piante trattate.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN FRUTTICOLTURA:

Contro la Psilla del pero gr. 150-200/hl. Afide verde e altri afidi gr. 100-150/hl. Litocollette e altri minatori fogliari delle pomacee gr. 150/hl; Eriofide del nocciolo gr. 150/hl. Cicadelle. Tentredini del pero, melo e susino, Maggiolino gr. 100-150/hl.

IN ORTICOLTURA:

Contro la Dorifora della patata gr. 200-400/hl; Tarsonemo e Antonomo della fragola gr. 150/hl; Criocera dell'asparago. Altiche. Punteruoli. Pieridi. Tignole delle crucifere. Cavolaia. Afidi. Tripidi. Cimici. gr. 150/hl.

Esche: Contro Nottue. impiegare gr. 60 di ENDOFENE PB per 10 Kg. di crusca, mescolare uniformemente con 6-8 litri di acqua e impiegare Kg. 40-50 per ettaro di esca così preparata.

IN FLORICOLTURA E PIOPPICOLTURA

Contro Afidi. Tripidi. Tarsonemo del ciclamino. Cimici. Cicadelle gr. 100-150/hl.

Contro: Maggiolino e Crisomela del pioppo gr. 750-900/ha.

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare accuratamente la dose necessaria di ENDOFENE PB in poca acqua. Ottenuta una poltiglia omogenea, portare a volume. Bagnare le piante con cura

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'ENDOFENE PB non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina
Il prodotto è miscelabile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGITARE PRIMA DELL'USO

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Peso netto Kg.

Reg. N. 3240 **Ministero Sanità del** 25.9.79 . . .

E/2

3:

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

DITHANE Z 78 POLVERE

Anticrittogamico acuprico per la lotta contro la Peronospora del tabacco

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 6,5 Zineb puro
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura dei rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

— per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3241 **Ministero Sanità del** 20.11.79

E/2

DOSE D'IMPIEGO

In media kg. 20-30 per ha. a seconda dello sviluppo raggiunto dalle piante.

ISTRUZIONI

Il **DITHANE Z-78 POLVERE** viene impiegato per combattere la Peronospora del tabacco, (Muffa bleu). L'applicazione può farsi sia sul fogliame asciutto che umido. Per combattere la Peronospora del tabacco in pieno campo, le dosi di impiego in media si aggirano sul 25-30 kg. per ha., a seconda dello sviluppo raggiunto dalle piante. Il ritmo delle applicazioni si aggirerà, secondo i casi, su due o tre alla settimana od anche una se la virulenza del parassita non è elevata.

IMPIEGO IN SEMENZAIO

Tabacco: Per combattere la Peronospora tabacina, iniziare le applicazioni quando le piantine di tabacco sono alte 1 cm.; oppure quando viene segnalata la malattia in zone vicine. Polverizzare regolarmente due volte alla settimana, oppure tre nel caso di un andamento climatico particolarmente favorevole allo sviluppo della malattia; immediatamente dopo la pioggia dilavante, ripetere una polverizzazione. Le dosi di impiego del prodotto variano da kg. 0,600 a 1,900 per ogni 100 mq. di semenzaio, a seconda dello sviluppo delle piantine.

IMPIEGO IN PIENO CAMPO

a) **Trattamenti primaverili:** Subito dopo la messa a dimora delle piantine dovranno iniziare le polverizzazioni per difendere la coltura dalla Peronospora, con un ritmo di intervento bisettimanale qualora dovessero persistere le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Il quantitativo di **DITHANE Z-78 POLVERE**, in questo caso, varierà da 15 a 20 kg. per ettaro.

b) **Trattamenti estivi:** La quantità di prodotto varia da kg. 25 a 30 per ha., a seconda dello sviluppo raggiunto dalle piante.
Il numero delle applicazioni di aggirerà, secondo i casi, su due o tre alla settimana, o anche una se la virulenza del parassita non è elevata. Si raccomanda di effettuare i trattamenti **subito dopo**, e mai prima delle irrigazioni.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3243

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

R 6 ERRESEI - M

Antiperonosporico indicato prima della fioritura della vite. Si impiega inoltre contro le malattie del pomodoro e del garofano di seguito indicate
Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 75 Mancozeb puro
Coadiuvanti e coloranti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3243 **Ministero della Sanità del** 21.5.82
E/3

PRINCIPALI IMPIEGHI E DOSI

In viticoltura:
Contro la Peronospora a gr 200-250/hl come preventivo in pre-fioritura.

In orticoltura:
Contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi del pomodoro solo fino alla prima fioritura a gr. 200-250/hl

In floricoltura:
Contro Ruggine del garofano in pieno campo a gr 150-200/hl.

MODALITA' D'IMPIEGO

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di **R 6 ERRESEI - M** in poca acqua, indi versare nella irroratrice e portare a volume

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

L'R 6 ERRESEI - M è miscibile con i nostri insetticidi, acaricidi e fungicidi (PARAFENE, METILON, FOSFENE, ZITIOL, KARATHANE, KELTHANE, SOFRIL, SUMIFENE). Miscibile agli zolfi in polvere. Dove è di uso o si rende necessario il trattamento polverulento con o senza zolfi, si consiglia l'impiego di Kg. 2,5-3 di **R 6 ERRESEI - M** per ettaro.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

3.

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

R6 ERRESEI SB - M 10

Fungicida cupro organico ad azione biologica per la difesa della vite del pomodoro e del garofano

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 Rame metallico (sottoforma di ossicloruro tetraramico)
gr. 8 Mancozeb puro
Coadiuvanti e coloranti quanto basta a 100.

Brev. n. 81/276 della Pechiney Progil

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare l'R 6 ERRESEI SB-M 10 in poca acqua sino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con acqua corrente.

DOSI

Peronospora della vite: 350-400 gr. per hl. d'acqua.

Peronospora ed Alternariosi del pomodoro solo fino alla prima fioritura 350-400 gr. per hl. d'acqua.

Ruggine del garofano in pieno campo: 400 gr. per hl. d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

L'R 6 ERRESEI SB-M 10 è miscibile con Sofril per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora e può essere miscelato con Kelthane, Zitiol, Parafene, Metilon, Fosfene, per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaralo, Zigene.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3244 **Ministero della Sanità del** 21.5.82
E/3

3254

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

DITHANE Z 78 BLU

Fungicida organico per la prevenzione e la lotta contro la Peronospora della vite e malattie crittogamiche di seguito indicate, del pomodoro, del garofano e del pioppo

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 65 Zineb puro
Sostanze coloranti, coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

— per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3254 **Ministero Sanità del** . 19.6.80 . . . .

E/2

MODALITA' D'IMPIEGO

Il **DITHANE Z-78 BLU** è un fungicida efficace, di facile impiego, possiede adeguata adesività, non macchia e non ustiona la vegetazione.
Versare il prodotto in poca acqua e mescolare accuratamente; indi aggiungere la quantità d'acqua necessaria tenendo la miscela costantemente agitata. L'aggiunta di Bagnante Adesivo Etaldin (gr. 50/hl) assicura una migliore distribuzione della miscela sulle piante;

Dosi: gr. 200-300 per 100 lt. d'acqua.

A queste dosi si possono efficacemente controllare le seguenti malattie crittogamiche:

— Peronospora della vite;
— Peronospora, Alternariosi del pomodoro fino alla prima fioritura;
— Ruggine del garofano;
— Marssonina del pioppo: impiegare kg. 5,5 per ettaro e per trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il **DITHANE Z-78 BLU** è miscibile con Sofril e Veravit e gli insetticidi della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

R 6 ERRESEI PB

Fungicida cupro-organico per la difesa della vite, del pomodoro e del garofano. Specifico contro la Peronospora della vite

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 Rame puro (sottoforma di ossicloruro tetraramico)
gr. 13 Zineb puro
Sostanze coadiuvanti q.b. a gr. 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni:
Alcool, olii, grassi.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

Avvertenza:
Consultare un Centro antiveleni.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3267 Ministero Sanità del 21-6-1982
11/84

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare l'R 6 Erresei PB in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida indi portare a volume con l'acqua occorrente.

DOSI

Peronospora della vite:
In condizioni normali gr. 300-350 per hl. d'acqua per una distribuzione media di 800-1000 lt. di miscela per ha. In caso di forti attacchi e per gli ultimi trattamenti la dose può essere aumentata a 400-500 gr. per hl. d'acqua.

Peronospora e Alternariosi del pomodoro solo fino alla prima fioritura:
gr. 300-400 per hl. d'acqua.

Ruggine del Garofano in pieno campo:
gr. 400 per hl. d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

L'R 6 Erresei PB è miscibile con Sofril per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora e può essere miscelato con Kelthane, Zitiol, Metilon, per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto sulla vite.
Sul pomodoro i trattamenti sono consentiti solo fino alla prima fioritura.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3268

CLASSE IV

MISAN® 50

Anticrittogamico in polvere bagnabile per la lotta contro le malattie fungine in frutticoltura, viticoltura, orto-floricoltura

COMPOSIZIONE

Captan puro	g 50
Bagnanti, disperdenti e inerti	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Stabilimento S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità N. 3268 del 25-10-1979

• Marchio registrato

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il MISAN 50 si usa alla dose di g 200-300 per ettolitro di acqua contro le seguenti malattie: ticchiolatura del melo e del pero, gommosi delle drupacee (pesco, albicocco, susino, ciliegio), marciume bruno delle pomacee (melo e pero) e delle drupacee (mandorlo, ciliegio e albicocco), muffa grigia (Botrytis) dell'uva, marciume della fragola, peronospora e septoriosi del pomodoro, vaiolo e antracnosi del fagiolo e delle cucurbitacee (melone, cocomero, zucca), malattie fungine dei fiori (seccume delle foglie del crisantemo; septoriosi del gladiolo; ruggine, occhio di pavone e alternariosi del garofano; ruggine, ticchiolatura e peronospora della rosa), vaiolatura e marciume grigio della fragola.

Preparazione della sospensione

Stemperare la dose stabilita di MISAN 50 in poca acqua a parte in modo da formare una pasta omogenea e versare poi nella quantità di acqua rimanente, mescolando con cura, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri), con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. In miscela con ZOLFO produce fitotossicità anche su: Starking (gruppo Delicious rosso), Stayman, Winesap.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta per frutta e ortaggi e 40 giorni prima per le uve da vino.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: kg 1

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia

Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale.

MILTENE

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di captano

Composizione
gr. 50 di captano (triclorometiltiotetraidroftalimmide) puro disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali
- *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;*
- *non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;*
- *dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

Informazioni per il medico
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua e digitale).

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Frutticoltura		
— Pomacee	Ticchiolatura Gloesporium Marciumi	0,2 - 0,3% = gr. 200 - 300
— Drupacee (solo per trattamenti sulla vegetazione)	Gommosi parassitaria (Coryneum) Cladosporium Carpophilum	0,2 - 0,3% = gr. 200 - 300
Viticoltura	Peronospora Botrytis	0,2 - 0,3% = gr. 200 - 300
Orto-floricoltura	Septoriosi Peronospore Vaiolatura Alternariosi Botrytis	0,2 - 0,3% = gr. 200 - 300

Preparazione della poltiglia
Stemperare bene il MILTENE in un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere una poltiglia pastosa, omogenea.
Diluire in seguito, fino al volume previsto, rimescolando bene.
Eseguire i trattamenti secondo necessità, cercando di ben bagnare la vegetazione da trattare. Ripetere gli interventi tutte le volte che la biologia dei parassiti da combattere e l'andamento stagionale lo impongono.

Da non applicare con mezzi aerei.

Miscibilità
Il MILTENE è miscibile con gli antiparassitari normalmente usati sulle colture ove viene impiegato lo stesso MILTENE.
Il MILTENE non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli e zolfi.
E' buona norma, infine, evitare miscele di insetticidi e acaricidi con MILTENE.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il MILTENE può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Ranetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta e 40 giorni prima della raccolta per le uve destinate alla vinificazione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3272 del 25.10.1979 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto netto kg.

3280

MILTENE "80"

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di captano

Composizione

gr. 80 di captano (triclorometiltiotetraidroftalimmide) puro disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali

— *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;*

— *non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;*

— *dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

Informazioni per il medico

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.

Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua e digitale).

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Frutticoltura		
— Pomacee	Ticchiolatura Gloesporium Marciumi	0,125 - 0,2% = gr. 125 - 200
— Drupacee (solo per trattamenti sulla vegetazione)	Gommosi parassitaria (Coryneum) Cladosporium Carpophilum	0,125 - 0,2% = gr. 125 - 200
Viticoltura	Peronospora Botrytis	0,125 - 0,2% = gr. 125 - 200
Orto-floricoltura	Septoriosi Peronospore Vaiolatura Alternariosi Botrytis	0,125 - 0,2% = gr. 125 - 200

Preparazione della poltiglia

Stemperare bene il MILTENE « 80 » in un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere una poltiglia pastosa, omogenea.

Diluire in seguito, fino al volume previsto, rimescolando bene.

Eseguire i trattamenti secondo necessità, cercando di ben bagnare la vegetazione da trattare. Ripetere gli interventi tutte le volte che la biologia dei parassiti da combattere e l'andamento stagionale lo impongono.

Da non applicare con mezzi aerei.

Miscibilità

Il MILTENE « 80 » è miscibile con gli antiparassitari normalmente usati sulle colture ove viene impiegato lo stesso MILTENE « 80 ».

Il MILTENE « 80 » non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi.

La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli e zolfi.

E' buona norma, infine, evitare miscele di insetticidi e acaricidi con MILTENE « 80 ».

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il MILTENE « 80 può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Ranetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta e 40 giorni prima della raccolta per le uve destinate alla vinificazione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3200 del 26-10-1979 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

CAPTANO CIBA

Fungicida organico di sintesi, efficace contro le malattie crittogamiche delle piante coltivate.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
50 g captano (triclorometiltiotetraidroftalimmide) puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE IV

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi d'intossicazione: *azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastro esofagei e diarrea.*
Eczemi cutanei resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione.
Possibilità di colasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: *lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua e digitale).*

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3281 **del** 10.10.79
® marchio depositato

Indicazioni
CAPTANO CIBA è indicato contro le seguenti malattie: Peronospora della vite, Muffa grigia o Botrite dell'uva, Ticchiolatura del melo e del pero, marciume bruno dei frutti, Antracnosi, Peronospora ed Alternariosi del pomodoro, Peronospora e nebbia della patata, Marciume o botrite della fragola ed altre malattie crittogamiche delle piante orticole, da frutto, ornamentali.
CAPTANO CIBA è indicato anche per la disinfezione dei bulbi e talee e per la disinfezione del terreno contro vari agenti del marciume.

Dosi d'impiego
Trattamenti per irrorazione
200-250 g per 100 litri d'acqua
Disinfezione di bulbi e talee
50-100 g in 10 litri d'acqua (trattamento per immersione)
Disinfezione del terreno:
250 g in 100 litri d'acqua.
Distribuire 7-8 litri di miscela per ogni 10 mq di terreno.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
« Avvertenza » - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Winesap - Stayman - Ranetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.
Il suo impiego deve essere sospeso 15 giorni prima della raccolta ma per le uve destinate alla vinificazione tale arco di tempo dovrà rispettare i 40 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

3283

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CUPROZEB

Fungicida cupro organico per la difesa della vite, del pomodoro e del garofano

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 Rame metallico (sottoforma di ossicloruro tetraramico)
gr. 12 Mancozeb puro
Complesso ad azione biologica, adiuvanti e coloranti quanto basta a 100

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

— per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 3283 **Ministero Sanità del** . 15.9.1980 . . .

E/2

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare il **CUPROZEB** in poca acqua sino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con acqua corrente.

- Peronospora della vite: 300-400 gr. per hl. d'acqua.
- Peronospora ed Alternariosi del pomodoro fino alla prima fioritura: 300-400 gr. per hl. d'acqua.
- Ruggine del garofano: 400 gr. per hl. d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il **CUPROZEB** è miscibile con Sulfosol per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora e può essere miscelato con Kelthane, Emmaton, Fitofos, Delfos, Drinfos, per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CUPROTHEX S BLU

Fungicida cupro organico in polvere bagnabile per la migliore difesa della vite, delle pomacee del pomodoro e del garofano

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 Rame metallico (sottoforma di ossicloruro tetraramico)
gr. 13 Zineb puro
Sostanze adesivanti, sospensivanti, coadiuvanti e coloranti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

— per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

Il **Cuprothex S Blu** può essere impiegato contro le malattie crittogamiche delle piante alle dosi di seguito indicate:

Peronospora della vite — dose gr. 300-400 in 100 lt. di acqua

Ticchiolatura del melo e del pero (a seconda dell'epoca di applicazione: le dosi più alte nel periodo prefiorale) — dose gr. 200-500 in 100 lt. di acqua

Peronospora, Alternariosi e Septoriosi del pomodoro fino alla prima fioritura — dose gr. 300-400 in 100 lt. di acqua

Ruggine del garofano — dose gr. 400 in 100 lt. di acqua

N.B. In condizioni poco favorevoli allo sviluppo della Peronospora della vite la dose di **Cuprothex S Blu** può essere ridotta a gr. 250 per hl. di acqua. Viceversa in condizioni molto favorevoli allo sviluppo della malattia, la dose dovrà essere elevata a gr. 500 ed in casi estremi a gr. 600 per hl. di acqua.

NORME PER LA PREPARAZIONE E L'IMPIEGO DELLA MISCELA

Aggiungere la dose occorrente di **Cuprothex S Blu** in poca acqua (es. gr. 400 in 2 litri di acqua) e agitare. Versare quindi la poltiglia ottenuta nella restante quantità di acqua occorrente per raggiungere la voluta concentrazione (nell'esempio versare i 2 litri di poltiglia in 98 lt. di acqua per ottenere un ettolitro di miscela allo 0,4%).

La miscela così preparata va irrorata sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.

Dovendo eseguire trattamenti su piante difficilmente bagnabili aggiungere alla miscela di **Cuprothex S Blu** pronta per l'uso il Bagnato Adesivo Liquido/2 in ragione di gr. 20 per ettolitro.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il **Cuprothex S Blu** è miscibile con Sulfosol per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora.

Può essere miscelato con Keithane, Emmaton, Fitofos, Delfos, Drinfos, per la lotta contemporanea contro Acari, Tignole, Sigaraio, Zigene.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Su varietà di melo cuprosensibili (Abbondanza - Belford - Black Stayman - Golden Delicius - Gravenstein Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - St[illegible]man Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del C[illegible]adà - Rosa Mantovana) e di pero sensibili al Mancozeb e al Rame (Abate [illegible]etel - Armella - Butirra precoce Morettini - Butirra Clargeau - Butirra Giffard - Buona Luigia d'Avanches - Conference - Coscia - Curato - Decana del Comizio - Gentil Bianca - Gentilona - Giardina - Mora - Passacrassana - Principessa di Gonzaga - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Santa Maria - Scipiona - Spadona d'estate - Spadoncina - Spinacarpi - Zecchermanna) **il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.**

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
[illegible]FICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
[illegible]a B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68

Ravit

Stabilim. RAVIT: Quassolo (To)

Reg. N. 3284 Ministero Sanità del . . 28.11.79 . .

E/2

3295

EFISAN

Anticrittogamico, in polvere bagnabile, costituito da: rame - maneb - folpet

Composizione

rame metallico gr. 10 (sotto forma di solfato tetraramico tricalcico)
rame metallico gr. 6 (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
rame metallico gr. 4 (sotto forma di carbonato basico di rame)
gr. 15 di maneb (etilenbisditiocarbamato di manganese) puro
gr. 10 di folpet (N-triclorometiltioftalimmide) puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
— conservare la confezione ben chiusa.
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— non operare contro vento.
— evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti.
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico

— Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea conati di vomito diarrea apatia irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose può provocare irritazione locale (dermatite congiuntivite faringite ecc.)
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di ingestione provocare il vomito lavanda gastrica purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti
— Controindicazioni
Alcool, oli e grassi

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora, Botrytis	0,3-0,5% = gr 300-500
Pomodoro (fino alla prima fioritura)	Peronospora	0,3-0,5% = gr 300-500
Garofano	Ruggine	0,3-0,5% = gr 300-500

Versare lentamente l'EFISAN nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore: portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.

Intervenire secondo le necessità dettate dall'andamento stagionale e dalla biologia dei parassiti.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità

L'EFISAN è miscibile con gli antiparassitari normalmente utilizzati sulle colture ove viene impiegato lo stesso EFISAN, ad eccezione di
— TIOTOX « 50 »
— prodotti a base di olio minerale
— prodotti fortemente alcalini (poltiglia bordolese poltiglia solfocalcica ecc.)

Per la preparazione delle poltiglie miste ad esempio EFISAN + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di EFISAN da solo, soltanto che, prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione dell'EFISAN con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di EFISAN, già pronta per l'uso rimescolando a fondo.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi per la fauna utile

E' tossico per i pesci e gli insetti utili

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta; 40 giorni prima della raccolta delle uve da vino.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3295 del 20.10.1979 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

Fungicida organico in forma liquida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
26,9 g ziram puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3303 **del** 25.10.79
® marchio registrato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare di respirarne i vapori.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Sintomi d'intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa.
Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Consigli terapeutici
a) in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
b) per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: *alcool, olii, grassi.*

CUMAN L è un fungicida organico in forma liquida per la preparazione di poltiglie con qualche migliore caratteristica di adesività.

Impiego e dosi (riferite a 100 litri di acqua)
Contro ticchiolatura delle pomacee, Bolla e Corineo delle drupacee, Alternaria, Septoria e ruggini delle colture orticole e floreali:
— nei trattamenti dopo la fioritura: 350 cc pari a g 400
— nei trattamenti prima della fioritura: 450 cc pari a g 500
— nei trattamenti autunnali ed invernali: 800-850 cc pari a g 900-950

Da non applicare con mezzi aerei

Preparazione della miscela
Versare, agitando, il CUMAN L direttamente nella quantità di acqua necessaria.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari di più comune impiego.
« Avvertenza »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Varietà di pere sensibili allo ziram: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpa, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

3317

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

R 6 ERRESEI DAC 30-15

Fungicida cupro-organico per la vite, fruttiferi, olivo, colture industriali ortive e floreali.

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto **contengono:**
Gr. 30 **rame** metallico (sottoforma di ossicloruro tetramico)
Gr. 15 di Clortalonil puro
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

L'R 6 ERRESEI DAC 30-15 è un fungicida cupro-organico indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle piante, in sostituzione dei tradizionali sali e poltiglie rameiche (ossicloruro di rame, poltiglia bordolese).

Dosi d'impiego: gr. 400 per ettolitro d'acqua contro i seguenti parassiti: peronospora della vite, occhio di pavone e lebbra dell'olivo; ticchiolatura del melo e del pero; bolla e vaiolo del pesco e del mandorlo; peronospora, alternariosi e septoria del pomodoro; peronospora e alternaria delle patata; cercospora della bietola; septoria del sedano; ramulariosi e ruggine del garofano; mal secco e allupatura degli agrumi.

Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose di **R 6 ERRESEI DAC 30-15** in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. N. 3317 **Ministero Sanità del** . . 23.1.82 . . .

E/1

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ».

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi formulati in polvere bagnabile.

Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide. Non si consiglia l'impiego di bagnanti adesivanti.

Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo. (Abbondanza • Belford • - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Goolden Delicious - Gravestein - Jonathan) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

332

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

M 65 MICRONIZZATO

Fungicida organico di sintesi per la prevenzione e lotta contro malattie crittogamiche di seguito indicate delle pomacee, del pomodoro, del garofano, del tabacco, del pioppo

Composizione
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 65 Zineb puro
Sostanze coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— *in caso di ingestione*

Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

— *per l'irritazione della cute e delle mucose:*

lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3324 **Ministero Sanità del** . 25.10.79. . . .

E/1

MODALITA' D'IMPIEGO

L'M 65 MICRONIZZATO è un fungicida efficace, di facile impiego, di adeguata adesività, non macchia e non ustiona la vegetazione. Versare il prodotto in poca acqua e mescolare accuratamente; indi aggiungere la quantità d'acqua necessaria tenendo la miscela costantemente agitata. L'aggiunta di Etaldyn (gr. 50 per hl.) assicura una migliore distribuzione della miscela sulle piante.

IMPIEGHI E DOSI

IN FRUTTICOLTURA:
Contro la Ticchiolatura: del Pero, del Melo nei trattamenti preventivi a gr. 200-300 per hl. d'acqua.

IN ORTICOLTURA:
Contro la Peronospora, l'Alternariosi del pomodoro fino alla prima fioritura: gr. 200-300 per hl. d'acqua.

IN FLORICOLTURA:
Contro la Ruggine del garofano gr. 200-300 per hl. di acqua.

IN TABACCHICOLTURA:
Contro la Peronospora del tabacco: gr. 200-300 per hl. d'acqua.

IN PIOPPICOLTURA:
Contro Marssonina: kg. 5-5,5 per ettaro e per trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

L'M 65 MICRONIZZATO è miscibile con i prodotti anticrittogamici, insetticidi e acaricidi della nostra gamma di produzione.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico su varietà di pere Zineb-sensibili quali: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3327

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MANESAN

Fungicida a base di Maneb per la lotta contro malattie crittogamiche di seguito indicate del tabacco, pomodoro, garofano e per la disinfezione delle sementi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 Maneb puro
Sostanze diluenti e bagnati quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
— per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

IMPIEGHI

Alla dose di gr. 200 per hl. di acqua (corrispondente a circa kg. 2 di prodotto per ettaro).

PERONOSPORA DEL TABACCO:
Da impiegarsi in pieno campo. Con clima favorevole alla Peronospora trattare ogni 7-8 giorni.

POMODORO:
Fino alla prima fioritura contro Alternariosi, Cladosporiosi, Septoriosi e Peronospora.

COLTURE FLOREALI:
Contro la Ruggine del garofano. Trattare dalla apparizione dei primi sintomi. Ripetere ogni 7-8 giorni.

Disinfezione delle sementi: Alla dose di gr. 150-200 per q.le di seme. Per il seme di barbabietola gr. 400-600 per q.le.

RACCOMANDAZIONI

Per le piante difficili a bagnarsi è raccomandabile aggiungere alla poltiglia di **Manesan** pronta per l'impiego il bagnante adesivo Etaldyn alla dose di gr. 50 per hl.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il **Manesan** è compatibile con tutti gli insetticidi e acaricidi. Non mescolarlo con la poltiglia solfocalcica.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3327 **Ministero Sanità del** 25.10.79. . . .

E/1

332

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

MANEVIT

Anticrittogamico acuprico per trattamenti a secco

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 4,8 Meneb puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
— conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
— durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
— per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3328 **Ministero Sanità del** 10.10.79 . . . .

E/1

Il **Manevit** è indicato per la lotta contro la Peronospora del tabacco in pieno campo, tuttavia può trovare impiego anche contro la Peronospora del pomodoro fino alla prima fioritura, specialmente in quelle zone ove, per mancanza di acqua o di adeguata attrezzatura, non sia possibile effettuare trattamenti liquidi.

ISTRUZIONI PER L'USO

CONTRO LA PERONOSPORA DEL TABACCO IN PIENO CAMPO:

1) Trattamenti primaverili: dose kg. 15-20 per ettaro. Iniziare le applicazioni subito dopo la messa a dimora delle piantine effettuando tre o più trattamenti a settimana, a seconda che le condizioni ambientali siano più o meno favorevoli allo sviluppo della malattia.

2) Trattamenti estivi: dose kg 25-30 per ettaro, secondo lo sviluppo delle piante. Il numero delle applicazioni continuerà ad essere di tre o più alla settimana secondo le condizioni ambientali. Nel caso di condizioni sfavorevoli allo sviluppo della malattia, sarà sufficiente una sola applicazione settimanale.

Effettuare i trattamenti subito dopo e non prima dell'irrigazione.

CONTRO LA PERONOSPORA DEL POMODORO fino alla prima fioritura.

Dose: kg. 15-20 per ettaro.

Eseguire i trattamenti alle stesse epoche in cui vengono applicati, per identiche malattie, gli usuali anticrittogamici (poltiglia bordolese, acuprici).

NORME D'IMPIEGO

Il **Manevit** va somministrato alle piante per mezzo delle comuni solforatrici (a mano, a zaino o a motore), curando che la polvere penetri nel fogliame ,in modo da ricoprire le foglie, su ambedue le pagine, di un sottile velo fungicida.

Preferire, per l'esecuzione dei trattamenti, le ore del primo mattino o le ore serali, per ottenere una migliore adesione della polvere sulle piante bagnate dalla rugiada.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti gli insetticidi polverulenti.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3354

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

R6 ERRESEI POLVERE

Anticrittogamico cupro-organico per i trattamenti polverulenti contro la peronospora ed altre crittogame

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 6 Rame metallico (sottoforma di ossicloruro tetraramico)
gr. 3 Zineb puro
Sostanze coadiuvanti ed inerti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.

Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

In caso di ingestione, in quanto il formulato contiene Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz ed anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

IMPIEGO E DOSI

Viticoltura: L'**R 6 ERRESEI POLVERE** è indicato contro la peronospora del grappolo.

Può essere mescolato agli zolfi per la lotta contemporanea contro l'oidio. Si impiegano Kg. 20-30 di prodotto ad ha. a seconda dello sviluppo della vegetazione.

L'**R 6 ERRESEI POLVERE** si utilizza ugualmente contro la peronospora del pomodoro solo fino alla prima fioritura nelle dosi di Kg. 20-30 per ettaro.

L'**R 6 ERRESEI POLVERE** si sparge utilizzando i normali solforatori e la sua finezza lo rende adesivo ed efficace.

L'**R 6 ERRESEI POLVERE** è un prodotto neutro da impiegare tal quale.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con tutti gli insetticidi polverulenti.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Fob. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3354 **Ministero della Sanità del** ~~21.5.~~82
E/2

335

Carbofuran Sipcam
CARBOSIP®

Insetticida microgranulare da impiegarsi esclusivamente per la barbabietola da zucchero all'epoca della semina per la lotta nel terreno contro i parassiti animali della coltura.

COMPOSIZIONE	
— Carbofuran puro	g. 4,5
— Coadiuvanti, inerti: quanto basta a . . .	g. 100

® Marchio registrato SIPCAM - Milano

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di Produzione:
CHEMIA SpA
S. Agostino (FE)

VELENO

Registrazione n. 3357 del 16/10/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirarne i vapori; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone, rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi)

Sintomi d'intossicazione
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione tremori, convulsioni, miosi, bradicardia edema polmonare

Consigli terapeutici:
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive
Ossigenoterapia se vi è cianosi.

MODALITA' DI IMPIEGO

L'applicazione del prodotto dovrà essere effettuata esclusivamente con attrezzatura meccanica.

Il prodotto si impiega **normalmente in trattamenti localizzati** lungo le file di semina distribuendo ed interrando **10-12 Kg/Ha** di prodotto, contemporaneamente alle operazioni di semina, mediante gli appositi distributori di microgranuli idonei per l'applicazione localizzata alla semina di insetticidi in formulazione microgranulare.

Il prodotto può anche essere distribuito, **in presemina della bietola, su tutta la superficie coltivata** impiegando una dose di **40-60 Kg/Ha** distribuiti uniformemente con idonee attrezzature spandiconcimi e successivamente interrato.

Il prodotto non trasmette alcun odore o sapore alle colture che crescono sul terreno trattato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo oppure miscelato con concimi granulari.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

3370

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ORTHOTIUREB

Anticrittogamico Acuprico contro le malattie di seguito indicate delle pomacee, della vite, del pomodoro e del garofano
Polvere bagnabile
Per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 Thiram puro
gr. 15 Captan puro
gr. 19,5 Zineb puro
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza nociva per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

— Sintomi d'intossicazione:

Nausea - vomito - coliche addominali - diarrea - rinorrea - broncospasmo - irrequietezza - prostazione - irritazione nervosa seguita da astenia o paralisi - lacrimazione - dermatosi - congestione del viso quando il paziente ha bevuto alcool.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Lavanda gastrica - terapia sintomatica: respirazione artificiale - ossigenoterapia - antistaminici - soluzioni glucosate endovena - vitamina C e complesso B.

— Controindicazioni:

Bevande alcooliche, grassi ed olii.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 3370. **Ministero Sanità del** .8.1.1980. . . .

E,2

L'**Orthotiureb** contiene in adatte proporzioni i seguenti principi attivi: tetrametiltiuramedisolfuro, etilenbisditiocarbamato di zinco e captan.

Dette sostanze attive si integrano a vicenda conferendo all'**Orthotiureb** una efficacia contro le malattie crittogamiche di seguito indicate.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Dose normale gr 250-300 per ettolitro d'acqua.

Per la preparazione della miscela acquosa aggiungere l'**ORTHOTIUREB** nella dose occorrente a poca acqua e agitare energicamente fino ad ottenere una poltiglia fluida e senza grumi. La poltiglia ottenuta va quindi versata nella quantità d'acqua necessaria per portare alla voluta concentrazione.

E' utile aggiungere gr. 20 di Bagnante Adesico Liquido/2 BPD per ettolitro di soluzione pronta per l'uso.

APPLICAZIONI

IN FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA.
contro: Ticchiolatura del melo e del pero; Peronospora della vite.

IN ORTICOLTURA
contro: Peronospora del pomodoro fino alla prima fioritura.

IN FLORICOLTURA:
contro: Ruggine del Garofano.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini (Poltiglia Bordolese, polisolfuri) con olii e con zolfi;

la sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli e zolfi;

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious-Winesap-Stayman-Ranetta del Canada) e di pero (Abate Fetel-Armella-Butirra precoce Morettini-Butirra d'Anyou-Butirra Clairgeau-Contessa di Parigi - Conference-Coscia-Curato-Decana del Comizio-Gentil Bianca-Gentilona-Giardina-Mora-Principessa di Gonzaga-Santa Maria - Scipiona - Spadona d'estate - Spadoncina - Spinacarpi - Trionfo di Vienna - Zecchermanna).

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto
Sulle uve da vino 40 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MANCOTHEX

Fungicida organico
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 di Mancozeb puro
Sostanze inerti q.b. a 100

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.

Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavada gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni:

Alcool, olii, grassi.

Avvertenza:

Consultare un Centro antiveleni.

Prescrizioni particolari

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

PRINCIPALI IMPIEGHI

Melo e Pero: nei trattamenti preventivi contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella a gr. 150-200/hl;

In Viticoltura: contro Peronospora, Antracnosi e Marciume nero a grammi 200-250/hl.; contro Escoriosi a gr. 350/hl;

In Tabacchicoltura: contro Peronospora a gr. 100-150 per hl. in semenzaio e a gr. 200/hl in pieno campo;

Soia: contro Peronospora a gr. 250/hl.

Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi e Cladosporiosi a gr. 200-250/hl.

Garofano in pieno campo: contro la ruggine a gr. 150-200 per hl.

In Pioppicoltura: contro la Marssonina, alla dose di kg. 4 per ha. e per trattamento.

Concia Semi: a gr. 200/ql. di seme:

Grano: contro Carie, Fusarium nivale;

Mais: contro Elmintosporiosi, Ustilago maidis e le contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae;

Riso: contro Piricularia orizae, Fusarium sp.;

Barbabietola: contro Foma betae, Fusarium sp., Rizoctonia solani, Cercospora beticola;

Sementi orticole: contro Fusarium sp., Rizoctonia solani, Phytium sp.

MODALITA' D'IMPIEGO

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semi-liquida, sciogliendo la dose di MANCOTHEX in poca acqua indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua, tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE IDICATE

COMPATIBILITA'

Il MANCOTHEX è miscibile con i prodotti anticrittogamici, insetticidi ed acaricidi della nostra gamma di produzione.

Non è miscibile con le poltiglie solfocalciche e il permanganato di potassa.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per le seguenti varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68

Ravit

Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 3371 Ministero Sanità del 7-1-1980
10/84

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MANCOTHEX

Fungicida organico
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 di Mancozeb puro
Sostanze inerti q.b. a 100

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.

Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavada gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni:

Alcool, olii, grassi.

Avvertenza:

Consultare un Centro antiveleni.

Prescrizioni particolari

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

PRINCIPALI IMPIEGHI

Melo e Pero: nei trattamenti preventivi contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella a gr. 150-200/hl;

In Viticoltura: contro Peronospora, Antracnosi e Marciume nero: a grammi 200-250/hl.; contro Escoriosi a gr. 350/hl;

In Tabacchicoltura: contro Peronospora a gr. 100-150 per hl. in semenzaio e a gr. 200/hl in pieno campo;

Soia: contro Peronospora a gr. 250/hl.

Pomodoro: solo fino alla prima fioritura: contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi e Cladosporiosi a gr. 200-250/hl

Garofano in pieno campo: contro la ruggine a gr. 150-200 per hl.

In Pioppicoltura: contro la Marssonina, alla dose di kg. 4 per ha. e per trattamento.

Concia Semi: a gr. 200/ql. di seme:

Grano: contro Carie, Fusarium nivale;

Mais: contro Elmintosporiosi, Ustilago maidis e le contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae;

Riso: contro Piricularia orizae, Fusarium sp.;

Barbabietola: contro Foma betae, Fusarium sp., Rizoctonia solani, Cercospora beticola;

Sementi orticole: contro Fusarium sp., Rizoctonia solani, Phytium sp.

MODALITA' D'IMPIEGO

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semi-liquida, sciogliendo la dose di MANCOTHEX in poca acqua indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua, tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE IDICATE

COMPATIBILITA'

Il MANCOTHEX è miscibile con i prodotti anticrittogamici, insetticidi ed acaricidi della nostra gamma di produzione.

Non è miscibile con le poltiglie solfocalciche e il permanganato di potassa.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per le seguenti varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68

Ravit

Stabilim.: Quassolo (To)

Reg. n. 3371 Ministero Sanità del 7-1-1980
10/84

3385

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande, o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Evitare il contatto con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

CAPTAN 50 SOLPLANT

Anticrittogamico organico in polvere bagnabile ad azione preventiva e curativa per la lotta contro la peronospora della vite, la ticchiolatura delle pomacee ed i parassiti fungini delle colture orto-floro-frutticole.

COMPOSIZIONE

Captan puro	g 50
Sostanze adesive e sospensivanti	q.b. a g 100

CLASSE IV

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 3385 del 20-11-1979

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI

g 250-300 in 100 l di acqua contro le seguenti malattie:
- peronospora della vite
- ticchiolatura del melo
- ticchiolatura del pero
- marciume bruno delle pomacee e delle drupacee
- peronospora delle solanacee
- nebbia del pomodoro
- nebbia del sedano
- alternariosi della patata
- vaiolo delle cucurbitacee

N.B. In caso di forti infezioni e desiderando un'azione curativa immediata si può anche impiegare una dose di g 450 o più per 100 l di acqua.

MODALITA' D'IMPIEGO

Istruzioni per la preparazione della poltiglia.
Per ottenere una sospensione acquosa uniforme, miscelare CAPTAN 50 SOLPLANT versando la dose di polvere prescelta in metà della quantità di acqua necessaria, agitando accuratamente per qualche tempo; indi aggiungere il residuato volume di acqua ripetendo il mescolamento.
Si consiglia di usare pompe munite di agitatore.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

CAPTAN 50 SOLPLANT può essere usato in combinazione con altri fungicidi organici ed inorganici, additivi. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

CAPTAN 50 SOLPLANT può essere usato, alle dosi prescritte, anche su fruttiferi in piena vegetazione. Può risultare fitotossico su alcune Cultivar di pero (Butirra Clairgeau, Butirra d'Aniou, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) e di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà), per le quali si sconsiglia.

AVVERTENZE

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta in genere e 40 giorni prima della vendemmia per le uve destinate alla vinificazione.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO g

3389

MILTOX

Anticrittogamico cupro-organico a base di ossicloruro tetraramico e di etilenbisditiocarbamato di zinco

Composizione
rame metallico gr. 25,8 (sotto forma di ossicloruro tetraramico) gr. 14 di zineb (etilenbisditiocarbamato di zinco) puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto,
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
— Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose può provocare irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla cure generiche delle dermatiti.
— Controindicazioni
Alcool, oli e grassi.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Viticoltura	Peronospora	0,25-0,4 % = gr. 250-400
Pomacee	Ticchiolatura	0,2-0,3 % = gr. 200-300
Pomodoro (fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi	0,25-0,4% = gr. 250-400
Garofano	Ruggini	0,25-0,4 % = gr 250-400

Le dosi più elevate si consigliano solo per condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle citate crittogame.

Versare lentamente il MILTOX nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.

Intervenire secondo le necessità dettate dall'andamento stagionale e dalla biologia dei parassiti

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il MILTOX è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ, ad eccezione del TIOTOX « 50 ».
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio MILTOX + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di MILTOX da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del MILTOX con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di MILTOX, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Si deve evitare inoltre di trattare le varietà di pero sensibili allo zineb, quali Abate Fetel, Armela Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3389 del 27.11.1979 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg. 4**

3392

ACATOX K.

Acaricida selettivo per la lotta contro le specie dannose di Acari (Ragni rossi, gialli) in frutticoltura e ortofloricoltura

Composizione
gr. 18,5 di Dicofol puro
solventi, emulsionati e coadiuvanti quanto basta a gr. 100; contiene xilolo.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni per il medico
— Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo
— Sintomi di intossicazione
vomito diarrea parestesie diffuse cefalea vertigini astenia intensa convulsioni
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Intossicazione acuta lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilita di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perche aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1 0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico
— Controindicazioni
la morfina e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool

Modalità di impiego

Campo di impiego	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in 100 litri di acqua
FRUTTICOLTURA ORTICOLTURA FLORICOLTURA	Acari (ragni rossi e gialli)	0,15-0,2% - gr 150-200

Versare l'ACATOX K. direttamente nell'intero volume di acqua oppure nelle poltiglie pronte per l'uso alle quali si desidera unirlo. Mescolare a fondo.

Eseguire il trattamento con ACATOX K non appena si riscontra un attacco di Acari. Bagnare accuratamente tutta la vegetazione delle piante da trattare (pagina inferiore e superiore delle foglie) affinchè il prodotto venga a contatto dei parassiti.

In caso di attacchi massivi elevare la dose a 200 grammi, meglio però intervenire con due trattamenti, anche a dose normale, distanziati l'uno dall'altro di 8-10 giorni.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'ACATOX K è miscibile con gli anticrittogamici e gli insetticidi normalmente usati sulle colture sulle quali viene utilizzato lo stesso ACATOX K ad eccezione dei prodotti alcalini, come poltiglia bordolese e polisolfuri.

AVVERTENZA. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non trattare le coltivazioni durante la fioritura
Il prodotto è fitotossico per la melanzana.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

SANDOZ

Registrazione n. 3392 del 20.11.1979 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg 1**

3393

Dimecron® 20

Insetticida sistemico per uso agricolo.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
18 g di fosfamidone puro
q.b. a 100 g coformulanti
« contiene etilglicole »

ATTENZIONE!
Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I^A^

VELENO

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Va)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 3393 del 7-1-80
® marchio registrato

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego, usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

DIMECRON 20 è efficace contro Afidi, Tingidi, Tripidi, Tentredini, Tortricidi, Tignole, larve ed adulti di Coleotteri, larve di Ditteri della frutta (pesco, melo, pero, agrumi, nocciolo) e degli ortaggi (pomodoro, fagiolo, peperone).
DIMECRON 20 è attivo anche contro l'Afide lanigero del pioppo.

Dosi d'impiego

0,15-0,2%	(150-200 cc in 100 litri di acqua), nella generalità dei casi.
0,15-0,2%	(150-200 cc in 100 litri di acqua) contro la mosca della frutta e la Tignola orientale del Pesco.
0,3-0,35%	(300-350 cc in 100 litri di acqua) contro l'Afide lanigero del pioppo (Phloemyzus Passerinii).

Il DIMECRON 20 va impiegato su piante in buono stato vegetativo, e con superficie fogliare sufficientemente sviluppata.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con COPRANTOL®, CUMAN®, AUROCOL® e tutti gli altri antiparassitari a reazione neutra. Non è invece miscibile con i prodotti a reazione alcalina quali la poltiglia bordolese e la poltiglia solfocalcica.
« Avvertenza »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati, direttamente o accidentalmente per non meno di 20 giorni dal trattamento.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **lt**

3403

ELANCO

ID 5700

Rubigan® 12 EC

(fenarimol)

Liquido emulsionabile

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Fungicida organico endoterapico, localmente mobile nelle superfici vegetali verdi irrorate.

COMPOSIZIONE:

Fenarimol puro	gr. 12,27
Coformulanti	q.b.a. gr. 100,00

Contiene 2-Etossietanolo

Registrato da:
ELI LILLY ITALIA S.p.A. - Divisione ELANCO
Via Gramsci, 733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

Prodotto e distribuito da:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
40064 OZZANO EMILIA (BO)

Reg. Ministero Sanità N° 3403 del 27/11/79
RUBIGAN® Marchio registrato per il Fenarimol della ELANCO PRODUCTS
Divisione della ELI LILLY & Co. - Indianapolis, 6 - Indiana (U.S.A.)

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MALATTIE COMBATTUTE: Oidi (Podosphaera leucotricha, Sphaerotheca pannosa, Sphaerotheca fulginea, Sphaerotheca macularis, Erysiphe polygoni, Erysiphe cichoracearum, Leveillula taurica, Mycrosphaera betae)

COLTURE PROTETTE: melo, pesco, melone, cocomero, zucchino, cetriolo, peperone, melanzana, pomodoro, fragola, carciofo, pisello

ISTRUZIONI PER L'USO DEL RUBIGAN® 12 EC

Modalità d'impiego: RUBIGAN® 12 EC si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume, la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.
Preparazione della miscela: Versare la quantità richiesta di RUBIGAN® 12 EC nella botte piena a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti.

Dosi, epoche e modalità d'impiego Ogni 100 litri d'acqua

Melo: (solo oidio) cc. 35-40 - iniziare i trattamenti alle " orecchiette di topo " e ripeterli ogni 7-10 giorni in funzione dell'intensità dell'attacco.
Pesco: (oidio)... cc. 35-40 dalla sfioritura in poi per 2-3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni. Ricominciare gli interventi ai primi sintomi dell'eventuale infezione secondaria mantenendo un intervallo di 6-8 giorni.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fragola (fino alla prima fioritura), pisello, carciofo: (oidio) cc. 20-40 alla prima comparsa dei sintomi delle malattie. Ripetere gli interventi ogni 8-12 giorni. Se si impiegano meno di 10 Q.li d'acqua/Ha, aumentare la concentrazione in modo da distribuire 200-400 cc. di RUBIGAN® 12 EC/Ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni fungicidi quali sali rameici, Captano, Mancozeb, Zineb, Ziram e con i più comuni insetticidi ed acaricidi impiegati nelle colture che figurano in questa etichetta. Dato l'elevato numero di possibili combinazioni con i numerosi formulati commerciali, si suggerisce di saggiare la compatibilità fisica di ciascuna miscela estemporanea preparandone una piccola quantità prima dell'uso.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: nel caso di miscele con altri principi attivi con i quali il RUBIGAN® 12 EC è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela. Non impiegare il RUBIGAN® 12 EC su varietà soggette a rugginosità quali la Golden Delicious.

Sospendere i trattamenti 14 GIORNI prima del raccolto su pesco; 21 GIORNI prima del raccolto su melo; 7 GIORNI prima del raccolto sulle altre colture.

CONSERVARE IL PRODOTTO CHIUSO NEL CONTENITORE ORIGINALE, IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO.

NON CONSERVARE PRESSO SORGENTI DI CALORE O FIAMME

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO ml

3405

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

RAVITALG

Disalgante e fungicida agricolo per la lotta contro le alghe infestanti della risaia

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 90 Nabam puro
Sostanze eccipienti e coadiuvanti quanto basta a 100

Natura del rischio

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere innocue dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

a) in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

b) per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3405 **Ministero Sanità del** . 8.1.80. . . . .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il RAVITALG è un prodotto in polvere solubile di norma caratterizzato da una valida e rapida efficacia contro alghe presenti nella risaia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Applicazioni al seme: mescolare Kg. 2-2,5 di **RAVITALG** per q.le di seme, preventivamente inumidito, ma non pre-germogliato. Procedere poi alla semina.
Durante questo periodo il movimento d'acqua deve essere ridotto al minimo.

In risaia

Applicazioni preventive: 3-5 giorni dopo la semina del riso, in risaia non ancora invasa da alghe o appena all'inizio della infestazione, disporre, nella bocchetta della camera di imboccatura, dei recipienti opportunamente forati contenenti il **RAVITALG** in maniera da permettere l'entrata dell'acqua da una parte e l'uscita della soluzione del prodotto dall'altra. Usare Kg. 1 di **RAVITALG** per giorno e per ettaro di risaia, per la durata di 6-8 giorni.

Applicazioni curative: quando le alghe hanno costituito il tipico feltro, abbassare il livello dell'acqua in risaia a 10-15 cm. cercando di mantenerlo col minimo ricambio possibile. Distribuire poi con una pompa irroratrice la soluzione di **RAVITALG** alla dose di 7-10 Kg/ha.

Usare la dose elevata con feltri compatti e temperature basse.

Dopo 36-48 ore ristabilire il normale livello dell'acqua.

E' sempre consigliabile intervenire preventivamente o all'inizio della formazione del feltro. Trattamenti su feltro ispessito possono dare risultati incompleti.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3406

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

EMMATON 50

Insetticida agricolo di sintesi. Polivalente; agisce per contatto, ingestione e vapori

COMPOSIZIONE

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di Malathion puro
Sostanze solubilizzanti quanto basta a cento

Contiene Xilolo

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande e corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. N. 3406 **Ministero Sanità del** 7.1.80. . . . .

E/1

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

In Frutticoltura: contro afidi in genere, Tripidi, Oplocampe, Cydia, Carpocapsa gr. 200 per hl.

In Viticoltura: contro Tignole gr. 200 per hl.

In Floricoltura, Orticoltura e su tutte le altre colture: contro Afidi, Tripidi Cocciniglie: gr. 200 per hl.

L'Emmaton 50 può essere versato direttamente nel quantitativo di acqua necessaria avendo cura di agitare bene durante la preparazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'Emmaton 50 è compatibile con tutti gli anticrittogamici e insetticidi della nostra gamma di produzione; non è compatibile con la Poltiglia Bordolese e solfocalcica e con zinco.

L'aggiunta di Bagante Adesivo Liquido/2 è consigliabile per ottenere un effetto totale.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

« Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

3407

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

ORTHOCIDE 50

Anticrittogamico Acuprico
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Captano Puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua e digitale).

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è efficace contro le malattie crittogamiche delle piante coltivate. E' raccomandato nei trattamenti pre-raccolta sulle pomacee.

APPLICAZIONI

IN FRUTTICOLTURA: Contro la Ticchiolatura, Gloeosporium (marciume tenero dei frutti) Marciume bruno dei frutti, Bolla del Pesco gr. 200-250 per hl.

IN VITICOLTURA: Contro Peronospora e muffa grigia dell'uva gr. 250-300 hl.

IN ORTICOLTURA
Patata e Pomodoro: contro Peronospora, Nebbia e Alternariosi; Pomodoro: contro Ticchiolatura, Antracnosi, Cladosporiosi e Septoriosi, gr. 300-350/hl.
Carota: contro Septoriosi e Cercosporiosi;
Fagiolo: contro Antracnosi;
Fragola: Contro Marciume, gr. 250 per hl.

IN FLORICOLTURA
Rosa: contro Peronospora, Ticchiolatura e Marciume;
Garofano: contro Alternariosi, Septoriosi, Ruggine, gr. 250-300 per hl.
Garofano, Azalea (talee), Crisantemo: contro i Marciumi, immergere l'estremità inferiore delle talee in una soluzione con gr. 400 per hl. e quindi procedere all'impianto.
Bulbi da fiore: contro Marciumi immergere i bulbi per 2-3 minuti in una soluzione all'1% e quindi piantarli dopo averli fatti asciugare.

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere il prodotto nella dose occorrente a poca acqua, agitando la miscela a mezzo di bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea.
Aggiungere poi il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con tutti i prodotti anticrittogamici, insetticidi ed acaricidi della nostra gamma.
Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.).
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi;
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Ranetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna), per le quali se ne sconsiglia l'impiego.

AVVERTENZE

Conservare la confezione di prodotto in luoghi freschi ed asciutti.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 gg. prima del raccolto e 40 gg. prima per le uve destinate alla vinificazione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericolos.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 3407 Ministero della Sanità del 8-1-1980

10/84

3412

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CURITAN 65

Anticrittogamico acuprico
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 65 Dodina pura
Sostanze inerti e coadiuvanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei resistenti alle terapie a causa della fitosensibilizzazione.
Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: *lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.*

CARATTERISTICHE

Il **CURITAN 65** è un fungicida per la lotta contro la Ticchiolatura del melo e del pero.
Possiede non soltanto un'azione preventiva, ma anche un'efficace azione curativa della malattia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

IN FRUTTICOLTURA
Contro la Ticchiolatura del melo, pero e nespolo, trattamenti preventivi a gr. 60-80 per hl d'acqua. Trattamenti curativi a gr. 120 per hl d'acqua, entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante. Trattamenti sradicanti, con macchie di Tichiolatura già presenti: gr. 150 per hl. d'acqua.
Contro la Cilindrosporiosi e l'Antracnosi del ciliegio, trattamenti preventivi a gr. 60 per hl. d'acqua.

IN ORTICOLTURA
Contro Peronospora della cipolla
Trattamenti preventivi gr. 80 per hl. d'acqua.
Trattamenti sradicanti gr. 150 per hl. d'acqua.
Contro la Botritys della fragola
Trattamenti preventivi gr 100 per hl. d'acqua

IN FLORICOLTURA:
Contro la Ticchiolatura della rosa
Trattamenti preventivi gr. 60-80 per hl. d'acqua
Trattamenti curativi gr. 100-120 per hl. d'acqua
Contro la Fusariosi del garofano
Trattamenti preventivi gr 80-100 per hl. d'acqua
Trattamenti curativi gr. 150 per hl. d'acqua.

Aggiungere alla dose occorrente di **CURITAN 65** poca acqua agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea.
Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina;

non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività;

evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05‰.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

AVVERTENZE

Da non impiegare durante la fioritura.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3412 **Ministero Sanità del** 8.1.80

341

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

ORTHOCIDE P 10

Anticrittogamico acuprico
Polvere per trattamenti a secco

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 10 di Captan Puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastro esofagei e diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.

Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua e digitale).

L'ORTHOCIDE P. 10, polvere al 10% di Captan, è un formulato indicato per la lotta contro:

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Muffa Grigia o Botrytis dell'uva.

Si consiglia di effettuare tre o più trattamenti (usando solforatrici a mano, a zaino o a motore), durante tutto il periodo in cui l'uva è esposta all'attacco della malattia, distribuendo 15-20 kg. di prodotto per ettaro, investendo e impolverando accuratamente i grappoli.

In linea di massima sulle uve da tavola sono consigliabili i seguenti interventi:

1° trattamento: poco prima che i grappoli « chiudano » (o prima dell'invaiatura)
2° trattamento: circa 6 settimane prima della raccolta
3° trattamento: circa 4 settimane prima della raccolta
4° trattamento: circa 2 settimane prima della raccolta

Sulle uve da vino è necessario interrompere il trattamento almeno 40 gg. prima della raccolta, per evitare un possibile rallentamento del processo fermentativo.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. ... Ministero della Sanità del . 8.1.1980 . . .
E/1 3413

Peronospora tardiva della vite
L'ORTHOCIDE P. 10 è pure un antiperonosporico e, pertanto, i trattamenti eseguiti contro la Muffa grigia servono anche a preservare le viti e l'uva dalla peronospora tardiva o peronospora a mosaico.

Muffa Grigia o Botrytis delle fragole
Per la lotta contro la Muffa grigia o Botrytis delle fragole, è necessario effettuare almeno 6 trattamenti, a distanza di 10-15 giorni uno dall'altro, di cui 2 preflorali e i rimanenti post-florali (di cui due al momento dell'invaiatura dei frutti) alla dose normale di impiego di kg. 15-20 per ettaro.

Ticchiolatura del melo e del pero
Allorché il terreno bagnato non consente di effettuare con le necessarie pesanti attrezzature, i trattamenti liquidi, è possibile ugualmente intervenire contro la Ticchiolatura eseguento i trattamenti in polvere con **OTHOCIDE P. 10**

Il suo impiego deve essere distanziato di almeno tre settimane dall'applicazione di prodotti ai base di zolfi e di olii.

Come noto, contro la Ticchiolatura vanno effettuati almeno due trattamenti prima della fioritura e due o più trattamenti (a seconda dell'andamento stagionale e dell'esperienza locale) dopo la fioritura. Dose: kg. 25-30 per ettaro.

Per frutta destinata alla conservazione in magazzino o in frigo è utile effettuare da 1 a 3 trattamenti al frutteto nell'ultimo mese che precede la raccolta, per evitare le perdite dovute alle malattie di conservazione (marciume lenticellare).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

— Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) con olii e con zolfi;

— la sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi;

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

— Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Ranetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia l'impiego.

AVVERTENZA

Conservare le confezioni di ORTHOCIDE P. 10 in luoghi freschi ed asciutti.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 gg. prima del raccolto e 40 gg. prima per le uve destinate alla vinificazione.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3414

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

ORTHOCIDE 83

Anticrittogamico Acuprico
Polvere Bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 83 di Captan Puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastro esofagei e diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.

Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua e digitale).

CARATTERISTICHE

L'ORTHOCIDE 83 è efficace contro le malattie crittogamiche delle piante coltivate.
E' raccomandato nei trattamenti pre-raccolta sulle pomacee.

APPLICAZIONI

IN FRUTTICOLTURA: Contro la Ticchiolatura. Glocosporium, (marciume tenero dei frutti). Marciume bruno dei frutti, Bolla del Pesco gr. 120-150 per hl.

IN VITICOLTURA: Contro Peronospora e Muffa grigia dell'uva gr. 150-180/hl.

IN ORTICOLTURA: Contro Peronospora, Nebbia e Alternariosi delle patate e del pomodoro; Ticchiolatura, Antracnosi, Cladosporiosi e Septoriosi del pomodoro gr. 180-210 per hl. Contro la Septoriosi e la Cercospora della carota, l'Antracnosi del fagiolo e il Marciume delle fragole gr. 150 per hl.

IN FLORICOLTURA: Contro la Peronospora, la Ticchiolatura ed il Marciume della rosa, l'Alternariosi, la Septoriosi, la Ruggine del garofano: gr. 150-180 per hl.
Contro il Marciume dei bulbi da fiori: immergere i bulbi per 2-3 minuti in una soluzione di gr. 600 e quindi piantarli dopo averli fatti asciugare.
Contro il Marciume del garofano delle talee di azalea, del crisantemo immergere l'estremità inferiore delle talee in una soluzione di 240gr/hl e quindi piantarle.

Disinfezione del terreno:
Alla dose di gr. 150/hl e con distribuzione di 7-8 litri di soluzione per ogni 10 mq. disinfetta il terreno dai vari agenti (Pythium, Phytophtora, Rhizoctonia) del marciume dei semi e della « moria » delle piantine nei semenzai e nei vivai.

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere l'ORTHOCIDE 83, nella dose occorrente a poca acqua, agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Aggiungere poi il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'ORTHOCIDE 83 è miscibile con tutti i prodotti anticrittogamici, insetticidi ed acaricidi della nostro gamma.
— Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) con olii e con zolfi;
— La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Ranetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia l'impiego.

AVVERTENZA

Conservare le confezioni di ORTHOCIDE 83 in luoghi freschi ed asciutti.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 gg. prima del raccolto e 40 gg. prima per le uve destinate alla vinificazione.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3414 Ministero della Sanità del 8.1.1980
E/1

34

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

CAPTAN 50 B.P.D.

Anticrittogamico Acuprico
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Captano Puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua e digitale).

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è efficace contro le malattie crittogamiche delle piante coltivate. E' raccomandato nei trattamenti pre-raccolta sulle pomacee.

APPLICAZIONI

IN FRUTTICOLTURA: Contro la Ticchiolatura, Gloeosporium (marciume tenero dei frutti) Marciume bruno dei frutti, Bolla del Pesco gr. 200-250 per hl.

IN VITICOLTURA: Contro Peronospora e muffa grigia dell'uva gr. 250-300 hl.

IN ORTICOLTURA
Patata e Pomodoro: contro Peronospora, Nebbia e Alternariosi; **Pomodoro:** contro Ticchiolatura, Antracnosi, Cladosporiosi e Septoriosi, gr. 300-350/hl.
Carota: contro Septoriosi e Cercosporiosi;
Fagiolo: contro Antracnosi;
Fragola: Contro Marciume, gr. 250 per hl.

IN FLORICOLTURA
Rosa: contro Peronospora, Ticchiolatura e Marciume;
Garofano: contro Alternariosi, Septoriosi, Ruggine, gr. 250-300 per hl.
Garofano, Azalea (talee), Crisantemo: contro i Marciumi, immergere l'estremità inferiore delle talee in una soluzione con gr. 400 per hl. e quindi procedere all'impianto.
Bulbi da fiore: contro Marciumi immergere i bulbi per 2-3 minuti in una soluzione all'1% e quindi piantarli dopo averli fatti asciugare.

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere il prodotto nella dose occorrente a poca acqua, agitando la miscela a mezzo di bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea.
Aggiungere poi il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con tutti i prodotti anticrittogamici, insetticidi ed acaricidi della nostra gamma.
Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, pofisolfuti, ecc.).
La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi;
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Ranetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna), per le quali se ne sconsiglia l'impiego.

AVVERTENZE

Conservare la confezione di prodotto in luoghi freschi ed asciutti.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 gg. prima del raccolto e 40 gg. prima per le uve destinate alla vinificazione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericolos.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Proveglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 3415 Ministero della Sanità del 8-1-1980

10/84

3416

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

DIMETOIL P

Insetticida agricolo per trattamenti a secco

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 3 Dimetoato puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 3416 Ministero della Sanità del 8.1.1980
E/1

CARATTERISTICHE

Il **Dimetoil P** è un preparato contenente il 3% di Dimetoato.

Questo insetticida è particolarmente indicato per la lotta contro la Mosca delle olive, trova però utile impiego anche nella lotta contro numerose specie di parassiti delle piante da frutto (Mosca delle ciliege, Mosca della frutta, Afidi, Acari)

L'uso del **Dimetoil P** si rende opportuno in tutti i casi in cui, per scarsità d'acqua o per mancanza di adeguata attrezzatura risultino onerosi o di difficile esecuzione i trattamenti liquidi.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Il **Dimetoil P** deve essere somministrato alle piante per mezzo delle comuni solforatrici (a zaino o a motore), curando che la nube polverulenta penetri tra il fogliame in modo da ricoprire interamente le foglie e i frutti di un sottile velo di polvere insetticida

E' preferibile eseguire i trattamenti nelle prime ore del mattino o dopo l'imbrunire, per utilizzare la rugiada. Scegliere per l'esecuzione dei trattamenti giornate non ventose

La quantità di polvere da somministrare per pianta e per trattamento varia, naturalmente, a seconda delle dimensioni delle stesse

Mediamente si impiegheranno kg. 20-30 di **Dimetoil P** per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **Dimetoil P** è miscibile con tutti gli antiparassitari polverulenti aventi reazione neutra e leggermente alcalina.

« **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsavile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

341ª

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

DIMETOIL 40-E

Insetticida agricolo
Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono
gr. 40 di dimetoato puro
Sostanze solventi e emulsionanti quanto basta a 100
Contiene Xilolo

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.*

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. 3417 Ministero della Sanità del 7.2.1980

E/1

CARATTERISTICHE

Il **Dimetoil 40 E** è un preparato contenente il 40% di Dimetoato puro.

Questo estere fosforico oltre ad agire per contatto contro numerose specie di parassiti animali dannosi alle piante, possiede la caratteristica di penetrare nell'interno dei frutti, proteggendoli dall'attacco degli insetti dei quali distrugge uova e larve.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Il **Dimetoil 40 E** è efficace contro i seguenti parassiti:

Mosca delle olive	gr 150 in 100 lt. d'acqua
Mosca delle ciliege	gr. 50 in 100 lt. d'acqua
Mosca della frutta	gr. 125 in 100 lt. d'acqua
Tignola dell'olivo	gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua
Afidi, Acari, Tripidi, Tingidi	gr. 50-75 in 100 lt. d'acqua
Mosca dei piselli, Mosca dei carciofi, Mosca delle bietole e Mosca del garofano	gr. 75 in 100 lt. d'acqua
Mosca delle cipolle	gr. 150 in 100 lt. d'acqua

Per preparare l'emulsione versare la dose richiesta di prodotto in pochi litri di acqua ed agitare fino ad ottenere una emulsione omogenea. Versare quindi l'emulsione ottenuta nella restante quantità di acqua necessaria per raggiungere la diluizione voluta. Per l'esecuzione dei trattamenti può essere usata qualsiasi pompa a mano o a motore, avendo cura di irrorare uniformemente e completamente le piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **DIMETOIL 40 E** è miscibile con tutti gli antiparassitari aventi reazione neutra e leggermente alcalina. E' compatibile con i prodotti a base di zolfi idrosospensibili, ditiocarbammati, composti, di rame (eccetto poltiglia bordolese) ed esteri fosforici.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il **Dimetoil 40 E** su cedro, limone « Iterdonato » limone cedrato, arancio amaro, pistacchio, nocciolo e crisantemo.

Non impiegare il **Dimetoil 40 E** in trattamenti a basso volume sulle varietà di olivo: Coratina, Simona, Canino, Marsella, Frantoio, Itrana.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsavile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3426

MILTOX BLEU

Anticrittogamico cupro-organico a base di ossicloruro tetraramico e di etilenbisditiocarbamato di zinco, di colore bleu intenso

Composizione

rame metallico gr. 25,8 (sotto forma di ossicloruro tetraramico) gr. 14 di zineb (etilenbisditiocarbamato di zinco) puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa,
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua,
- non operare contro vento,
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti,
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico

- Sintomi di intossicazione
  L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose può provocare irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
  In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, inalazioni di camomilla, cure generiche delle dermatiti.
- Controindicazioni
  Alcool, oli e grassi.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Viticoltura	Peronospora	0,25-0,4 % = gr 250-400
Pomacee	Ticchiolatura	0,2-0,3 % = gr 200-300
Pomodoro (fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi	0,25-0,4% = gr 250-400
Garofano	Ruggini	0,25-0,4 % = gr 250-400

Le dosi più elevate si consigliano solo per condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle citate crittogame.

Versare lentamente il MILTOX BLEU nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore, portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.

Intervenire secondo le necessità dettate dall'andamento stagionale e dalla biologia dei parassiti.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità

Il MILTOX BLEU è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ, ad eccezione del TIOTOX « 50 ».
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio MILTOX BLEU + TIOVIT procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di MILTOX BLEU da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del MILTOX BLEU con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di MILTOX BLEU, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non si deve trattare durante la fioritura.
Su varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Si deve evitare inoltre di trattare le varietà di pero sensibili allo zineb, quali Abate Fetel, Armela Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. · MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3426 del 4.12.1979 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

343

LONGOSAN

Antigermogliante delle patate, in polvere secca, a base di profam

Composizione

gr. 0,9 di profam puro disperdenti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa in luogo fresco ed asciutto;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto (inibitore della colinesterasi)

— Sintomi di intossicazione
nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini.
Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Modalità di impiego

Dose di impiego: gr. 200 di Longosan per chilogrammi 100 di patate.

Con il quantitativo necessario di Longosan eseguire le seguenti operazioni:

- spargerne una piccola parte sul pavimento del locale destinato a magazzino;
- distribuire (a mano o con una paletta) il restante Longosan, ripartendolo su strati di circa 10 cm. di tuberi;
- coprire le patate trattate con teloni o sacchi o carta;
- di norma il trattamento con Longosan è bene venga eseguito all'immagazzinamento delle patate (solitamente nel tardo autunno).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il prodotto si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima dell'immissione al consumo delle patate.

Norme di bonifica

Prima dell'immissione al consumo delle patate provvedere all'eliminazione dell'antigermogliante residuo mediante lavaggio con acqua.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per l'uso consentito. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

SANDOZ

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3431 del 15-3-1930 .... del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

3434

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

III CLASSE TOSSICOLOGICA

OVOMITEX K

Acaricida selettivo
Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono
gr. 30 Fenson puro
gr. 20 Dicofol puro
Sostanze solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto a basta a 100
Contiene Xilolo e Cicloesanone

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologia contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

CARATTERISTICHE

L'OVOMITEX K è efficace contro uova, ninfe e adulti delle diverse specie di acari che infestano piante da frutto (meli, peri, peschi) cotone, pomodori, piante ortive, fiori

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Dosi d'impiego gr 150-200 in 100 lt. d'acqua

Aggiungere l'OVOMITEX K, nella dose occorrente a poca acqua e dopo aver agitato, versare l'emulsione ottenuta nella restante quantità di acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione

Irrorare l'emulsione sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore, curando una perfetta nebulizzazione, in modo che risultino bagnate entrambe le pagine delle foglie

E' consigliabile l'aggiunta di 10-20 gr di Bagnante Adesivo L/2 per ettolitro di emulsione pronta per l'uso

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

L'OVOMITEX K non è miscibile con poltiglia bordolese, con prodotti a reazione alcalina, con Dodina

Come tutti gli acaricidi si consiglia di impiegarlo da solo

FITOTOSSICITA'

Applicato a dosi o con quantità di soluzione superiore alla norma, l'OVOMITEX K può danneggiare peperoni.

E' fitotossico per la coltura di melanzane.

Per l'Alto Adige, in condizioni di elevata temperatura non usare su Jonathan, William, Golden Delicious.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68

Stabilim.: RAVIT: Paganica (Aq)

Reg. n. 3434 Ministero della Sanità del 27.3.1980

OLIO BIANCO SANDOZ

Emulsione di olio minerale paraffinico con grado di residuo insolfonabile (95% minimo) per trattamenti in Frutticoltura - Olivicoltura - Agrumicoltura - Floricoltura

contro **Cocciniglie, Afidi, Tripidi, Ragno rosso**

Composizione
gr. 80 di olio minerale paraffinico con residuo insolfonabile del 95%.
emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- — Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- — conservare la confezione ben chiusa;
- — non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- — non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- — non operare contro vento;
- — evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- — dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità di impiego
Epoca e dosi di impiego

Trattamenti in vegetazione	
su: meli - peri - agrumi - ciliegi - olivi - piante ornamentali	1 - 2% di OLIO BIANCO SANDOZ (kg. 1 - 2 di OLIO BIANCO SANDOZ per litri 100 di acqua)
Trattamenti invernali	
(sino al rigonfiamento delle gemme) su: meli - peri - peschi - ciliegi - susini	2 - 3% di OLIO BIANCO SANDOZ (kg. 2 - 3 di OLIO BIANCO SANDOZ per litri 100 di acqua)

Nel trattamento invernale elevare la dose di OLIO BIANCO SANDOZ al 4% solo in caso di forti infestazioni di Diaspis pentagona, Diaspis Leperii.

Preparazione della poltiglia
Pesare la quantità stabilita di OLIO BIANCO SANDOZ, versarla in acqua rimescolando e diluire con altra acqua, sino alla concentrazione voluta, agitando prima dell'uso.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'OLIO BIANCO SANDOZ è miscibile con gli antiparassitari di produzione Sandoz, tranne quelli a base di zolfo. Per la preparazione di poltiglie miste:
- — **con anticrittogamici**, eseguire prima l'emulsione dell'OLIO BIANCO SANDOZ sino a 3/4 circa del volume previsto, poi aggiungere a detta emulsione il prodotto prescelto, dopo averlo sciolto o sospeso in poca acqua. Mescolare il tutto a fondo, aggiungendo l'acqua sino alla concentrazione voluta;
- — **con insetticidi e acaricidi**, basta aggiungere direttamente questi ultimi all'emulsione già pronta per l'uso, agitando.
  Utilizzare la poltiglia il giorno stesso della preparazione.

Avvertenze
Per i trattamenti in vegetazione: evitare gli interventi con OLIO BIANCO SANDOZ per una decina di giorni dopo l'applicazione di un qualsiasi prodotto a base di zolfo e non irrorare in periodi di forte calore e nelle ore di maggiore insolazione.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione:
Palazzolo Milanese

SANDOZ

Registrazione n.3438 del 7-1-1980 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

3440

CLASSE I°

VELENO

* Marchio registrato dalla
DIAMOND SHAMROCK
Corporation di Cleveland (OHIO - USA)

TIOFANOX RAVIT
DACAMOX* 5 G/R

Insetticida granulare protetto per la disinfestazione del terreno alla semina di barbabietole da zucchero

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 4,75 Thiofanox puro (3,3 dimetil-1-(metiltio)-2-butanone O-[(metilamino) carbonil] ossima)
Inerti quanto basta a 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

Natura del rischio:

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di contaminazione degli indumenti togliersi immediatamente quelli contaminati prima di indossarli nuovamente;
Lavare accuratamente i guanti dopo l'impiego specialmente l'interno.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

— Sintomi d'intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

— Consigli terapeutici:
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.

Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini.

Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N3440 . **Ministero Sanità del** 7.1.80. . . . . .

E/1

CARATTERISTICHE

E' un insetticida granulare ad azione sistematica contro diversi insetti ed acari, per applicazioni al terreno destinato alla coltura di barbabietole da zucchero al momento della semina.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto dovrà essere impiegato esclusivamente per mezzo di attrezzature meccaniche le quali dovranno essere opportunamente calibrate per essere certi che le quantità previste siano uniformemente distribuite sui terreni destinati alle coltivazioni di barbabietole da zucchero e contro i parassiti di seguito indicati:

Barbabietola da zucchero: contro altica, afidi, atomaria, pegomia, elateridi, scutigerella, millepiedi; dose Kg. 12-16 per ettaro, alla semina, localizzati lungo le file. Distribuire uniformemente i granuli lungo il solco di semina.

Applicare uniformemente sul terreno interrando se possibile, oppure far seguire una irrigazione: questa ha il duplice scopo di far penetrare il prodotto nei primi strati del tereno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per bestiame, animali domestici, selvaggina, pesci e per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Avvertenza: È vietato utilizzare come mangime per il bestiame il colletto e le foglie della coltura trattata

Intervallo di sicurezza: non necessario in quanto il prodotto si impiega al momento della semina.

Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

CLASSE I°

VELENO

ENDOFENE E

Insetticida a base di Endosulfan, dotato di azione per contatto e per ingestione

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 35 di Endosulfan puro (da p.a. tecnico al 98-99%)
Sostanze solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a 100.

Contiene Xilolo

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. N. 3457 **Ministero Sanità del** . 8.1.80 . . .

E/2

Natura del rischio

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle!

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologia contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

MODALITA' D'IMPIEGO

In frutticoltura:
Contro la Psilla del pero gr. 150-200/hl; Afidi verde ed altri afidi gr. 100-150/hl; Litocollette ed altri minatori fogliari delle pomacee gr. 150/hl; Eriofide del nocciuolo gr. 150/hl; Cicadelle, Tentredini del pero, melo e susino, maggiolino gr. 100-150/hl.

In orticoltura:
Contro la Dorifora della patata gr. 200-400/hl; Tarsonemo e Antonomo della fragola gr. 150/hl; contro Criocera dell'asparago, Altiche, Punteruoli, Pieridi, Tignole delle crucifere, Cavolaia, Afidi, Tripidi, Cimici, gr. 150/hl.

Esche: Contro Nottue, impiegare gr. 60 di ENDOFENE E per 10 Kg. di crusca, mescolare uniformemente con 6-8 litri di acqua e impiegare Kg. 40-50 per ettaro di esca così preparata.

In floricoltura e pioppicoltura:
Contro Afidi, Tripidi, Tarsonemo del ciclamino, Cimici, Cicadelle, gr. 100-150/hl.

Contro: Maggiolino e Crisomela del pioppo gr. 750-900/ha.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'ENDOFENE E è un liquido emulsionabile che si mescola istantaneamente in acqua.

Irrorare l'emulsione sulle piante curando una uniforme copertura di esse.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'ENDOFENE E non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
E' miscelabile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

3478

EUFITANA ESTIVA

Olio minerale paraffinico emulsionabile per trattamenti primaverili ed estivi su agrumi, olivi, meli, peri, piante ornamentali.

COMPOSIZIONE

gr. 85 di olio minerale paraffinico con residuo insolfonabile del 95%
emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità di impiego

Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Cocciniglie - acari - tripidi	1-1,5% - kg 1-1,5

Epoca di impiego
Contro le Cocciniglie quando queste si presentano per la maggior parte nello stadio di giovani larve; contro gli Acari e i Tripidi alla loro prima apparizione.
Se necessario ripetere il trattamento ad una distanza però, dal primo, di almeno 10-15 giorni.

Preparazione della poltiglia
Pesare la quantità necessaria di EUFITANA ESTIVA e versarla in un recipiente pulito.
Aggiungere poco per volta acqua, agitando con energia fino ad ottenere una emulsione lattea, senza macchie d'olio in superficie. Diluire con altra acqua fino alla concentrazione voluta. Rimescolare bene prima dell'uso.
Utilizzare l'emulsione entro il giorno stesso delle preparazione.
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'EUFITANA ESTIVA è miscibile con ACATOX K.T., ANTHIO, ECATOX « 20 » LIQUIDO, ECATOX METIL, EKATIN, NICOTOX SANDOZ, per l'apprestamento delle poltiglie miste, basta aggiungere l'insetticida o l'acaricida prescelto all'emulsione di EUFITANA ESTIVA già pronta per l'uso, agitando.

Avvertenze
Evitare ogni intervento con EUFITANA ESTIVA per una decina di giorni dopo l'applicazione di qualsiasi prodotto a base di zolfo (zolfi polverulenti, zolfi bagnabili, polisolfuri) e non irrorare in periodi di forte calore e nelle ore di maggiore insolazione.
Preservare dal gelo; nel caso che il prodotto sia stato esposto a lungo a temperatura molto fredda (al di sotto di zero gradi), agitare bene il recipiente prima dell'uso.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3478 del 7.2.1930 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

348

EUFITANA

Olio minerale paraffinico emulsionabile con residuo insolfonabile (95% minimo) per trattamenti in frutticoltura - olivicoltura - agrumicoltura - floricoltura

contro

Cocciniglie - Afidi - Tripidi - Ragni rossi (uova invernali)

COMPOSIZIONE
gr. 80 di olio minerale paraffinico con residuo insolfonabile del 95%.
emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità di impiego
Epoca e dosi di impiego

Trattamenti in vegetazione su: meli - peri - agrumi - ciliegi - olivi - piante ornamentali	1-1,5% di EUFITANA (kg 1-1,5 di EUFITANA per litri 100 di acqua)
Trattamenti entro il rigonfiamento delle gemme su: meli - peri - peschi - ciliegi - susini	2-3% di EUFITANA (kg 2-3 di EUFITANA per litri 100 di acqua)

Per il trattamento da eseguirsi entro il rigonfiamento delle gemme elevare la dose di EUFITANA sino al 4% solo in caso di forti infestazioni di Diaspis pentagona, Diaspis Leperii.

Preparazione della poltiglia
Pesare la quantità stabilita di EUFITANA e versarla direttamente nel volume totale di acqua, agitando (ad esempio kg. 3 di EUFITANA per litri 100 di acqua).
Se più comodo, si può preparare a parte, ad esempio in un mastello, una emulsione concentrata, versando l'EUFITANA in pochi litri di acqua, agitando e immettere poi detta emulsione, sempre rimescolando, nel serbatoio della motopompa contenente il restante quantitativo di acqua.
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'EUFITANA è miscibile con gli antiparassitari di produzione Sandoz, tranne quelli a base di zolfo. Per la preparazione di poltiglie miste:
— **con anticrittogamici**, eseguire prima l'emulsione dell'EUFITANA sino a 3/4 circa del volume previsto, poi aggiungere a detta emulsione il prodotto prescelto, dopo averlo sciolto o sospeso in poca acqua;
— **con insetticidi e acaricidi**, basta aggiungere direttammente l'insetticida o l'acaricida alla emulsione già pronta per l'uso, agitando. Utilizzare la poltiglia entro il giorno della preparazione.

Avvertenze
Per i trattamenti in vegetazione:
evitare gli interventi con EUFITANA per una decina di giorni dopo l'applicazione di un qualsiasi prodotto a base di zolfo; non irrorare in periodi di forte calore e nelle ore di maggiore insc[…]one.
AVVERTENZA: In caso di miscela con al[…]rmulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccclta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 34…3 del 7.2.19?0 .... **del Ministero della Sanità.**
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

3493

RAMETRIN 16PB

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE
A BASE DI OSSICLORURO DI RAME E CALCIO

COMPOSIZIONE

— Rame metallo . . . . gr. 16
(sotto forma di ossicloruro di Rame e Calcio)
— Disperdenti, bagnanti ed inerti . q. b. a gr. 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il RAMETRIN 16 PB per la sua natura chimica costituisce un formulato cuprico indicato nella lotta contro:

Vite: contro la Peronospora alla dose di Kg. 1 ogni 100 lt. di acqua.

Patata: contro Peronospora ed Alternaria, alla dose di Kg. 1 ogni 100 lt. di acqua.

Pomodoro: contro Peronospora, Septoria, Alternaria e Batteriosi, alla dose di Kg. 1 ogni 100 lt. di acqua (nei primi trattamenti).

Barbabietola: contro Cercospora alla dose di Kg. 10 - 13 per ettaro.

Olivo: contro Occhio di Pavone alla dose di Kg. 1 ogni 100 lt. di acqua.

Agrumi: contro Allupatura e Mal Secco in due trattamenti autunno - invernali alla dose di Kg. 1 per ogni 100 lt. di acqua.

Concia del grano da seme: gr. 150 - 200 per q.le di seme per il controllo delle Carie.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: il RAMETRIN 16 PB è compatibile anche con altri anticrittogamici quali lo Zineb e lo Zolfo.

Avvertenza: in caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: con il RAMERIN 16 PB non si deve trattare durante la fioritura.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S.p.A.
SS 193 Km. 8 Melilli (SR)

Officina di produzione ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. 3493 del 6 - 2 - 1980 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

3

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ZIRASAN 90

Anticrittogamico Acuprico
Polvere Bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 90 di ziram puro.
Sostanze diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— *in caso di ingestione*
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
— *per l'irritazione della cute e delle mucose:*
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3497 **Ministero Sanità del** . 7.2.80 . . . . .

E/1

CARATTERISTICHE

Lo **ZIRASAN 90** è un fungicida organico micronizzato al 90% di Ziram puro, specifico per la lotta contro Bolla e Vaiolatura (Coryneum) del pesco.

E' altresì efficace contro Fusicoccum e Ticchiolatura del pesco ed altre crittogame delle pomacee, delle piante ortive ed ornamentali.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

Contro Bolla e Coryneum del pesco e del mandorlo:
Per trattamenti autunno-invernali: gr. 400 in lt. 100 d'acqua.
Per trattamenti primaverili-estivi: gr. 150 in lt. 100 d'acqua.
Sospendere i trattamenti su pesco nei periodi più caldi.

Contro Ticchiolatura del melo e del pero:
Per trattamenti pre-florali gr. 200 in 100 lt. d'acqua.
Per trattamenti post-florali gr. 150 in lt. 100 d'acqua.

Contro crittogame diverse delle colture ortive ed ornamentali:
Gr. 150 in lt. 100 d'acqua.

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere allo **ZIRASAN 90** nella dose occorrente, poca acqua, agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea.

Aggiungere poi il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Irrorare la soluzione così preparata sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.

Per le miscele con prodotti in emulsione si consiglia di preparare prima la sospensione normale di **ZIRASAN 90** e quindi aggiungere la dose occorrente del prodotto emulsionabile, agitando.

Per le polveri Bagnabili si consiglia di miscelare prima i due prodotti a secco, preparando quindi la poltiglia acquosa, come illustrato nelle norme d'impiego.

Le eventuali miscele sono comunque da prepararsi al momento dell'impiego.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Lo **ZIRASAN 90** non è compatibile con la poltiglia solfocalcica e la poltiglia bordolese.

Il prodotto è compatibile con il Sofril, Parafene, Kelthane.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili allo Ziram: Abate Fetel - Armella Butirra precoce Morettini - Conference - Coscia - Curato - Decana del Comizio - Gentil Bianca - Gentilona - Giardina - Mora - Principessa di Gonzaga - Santa Maria - Scipiona - Spadona d'estate - Spadoncina - Spinacarpi - Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3508

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

KELTHANE PB*

Acaricida agricolo a lunga attività residua, con efficacia anche nella stagione estiva

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 18,5 di Dicofol puro
Sostanze inerti, adesivanti e bagnanti quanto basta a 100

Marchio reg. dalla Rohm & Haas Co. di Filadelfia, (U.S.A.) negli Stati Uniti e nei principali altri paesi.
Riconfezionato e distribuito dalla RAVIT S.p.A.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 350 **Ministero della Sanità del** 7.2.80

E/1

CARATTERISTICHE

Il **KELTANE PB** è efficace nel controllo di vari acari che attaccano i fruttiferi e le colture sottoindicate. Esso ha potere abbattente ed un lungo effetto residuo.

E' efficace contro ragnetti rossi, gialli, nonché altri acari.

Trattare, bagnando accuratamente ed abbondantemente le piante quando appaiono i primi acari

L'aggiunta di gr. 50-80 di Etaldyn per ettolitro di poltiglia, aumentando la bagnabilità, potenzia l'azione del **KELTHANE PB** stesso. L'aggiunta di Etaldyn è indispensabile dovendosi trattare piante o frutti ricchi di pruina o comunque difficilmente bagnabili.

Il **KELTHANE PB**, si può impiegare sulle colture: fruttifere, orticole, ornamentali.

FRUTTIFERI E AGRUMI:

Per controllare gli acari, usare da 200 a 250 gr. di **KELTHANE PB** per 100 litri di acqua

FRAGOLE E ORTAGGI:

Iniziare i trattamenti al primo comparire degli acari, impiegando gr. 200-250 di **KELTHANE PB** per 100 litri d'acqua.

PIANTE ORNAMENTALI:

Per il controllo degli acari sulle rose, astri, ciclamini, crisantemi e varie altre piante ornamentali, usare da 200 a 250 gr. di **KELTHANE PB** per 100 litri d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Il **KELTHANE PB** è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.

Non è compatibile con i polisolfuri, la poltiglia bordolese ed altri materiali fortemente alcalini.

Avvertenza: In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per la melanzana.

Non trattare gli alberi da frutta durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 gg prima del raccolto

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

353

REMILTINE P

Antiperonosporico in polvere bagnabile
per la vite, il pomodoro ed il tabacco

Composizione
gr. 7 di cymoxanil* puro
gr. 65 di mancozeb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
— Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
— Controindicazioni
Alcool, olii e grassi.

Caratteristiche
Il REMILTINE P è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco.
Il REMILTINE P agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
— **Peronospora della vite**
Usare gr. 150-175 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
— Peronospora del pomodoro (fino alla prima fioritura)
Usare gr. 175 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
— Pernospora del tabacco
Usare gr. 175 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere una azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non impiegare in serra.

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con concimi fogliari contenenti boro.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
E' bene evitare trattamenti con REMILTINE P miscelato a concimi fogliari contenenti boro in quantità elevate.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3530 del 20.2.1980 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg. 1**

* Contiene fungicida CURZATE, ® marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.).

3560

TRI-MILTOX P

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite ed il pomodoro

Composizione
gr. 3,5 di cymoxanil* puro
gr. 12 di mancozeb puro
gr. 13 di rame puro, di cui:
gr. 10 sotto forma di ossicloruro tetraramico
gr. 3 sotto forma di solfato tetraramico tricalcico
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
— Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti
— Controindicazioni
Alcool, oli e grassi.

Caratteristiche
Il TRI-MILTOX P è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite e del pomodoro.
Il TRI-MILTOX P agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
— Peronospora della vite
Usare gr. 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
— Peronospora del pomodoro (fino alla prima fioritura)
Usare gr. 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere una azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non impiegare in serra.

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con il TIOTOX 50.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3560 del 20.2.1980 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

* Contiene fungicida CURZATE, ® marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.).

3561

KALIRAM P

Antiperonosporico in polvere bagnabile
per la vite, la patata ed il pomodoro

Composizione

gr. 3,5 di cymoxanil* puro
gr. 32,20 di rame puro (sotto forma di ossicloruro tetraramico
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il KALIRAM P è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro.
Il KALIRAM P agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego

Contro:
- Peronospora della vite
  Usare gr. 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
  Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
- Peronospora della patata e pomodoro
  Usare gr. 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere una azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia

Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con il TIOTOX 50.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi per la fauna utile

E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3561 del 20.2.1980 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

* Contiene fungicida CURZATE, ® marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.).

3570

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

HERBIDAL MAIS

Diserbante selettivo per il mais
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 Atrazina pura
Sostanze inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'**HERBIDAL MAIS** agisce sulle infestanti per contatto e soprattutto per assorbimento radicale. La sua azione è favorita e resa più immediata da un giusto grado di umidità del terreno o da opportune irrigazioni nei casi di prolungata siccità.

L'**HERBIDAL MAIS** è attivo contro le principali infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali: giavoni, amaranti, farinaccio, persicaria, poa, ortica, erba porcellana, stellaria, capsella, erba marella, geranio, mercurella, veronica piantaggino, matricaria.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato in primavera, in pre-emergenza della coltura, alla dose di kg. 4 di **HERBIDAL MAIS** per ettaro, distribuiti con 400-1000 litri di acqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare l'**HERBIDAL MAIS** in poca acqua, versare la poltiglia nel serbatoio dell'irroratrico o indi aggiungere l'acqua occorrente agitando energicamente.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Impiegare comuni irroratrici a pressione costante munito di agitatore meccanico: il liquido erbicida deve essere sempre ben agitato per evitare depositi.

Stabilire con esattezza il volume di acqua da distribuire che non deve mai essere inferiore a lt. 400 per ettaro, per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona penetrazione dell'erbicida nel terreno.

Eseguire le applicazioni in preferenza su terreno già umido o che potrà ricevere la necessaria acqua da piogge o irrigazioni.

Il trattamento può anche effettuarsi localizzato sulle file di semine per una larghezza di cm 30 riducendo di 1/3 la dose di prodotto. Tale trattamento potrà farsi in terreni non soggetti a forti inerbimenti.

Prima del trattamento di **HERBIDAL MAIS**, per ottenere buoni risultati erbicidi, occorrerà che il terreno sia ben preparato e non zolloso.

Le eventuali sarchiature meccaniche e la rimozione della crosta superficiale del terreno non dovranno superare i 4-5 cm. di profondità per conservare l'effetto erbicida residuo.

Tale effetto residuo si protrae per tutto il periodo del ciclo colturale del mais, qualora non si intervenga con rincalzature.

I trattamenti estivi su mais di secondo raccolto possono effettuarsi solo se la successiva coltura di frumento si distanzia di 5-6 mesi, per consentire l'estinzione dell'effetto erbicida residuo. **Tali trattamenti estivi sono pertanto consentiti soltanto quando il terreno viene investito ad altra coltura soltanto nella primavera successiva.** La scarsità o il ritardo di piogge richiede in misura maggiore, nel periodo estivo, l'ausilio delle irrogazioni per ottenere il miglior effetto erbicida.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE

L'efficacia dell'**HERBIDAL MAIS** è ridotta dalla presenza di sostanza organica in quantità molto elevata: non è consigliabile trattare su terreni torbosi.

I terreni coltivati a mais e trattati con **HERBIDAL MAIS non consentono** la consociano con colture ortive, da foraggio, od arboree (legumo, crucifere, pioppi etc.).

Non impiegare dosi di **HERBIDAL MAIS** superiori a quelle consigliate che potrebbero compromettere colture in rotazione.

Evitare passaggi ripetuti della irroratrice su porzioni di terreno.

Si consigliano preventive prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimazione. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NORME FITOPROTETTIVE

Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per le altre colture (es. bietole tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 3570 . Ministero Sanità del 10.3.1980

Contenuto netto Kg.

3:

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

OVOTEK

Acaricida di lunga persistenza. Distrugge uova, larve e adulti dei ragni rossi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 7 di Tetradifon puro
Gr. 18 di Dicofol puro
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a 100
Contiene Xilolo

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione

Vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante. Somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio).

Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico.

Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari.

Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.

Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni

Morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 3579 Ministero della Sanità del . . 19.6.80 . . .

E/1

CARATTERISTICHE

L'Ovotek è un acaricida che offre potere di penetrazione e impedisce lo sviluppo delle uova deposte da femmine adulte venute a contatto con il prodotto.

APPLICAZIONI

Acaricida specifico contro tutte le forme di acari delle pomacee, drupacee, colture floricole e tutte le colture orticole ad eccezione delle melanzane.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere la massima efficacia con l'Ovotek è consigliabile effettuare il trattamento con grande accuratezza cercando di bagnare bene tutte le parti della pianta onde colpire le uova in schiusura.

Preferire trattamenti separati con solo Ovotek evitando le ore più calde. Dose: gr. 200 per hl. d'acqua.

Aggiungere la dose occorrente di Ovotek a poca acqua e dopo aver agitato, versare l'emulsione ottenuta nella quantità di acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

MISCIBILITA'

L'Ovotek è miscibile con le nostre emulsioni antiparassitarie quali Fitofos, Delfos M, Emmaton 50. Non è miscibile con poltiglie contenenti calce. E' dubbia la compatibilità con gli zolfi bagnabili.

Avvertenza: In caso di miscela con gli altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per le colture di melanzane.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3579

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

DESORMONE TOTALE C

Erbicida

Miscela polivalente efficace per l'azione sinergica ottenuta dai suoi componenti.

COMPOSIZIONE:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 42 di Diclorprop puro
gr. 10,5 di 2,4 D puro
Sostanze emulsionanti quanto basta a 100
Contiene Etilenglicole

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande e corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Per i formulati a base di CLORO DERIVATI DEGLI ACIDI FENOSS CARBOSSILICI

— avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

— sintomi d'intossicazione

Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per la dermatosi.

CARATTERISTICHE

Il DESORMONE TOTALE C, elimina la Matricaria Camomilla, Gallium aparine, Poligono comune, Poligonum persicaria, Poligonum convolvus; Stellaria.

Il DESORMONE TOTALE C, si usa nelle colture di grano, orzo, avena seminate tanto in inverno che in primavera.

Il DESORMONE TOTALE C, come tutti gli erbicidi è assorbita dalle foglie da cui viene trasportato grazie alla linfa nei vari organi della pianta fino alle radici.
Provoca un arresto della crescita, seguito da deformazione di intensità variabile e da disseccamento delle erbe infestanti.

L'azione è progressiva, per cui, anche se le male erbe sono bloccate nella loro crescita dopo i trattamenti, non se ne può apprezzare l'efficacia che dopo qualche tempo.

EPOCA DEI TRATTAMENTI

I trattamenti devono essere fatti in primavera, tanto su cereali seminati in autunno quanto su quelli seminati in primavera.

Cereali a semina autunnale: trattare esclusivamente dalla fine dell'accestimento sino all'inizio della fase di botticella;

Cereali a semina primaverile: trattare quando il culmo principale ha almeno 5 foglie (ciò corrisponde all'incirca a 9-10 foglie di tutto il cespo).

Evitare ogni trattamento a partire dal momento in cui la fase di levata è giunta a metà. Lo stadio favorevole per i trattamenti è quindi piu breve per i cereali a semina primaverile di quanto non lo sia per quelli a semina autunnale.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono quando la temperatura si aggira sui 12 °C e quando le piante sono in attiva crescita. L'efficacia del **DESORMONE TOTALE C** può essere sensibilmente diminuita od essere incompleta se il trattamento viene effettuato dopo o durante un periodo freddo o secco. E' inoltre pregiudicata se l'applicazione è seguita, nell'intervallo di 4 ore, da una pioggia.

E' sempre vantaggioso trattare le infestanti il più presto possibile, sempreché lo sviluppo dei cereali lo permetta e quando le condizioni di crescita delle infestanti sono favorevoli.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Grano, orzo: litri 4 per ettaro

Avena: litri 3,5 per ettaro

In caso di infestanti o di cereali molto sviluppati, o di lotta contro Matricaria Camomilla, Gallium aparine, ortica reale, è necessario impiegare 500/600 litri di acqua per ha. Su infestanti giovani o su specie molto sensibili (Capsella bursa pastoris, Chenopodium sp. Brassica sp. Raphanus raphanistrum) in crescita attiva ed inperiodo a clima mite, la quantità d'acqua da distribuire per ettaro può scendere fino ad un minimo di 300 litri.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITA'

Per evitare danni alle colture sensibili eventualmente esistenti nelle vicinanze delle superfici da trattare (vigne, frutteti, leguminose, tabacco) è necessario:

— trattare in giornate con assenza di vento;
— trattare con temperatura ambiente che non superi i 25 °C all'ombra.
— impiegare apparecchiature a bassa pressione tenendo gli irroratori più in basso possibile;
— lavare accuratamente le apparecchiature ed i recipienti utilizzati nei trattamenti, possibilmente con soda.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

AVVERTENZE

Cereali in consociazione con leguminose

Il DESORMONE TOTALE C non può essere utilizzato su leguminose (trifoglio, erba medica) sia seminate su suolo nudo che in consociazione.

Rispettare scrupolosamente le indicazioni concernenti l'epoca dei trattamenti e le dosi.

Trattamenti in stadi troppo precoci o tardivi rischiano di danneggiare i cereali e ne possono diminuire il rendimento.

Non effettuare rullature od erpicature ai cereali nelle due settimane precedenti e seguenti il trattamento.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3579 **Ministero Sanità del** 10.3.80 . . . .

E/1

IV CLASSE

Sorene PB 83

Fungicida in polvere bagnabile, indicato per la lotta contro numerose malattie crittogamiche che colpiscono sia la parte aerea che l'apparato radicale delle piante coltivate.

COMPOSIZIONE IN PESO

Captan puro		g 83,0
Diluenti, disperdenti, bagnanti	q.b. a	g 100,0

SORENE è un marchio Shell

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande, o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: *lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.*
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3586 del 4-4-1980

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Istruzioni per l'uso

- Ticchiolatura del melo e del pero: 120-150 grammi per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti alla comparsa della nuova vegetazione, in primavera e proseguirli sino alla raccolta, con una frequenza dettata dall'andamento stagionale, in modo da mantenere il fogliame continuamente protetto.
  Non usare il prodotto sulla varietà Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna. Qualora impiegato in trattamenti preflorali sulle varietà di melo Red Delicious e Winesap il Sorene PB 83 può provocare delle necrosi fogliari peraltro transitorie.
- Peronospora della vite: 120-150 grammi per ettolitro. Effettuare il primo trattamento allorchè i germogli hanno raggiunto la lunghezza di 10 cm, la temperatura minima si è stabilizzata sui 10°C e sono caduti almeno 10 mm di pioggia.
  I trattamenti successivi al primo, qualora non si segua un calendario locale basato sui periodi di incubazione della malattia, andranno ripetuti con una frequenza dettata dall'andamento della piovosità e dall'intensità di accrescimento dei tralci.
- Muffa grigia dell'uva: 150 grammi per ettolitro di acqua. Intervenire di norma con un primo trattamento 6 settimane prima della raccolta da ripetere una o due volte ad intervalli settimanali.
- Occhiato o marciume lenticellare delle mele: 180 grammi per ettolitro di acqua. Effettuare un primo trattamento verso la 2ª decade di settembre, prima che sopravvengano gli abbassamenti di temperatura e le piogge di fine estate, da ripetersi dopo 15-20 giorni.
  Varietà particolarmente recettive della malattia sono: Commercio, Rambour Frank, Golden Delicious.
- Peronospora, Alternaria, Septoria e Cladosporiosi o Ticchiolatura del pomodoro: 150-180 grammi per ettolitro di acqua. Le irrorazioni, che devono interessare tutte le piante ed in particolare la pagina inferiore delle foglie, vanno iniziate in campo alla fioritura del primo palco florale e continuate ad intervalli variabili con l'andamento stagionale (5-15 giorni) in modo da mantenere continuamente protetta la vegetazione. Intervenire anche prima di ogni irrigazione per scorrimento e subito dopo ogni irrigazione a pioggia. Il prodotto evita la « carica di rame » nelle conserve.
- Peronospora ed Alternaria della patata: 150-180 grammi per ettolitro di acqua. I trattamenti vanno iniziati alla fioritura e ripetuti tre, quattro o più volte ad intervalli variabili (5-15 giorni) con la frequenza e l'intensità delle piogge. Aver cura di bagnare anche la pagina inferiore delle foglie.
- Vaiolatura e Marciume grigio della fragola: 150 grammi per ettolitro di acqua. Contro la vaiolatura iniziare i trattamenti al primo apparire dei sintomi e ripeterli sino al termine del ciclo vegetativo ad intervalli di 8-10 giorni.
  Per combattere il « Marciume grigio » effettuare un primo trattamento quando il 10-20% dei fiori è aperto, un secondo in piena fioritura ed un terzo alla caduta dei petali. Bagnare bene le piante ed il terreno a queste sottostante.
- Ruggine, Ticchiolatura e Peronospora della rosa: 150-180 grammi per ettolitro di acqua. Effettuare le irrorazioni ad iniziare dall'allungamento dei germogli, non appena si manifestano i primi sintomi delle malattie. Ripetere i trattamenti ad intervalli variabili (7 giorni o più) a seconda della frequenza ed intensità delle piogge.
- Ruggine, Occhio di pavone ed Alternariosi del garofano: 150-180 grammi per ettolitro di acqua con l'aggiunta di un bagnante (30-50 grammi di Bagnante Shell). Sulle talee, nei cassoni di radicamento, effettuare trattamenti settimanali. In campo od in serra iniziare le irrorazioni al termine della crisi di trapianto (15-20 giorni dopo di questo) e ripeterle ogni 7-8 giorni nell'inverno (salvo che nei periodi di forti freddi) nella primavera e nell'autunno ed ogni 15 nell'estate sino al termine del ciclo vegetativo.
- Marciume bruno dei frutti delle drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo): 150 grammi per ettolitro di acqua. Effettuare un primo trattamento allorchè i bottoni florali sono completamente fuori dalle gemme, sino al momento in cui il 10% dei fiori è aperto, ed un secondo alla caduta dei petali.

Disinfezione di bulbi, tuberi, rizomi, radici, talee: immergere, prima della messa a dimora, od anche prima dello immagazzinamento, i bulbi, tuberi in una soluzione allo 0,6% di Sorene PB 83 lasciandoveli per un periodo di tempo variabile da mezz'ora ad un'ora.
Per i tuberi di patata da seme, in particolare, la concentrazione della sospensione del prodotto dovrà essere ridotta allo 0,25% ed il periodo d'immersione a 2-3 minuti.
Le talee delle piante da fiore (crisantemo, azalea, garofano) dovranno venire immerse, prima della messa a dimora, per l'estremità inferiore in una sospensione di Sorene PB 83 allo 0,25%.
Le porzioni vegetali trattate, prima dell'interramento, dovranno essere lasciate asciugare completamente esponendole per qualche ora all'aria.
Disinfezione del terreno - Per proteggere le colture dagli attacchi dei funghi del suolo (Phythium, Phytophthora, Rizoctonia) irrorare uniformemente il terreno con 1 litro per metro quadrato di una sospensione acquosa di Sorene PB 83 allo 0,15-0,18% (150-180 grammi in 100 litri di acqua). Iniziare i trattamenti al germogliamento dei semi e ripeterli 3-4 o più volte ad intervalli settimanali.
Altre malattie che si combattono col Sorene PB 83 (120-150 grammi per ettolitro di acqua): Peronospora e Ruggine dell'aglio e della cipolla; Peronospora, Cercosporiosi, Septoriosi ed Antracnosi della carota; Peronospora del carciofo, cardo, cavolo, cetriolo, finocchio, spinacio, lattuga; Ruggine dell'asparago e dell'insalata; Ruggine, Peronospora, Antracnosi del fagiolo e del pisello; Peronospora ed Antracnosi del melone, cocomero e della zucca; Peronospora e Septoria del sedano; Ruggine e seccume delle foglie del narciso; Seccume delle foglie del crisantemo; Septoria del gladiolo.

Modalità di preparazione della poltiglia

Disperdere il quantitativo stabilito di Sorene PB 83 in poca acqua, in modo da ottenere una pasta omogenea ed aggiungere poi l'acqua rimanente sino alla diluizione richiesta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il Sorene PB 83 può essere miscelato con insetticidi ed acaricidi di normale impiego. Non deve essere impiegato in miscela con i prodotti a reazione alcalina (Poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) e con gli olii semplici (Foliol) o attivati o con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di 3 settimane dalla distribuzione di oli e zolfi.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Può risultare fitotossico su alcune varietà di melo (Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere il trattamento 15 giorni prima del raccolto, 40 giorni prima della vendemmia dei vigneti con uve da vino.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO. Contenuto:

3592

SANFOL "75"

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di folpet

Composizione
gr. 75 di folpet puro;
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

— Sintomi di intossicazione
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua e digitale).

MODALITA' DI IMPIEGO

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Frutticoltura **Pomacee**	Ticchiolatura Marciumi da Gloeosporium Botrytis Monilia	0,1-0,15% = gr. 100-150
Viticoltura	Peronospora Botrytis (parzialmente)	0,15% = gr. 150
Orto-floricoltura	Alternariosi Antracnosi Botrytis Marciumi Peronospore Septoriosi	0,15-0,17% = gr. 150-170

Preparazione della poltiglia
Stemperare il SANFOL «75» in un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere una poltiglia omogenea; versare poi quanto sopra in circa metà volume di acqua agitando bene; completare infine con acqua necessaria, sempre rimescolando.
Eseguire i trattamenti secondo necessità, cercando di ben bagnare la vegetazione. Ripetere gli interventi tutte le volte che la biologia dei parassiti da combattere e l'andamento stagionale lo impongono.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco. E' buona norma, infine, evitare miscele di insetticidi e acaridi con SANFOL «75».

AVVERTENZA
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
In frutticoltura è bene evitare di trattare le varietà di pero Butirra d'Anyou e le varietà di melo dopo la fioritura.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.
Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione:
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3592 del 16.10.1980 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

SANFOL

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di folpet

Composizione
gr. 50 di folpet puro;
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

— Sintomi di intossicazione
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua e digitale).

MODALITA' DI IMPIEGO

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Frutticoltura Pomacee	Ticchiolatura Marciumi da Gloeosporium Botrytis Monilia	0,15-0,2‰ = gr. 150-200
Viticoltura	Peronospora Botrytis (parzialmente)	0,2‰ = gr. 200
Orto-floricoltura	Alternariosi Antracnosi Botrytis Marciumi Peronospore Septoriosi	0,2-0,25‰ = gr. 200-250

Preparazione della poltiglia

Stemperare il SANFOL in un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere una poltiglia omogenea; versare poi quanto sopra in circa metà volume di acqua agitando bene; completare infine con acqua necessaria, sempre rimescolando.
Eseguire i trattamenti secondo necessità, cercando di ben bagnare la vegetazione. Ripetere gli interventi tutte le volte che la biologia dei parassiti da combattere e l'andamento stagionale lo impongono.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il prodotto non è miscibile con poltiglia bordolese, plisolfuri e olio bianco. E' buona norma, infine, evitare miscele di insetticidi e acaridi con SANFOL.

AVVERTENZA

Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

In frutticoltura è bene evitare di trattare le varietà di pero Butirra d'Anyou e le varietà di melo dopo la fioritura.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.
Sulle uve di vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione:
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3593 del 16.9.1980 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg.

3595

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

RISOVIT

Erbicida di post-emergenza del riso, contro Ciperacee ed Alismatacee

Emulsione

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 14,64 di MCPP puro (da acido libero da estere cicloesilico MCPP)
gr. 14,67 di MCPA puro (da acido libero da estere butilglicolico MCPA
gr. 17,78 di Propanile puro
Emulsionanti ed inerti q.b. a 100
Contiene Xilolo

Natura del rischio

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione

Astenia di grado notevole - aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici:

Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: *è sconsigliata la digitale.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3595 **Ministero della Sanità del** 4.4.80
E/1

CARATTERISTICHE

Il **RISOVIT** è un erbicida studiato per la lotta contro le infestanti Ciperacee ed Alismatacee del riso.

Infestanti sensibili

Scirpus maritimus.
Scirpus mucronatus.
Alisma plantago.
Butomus umbellatus (parte epigea).

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSE

Il **RISOVIT** si impiega alla dose di Kg. 4 per ettaro distribuiti con 400-500 litri d'acqua

Il trattamento va effettuato su risaia non in asciutta, in post-emergenza del riso e precisamente prima dell'accestimento, oppure nella fase di levata (fino alla fase che precede la formazione della botticella), su infestanti emerse ed in attiva crescita

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Trattare in giornate senza vento in modo che l'emulsione nebulizzata non raggiunga colture sensibili (viti, fruttiferi, bietole, ortaggi ed erba medica).

NOCIVITA'

Nel corso del trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

3596

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

BENFRUT A

Fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura del pero e del melo

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 10 Benomyl* puro
gr. 45,5 Dodina pura
Conformulati quanto basta a 100

p.a. del Benlate
marchio reg. E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea. Eczemi resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione.

Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il **BENFRUT A** è un fungicida organico a base di Benomyl e di Dodina, indicato nella lotta preventiva e curativa contro la ticchiolatura del pero e melo. Grazie all'azione sistemica del Benomyl, unita all'azione citotropica della Dodina, il **BENFRUT A** può impiegarsi a cadenza fissa, dal primo all'ultimo trattamento.

APPLICAZIONI E DOSI

Contro la ticchiolatura del melo e del pero:
a) trattamenti pre-florali e primi post-florali: cadenza 8 giorni;
b) trattamenti post-florali e successivi: cadenza 10-12 giorni.
Dose d'impiego: gr. 100/hl.
Il prodotto si può usare inoltre **negli interventi curativi** (entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante) e come eradicante sulle macchie di ticchiolatura a gr. 140/hl.
Diluire la dose del prodotto in poca acqua, indi versare la miscela così ottenuta nell'irroratrice già riempita, mescolando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

« L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta ».

COMPATIBILITA'

E' generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.
Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con gli olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività;
evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° C.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non deve essere distribuito durante la fioritura.
Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 gg prima del raccolto

AVVERTENZA

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3596 Ministero della Sanità del 4.4.80

E/1

3597

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

POMETAL A

Fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura del pero e del melo

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 10 Benomyl* puro
gr. 45,5 Dodina pura
Conformulanti quanto basta a 100.

p.a. del Benlate
marchio reg. E.I. du Pont de
Nemours & Co. (Inc.)

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea. Eczemi resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione.

Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro) e digitale.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3597 Ministero della Sanità del 4.4.1980

E/1

CARATTERISTICHE

Il **POMETAL A** è un fungicida organico a base di Benomyl e di Dodina, indicato nella lotta preventiva e curativa contro la ticchiolatura del melo e del pero.

Grazie all'azione sistemica del Benomyl, unita all'azione citotropica della Dodina, il **POMETAL A** può impiegarsi a cadenza fissa, dal primo all'ultimo trattamento.

APPLICAZIONI E DOSI

Contro la ticchiolatura del melo e del pero:
a) trattamenti pre-florali e primi post-florali: cadenza 8 giorni;
b) trattamenti post-florali e successivi: cadenza 10-12 giorni.

Dose d'impiego: gr. 100/hl.

Il prodotto si può usare inoltre negli interventi curativi (entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante), e come radicante sulle macchie di ticchiolatura a gr. 140/hl.

Diluire la dose del prodotto in poca acqua, indi versare la miscela così ottenuta nell'irroratrice già riempita, mescolando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

« L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta ».

COMPATIBILITA'

E' generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con gli olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività;
evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° C.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non deve essere distribuito durante la fioritura.

Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 gg prima del raccolto

AVVERTENZA

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

DOSANEX FL

Diserbante liquido per la lotta contro le Graminacee avventizie e le Dicotiledoni annuali infestanti colture di grano e di orzo a semina autunnale e di carote

Composizione

gr. 45 metoxuron puro;
solventi e coadiuvanti quanto basta a gr. 100;
contiene etilenglicole.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici,
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Il DOSANEX FL è efficace contro Alopecurus myosuroides (Erba codina), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Anagallis arvensis (Anagallide), Apera spica venti (Spica venti), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore), Centaurea cyanus (Fiordaliso), Chenopodium album (Farinaccio), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Echinochloa crus-galli (Giavone), Galeopsis tetrahit (Canapa selvatica), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Galium aparine (Attaccamano), Lamium purpureum (Falsa ortica), Lolium spp (Loglio), Mercurialis annua (Mercurella), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano), Papaver rhoeas (Papavero), Poa spp. (Poe), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Rafanistro), Senecio vulgaris (Erba calderina), Setaria spp. (Falso panico, panicastrella), Sinapis arvensis (Senape), Solanum nigrum (Erba morella), Stachys annua (Erba stregona), Stellaria media (Centocchio).

Infestanti poco sensibili: Matricaria chamomilla (Camomilla), Avena spp. (Avene selvatiche), Polygonum aviculare (Coreggiola), Polygonum convolvulus (Convolvulo).

Dosi ed epoche di impiego

- GRANO e ORZO a semina autunnale
  — In pre-emergenza
  subito dopo la semina
  kg. 7 di DOSANEX FL per ettaro in terreni leggeri o comunque a scheletro prevalente
  kg. 8 di DOSANEX FL per ettaro in terreni di medio impasto
  kg. 9 di DOSANEX FL per ettaro in terreni forti, ricchi di sostanza organica e dove si prevedono nascite tardive di infestanti
  — In post-emergenza
  fra lo stadio delle 3 foglie e quello dell'accestimento compreso del cereale
  kg 7-8 di DOSANEX FL per ettaro
  Quando le infestanti si trovano nei loro primi stadi vegetativi di sviluppo, su terreni leggeri o di medio impasto.
  kg. 8-9 di DOSANEX FL per ettaro
  Contro infestanti più sviluppate o in presenza di **Avena selvatica** e di **Attaccamano**, su terreni di medio impasto o forti.
- CAROTE
  — In pre-emergenza
  al più tardi una settimana dopo la semina
  kg 6 di DOSANEX FL per ettaro in terreni sabbiosi e leggeri
  kg. 7-8 di DOSANEX FL per ettaro in terreni di medio impasto
  kg. 9 di DOSANEX FL per ettaro in terreni forti e umiferi
  — In post-emergenza
  — dallo stadio delle 2 foglie (quando cioè tutte le carote hanno sviluppato almeno 2 foglie) nei terreni a medio impasto, forti e umiferi
  — dallo stadio delle 3-4 foglie nei terreni leggeri
  Impiegare le stesse dosi indicate, a seconda dei tipi di terreno, per l'applicazione in pre-emergenza.

Preparazione e applicazione della poltiglia

Durante le operazioni di riempimento del serbatolo con acqua, versare il quantitativo necessario di DOSANEX FL, avendo cura di far funzionare l'agitatore o di mescolare, comunque, energicamente la poltiglia.
Quantità di poltiglia da distribuire per ettaro: litri 500-600.

Avvertenze

— Di carattere generale:
distribuire il prodotto il più uniformemente possibile ed evitare che la poltiglia raggiunga le colture confinanti.
Nei campi destinati a trattamenti di pre-emergenza preparare accuratamente i letti di semina, evitando il più possibile la presenza di zolle.
Trattare colture sane e dopo l'uso lavare bene il mezzo irroratore.
— Per la carota:
non eseguire il diserbo su semine effettuate con miscugli di varietà e dove la profondità di semina sia inferiore a cm 1-2.
Al momento del trattamento la temperatura non deve superare i 25°C.
- Per i cereali:
— Nei trattamenti di pre-emergenza intervenire su colture seminate precocemente, entro il mese di ottobre, e quando si prevede la presenza di infestanti a prevalente nascita autunnale.
— Nei trattamenti di post-emergenza intervenire, entro le fasi della colture sopra indicate, il più presto possibile, vale a dire non appena il terreno è sufficientemente rassodato per permettere il passaggio dei mezzi irroratori e quando la massima parte delle malerbe si trova nei primi stadi vegetativi; **in particolare per le Avene selvatiche intervenire solo in post-emergenza e prima del loro accestimento.**

Evitare la trasemina di foraggere.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità

Il prodotto può essere utilizzato con altri erbicidi solo se espressamente consigliato.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
In caso di dubbio e di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di interpellare la casa produttrice o di eseguire preventive prove parcellari. Evitare di diserbare le varietà di grano DEMAR 4 e KID.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3607 del 4.4.19[illegible] del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3666

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

FERMATE*

Fungicida a base di Ferbam

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 76 di Ferman puro
Ingredienti inerti quanto basta a 100

(*) Marchio Reg. E.I. Du Pont Nemours & Co. (Inc.) USA

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3666 **Ministero della Sanità del** 16.6.80 . . . .

E/1

Il Fermate è un fungicida efficace contro molte malattie crittogamiche dei fruttiferi, piante ortive, tabacco, piante ornamentali.

PRINCIPALI IMPIEGHI DEL FERMATE

IN FRUTTICOLTURA: Pero e Melo: contro la ticchiolatura, le ruggini, il marciume amaro, l'imbrunimento e il Gloeodes a gr. 120/200 per hl. nei trattamenti pre-e post-fiorali; a gr. 90 per hl. nei trattamenti successivi.

Pesco: Contro la Bolla, le Gommosi, il Fusicoccum e la Moniliosi a gr. 250-400 per hl. nei trattamenti eseguiti durante il riposo vegetativo.

Ciliegio: Contro la perforazione delle foglie e la Moniliosi a gr. 150 per hl. nei trattamenti eseguiti dopo la caduta dei fiori fino al raccolto.

Albicocco, Susino, Mandorlo: Contro la Moniliosi e la perforazione delle foglie a gr. 150 per hl. nei trattamenti eseguiti in pre-fioritura, fioritura e post-fioritura.

IN ORTICOLTURA: Contro la moria della Lattuga a gr. 120 per hl. iniziando i trattamenti alla fuoriuscita delle piantine.

Nei semenzai di tabacco contro la Peronospora alla dose di gr. 200-240 per hl. Eseguire due trattamenti settimanali, dallo stadio cotiledonale fino al trapianto.

NEI SEMENZAI DI CONIFERE: a gr. 240 per hl. ogni 5-8 giorni dalla fuoriuscita delle piantine fino a metà giugno.

MODALITA' D'IMPIEGO

Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di **Fermate** in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Il **Fermate** è compatibile con i più comuni insetticidi e fungicidi della nostra gamma di produzione. Il **Fermate** non è compatibile con gli zolfi.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non deve essere distribuito durante la fioritura.

Varietà di pere sensibili al **Ferbam:** Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

NOCIVITA'

Il prodotto è dannoso per il polline.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

368

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

FTALIDAN

Anticrittogamico Acuprico
Polvere bagnabile
Per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di FOLPET puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti qb a 100

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.

Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua, e digitale.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3686 Ministero della Sanità del . 15.9.1980 . . .

E/1

ISTRUZIONI PER L'USO

Dose d'impiego: gr. 200-250 in 100 lt d'acqua.

Lo **FTALIDAN** agisce contro: Peronospora della vite, Muffa grigia dell'uva (parzialmente), Ticchiolature del melo e del pero; Peronospora, Nebbia, Ticchiolatura, Antracnosi e Alternariosi del pomodoro; Peronospora e Nebbia della patata; Marciume, Vaiolatura delle fragole; Ticchiolatura della rose; Fusariosi dei gladioli.

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere lo **FTALIDAN**, nella dose occorrente, a poca acqua agitando la miscela con un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Dopo aver fatto riposare la poltiglia per alcuni minuti, aggiungere il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non è miscibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Olio Bianco.

Deve essere applicato a distanza di almeno 20 giorni dalla distribuzione di olii minerali e prodotti a base di zolfo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

E' fitotossico per la varietà di pero Butirra d'Anyou e per la varietà di melo se irrorato dopo la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 gg. prima del raccolto e 40 gg. prima della vendemmia delle uve destinate alla vinificazione, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

3688

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

KARATHANE WD

Fungicida organico specifico per la lotta contro l'oidio o mal bianco in frutticoltura, viticoltura e nelle colture orticole, industriali e floreali

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 19,5 Dinocap puro.
Ingredienti inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere la ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.

Controindicazioni:
Atropina.

CARATTERISTICHE

Fungicida organico contro l'oidio o mal bianco in frutticoltura, viticoltura e nelle colture orticole, tabacco, floreali e ornamentali.

Dotato di azione preventiva e curativa è meglio sopportato dello zolfo dalla vegetazione e non produce rugginosità.

Trattamenti ripetuti a 7-10 giorni di distanza esprimono una qualche attività collaterale contro il Ragno rosso.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 3688 **Ministero della Sanità del** 11.12.80

E/2

MODALITA' D'IMPIEGO

Versare la dosa occorrente in poca acqua indi portare a volume aggiungendo l'acqua rimanente. L'aggiunta di Bagnante Adesivo Liquido 2 (gr. 20-30 per hl.) assicura una bagnatura perfetta delle parti trattate.

Frutticoltura: Contro Oidio e Mal bianco del melo, pero, pesco ed albicocco: gr. 80-120 per hl. di acqua.

Viticoltura: Oidio della vite: gr. 80-120 per hl. di acqua. Particolarmente indicato per le uve da tavola per evitare la rugginosità degli acini.

Oidio delle colture orticole:
- Melone, cocomero, cetriolo, zuccheno, gr. 45-90 per hl. d'acqua;
- carciofo, [illegible], sedano, carota, finocchio, cardo, pisello, fagiolo, fagiolino, melanzana, peperone, pomodoro: gr. 80-100 per hl. d'acqua.

Oidio delle colture floreali e ornamentali in pieno campo: gr. 60 per hl. d'acqua.

Per le rose in serra gr. 50-60 per hl. d'acqua.

Oidio del tabacco: gr. 60-80 per hl. d'acqua. Il **KARATHANE WD** non conferisce nessun gusto particolare al tabacco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica ed alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri), con Promecarb, Carbo-Fenothion, Dimeton-Metile, Triclorfon, Olii minerali (estivi ed invernali), T.M.T.D., con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacryl.

Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura non deve essere miscelato con Parathion.

E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, Zolfo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Durante la stagione calda, utilizzare il **KARATHANE WD** solo alle dosi minime e nelle prime ore del mattino e della sera. Non impiegare il **KARATHANE WD**:
- quando la temperatura supera i 32°C;
- durante la fioritura.

Sul melo, nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura, usare il Parathion separatamente da **KARATHANE WD**.

Su cultivar di uve sensibili quale Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

Deve essere impiegato a distanza di tre settimane dalla distribuzione di olii minerali e di qualunque formulato emulsionabile.

NOCIVITA'

E' tossico per acari ed insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto sulle cucurbitacee e 20 giorni prima sulle altre colture.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

Forate Sipcam
Forasip® 5 G

Geodisinfestante sistemico granulare a granulo protetto per la difesa della barbabietola da zucchero, mais, patata, tabacco, ortaggi e colture ornamentali.

COMPOSIZIONE	
Forate puro	g 4,5
Coadiuvanti, inerti: quanto basta a	g 100

® Marchio registrato SIPCAM - Milano

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di Produzione:
CHEMIA - SpA
S. Agostino (FE)

I CLASSE

VELENO

Registrazione n. 3691 del 16/10/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirare i vapori; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle e gli occhi; durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione;
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni; morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza; consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un granulare sistemico provvisto di azione per contatto, asfissia ed ingestione, che permette la difesa delle piantine per tutto il primo e più delicato periodo di vegetazione proteggendole sia dai parassiti delle radici e del colletto (agrotidi, atomarie, blaniuli, elateridi, grillotalpe, maggiolini, mosche e punteruoli delle radici, scutigerelle, tipule, nematodi liberi del genere Pratylenchus e simili), sia dai precoci attacchi dei parassiti delle foglie e degli steli (afidi, altiche, casside, mosche minatrici, tripidi e ragno rosso).
L'applicazione del prodotto dovrà essere effettuata esclusivamente con attrezzatura meccanica.
Il prodotto si impiega all'epoca delle semine o dei trapianti secondo le dosi per ettaro sotto indicate, per trattamenti localizzati, impiegando idonei distributori di microgranuli opportunamente tarati in modo da assicurarne la giusta ed uniforme distribuzione unitamente al necessario incorporamento.
La distribuzione può essere effettuata a seconda delle attrezzature disponibili e delle colture, nei solchi di semina o ai lati delle file.

— **Per barbabietola da zucchero: Kg. 8-12.**

— **Per mais, patata, tabacco: Kg. 18-22.**

— Per trattamenti su tutta la superficie usare una dose di **40-60Kg/Ha** seguita da accurato interramento al terreno per le seguenti colture orticole ed ornamentali: carota, cavoli, fagiolo, pomodoro, melanzana, peperone, pisello, sedano, zucchino; garofano, vivai di piante ornamentali.

— Nei casi in cui l'interramento del prodotto non sia assicurato dalla tecnica di distribuzione, provvedervi mediante leggera lavorazione o irrigazione. Su terreni fortemente alcalini o ad alto contenuto di sostanza organica, è consigliabile aumentare di circa 1/3 le dosi suggerite.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo oppure miscelato con concimi granulari.

Fitotossicità: a causa del numero particolarmente elevato di varietà e specie floreali, ornamentali ed orticole, aventi eventuale diversa sensibilità, si consiglia di effettuare una prova su limitata superficie, prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Non trattare in fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal trattamento.

Sospendere il trattamento 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

3692

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

PIRENYL E

Contro gli insetti che danneggiano le colture floro-orto-frutticole (Afidi, Mosche, Moscerini, Psille, Tripidi, Tingidi).

Contiene Piretro africano

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 2 Piretrine pure
gr. 8 Piperonyl Butossido puro
gr. 0,5 Antiossidante per Piretro
Solventi ed emulsionanti q.b. a 100.

Contiene XILOLO

Formula della Pyrethrum Board of Kenya-Nakuru-Kenya
Venduto in Italia dalla RAVIT S.p.A. - ROMA

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **PIRENYL E** è un insetticida che può essere impiegato in qualsiasi stagione.

Il **PIRENYL E** è un insetticida di contatto, dotato di forte potere abbattente con persistenza di azione di 3-5 giorni per la presenza nel formulato di sostanze antiossidanti del Piretro.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- Carciofo, crisantemo, fagiolo, fave, fragole, garofano, lattuga, rose, susino: contro afidi
- Asparago, cipolle, carota, cavolo, ciliegie: contro mosca gr. 140-160/hl d'acqua
- Melo: contro afide verde
- Pero: contro Psilla gr. 140-160/hl d'acqua
- Melanzana, tabacco: contro Cavolaia, Bemisia (Aleurodidi) gr. 160-200/hl d'acqua
- Pomodoro: contro moscerino gr. 160/hl d'acqua

I trattamenti alle colture dovranno essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni ed in giornate di tempo buono.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

E' generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 2 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3692 Ministero della Sanità del 30-5-80

E/1

3'

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

OSSICLORURO DI RAME CREMA OLIO 15

Anticrittogamico

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 15 di rame metallico (sottoforma di ossicloruro)
Gr. 45 di Olio minerale attivato (U.R. 95%)
Sostanze diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

L'OSSICLORURO DI RAME CREMA OLIO 15 può essere impiegato contro la maggior parte delle malattie crittogamiche delle piante.
In particolare è indicato per la lotta contro le seguenti malattie, alle dosi di seguito indicate:
Peronospora della vite gr. 1000-1500 in 100 litri d'acqua
Occhio di pavone dell'olivo gr. 1000-1500 in 100 litri d'acqua
Bolla e gommosi del pesco gr. 3000-3500 in 100 litri d'acqua
in trattamenti al bruno

Ticchiolatura del pero e del melo:
nei trattamenti pre-florali gr. 800-1500 in 1000 litri d'acqua
nei trattamenti post-florali gr. 800 in 100 litri d'acqua
nei trattamenti invernali gr. 3000 in 100 litri d'acqua.
Impiegando 7-8 hl d'acqua ad ettaro.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n3704Ministero della Sanità del 30-5-1980 . . .

E/1

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere, alla dose occorrente di prodotto, poca acqua, agitando con un bastone fino ad ottenere una emulsione omogenea. Aggiungere quindi la quantità di acqua necessaria per ottenere la concentrazione voluta.
Irrorare l'emulsione sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore, curando una perfetta nebulizzazione, in modo che risultino bagnate entrambe le pagine delle foglie.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Non è miscibile con preparati a base di zolfo, Karathene, Captano, Clorfenamidina, Delan, Folpet, Foltapet, Dpolisolfuri e Spersul.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura su pesco, susino e varietà d imelo:
Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonatham, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Montavana,

e di pero:
Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard;
Cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

AVVERTENZE

Tra i trattamenti con prodotti a base di zolfo, Karathane, Captano e quelli con Ossicloruro di Rame Crema Olio 15 deve essere osservato un intervallo di 20 giorni circa.

Agitare il prodotto prima dell'uso.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3705

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Insetticida agricolo

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 0,3 Piretrina pura
Gr. 1,2 Piperonilbutossido puro
Sostanze inerti quanto basta a 100

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Disinfestante di facile impiego.

Il **PIREVIT** rappresenta il mezzo per sottrarre i prodotti immagazzinati, alla distruzione causata dagli insetti.

Il **PIREVIT** agisce per contatto.

Va usato mescolandolo alla granella con semplice paleggiamento. Non richiede speciali attrezzature.

Il **PIREVIT** agisce contro gli insetti allo stato adulto, viventi in magazzini e spese dei cereali.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3705 Ministero della Sanità del 30.5.1980
E/1

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento con **PIREVIT** va eseguito direttamente all'atto dell'immagazzinaggio.

Il **PIREVIT** va impiegato alle seguenti dosi
- per trattamenti preventivi: gr. 100 per quintale di cereali;
- per trattamenti curativi: gr. 150 per quintale di cereali.

Il trattamento preventivo, eseguito al momento in cui i prodotti vengono introdotti nel magazzino, evita ogni successivo intervento curativo.

Trattamenti dei cereali ammassati.
Stendere in strato i mucchi, soffiettarvi in superficie il **PIREVIT** e, rivoltare con pale. Ripetere l'operazione fino a quando tutta l'occorrente quantità di **PIREVIT**, risulti uniformemente incorporata nella massa.

Trattamenti nei silos.
Soffiettare il **PIREVIT** durante i passaggi dei cereali da una cella all'altra.

Trattamenti alla trebbia.
Soffiettare il **PIREVIT** nei sacchi all'atto dell'uscita del cereale dalla bocca della trebbia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE

- Non attendere che i cereali siano invasi da insetti per trattarli con **PIREVIT**.
- Eseguire il trattamento al momento dell'immagazzinaggio: si risparmierà tempo e si eviteranno i cali per attacchi iniziali di parassati.
- Un solo trattamento, eseguito all'atto dell'immagazzinaggio, è sufficiente per tutto il periodo di immagazzinamento.
- I semi trattati con **PIREVIT**, conservano integralmente il loro potere germinativo.
- La semplice vagliatura, normalmente eseguita prima di avviare i cereali alla molitura, basta per eliminare il **PIREVIT**.

Sospendere il trattamento 3 giorni prima della immissione al consumo.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsavile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Evitare di respirarne i vapori.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.**
- **Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.**
- **Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**
- **Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).**
- **In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, ingestione e contatto cutaneo.

Veleno protoplasmatico, depressore del sistema nervoso centrale.

SINTOMATOLOGIA: congiuntivite, malessere, cefalea, vertigini, sonnolenza, nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, emorragia delle mucose, febbre, ipotensione, segni di danno epatico e renale.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO:

- *in caso di inalazione trasportare subito il paziente in ambiente ventilato; rianimazione respiratoria;*
- *in caso di ingestione: lavanda gastrica o emesi, somministrazione di carbone attivo in sospensione acquosa, poi purgante salino oppure olio di paraffina (non usare olio di ricino nè latte).*

Terapia sintomatica e rianimatoria, cortisone, epatoprotettori.

CONTROINDICAZIONI: amine simpaticomimetiche, sostanze lipidiche, latte, alcool, diuretici, oppiacei.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

GRANOVIT® 75

Fumigante per cereali e derrate in magazzino

COMPOSIZIONE

— Dicloroetano puro	g 75
— Tetracloruro di carbonio puro . . .	g 25

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del 3 agosto 1968, n. 1255.

I CLASSE

VELENO

Prodotto negli stabilimenti della Società ANICAGRICOLTURA Unità di Carrara-Avenza (MS)

Registrazione Ministero Sanità n. 3723 del 12-9-80

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

CARATTERISTICHE

Il GRANOVIT 75 è un liquido gassificabile studiato per la disinfestazione dei cereali e delle derrate immagazzinate.

E' un prodotto a rapida evaporazione che origina vapori tossici di elevata azione insettic e di spiccata penetrazione nella massa dei cereali.

E' particolarmente indicato per difendere frumento, riso, orzo, avena, granoturco, fave, piselli, fagioli in magazzino dall'attacco di Tignole, Plodie, Calandre, Triboli, Tonchi nei loro vari stadi di sviluppo all'esterno ed all'interno dei semi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Contro tutti gli insetti parassiti del frumento e dei cereali in genere (vere e false Tignole, Plodie, Calandre, Triboli, Strugglgrano, Tonchi): da **300 a 600 g per m³** di ambiente (o da **40 a 80 g per quintale** della derrata) a seconda delle condizioni ambientali, la grossezza dei semi e le specie infestanti.

E' sconsigliabile effettuare il trattamento quando la temperatura della derrata è inferiore a 10 °C.

Il liquido può essere versato uniformemente sulla massa di seme con l'ausilio di normali pompe, innaffiatoi ovvero può essere sistemato in piccoli recipienti (coperchi di scatole di metallo, vasetti in terraglia) da collocare sugli stessi cumuli di cereale.

Il prodotto può essere anche versato direttamente sui sacchi, quando il seme è insaccato. Nei sili e nei grossi magazzini, al fine di facilitare la penetrazione dei gas insetticidi nella massa dei semi, è opportuno servirsi di una sonda per distribuire a varie altezze l'insetticida.

Durata esposizione: da 3 a 7 giorni al massimo a seconda delle condizioni ambientali. Per le granaglie destinate alla semina la durata di esposizione non deve superare le 72 ore (3 giorni) ed il trattamento non deve essere effettuato se l'umidità dei semi supera il 12%; è sconsigliabile operare quando la temperatura della partita da disinfestare supera i 30 °C.

Bonifica: immediatamente dopo la riapertura del deposito — a trattamento effettuato — le derrate e l'ambiente in cui sono conservate, devono essere aerati almeno per 24 ore.

AVVERTENZA: All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate col prodotto devono essere posti dei cartelli con la dicitura: « Vietato l'ingresso alle persone estranee — pericolo di morte » (circolare ACIS n. 52 del 9-6-1954).

COMPATIBILITA': Il **GRANOVIT 75** si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Prima della commercializzazione o della trasformazione industriale, le partite trattate devono subire una aerazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e pe gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

3747

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

KARATHANE L. C.

Fungicida
Liquido concentrato

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 37,44 di Dinocap puro
Emulsionanti e solventi q.b. a 100
Contiene Xilolo e Cicloesanone

Natura del rischio:

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere la ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.

Controindicazioni:
Atropina.

GENERALITA'

Il **KARATHANE L.C.** - (Liquido concentrato) è efficace nel controllo di tutte le forme di oidio con qualche attività secondaria contro alcune specie di ragnetti rossi.
Il **KARATHANE L.C.** è concentrato e pertanto le dosi d'impiego suggerite devono essere scrupolosamente osservate.
Per ottenere un buon controllo dell'oidio è necessario impiegare una forte quantità di soluzione in modo da bagnare completamente le piante da difendere. Per le colture sottoriportate impiegare il **KARATHANE L.C.** nelle dosi indicate aggiungendo alla soluzione gr. 20-30 del Bagnante Adesivo Liquido 2.

DOSI ED EPOCA DEI TRATTAMENTI

Melo e Pero
Per controllare l'oidio e diverse specie di ragni rossi impiegare 50-60 centimetri cubici di **KARATHANE L.C.** per 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti alla schiusura delle gemme e continuare fino dopo la fioritura alla caduta dei petali, ripetendo le irrorazioni almeno ogni 14 giorni in caso di forti attacchi. Assicurarsi che i rami terminali colpiti da oidio siano bene irrorati.

Albicocco
Contro l'oidio impiegare **KARATHANE L.C.** nella dose di centimetri cubici 50 per ettolitro di acqua.

Pesco
Contro l'oidio impiegare 50 centimetri cubici di prodotto per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti alla schiusura delle gemme e continuarli fino alla caduta dei petali.

Ortaggi: Carciofo, [illegible], sedano, carota, finocchio, cardo, pisello, fagiolo, fagiolino, melanzana, peperone, pomodoro.

Cucurbitacee: Melone, cocomero, cetriolo, zucchino.
Contro il mal bianco impiegare da 40 a 45 centimetri cubici di **KARATHANE L.C.** per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e ripeterli a 7-10 giorni di intervallo a seconda delle neccessità.
E' importante la completa copertura delle foglie specie nella pagina inferiore.

ROSE - **contro l'oidio:**
a) In Serra: Impiegare il **KARATHANE L.C.** nella dose di 30-50 centimetri cubici per ettolitro di acqua. Iniziare la lotta al primo apparire della malattia e ripetere i trattamenti ad intervalli di 5-7 giorni a seconda della necessità.
Trattare con precauzione quando la temperatura si avvicina al 30° C. e non trattare a temperature superiori al 32° C.
b) In pieno campo: Impiegare il **KARATHANE L.C.** nella dose di centimetri cubici 30-50 per ettolitro di acqua alla prima comparsa della malattia e ripetere i trattamenti a 7-10 gg. di intervallo. Irrorare accuratamente tutta la pianta dirigendo lo spruzzo specialmente verso la pagina inferiore delle foglie. Quando necessario, per combattere ruggine o altre malattie, aggiungere Dithane Z-78.

FIORI in particolare Aster, Begonia e Begonia Rex, Crisantemo, Dalia, Delphinium contro l'oidio.

Dosi: in serra 30 centimetri cubici, e in pieno campo da 30-40 centimetri cubici di **KARATHANE L.C.** per ettolitro di acqua.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dell'oidio e ripeterli a distanza di 7-10 giorni a seconda della necessità.

VIVAI - (Melo - pero - pesco - ciliegio - mandorlo)
Contro l'oidio usare il **KARATHANE L.C.** alla dose di 50-60 centimetri cubici per ettolitro di acqua, iniziando i trattamenti alla apertura delle gemme e ripetendoli successivamente a distanza di 7-10 giorni secondo necessità.

VITE - Contro l'oidio e gli acari. Irrorare con **KARATHANE L.C.** nella dose di centimetri cubici 40-60 per ettolitro di acqua iniziando i trattamenti al primo allungamento del germoglio e ripetere in seguito i trattamenti a distanza di 10-14 giorni. Con l'avanzare della stagione è bene sostituire il **KARATHANE L.C.** con quello in polvere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica ed alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri), con Promecarb, Carbo-Fenothion, Dimeton-Metile, Triclorfon, Olii minerali (estivi ed invernali), T.M.T.D., con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacryl.

Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura non deve essere miscelato con Parathion.

E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, Zolfo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Durante la stagione calda, utilizzare il **KARATHANE L.C.** solo alle dosi minime e nelle prime ore del mattino e della sera. Non impiegare il **KARATHANE L.C.**:

- quando la temperatura supera i 32°C;
- durante la fioritura.

Sul melo, nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura, usare il Parathion separatamente da **KARATHANE L.C.**.

Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

Deve essere impiegato a distanza di tre settimane dalla distribuzione di olii minerali e di qualunque formulato emulsionabile.

NOCIVITA'

E' tossico per acari ed insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

— Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto sulle cucurbitacee, e 20 giorni prima, sulle altre colture.

AVVERTENZE

E' infiammabile - tenere quindi lontano dalla fiamma.

Non impiegare il **KARATHANE L.C.** quando la temperatura ambiente è superiore al 32° C. Con temperatura elevata utilizzare il **KARATHANE L.C.** alle dosi minime consigliate ed effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino e della sera.

Deve essere impiegato a distanza di tre settimane dalla distribuzione di oli minerali e di qualunque formulato emulsionabile.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 3747 **Ministero della Sanità del** 111.12.80
E/2

Amizina® 50 L

Diserbante liquido per il diserbo del mais, di fruttiferi, vite, agrumi, olivo, asparago e per il diserbo totale.
Il prodotto agisce per assorbimento radicale nei confronti delle infestanti annuali mono e dicotiledoni.
Essendo praticamente insolubile in acqua e lentamente decomposto nel terreno, è caratterizzato da una lunga persistenza di azione.
Il prodotto non è dannoso per la vite e per le colture arboree in genere in quanto rimane nello strato superficiale del terreno e non migra in profondità dove si trovano le radici dei fruttiferi.
Il prodotto non distrugge le malerbe perennanti a radicazione profonda e munite di stoloni e rizomi, come la gramigna, il convolvolo, la sorghetta.

COMPOSIZIONE	
— Simazina pura	g. 47,5
— Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a	g. 100
— Contiene Glicole etilenico	

® Marchio registrato SIPCAM - Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A. - Viale G. Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
CHEMIA - SpA
S. Agostino (FE)

Registrazione n. 3748 del 19/6/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua, non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO

— **Mais:** intervenire in pre-emergenza, da subito dopo la semina a prima della nascita delle infestanti, con AMIZINA 50 L alla dose di **3-4 kg/ha** in 400-500 o più litri di acqua utilizzando la dose più bassa nei terreni leggeri ed umidi; contro le infestanti resistenti (Giavone americano, Setarie, Digitarie, Sorghetta da seme e Giavoni resistenti), impiegare l'associazione di 2 kg/ha di AMIZINA 50 L con 4-6 lt/ha di LASSO. Qualora non cada una pioggia entro 8-10 giorni dal trattamento provvedere con una irrigazione. Il prodotto non è efficace sui terreni torbosi.

— **Fruttiferi (melo, pero, pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo), vite, agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino), olivo:** intervenire dopo la lavorazione del terreno di fine inverno, su terreno privo di infestanti, con AMIZINA 50 L alla dose di **4-6 kg/ha**, utilizzando 800-1000 litri di acqua. In presenza di malerbe perennanti è necessario effettuare il diserbo con un prodotto specifico. (ROUNDUP).

— **Asparago:** intervenire subito dopo la lavorazione di fine inverno e la sistemazione dell'asparagiaia, su terreno nudo privo di infestanti e prima della emergenza dei turioni con AMIZINA 50 L alla dose di **4 kg/ha** in 400-600 litri di acqua, oppure dopo la raccolta degli asparagi alla dose di **2 kg/ha**.

— **Diserbo totale** (ripe, scoline, canali, strade, piazze, depositi ed impianti industriali): intervenire prima della nascita delle infestanti con AMIZINA 50 L alla dose di **5-10 kg/ha** in 800-1000 o più litri di acqua, utilizzando la dose più alta per ottenere un'azione più duratura del diserbo; il diserbo va ripetuto in caso di necessità.

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto direttamente nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con altri diserbanti onde ampliare lo spettro d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non deve essere impiegato negli impianti di età inferiore ai 4 anni, sulle drupacee, sui pioppi e sulle asparagiaie. Evitare durante il diserbo che la poltiglia di prodotto vada a cadere sui terreni limitrofi coltivati. I vigneti e frutteti diserbati con il prodotto non possono essere investiti con sottocolture per l'intera stagione.

Avvertenze: lavare accuratamente e ripetutamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per il diserbo, prima di destinarli ad altri trattamenti antiparassitari.

Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture (es. Bietole, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi su fruttiferi, vite, agrumi, olivo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg.**

3759

GESAL ORTO INSETTICIDA LIQUIDO **Classe III**

Insetticida polivalente a largo spettro d'azione, efficace contro afidi, dorifora delle patate, cavolaia, tentredini del pero e del melo, psille, coccinigile, tortricidi, tripidi e ragnetti rossi delle seguenti colture ortive: asparagi, barbabietole, carote, cavoli, cipolle, fagioli, fave, fragole, insalate, patate, piselli; nonché delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e serra.
Il prodotto è dotato di azione citropica ed agisce sui parassiti per contatto e per ingestione.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Diazinone puro g 20
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILOLO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg per gli adulti, 0,2 - 1 mg per bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

Dose d'impiego
0,2% (200 g per 100 litri d'acqua).

Come si usa
Versare il contenuto del tappo in un litro d'acqua e mescolare. Spruzzare in modo uniforme tutta la pianta anche dove non si nota la presenza di insetti.

Quando si usa
Trattare le piante non appena si nota l'infestazione. Quando occorre ripetere il trattamento 4 - 5 giorni più tardi. Applicare il prodotto nelle ore meno calde della giornata.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con Gesal Orto Anticrittogamico Polvere Bagnabile.

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Officina di produzione: **IRCA S.p.A., Albano S. Alessandro (MI)**

Registrazione Ministero Sanità n. 3759 del 19 giugno 1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: ml

AIRWICK ITALIA S.p.A.

3761

GESAL ORTO INSETTICIDA GRANULARE **Classe III**

Granulato al 5% di Diazinone.
Insetticida per la lotta contro gli insetti del terreno. E' efficace contro larve di coleotteri (elateridi), lepidotteri, larve di ditteri (mosca degli ortaggi e delle colture floreali in pieno campo).
Il prodotto agisce sui parassiti del terreno sia per contatto che per ingestione, provocandone in breve tempo la morte.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Diazinone puro g 5
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg per gli adulti, 0,2 - 1 mg per bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

Come si usa
Trattamento generale del terreno: poco prima della semina lo si sparge su tutta la superficie da disinfestare incorporandolo leggermente nel terreno.
Trattamento parziale del terreno: può essere eseguito distribuendo il prodotto lungo le file oppure limitando il trattamento alla singola piantina. Il trattamento si deve eseguire subito dopo il trapianto, incorporando il prodotto nel terreno.

Quando si usa e quanto se ne deve usare
Il prodotto si usa ogni qualvolta si deve procedere alla disinfestazione del terreno dai parassiti animali, per difendere le coltivazioni di asparagi, barbabietole, carote, cavoli, cipolle, fagioli, fave, fragole, insalate, patate, piselli; nonché di crisantemi, dalie, ciclamini, gladioli in pieno campo e in serra.
Gesal Orto Insetticida Granulare si usa in ragione di 8 - 10 g per metro quadro nel caso di trattamento generale del terreno in dosi di 3 - 4 g per metro quadro per trattamenti nelle file.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Officina di produzione: **IRCA S.p.A., Albano S. Alessandro (MI)**

Registrazione Ministero Sanità n. 3761 del 19 giugno 1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: **g**

AIRWICK ITALIA S.p.A.

3771

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ROVRAL

Fungicida organico di contatto
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 Iprodione puro
Coformulanti q.b. a 100.

*** Marchio registrato Rhône Poulenc**
Parigi - Francia

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **ROVRAL** è un fungicida organico ad azione di contatto, particolarmente indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle colture di seguito indicate e per la concia delle semonti del frumento e dell'orzo.

APPLICAZIONI E DOSI

— **VITICOLTURA:** contro la Botrite a kg. 1,5/2 per ettaro, distribuiti con 10-15 ettolitri d'acqua. Trattare alla sfioritura, prima della chiusura dei grappoli, all'inizio dell'invaiatura, e 2-3 settimane dopo l'invaiatura.

Per le varietà sensibili alla Botrite del peduncolo, effettuare un trattamento anche in pre-fioritura.

Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti; esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del mal bianco.

Il prodotto può essere impiegato anche per effettuare trattamenti polverulenti in miscela con zolfo ventilato, alle stesse dosi sopra indicate.

— **FRAGOLA:** contro la Botrite a kg. 1,5/2 per ettaro distribuito con 10-15 ettolitri d'acqua.

Trattare all'inizio della fioritura e ripetere ogni 8-10 giorni, secondo l'andamento stagionale.

— **ORTICOLTURA:**

a) **Lattuga:** contro la Botrite e la Sclerotinia della lattuga kg. 1,5/ha con trattamenti fogliari ripetuti.

b) **Indivia:** per combattere le Sclerotinie che possono attaccare le indivie nel terreno, usare gr. 6-8/mq.

c) **Pomodoro - Peperone - Melanzana:** contro Botrite ed Alternaria gr. 100/150/hl. con trattamenti fogliari ripetuti.

Dato il gran numero di varietà e le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi preliminari.

— **FRUTTICOLTURA:**

— **Pomacee (pero):** contro Alternaria a gr. 150/hl. Iniziare i trattamenti alla caduta dei petali e proseguirli alla cadenza di 15 giorni fino al termine della carenza.

— **Drupacee:** contro la Monilia del pesco, albicocco, ciliegio, mandorlo, susino a gr. 150/hl. Trattare prima, durante e dopo la fioritura.

— **FLOREALI ED ORNAMENTALI (in pieno campo o in serra):** contro Botrite a gr. 150/hl.; contro Alternaria del Garofano a gr. 200/hl.; contro Rizoctonia del Garofano a gr. 4-8/mq.

Dato il gran numero di specie e varietà e le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi preliminari d'impiego.

— **AGLIO:** contro il mal dello sclerozio mediante impolverazione dei bulbilli, a gr. 300 per quintale di bulbilli.

— **PATATA:** contro Rizoctonia; immergere i tuberi per 5 minuti in una soluzione di gr. 800/hl., prima della semina.

— **BARBABIETOLA:** contro Phoma, mediante impolverazione a gr. 300 per quintale di seme.

— **CONCIA DELLE SEMENTI:** contro la Carie del frumento e l'Elmintosporiosi dell'orzo gr. 150-200 per q.le di seme.

Per la preparazione della miscela, mettere la dose in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea.

Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il **ROVRAL** è compatibile con Azifene; Benlate; Dithane M 45; Fosfene; Folgreen LB; Karathane LC; Lannate 25; Lannate L; Lorzene Flow; Metilon 20; Naftil micronizzato; R6 Erresei M 50; R6 Erresei SB M 10; Sofril 80; Soluble Plant Food; Spintox; Zirasan 90; Zolone Liquido 25; Zolone P B 25.

Per quanto riguarda la miscibilità del prodotto con Dafene; Karathane PB; Parafene Rosso; Sumifene; Zitiol, si consiglia di procedere nel modo seguente:

1) stemperare in acqua il **ROVRAL** e versare nell'irroratrice già riempita di acqua per metà,
2) aggiungere il bagnante adesivo Etaldyn a gr. 50 per ettolitro;
3) stemperare in acqua il prodotto da aggiungere e versarlo quindi nell'irroratrice che, agitando, va portata a volume.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto sulla pera Decana del Comizio.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:

21 giorni prima della raccolta, su lattuga, indivia, pomodoro, peperone, melanzana, pero, fragola

28 giorni prima della raccolta su vite

40 giorni prima della raccolta sulle altre colture

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3771 Ministero della Sanità del 16/6/1980
1/83

3'

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

SULFOSOL RAMATO

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 40 di zolfo puro ventilato (esente da selenio)
gr. 3,5 di rame metallico (sotto forma di carbonato basico)
Sostanze diluenti, bagnanti ed adesive quanto basta a 100.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **SULFOSOL RAMATO** è particolarmente efficace contro: Mal Bianco, Oidio o Nebbia delle piante ortensi ed ornamentali in pieno campo.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Versare lentamente la quantità occorrente di **SULFOSOL RAMATO** in poca acqua (es. 3 litri di acqua per 1 kg. di **SULFOSOL RAMATO**), stemperando energicamente la miscela fino ad ottenere una poltiglia omogenea.
Far riposare per 10-15 minuti, quindi aggiungere, agitando, altra acqua fino alla diluizione voluta.
La poltiglia così preparata viene irrorata sulle piante a mezzo di una comune pompa da solfato di rame o a mezzo di pompe a pressione.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3783 Ministero della Sanità del 19.6.1980

E/1

APPLICAZIONI E DOSI

Floricoltura in campo e in serra:	Mal Bianco od Oidio delle rose, Oidio del crisantemo, Oidio dell'ortensia.
Orticoltura:	Nebbia della fragola, del pisello, Mal Bianco od Oidio del pomodoro.

Dosi: gr. 500-600 per hl. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, diclofluanide.
Può essere mescolato con insetticidi per la lotta contemporanea contro crittogame ed insetti.
Nella preparazione delle miscele, si stempera prima il **SULFOSOL RAMATO** in poca acqua (vedansi le norme d'impiego) e lo si versa quindi agitando nell'altro liquido antiparassitario preparato in precedenza.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.
Ad evitare eventuali ustioni alle piante, si consiglia di non effettuare trattamenti con **SULFOSOL RAMATO** in ore eccessivamente assolate o di forte calore.
Dovendo eseguire trattamenti in periodi con temperatura ambiente elevata (superiore a 30°C) si preferiscano giornate con cielo coperto o le ore del mattino, adottando dosi non superiori a gr. 300-400 in 100 litri d'acqua.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

3812

®BAVISTIN M

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per il controllo delle malattie fungine del frumento e per la concia delle sementi.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Carbendazim puro	g 6,0
Maneb puro	g 50
Coformulanti q.b. a	g 100

CLASSE TOSSICOLOGICA III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Prodotto originale fabbricato dalla:

BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen/Rhein
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N.° 3812 del 19-6-1980

® = Marchio registrato BASF

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: *nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni: alcool, olii, grassi.*

Avvertenza: *Consultare un Centro Antiveleni.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il ®BAVISTIN M è un fungicida che presenta associati due principi attivi ad ampio spettro d'azione: il Carbendazim, ad azione sistemica ed attività preventiva e curativa, ed il Maneb, ad azione di contatto ed attività preventiva.

Tale composizione assicura un buon controllo delle malattie fungine, dovute a diversi agenti patogeni, che colpiscono il frumento nelle diverse fasi del suo ciclo vegetativo e che vengono comunemente indicate come: marciumi delle cariossidi e dei germinelli, mal del piede, malattie della parte aerea (foglie e spighe).

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Trattamento di concia delle sementi (cereali, barbabietola da zucchero, orticole e floreali)

Dose d'impiego: 250 g per quintale di seme.

Questo intervento difende la coltura nelle delicate fasi vegetative di germinazione, emergenza e iniziali stadi di accrescimento, in particolare da attacchi di septoriosi, fusariosi, elmintosporiosi, cercosporella, rizoctonia, ofiobolo, carie e carboni.

Trattamenti sulla vegetazione (frumento)

Dose d'impiego: 3-4 kg/ha, in relazione all'intensità dell'attacco in atto o previsto, distribuiti con 400-600 litri d'acqua per ettaro.

Per una buona difesa della coltura, in particolare in zone o condizioni climatiche favorevoli alle malattie fungine, si rendono opportuni due trattamenti:

a) fine accestimento-levata, per il controllo di mal del piede ed infezioni precoci di oidio e septoriosi

b) spigatura (fuoriuscita della spiga), per il controllo delle malattie delle foglie e della spiga.

In caso di forti attacchi di oidio si consiglia di aggiungere al ®BAVISTIN M il ®CALIXIN alla dose di 0,5 l/ha.

Divieto d'impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare il prodotto in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio della irroratrice quasi completamente riempito.

AVVERTENZA: L'impiego del prodotto è consentito solo per le colture indicate in etichetta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il ®BAVISTIN M è miscibile con ®CALIXIN, ®U 46 COMBI-FLUID, CYCOCEL e con gli insetticidi di comune impiego, nonché con i fertilizzanti fogliari BASFOLIAR 34 e FETRILON COMBI.

I prodotti ad azione insetticida dovranno essere aggiunti alla poltiglia di irrorazione poco prima dell'applicazione. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

I semi trattati e residuati non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

1 Kg.

ZINEB SANDOZ

Anticrittogamico, in polvere bagnabile, di colore azzurro a base di zineb

Composizione

gr. 65 di zineb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
— Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose può provocare irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
— Controindicazioni
Alcool, olii e grassi.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Pomacee	Ticchiolatura	0,2 % = gr. 200
Garofano	Ruggini	0,2-0,3 % = gr. 200-300
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi	0,2-0,3 % = gr. 200-300
Viticolture	Peronospora	0,2-0,3 % = gr. 200-300

Intervenire secondo le necessità dettate dall'ambiente stagionale e dalla biologia dei parassiti, attenendosi ai calendari dei trattamenti suggeriti in zona. Le dosi più elevate si consigliano solo in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle crittogame citate.

Per la preparazione della poltiglia: versare la quantità necessaria di ZINEB SANDOZ nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume con l'acqua mancante, sempre agitando.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non impiegare in serra.

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Lo ZINEB SANDOZ è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ; è incompatibile con la poltiglia solfo-calcica, il permanganato di potassio.
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio, ZINEB SANDOZ + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di ZINEB SANDOZ da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione ZINEB SANDOZ con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di ZINEB SANDOZ, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

« AVVERTENZA »: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si deve evitare di trattare le varietà di pero sensibili allo zineb, quali Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi e Zucchermanna.
Su piante di pomodori è bene evitare trattamenti con ZINEB SANDOZ miscelato a concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione:
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3814 del 16.9.1980 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

3815

ACATOX K.T.

Acaricida-ovicida per la lotta contro le specie dannose di Acari (ragni rossi, gialli) in frutticoltura, viticoltura ed orto-floricoltura in pieno campo

Composizione
gr. 16 di Dicofol puro
gr. 6 di Tetradifon puro
solventi, emulsionanti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100; contiene xilolo.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa,
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
— Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo;
— Sintomi di intossicazione
vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0.1-0.2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico
— Controindicazioni
la morfina e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

Modalità di impiego

Campo di impiego	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in 100 litri di acqua
VITICOLTURA FRUTTICOLTURA (melo, pero, pesco, susino, albicocco, nocciolo, arancio, mandarino, limone, pompelmo) ORTICOLTURA (fragola fino alla fioritura, pomodoro, peperone, zucchino, cetriolo, cocomero, melone, fagiolo, fagiolino) FLORICOLTURA in campo	Acari (ragni rossi e gialli)	0,2-0,3% = gr. 200-300

Versare l'ACATOX K.T. direttamente nell'intero volume di acqua oppure nelle poltiglie pronte per l'uso alle quali si desidera unirlo. Mescolare a fondo.

Eseguire il trattamento con ACATOX K.T. non appena si riscontra un attacco di Acari. Bagnare accuratamente tutta la vegetazione delle piante da trattare (pagina inferiore e superiore delle foglie) affinché il prodotto venga a contatto dei parassiti e delle loro uova.
In caso di attacchi massivi elevare la dose a 300 grammi per ettolitro di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
L'ACATOX K.T. è miscibile con gli anticrittogamici e gli insetticidi normalmente usati sulle colture sulle quali viene utilizzato lo stesso ACATOX K.T., ad eccezione dei prodotti alcalini, come poltiglia bordolese e polisolfuri.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non trattare le coltivazioni durante la fioritura.
Il prodotto è fitotossico per la melanzana.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3315 del 16.9.1980 del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto netto kg.

383!

ZIMASOL

ANTICRITTOGAMICO A BASE DI ZINEB, MANEB, ZOLFO IN POLVERE BAGNABILE

Composizione gr 100 contengono: MANEB puro gr **24** - ZINEB puro gr **2,5** - Zolfo puro (Esente da Selenio) gr **20** - Bagnanti, sospensivanti ed inerti q.b. a gr **100.**
CLASSE III **ATTENZIONE: manipolare con prudenza.**

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontana dall'umidità e calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mosarandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Consigli terapeutici: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello **ZINEB** può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: Lo ZIMASOL si prepara versando la dose necessaria nel totale quantitativo d'acqua ed agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea. - VITE: Peronospora, Oidio gr 600-700 per 100 litri d'acqua. - POMACEE: Ticchiolatura, Mal Bianco, Septoriosi gr 600-700 per 100 litri d'aqua. POMODORO: solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Alternariosi, Septoriosi gr 600-700 per 100 litri d'acqua. - GAROFANO in pieno campo: Ruggine, Alternariosi gr 600-700 per 100 litri d'acqua.
DIVIETO D'IMPIEGO: Divieto d'impiego in serre. - Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Lo ZIMASOL non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, con Captano, con DDVP e con Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Può arrecare danno alle seguenti varietà di PERE sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna. Per la presenza dello Zolfo, inoltre, può arrecare danno alle seguenti cultivar di: MELE (Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap); PERE (Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser - Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio); VITE (Sangiovese).
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOSTE E GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Reg. N. 3839 del 19-06-1980 del Ministero della Sanità.

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 85.81.89 - 85.81.89

Officina di produzione: bimex s.p.a. - via cogolla, 5 - isola vicentina (vi)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO gr**

3846

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

FITIOS B/77 PB 25

Insetticida agricolo
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 25 di Metil-Etoato puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzalzone può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni:

Morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

CARATTERISTICHE

Insettidica dotato di forte potere di penetrazione particolarmente attivo contro le mosche delle ciliegie e della frutta. Dotato inoltre di un'azione immediata di contatto.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

In Frutticoltura:

Contro la mosca della frutta (pesche, albicocche, melo e pero) e degli aranci a gr. 200/hl.; contro la mosca delle ciliegie a gr. 80/hl; contro Carpocapsa del melo e del pero e Cydia del pesco a gr. 200/hl; contro Tortricidi e Tentredini delle susine a gr. 120/hl; contro Zeuzera del pero gr. 240/hl; contro Cemiostoma del melo e del pero, appena si notano le mine a gr. 200/hl; contro Pseudococcus citri a gr. 80-200/hl; contro Diaspis Pentagona del pesco a gr. 80/hl.

In Floricoltura solo in pieno campo:

Contro la mosca del garofano a gr. 120-160/hl; contro la Tortrice (bega) del garofano a gr. 200/hl.

In Orticoltura:

Contro la Mosca del sedano, carciofo, porro, aglio, cipolla, asparago, spinacio, e insalata a gr. 160/hl.

In bieticoltura:

Contro la Mosca della barbabietola da kg 0.8 a kg 12 per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Aggiungere alla dose occorrente di **FITIOS B/77 PB 25** poca acqua, agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere, una poltiglia omogenea. Aggiungere poi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **FITIOS B/77 PB 25** è miscibile con prodotti della nostra gamma ad esclusione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precuazionali prescritte per iprodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili. E' nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3846 **Ministero della Sanità del** . 15.9.1980 . .

E/2

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

OVONEX

Acaricida
Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 8 di Tetradifon puro
Sostanze solventi, emulsionanti e coadiuvanti, quanto basta a 100.
Contiene Xilolo

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:

Vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Intossicazione acuta: *lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno* controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi *in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0.1-0.2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.*

Controindicazioni:
La morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3849 Ministero della Sanità del . 15.9.1980 . . .
E/1

CARATTERISTICHE

L'OVONEX è uno specifico per la lotta contro gli acari (ragnetti rossi, ragnetti gialli, eriofidi, che infestano le piante coltivate: melo, pero, pesco, albicocco.

L'OVONEX distrugge uova e ninfe degi acari.

L'OVONEX possiede un alto potere di penetrazione nei tessuti delle foglie e una lunga persistenza d'azione.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Dosi d'impiego: gr. 150-200 in 100 litri d'acqua.
Aggiungere l'OVONEX nella dose occorrente a poca acqua e dopo aver agitato, versare l'emulsione ottenuta nella quantità di acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.
Irrorare l'emulsione sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore, curando una perfetta nebulizzazione, in modo che risultino bagnate entrambe le pagine delle foglie.
E' consigliabile l'aggiunta di 10-20 gr. di Bagnante Adesivo L/2 per ettolitro di emulsione pronte per l'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'OVONEX è miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.. '

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 gg prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

3850

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

VPM SOIL FUMIGANT

Soluzione fumigante per la disinfezione del terreno

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 32,7 di Metam sodium puro (anidro).
Sostanze coadiuvanti ed emulsionanti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

1) **Disinfezione di grandi superfici.** — Normalmente il **VPM SOIL FUMIGANT** viene distribuito mediante l'impianto di irrigazione od un irroratore a spruzzo. La dose di **VPM SOIL FUMIGANT** deve essere prima diluita in acqua e distribuita nel modo più uniforme possibile sul terreno.

2) **Innaffiature.** — Su piccole superfici (semenzai, letti caldi, ecc.) basta versare in un annaffiatoio a mano litri 1-2 di **VPM SOIL FUMIGANT**, riempirlo d'acqua (fino a 20-25 litri circa), agitare e quindi distribuire uniformemente su 10 mq. di superficie.

3) **Pompe irroratrici.** — Per superfici più ample si usano le dosi necessarie di **VPM SOIL FUMIGANT** con tanta acqua, sufficiente per permettere una perfetta distribuzione (circa 40-50 litri di acqua per ogni litro di **VPM SOIL FUMIGANT**).

4) **Irrigazione.** — In questo caso i volumi di acqua dovranno essere superiori per rendere uniforme la distribuzione (50-60 litri di acqua per litro di **VPM SOIL FUMIGANT**).

5) **Per iniettori.** — Si useranno le consuete modalità di applicazione dei fumiganti, praticando le iniezioni a distanza di cm 15 in quadrato.

6) **Macchine fumigatrici.** — Il **VPM SOIL FUMIGANT** si può anche distribuire allo stato puro mediante le apposite macchine fumigatrici applicate al motocoltivatore o al trattore. Poiché il prodotto ha una scarsa diffusione laterale, è bene, adottando tale sistema, tenere i cannelli distributori ad una distanza non superiore ai 15 cm. e per una profondità di 10 cm. Effettuata l'applicazione si deve irrigare superficialmente (cm. 2-3) il terreno allo scopo di evitare una troppo rapida dispersione del gas prodotti dal **VPM SOIL FUMIGANT**.

N.B. — Riteniamo tuttavia utile far rilevare che i fumiganti che contengono metilisotiocianato di Sodio, o che in esso si trasformano, esplicano la loro azione nel modo migliore se distribuiti per innaffiatura o irrorazione. Infatti la caratteristica di questi prodotti è di diffondersi sotto forma di vapore, soprattutto verticalmente.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3850 Ministero della Sanità del 20-12-1980
7/82

DOSI

La dose normale d'impiego del **VPM SOIL FUMIGANT** è di 1.000 Kg/ha. Tale dose dovrà essere portata a 1.500-2.000 Kg/ha nel caso si operi su terreni pesanti e interessati prevalentemente da Verticillium, Fusarium e Fialofora.

Le dosi vanno variate anche in funzione delle temperature, per cui a temperature più basse è consigliabile adottare dosi più elevate.

Terminata la distribuzione del **VPM SOIL FUMIGANT** si eseguirà una lenta ed abbondante irrigazione in modo da far penetrare il fumigante alla profondità di 25-30 cm.

Nei terreni sabbiosi evitare una eccessiva distribuzione di acqua dopo il trattamento, che comporterebbe una perdita di percolazione negli strati più profondi e nello stesso tempo una risalita tardiva del gas che potrebbe provocare dei fenomeni di fitotossicità nella coltura.

In tali terreni può rendersi utile una rullatura del suolo.

Operazioni successive al trattamento.
Otto-dieci giorni dopo il trattamento (2 settimane se la temperatura è bassa), si deve effettuare una lavorazione veramente superficiale del terreno allo scopo di arieggiare lo stesso e favorire la dispersione del gas originatosi dal **VPM SOIL FUMIGANT**. Una lavorazione profonda in questo caso potrebbe infatti portare in superficie terreno non disinfettato, compromettendo i risultati dell'operazione. Dopo questa lavorazione attendere ancora 20-30 giorni, a seconda della temperatura dopo di che si può procedere alla semina o al trapianto. L'intervallo di tempo tra l'applicazione del prodotto e l'inizio della coltura può essere ridotto al minimo quando la stagione decorre calda e asciutta, e prolungato fino al massimo con andamento stagionale, freddo e piovoso.

Per applicazioni in pieno campo il **VPM SOIL FUMIGANT**, che va sempre impiegato su terreni nudi, si può impiegare fino ad una distanza di almeno un metro da colture arboree o erbacee in atto.

In caso di trattamenti con temperatura del terreno prossima a quella minima, è molto utile ricoprire immediatamente il terreno trattato con un foglio di polietile o CVP, possibilmente nero. Ciò allo scopo di determinare un innalzamento della temperatura del terreno (3-4°C) che influenzerà positivamente l'attività del prodotto).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

CARATTERISTICHE

Il **VPM SOIL FUMIGANT** è un fumigante raccomandato nel trattamento preventivo del terreno:
contro le crittogame parassite che vivono nel terreno quali
Fusarium, Verticillium, Pytium, Armillaria, Rizoctonia, ecc.;
come erbicida contro le erbe infestanti annuali;
contro i Nematodi liberi quali: Pratylenchus e Paratylenchus.

Contro gli insetti del terreno: ha azione secondaria su alcune loro forme. Il **VPM SOIL FUMIGANT** è un fumigante del terreno a base di metilditiocarbammato di sodio iniettato allo stato liquido si decompone in un gas sterilizzante: il metilisotiocianato di sodio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati dal **VPM SOIL FUMIGANT** è consigliabile lavorare bene il terreno e mantenerlo in buone condizioni di umidità. Non applicarlo in terreno asciutto e costipato.

Temperatura del terreno: al momento dell'applicazione la temperatura del terreno ad una profondità di 25-30 cm., dovrebbe essere compresa tra i 14 e i 32°C. Sostanza organica: il letame e la torba devono essere interrati almeno un mese prima del trattamento.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci, è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20-30 giorni prima della semina

AVVERTENZE

Evitare l'inalazione di gas o vapori.
Per l'applicazione del **VPM SOIL FUMIGANT** in serra bisognerà avere la precauzione che in queste non vi siano colture in atto. In tali applicazioni gli operatori dovranno usare maschere di protezione.
Dopo i trattamenti, lavare le attrezzature usate.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

Contenuto netto Kg.

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

SULFOSOL RAMATO 5

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 40 di zolfo puro ventilato (esente da selenio)
gr. 5,5 di rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico)

Sostanze diluenti, bagnanti ed adesive quanto basta a 100.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **SULFOSOL RAMATO 5** è un preparato anticrittogamico, contenente zolfo fissato su argille colloidali e un sale di rame unito a sostanze adesive e bagnanti.

Le proprietà di adesività e di idrosospensibilità dell'argilla, unite alla presenza di un sale di rame, conferiscono al prodotto le caratteristiche seguenti:
— attività migliorata, rispetto agli zolfi bagnabili semplici;
— adesività sulle foglie e sugli altri organi delle piante irrorate.

DOSI

Il **SULFOSOL RAMATO 5** può essere irrorato normalmente alla dose di gr. 400-500 in 100 litri di acqua.

Nelle zone eccessivamente umide, ove frequenti piogge o nebbie persistenti favoriscono lo sviluppo delle malattie, si adotti la dose di gr. 600 in 100 litri di acqua.

NORME D'IMPIEGO

Versare lentamente la quantità di **SULFOSOL RAMATO 5** in poca acqua (es. 2 litri di acqua per gr. 400 di **SULFOSOL RAMATO 5**) stemperando energicamente la miscela, fino ad ottenere una poltiglia omogenea.

Far riposare per 10-15 minuti (non trascurare questa norma), quindi aggiungere, agitando, altra acqua fino alla diluizione voluta.

La poltiglia così preparata viene irrorata sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3853 **Ministero della Sanità del** 15.9.1980

E/2

APPLICAZIONI E DOSI

Il **SULFOSOL RAMATO 5** trova impiego nelle seguenti colture per le malattie a fianco indicate:

Floricoltura in campo e in serra:	Mal Bianco od Oidio delle rose, Oidio del crisantemo, Oidio dell'ortensia.
Orticoltura:	Nebbia della fragola, del pisello, Mal Bianco od Oidio del pomodoro.

Dosi: gr. 500-600 per hl. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, diclofluanide.

Può essere mescolato con insetticidi per la lotta contemporanea contro crittogame ed insetti.

Nella preparazione delle miscele, si stempera prima il **SULFOSOL RAMATO 5** in poca acqua (vedansi le norme d'impiego) e lo si versa quindi agitando nell'altro liquido antiparassitario preparato in precedenza.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Ad evitare eventuali ustioni alle piante, si consiglia di non effettuare trattamenti con **SULFOSOL RAMATO 5** in ore eccessivamente assolate o di forte calore.

Dovendo eseguire trattamenti in periodi con temperatura ambiente elevata (superiore a 30°C) si preferiscano giornate con cielo coperto o le ore del primo mattino, adottando dosi non superiori a gr. 300-400 in 100 litri d'acqua.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

3854

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

HERBIDAL CESPUGLI

Erbicida - Cespuglicida

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contegono:
gr. 10,2 Picloran puro (da sale isopropanolaminico)
gr. 39,6 di 2,4 D puro (da sale isopropanolaminico)
Sostanze emulsionanti e coadiuvanti: quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gl indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per la dermatosi.

Controindicazioni:
E' sconsigliata la digitale.

CARATTERISTICHE

L'HERBIDAL CESPUGLI è un decespugliante ed un erbicida liquido ad azione sistemica, agente per assorbimento fogliare e radicale.

L'HERBIDAL CESPUGLI devitalizza infestanti arbustive e legnose, quali: abete, tamarindo, acero, ontano, betulla, corniolo, biancospino, larice, pino, lentisco, pioppo, pruno selvatico, rododendro, robinia, rosa selvatica, salice, sambuco, olmo, rovo, ginepro.

L'HERBIDAL CESPUGLI devitalizza infestanti erbacee a foglia larga, quali: stoppione, vilucchio, romice, ferula, coda di cavallo, soffione, campanula, carota, euforbiacee, camomilla, ortica, leguminose, nonché le felci (Pteridium spp.).

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3854 Ministero della Sanità del 15.9.1980
E/2

CAMPI DI APPLICAZIONE

L'HERBIDAL CESPUGLI può essere impiegato in trattamenti su grandi superfici od in trattamenti localizzati, per la devitalizzazione di alberi di alto fusto, ceppai, cespugli, erbe a foglia larga, che invadono prati e parchi alpini e prealpini, alvei e sponde di fiumi e torrenti, argini di canali di bonifica e scolo, zone collinari da adibire ad impianto di essenze pregiate ed ad alto reddito bordi di strade, reti di recinzione, muri di cinta, zone militari, aree industriali, linee ferroviarie, scarpate, zone storiche, fasce frangifuoco, zone soggette a servitù di elettrodotto in collina e montagna

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

L'HERBIDAL CESPUGLI agisce sistemicamente per assorbimento fogliare e radicale, la sua applicazione deve avvenire quindi nel periodo di massima attività vegetativa (aprile-settembre). La dose d'impiego varia fra lo 0,750-1% a secondo dello sviluppo delle infestanti.

Arbusti e cespugli: Irrorare uniformemente la chioma, il fusto ed il colletto. In caso di specie particolarmente resistenti, quali Frassino o Quercia, irrorare anche il terreno, tenendo presente che il prodotto è tossico per le leguminose.

Piante di alto fusto. Praticare delle fenditure anulari e degli intagli nella corteccia e versare un'emulsione costituita dal 50% di **HERBIDAL CESPUGLI** e dal 50% d'acqua

PRECAUZIONI PER L'USO

L'HERBIDAL CESPUGLI ha una persistenza d'azione molto prolungata.

E' vietato impiantare nuove colture sui terreni trattati prima di un anno

E' indispensabile, prima di procedere alla messa in coltura delle zone trattate, effettuare delle prove test o interpellare la Società distributrice, a meno che non si sia perfettamente certi che durante il trattamento il terreno sottostante non sia stato contaminato dal prodotto (trattamenti alla sola chioma).

AVVERTENZE

Applicare l'**HERBIDAL CESPUGLI** in giornate poco ventilate e nelle ore meno calde (meglio verso sera) onde evitare al massimo che gocce o vapori vengano trasportate su tutte le colture utili.

Gli atomizzatori possono essere usati, ma con le dovute cautele.

Evitare lo scorrimento, e, in ogni modo, che la miscela venga immessa in canali portanti acqua d'irrigazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

Non è miscibile con nafta o petrolio.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per tutte le colture.

Evitare, pertanto che il prodotto giunga a contatto con le colture anche sotto-forma di vapori portati dal vento.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

VAPAM*

Soluzione fumigante per la disinfezione del terreno

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 32,7 di Metam-sodium puro (anidro).
Sostanze coadiuvanti ed emulsionanti q.b. a 100.

*Marchio registrato STAUFFER CHEMICAL Co. - U.S.A.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni

Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il **VAPAM** è un fumigante raccomandato nel trattamento preventivo del terreno:
- contro le crittogame parassite che vivono nel terreno, quali: Fusarium, Verticillium, Pythium, Armillaria, Rizoctonia.
- come erbicida contro le erbe infestanti annuali.
- contro i Nematodi liberi quali: Pratylenchus e Paratylenchus.
- contro gli insetti del terreno: ha azione secondaria su alcune loro forme.

Il **VAPAM** è un fumigante del terreno a base di metilditiocarbammato di sodio. Iniettato allo stato liquido si decompone in un gas sterilizzante: il metilisotiocianato di sodio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del terreno: Per ottenere i migliori risultati dal **VAPAM** è consigliabile lavorare bene il terreno e mantenerlo in buone condizioni di umidità. Non applicarlo in terreno asciutto e costipato.

Temperatura del terreno: Al momento dell'applicazione la temperatura del terreno ad una profondità di 25-30 cm., dovrebbe essere compresa tra i 14 e i 32° C.

Sostanza organica: Il letame e la torba devono essere interrati almeno un mese prima del trattamento.

MODALITÀ D'IMPIEGO

1) **Disinfezione di grandi superfici** — Normalmente il **VAPAM** viene distribuito mediante l'impianto di irrigazione od un irroratore a spruzzo. La dose di **VAPAM** deve essere prima diluita in acqua e distribuita nel modo più uniforme possibile sul terreno.

2) **Innaffiature** — Su piccole superfici (semenzai, letti caldi, ecc.) basta versare in un annaffiatoio a mano litri 1-2 di **VAPAM**, riempirlo d'acqua (fino a 20-25 litri circa), agitare e quindi distribuire uniformemente su 10 mq. di superficie.

3) **Pompe irroratrici** — Per superfici più ample si usano le dosi necessarie di **VAPAM** con tanta acqua, sufficiente per permettere una perfetta distribuzione (circa 40-50 litri di acqua per ogni litro di **VAPAM**).

4) **Irrigazione** — In questo caso i volumi di acqua dovranno essere superiori per rendere uniforme la distribuzione (50-60 litri di acqua per litro di **VAPAM**).

5) **Pali iniettori** — Si useranno le consuete modalità di applicazione dei fumiganti, praticando le iniezioni a distanza di cm. 15 in quadrato.

6) **Macchine fumigatrici** — Il **VAPAM** si può anche distribuire allo stato puro mediante le apposite macchine fumigatrici applicate al motocoltivatore o al trattore. Poiché il prodotto ha una scarsa diffusione laterale, è bene, adottando tale sistema, tenere i cannelli distributori ad una distanza non superiore ai 15 cm. e per una profondità di 10 cm. Effettuata l'applicazione si deve irrigare superficialmente (cm. 2-3) il terreno allo scopo di evitare una troppo rapida dispersione dei gas prodotti dal **VAPAM**.

N.B. Riteniamo tuttavia utile far rilevare che i fumiganti che contengono metilisotiocianato di Sodio, o che in esso si trasformano, esplicano la loro azione nel modo migliore se distribuiti per innaffiatura o irrorazione. Infatti la caratteristica di questi prodotti è di diffondersi sotto forma di vapore, soprattutto verticalmente.

DOSI

La dose normale d'impiego del **VAPAM** è di 1000 kg/ha. Tale dose dovrà essere portata a 1500-2000 kg/ha nel caso si operi su terreni pesanti e interessati prevalentemente da Verticillium, Fusarium e Fialofora.

Le dosi vanno variate anche in funzione della temperatura, per cui a temperature più basse è consigliabile adottare le dosi più elevate.

Terminata la distribuzione del **VAPAM** si eseguirà una lenta ed abbondante irrigazione in modo da far penetrare il fumigante alla profondità di 25-30 cm.

Nei terreni sabbiosi evitare una eccessiva distribuzione di acqua dopo il trattamento, che comporterebbe una perdita di prodotto per percolazione negli strati più profondi e nello stesso tempo una risalita tardiva del gas che potrebbe provocare dei fenomeni di fitotossicità nella coltura. In tali terreni può rendersi utile una rullatura del suolo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci, è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Operazioni successive al trattamento

Otto-dieci giorni dopo il trattamento (2 settimane se la temperatura è bassa), si deve effettuare una lavorazione veramente superficiale del terreno allo scopo di arieggiare lo stesso e favorire la dispersione del gas originatosi dal **VAPAM**. Una lavorazione profonda in questo caso potrebbe infatti portare in superficie terreno non disinfettato compromettendo i risultati dell'operazione.

Dopo questa lavorazione attendere ancora 20-30 giorni, a seconda della temperatura dopo di che si può procedere alla semina o al trapianto.

L'intervallo di tempo tra l'applicazione del prodotto e l'inizio della coltura può essere ridotto al minimo quando la stagione decorre calda e asciutta, e prolungato fino al massimo con andamento stagionale, freddo e piovoso.

Per applicazioni in pieno campo il **VAPAM**, che va sempre impiegato su terreni nudi, si può impiegare fino ad una distanza di almeno un metro da colture arboree o erbacee in atto.

In caso di trattamenti con temperatura del terreno prossima a quella minima, è molto utile ricoprire immediatamente il terreno trattato, con un figlio di polietilene o CVP, possibilmente nero. Ciò allo scopo di determinare un innalzamento della temperatura del terreno (3-4° C) che influenzerà positivamente l'attività del prodotto.

Sospendere i trattamenti 20-30 giorni prima della semina

AVVERTENZE

Evitare l'inalazione di gas o vapori.

Per l'applicazione del **VAPAM** in serra bisognerà avere la precauzione che in queste non vi siano colture in atto, in tali applicazioni gli operatori dovranno usare maschere di protezione.

Dopo i trattamenti, lavare le attrezzature usate.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n.3855 Ministero della Sanità del 19 - 6 - 1980
7/82

Contenuto netto Kg.

3879

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

VERAVIT M

Fungicida a base di ossicloruro di rame. Si utilizza per i trattamenti delle colture di seguito indicate

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Sostanze coadiuvanti, adesivanti e disperdenti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Versare il **VERAVIT M** in una piccola quantità di acqua, mescolare accuratamente quindi aggiungere altra acqua sino ed ottenere la concentrazione voluta. Dovendo eseguire trattamenti su piante difficilmente bagnabili (olivi, ecc.) aggiungere alla miscela di **VERAVIT M**, pronta per l'uso Etaldyn alla dose di gr. 50 per ettolitro.

PATATA E POMODORO
Contro Peronospora, Cercospora, Alternariosi: gr. 300-500 per hl. di acqua.

FRUTTICOLTURA
Su pero e melo: dalla caduta delle foglie alla ripresa vegetativa, contro Ticchiolatura, Moniliosi, Nectria, Batteriosi due o più trattamenti alla dose di Kg. 1 per 100 litri di acqua.

Nel corso della vegetazione, gr. 300-500 per hl. in trattamenti pre-florali, gr. 300 per hl. in trattamenti post-florali.

Sulle varietà di melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana;

e di pero: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, sensibili al rame, nel corso della vegetazione impiegare prodotti acuprici.

Su pesco e mandorlo: alla caduta delle foglie e a fine inverno contro Bolla e gommosi: Kg. 1 per hl. d'acqua. Sulle varietà sensibili al rame utilizzare lo Zirasan 90 micronizzato per lottare contemporaneamente contro il Fusicoccum o cancro del pesco.

Su albicocco, ciliegio, susino: alla caduta delle foglie e a fine inverno Kg. 1 per hl. d'acqua.

In olivicoltura: Contro Occhio di Pavone e Lebbra dell'olivo, alla dose di gr. 300-500 per hl. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **VERAVIT M** è miscibile con quasi tutti i prodotti della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo e di pero, sopracitate, sensibili al rame, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Utilizzare, in sostituzione, anticrittogamici acuprici.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3879 **Ministero della Sanità del** 13.10.80
E/1

3881

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

FITODEL

Anticrittogamico Acuprico
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 65 Dodina pura
Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea. Eczemi cutanei resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il **FITODEL** è un prodotto per la lotta contro la Ticchiolatura.

Il **FITODEL** possiede non soltanto un'azione preventiva, ma anche un'azione curativa della malattia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

In frutticoltura:
Contro la Ticchiolatura del melo, pero e nespolo, trattamenti preventivi a gr. 60-80 per hl. d'acqua. Trattamenti curativi a gr. 120 per hl. d'acqua, entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante. Trattamenti eradicanti, con macchie di Ticchiolatura già presenti: gr. 150 per hl. d'acqua.
Contro la Cilindrosporiosi e l'Antracnosi del ciliegio, trattamenti preventivi a gr. 60 per hl. d'acqua.

In orticoltura:
Contro Peronospora della cipolla.
Trattamenti preventivi gr. 80 per hl. d'acqua.
Trattamenti eradicanti gr. 150 per hl. d'acqua.
Contro la Botritys della fragola.
Trattamenti preventivi gr. 100 per hl. d'acqua.

In floricoltura:
Contro la Ticchiolatura della rosa.
Trattamenti preventivi gr. 80 per hl. d'acqua.
Trattamenti curativi gr. 100-120 per hl. d'acqua.
Contro la Fusariosi del garofano.
Trattamenti preventivi gr. 100 per hl. d'acqua.
Trattamenti curativi gr. 150 per hl. d'acqua.

Aggiungere alla dose occorrente di **FITODEL** poca acqua, agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea.

Aggiungere quindi, sempre agitando, il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **FITODEL** non è compatibile con la calce, con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP.

Sono poco consigliabili le miscele del **FITODEL** con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali in quanto possono dar luogo a scarsa sospensività dell'emulsione.

Il **FITODEL** pur essendo compatibile con la maggior parte degli antiparassitari della nostra gamma, è preferibile irrorarlo da solo, poiché la diversa natura delle acque influisce sensibilmente sulla miscibilità del prodotto. Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperatura esterna prossima a 0 °C.

« **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA

Da non impiegare durante la fioritura.

Su meli Golden Delicious il **FITODEL** può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05% e può causare qualche rugginosità.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N.3881 **Ministero della Sanità del** 3.10.1980

E/1

3882

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Fungicida - Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 76 di Ferbam puro
Ingredienti inerti quanto a basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— in caso di ingestione

Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

— per l'irritazione della cute e delle mucose:

lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

CARATTERISTICHE

Il **FER-DITHEX** è un fungicida per la lotta contro malattie crittogamiche dei fruttiferi, piante ortive, tabacco, piante ornamentali.

Principali impieghi del FER-DITHEX

In frutticoltura: **pero e melo:** contro la ticchiolatura, le ruggini, il marciume amaro, l'imbrunimento e il Gloeodes a gr. 125/200 per hl. nei trattamenti pre e post-florali; a gr. 125 per hl. nei trattamenti successivi.

Pesco: contro la Bolla, la Gommosi, il Fusicoccum e la Moniliosi a gr. 250-400 per hl. nei trattamenti eseguiti durante il riposo vegetativo.

Ciliegio: contro la perforazione delle foglie e la Moniliosi a gr. 150 per hl. nei trattamenti eseguiti dopo la caduta dei fiori fino al raccolto.

Albicocco, susino, mandorlo: contro la Moniliosi e la perforazione delle foglie a gr. 150 per hl. nei trattamenti eseguiti in pre-fioritura, fioritura e post-fioritura.

In orticoltura: contro la moria della lattuga a gr. 125 per hl. iniziando i trattamenti alla fuoriuscita delle piantine.

Nei semenzai di tabacco contro Peronospora alla dose di gr. 240 per hl.

Eseguire due trattamenti settimanali, dallo stadio cotiledonale fino al trapianto.

Nei semenzai di conifere: a gr. 240 per hl. ogni 5-6 giorni dalla fuoriuscita delle piantine fino a metà giugno.

MODALITA' D'IMPIEGO

Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di **FER-DITHEX** in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **FER-DITHEX** è completamente compatibile con i più comuni insetticidi e fungicidi della nostra gamma di produzione. Il **FER-DITHEX** non è compatibile con gli zolfi.

« **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il **FER-DITHEX** è sconsigliato sulle varietà di meli Golden Delicious.

NOCIVITA'

Il prodotto è dannoso per il pollame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 3882 **Ministero della Sanità del** 3.10.1980
E/1

3

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

WETTION CUPRICO

Zolfo bagnabile micronizzato ramato

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 Zolfo puro (esente da selenio)
gr. 16,5 Rame metallico (sottoforma di ossicloruro tetraramico)

Sostanze dispemdenti e sospensivanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **WETTION CUPRICO** è dotato, di facile dispersibilità e di notevole sospensività.

Il **WETTION CUPRICO** è un prodotto polivalente destinato alla lotta delle malattie crittogamiche dei fruttiferi (ticchiolatura del melo e del pero, mal bianco del melo).

DOSI D'IMPIEGO

La dose d'impiego è di 500 gr. per hl. di acqua. Questa dose deve essere diminuita a gr. 300-400 per hl. di acqua nella stagione calda.

PREPARAZIONE

Stemperare il **WETTION CUPRICO** in un po' di acqua poi diluire alla concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **WETTION CUPRICO** è miscibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi della nostra gamma. Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide.

Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Nei trattamenti misti, insetticidi e fungicidi, gli insetticidi vanno aggiunti alla poltiglia già pronta.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.

Su varietà di melo:
Abbondanza Belford, Black Stayman, Black Ben Davis, Calvilla bianca, Commercio, Imperatore, Golden Delicius, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

Su varietà di pero:
Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Olivier de Serres, Decana del Comizio, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Cuprosensibili: il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3885 **Ministero della Sanità del** 13.10.80
E/1

3893

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

R 6 ERRESEI S BLU

Fungicida cupro organico con adiuvanti ad azione biologica, capace di attivare la vegetazione e di dare aspetto migliore alla vite, alle pomacee, al pomodoro ed al garofano

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 Rame metallico (sottoforma di Ossicloruro tetraramico)
gr. 13 Zineb puro
Adiuvanti e coloranti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— in caso di ingestione

Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

— per l'irritazione della cute e delle mucose:

lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3893 **Ministero Sanità del** 20.12.80 . . . .

E/1

L'R 6 Erresei S Blu può essere impiegato contro le malattie crittogamiche delle piante di seguito indicate in sostituzione dei tradizionali sali e poltiglie rameiche (Ossicloruro di rame, Poltiglia Bordolese).

L'R 6 Erresei S Blu va impiegato contro le seguenti malattie alle dosi di seguito indicate:

Peronospora della vite dose gr. 350-400 in 100 lt. di acqua.

Ticchiolatura del melo e del pero (a seconda dell'epoca di applicazione: le dosi più alte nel periodo prefiorale): dose gr. 300-500 in 100 lt. di acqua;
Peronospora, Alternariosi, Septoriosi del pomodoro fino alla prima fioritura dose gr. 350-400 in 100 lt. di acqua.

Ruggine del garofano dose gr. 400 in 100 lt. di acqua.

N.B. In condizioni poco favorevoli allo sviluppo della Peronospora della vite la dose di R 6 Erresei S Blu può essere ridotta a gr. 250 per hl. di acqua. Viceversa in condizioni molto favorevoli allo sviluppo della malattia, la dose dovrà essere elevata a gr. 500 ed in casi estremi a gr. 600 per hl. di acqua.

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare l'R 6 Erresei S Blu in poca acqua fino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con l'acqua occorrente.

Dovendo eseguire trattamenti su piante difficilmente bagnabili, aggiungere alla miscela di R 6 Erresei S Blu pronta per l'uso l'Etaldyn in ragione di gr. 50 per ettolitro.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

L'R 6 Erresei S Blu è miscibile con il Sofril ed altri zolfi compresi quelli polverulenti per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora e può essere miscelato con Kelthane, Zitiol, Parafene, Metilon, Fosfene, per la lotta contemporanea contro acari, tignole, zigene.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Su varietà di Melo, (Abbondanza « Belford » - Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Goolden Delicious - Gravenstein - Jonathan) e di pero (Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clargeau - Passacrassana -B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

3911

PIRETRAN

INSETTICIDA AGRICOLO AD AZIONE MOLTO RAPIDA

Composizione gr 100 di prodotto contengono: PIRETRO pro gr **2,5** - PIPERONILBUTOSSIDO puro gr **8,0** - Coformulanti q.b. a gr **100,0**. **CLASSE IV**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Il PIRETRAN è un insetticida che agisce prevalentemente per contatto. Ha un'azione molto rapida, ma poco persistente. In agricoltura viene impiegato alle seguenti dosi:

— Contro Afidi del GAROFANO, CRISANTEMO, ROSE in colture in pieno campo o in serra.
— Contro Afidi del Carciofo, Fagiolo, Fragola, Lattuga, Susine: gr 100-150 per ettolitro.
— Contro Mosca dell'Asparago, Cipolla, Carota, Cavolo e Ciliegio: gr 100-150 per ettolitro.
— MELO: Contro Afide, Farfalle di Minatori, Psille e Tripidi: gr 150-200 per ettolitro.
— POMODORO: Contro Cavolaia, Bemista e Moscerino: gr 100-150 per ettolitro.

Il prodotto, in presenza di luce e di alte temperature, perde velocemente la sua efficacia insetticida, per cui si consiglia di eseguire i trattamenti nelle ore meno calde della giornata, possibilmente di sera.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalina. - AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. - Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci e per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA, NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. N. 3911 del 09-12-1980 del Ministero della Sanità.

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.59

Officina di produzione: bimex s.p.a. - via cogolla, 5 - isola vicentina (vi)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg**

3918

Z 72

Anticrittogamico, in polvere bagnabile, a base di zineb

Composizione

gr. 72 di zineb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
- Sintomi di intossicazione
  L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose può provocare irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
  In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
- Controindicazioni
  Alcool, olii e grassi.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Pomacee	Ticchiolatura	0,2 % = gr. 200
Garofano	Ruggini	0,2-0,3 % = gr 200-300
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi	0,2-0,3 % = gr. 200-300
Viticoltura	Peronospora	0,2-0,3 % = gr. 200-300

Intervenire secondo le necessità dettate dall'ambiente stagionale e dalla biologia dei parassiti, attenendosi ai calendari dei trattamenti suggeriti in zona. Le dosi più elevate si consigliano solo in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle crittogame citate.

Per la preparazione della poltiglia: versare la quantità necessaria di Z 72 nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume con l'acqua mancante, sempre agitando.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non impiegare in serra.

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Lo Z 72 è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ; è incompatibile con la poltiglia solfo-calcica, il permanganato di potassio.
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio Z 72 + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di Z 72 da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione dello Z 72 con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di Z 72, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

« AVVERTENZA »: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si deve evitare di trattare le varietà di pero sensibili allo zineb, quali Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi e Zucchermanna.
Su piante di pomodori è bene evitare trattamenti con Z 72 miscelato a concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione:
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 3910 del 16.9.1970 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

392!

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

METILSAN

Fungicida organico a base di Thiram

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 40 di Thiram puro
Sostanze diluenti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza nociva per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

— Sintomi d'intossicazione:

Nausea - vomito - coliche addominali - diarrea - rinorrea - broncospasmo - irrequietezza - prostrazione- irritazione nervosa seguita da astenia o paralisi - lacrimazione - dermatosi - congestione del viso quando il paziente ha bevuto alcool.

— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Lavanda gastrica - terapia sintomatica - ossigenoterapia - respirazione artificiale - antistaminici - soluzioni glucosate endovena - vitamina C e complesso B.

— Controindicazioni:

Bevande alcoliche, grassi ed olii.

CARATTERISTICHE

Il **METILSAN** è un fungicida organico per trattamenti ai fruttiferi, alle colture ortive e floreali. Si impiega anche per trattamenti a sementi di cereali, bulbi, tuberi, nonché per trattamenti al terreno.

SETTORI E DOSI D'IMPIEGO

Frutticoltura:
POMACEE: melo e pero.

Contro la Ticchiolatura, prima e dopo la fioritura, alla dose di gr. 350-400/hl.

Per i trattamenti al verde, a seconda del pericolo di ulteriori infezioni, la dose d'impiego può essere ridotta a gr. 250/hl. Per prevenire sviluppi di Ticchiolatura in magazzino, trattamenti pre-raccolta alla dose di gr. 400/hl.

Contro il Marciume dei frutti, alla dose di gr. 400/hl, subito dopo la comparsa delle lesioni che permettono lo sviluppo dell'infezione (p.e. dopo la grandine).

DRUPACEE: Pesco, Albicocco, Susino e Ciliegio.

Contro la Bolla e il Corineo (gommosi), alla caduta delle foglie in autunno e a fine inverno alla dose di gr. 800/hl. Per i trattamenti primaverili-estivi, alla dose di gr. 300-350/hl. Contro il marciume dei frutti come per le pomacee.

E' efficace anche contro Ticchiolatura e Fusicoccum del pesco.

Viticoltura:
Contro la muffa grigia (Botrytis) dell'uva: eseguire trattamenti ripetuti alla dose di gr. 350/hl. sino a 10 giorni dalla raccolta.

Orticoltura:
Contro la Vaiolatura, il Mal Bianco e il Marciume dei frutti delle fragole, la Botrytis dell'insalata, la Peronospora del Cetriolo, il Mal Bianco del carciofo, la Ticchiolatura del pomodoro alla dose di gr. 400-500/hl.

Floricoltura:
Contro la Ticchiolatura, la Ruggine, la Peronospora, il Marciume dei bottoni floreali della rosa; il Carbone del garofano, la Botrytis dei gladioli e dei tulipani, alla dose di gr. 350-400/hl.

Per la disinfezione dei bulbi: (gladioli, tulipani). Contro Fusarium, Sclerotinia, Penicillium, Botrytis. Dopo la raccolta, e dopo aver eliminato i bulbi evidentemente malati, effettuare un abbondante impolveramento a secco. Prima della piantagione, immergere i bulbi per la durata di un'ora in una soluzione all'1-2% di **METILSAN.**

Per la disinfezione di piante, barbatelle: durante la vegetazione in semenzaio o piantonaio, effettuare 2-3 trattamenti alla dose di gr. 400/hl. Prima del trapianto, immergere la base delle piante o delle barbatelle in una soluzione di **METILSAN** alla dose di gr. 600-800/hl.

Per la disinfezione delle sementi di cereali e floreali: il **METILSAN** agisce contro la maggior parte delle malattie trasmesse dalle sementi, alle seguenti dosi, per q.le di seme:
mais: gr. 200-300
floreali: gr. 400-600

Per la disinfezione del terreno: contro agenti di marciumi pedali e radicali delle colture (Botrytis, Marciume dei bulbi, Ernia del cavolo) irrorare il terreno preventivamente prima della semina o del trapianto o all'apparizione della malattia con **METILSAN** alla dose di gr. 400/hl., impiegando lt. 4 di soluzione per mq. Contro Ernia del cavolo, elevare la dose di **METILSAN** a gr. 800-1000/hl.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Stemperare il **METILSAN** in poca acqua e poi diluire alla concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **METILSAN** è compatibile con la quasi generalità degli antiparassitari della nostra gamma. Non è miscibile con prodotti a base di rame, mercurio, arseniati, methidathion, chinometionate, thioquino, difolatan, ecc. Il prodotto non deve essere irrorato su piante trattate con rame.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per varietà di pere sensibili al **THIRAM:** Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 3929 **Ministero della Sanità del** 13.10.80
E/1

3969

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ROTHON 101

Erbicida-Cespuglicida

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 10,2 Picloran puro
gr. 39,6 di 2,4 D puro (da sale isopropanolaminico)
Sostanze emulsionanti e coadiuvanti: q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

— **Sintomi d'intossicazione:**
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

— **Consigli terapeutici di massima e condizioni al caso:**
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

— **Controindicazioni:**
E' sconsigliata la digitale.

CARATTERISTICHE

Il **Rothon 101** è un decespugliante ed un erbicida liquido ad azione sistematica, agente per assorbimento fogliare e radicale.

Il **Rothon 101** devitalizza infestanti arbustive e legnose, quali: abete, tamarindo, acero, ontano, betulla, corniolo, biancospino, larice, pino, lentisco, pioppo, pruno selvatico, rododendro, robinia, rosa selvatica, salice, sambuco, olmo, rovo, ginepro.

Il **Rothon 101** devitalizza infestanti erbacee a foglia larga, quali: stoppione, vilucchio, romice, ferula, coda di cavallo, soffione, campanula, carota, euforbiacee, camomilla, ortica, leguminose, nonché le felci (Pteridium spp.).

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3969 **Ministero della Sanità del** 28.12.81
E/1

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il **Rothon 101** può essere impiegato in trattamenti su grandi superfici ed in trattamenti localizzati, per la devitalizzazione di alberi di alto fusto, ceppai, cespugli, erbe a foglia larga, che invadono prati e parchi alpini e prealpini, alvei e sponde di fiumi e torrenti, argini di canali di bonifica e scolo, zone collinari da adibire ad impianto di essenze pregiate e ad alto reddito, bordi di strade, reti di recinzione, muri di cinta, zone militari, aree industriali, linee ferroviarie, scarpate, zone storiche, fasce frangifuoco, zone soggette a servitù di elettrodotto in collina e montagna.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **Rothon 101** agisce sistemicamente per assorbimento fogliare e radicale, la sua applicazione deve avvenire quindi nel periodo di massima attività vegetativa (aprile-settembre). La dose d'impiego varia fra lo 0,750-1% di acqua a secondo dello sviluppo delle infestanti:

Arbusti e cespugli: Irrorare uniformemente la chioma, il fusto ed il colletto.

In caso di specie particolarmente resistenti, quali Frassino e Quercia, irrorare anche il terreno.

Piante di alto fusto: Praticare delle fenditure anulari e degli intagli nella corteccia e versare un'emulsione costituita dal 50% di Rothon 101 e dal 50% di acqua.

PRECAUZIONI PER L'USO

Il **Rothon 101** ha una persistenza d'azione molto prolungata.

E' indispensabile, prima di procedere alla messa in coltura delle zone trattate, effettuare delle prove Test o interpellare la Società distributrice, a meno che non si sia perfettamente certi che durante il trattamento il terreno sottostante non sia stato contaminato dal prodotto (trattamenti alla sola chioma).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi ecc.

Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Lasciare trascorrere un anno prima di impiantare nuove colture sui terreni trattati.

AVVERTENZE

Applicare il **Rothon 101** in giornate poco ventilate e nelle ore meno calde (meglio verso sera).

Gli atomizzatori possono essere usati ma con le dovute cautele.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

39

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Erbicida a base di Bromacile
Per il diserbo selettivo degli Agrumeti
e per il diserbo totale.
Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 di Bromacile puro
Ingredienti inerti q.b. a 100.

***Marchio reg. E.I. du Pont de Nemours e Co. (Inc)**

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Non contaminare acque di uso domestico.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Diserbi totali

Il trattamento può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno.

I risultati migliori si hanno se le applicazioni sono fatte nel periodo di attiva crescita delle erbe infestanti, quando tuttavia queste non hanno ancora raggiunto un tale stadio di sviluppo da rendere difficile la penetrazione della miscela nel terreno.

Distribuire il prodotto nel modo più uniforme possibile, avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

L'irrorazione va eseguita con le normali pompe munite di agitatore.
Per le piccole superfici possono essere utilizzate anche le comuni pompe a spalla.

DOSI D'IMPIEGO

Tipo d'infestazione	quantità di prod. kg./ha.	quantità di acqua lt./ha.	quantità di prod. gr./mq.	quantità di acqua lt./mq.
Aree poco infestate	3- 6	1000-1500	0,3-0,6	0,100-0,150
Aree mediamente infestate	7-12	1000-1500	0,7-1,2	0,100-0,150
Aree notevolmente infestate	15-30	1000-1500	1,5-3	0,100-0,150

Nelle aree sulle quali l'**HYVAR-X** è già stato applicato in precedenza le dosi possono essere gradualmente diminuite.

Diserbo selettivo degli agrumeti

L'**HYVAR-X** deve essere impiegato in agrumeti di almeno 4 anni di età.

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali e su alcune perenni (ad eccezione del Convolvolo (Convolvulus arvensis), con qualche azione di contenimento su Cynodon dactilon (Gramigna) e Cyperus spp. (Cipero).

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 3970 **Ministero della Sanità del** 16.10.80
E/1

— **Con predominanza assoluta di infestanti annuali:** fare il trattamento in pre o post-emergenza delle infestanti, dopo la sistemazione dell'agrumeto per l'irrigazione (febbraio-aprile), alle dosi di kg. 3-4 per ettaro.
— **Con predominanza assoluta di infestanti perenni:** fare il trattamento in post-emergenza delle infestanti, in primavera avanzata (aprile-maggio) o all'inizio dell'autunno (settembre-ottobre) alle dosi di kg. 5-6 per ettaro.
— **Con vegetazione mista di infestanti annuali e perenni:** fare un trattamento in pre-emergenza delle infestanti dopo la sistemazione dell'agrumeto per l'irrigazione, alle dosi di kg. 3-4 per ettaro, facendolo seguire, in primavera avanzata o alla fine dell'estate, a seconda dello sviluppo delle infestanti, **da un trattamento localizzato sui ricacci** quando hanno raggiunto uno sviluppo di 5-10 cm. e sono nella prima fase di attiva crescita, alle dosi di kg. 5-6 per ha.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto va distribuito uniformemente con un quantitativo di acqua tale da assicurare una perfetta bagnatura (minimo lt. 1000/ha.).

Assicurarsi che il sistema di agitazione della miscela negli apparecchi di distribuzione sia perfettamente funzionante.

Nel caso di trattamenti primaverili, qualora al trattamento non seguano piogge, è indispensabile per la buona riuscita del trattamento, l'effettuazione di una irrigazione.

Nei trattamenti di post-emergenza delle infestanti è indispensabile, onde ottenere la migliore efficacia, l'aggiunta di Etaldyn.

Nei trattamenti di pre-emergenza delle infestanti assicurarsi che il terreno sia stato ben preparato e libero da zolle.

Non effettuare trattamenti in terreni sabbiosi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Per l'**HYVAR-X**, come per gli altri erbicidi totali, sono necessarie alcune precauzioni per prevenire danni alle piante utili.

Non deve pertanto, essere impiegato:
— sopra o presso alberi ed altre colture utili;
— su zone nelle quali si estendono presumibilmente radici di colture utili;
— in luoghi dai quali può essere dilavato e condotto fino alle radici di piante utili;
— senza opportuna cautela per prevenire che spruzzi o polvere finiscano su foglie e frutti degli stessi agrumi.

Il prodotto può essere fitotossico se non usato secondo le norme e sulle colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

AVVERTENZE

Dopo il trattamento lavare accuratamente le attrezzature impiegate.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Non infiammabile, non corrosivo, non volatile.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

3971

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

SULFOSOL COLLOIDALE

Zolfo colloidale bagnabile dotato di sospensività e finezza per trattamenti liquidi - combatte l'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle piante ornamentali

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 Zolfo colloidale puro (esente da selenio)
Sostanze bagnanti e disperdenti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il SULFOSOL COLLOIDALE si unisce immediatamente all'acqua formando una miscela molto stabile. Non provoca ustioni sulle piante anche ad elevate temperature. Possiede persistenza ed adesività dovute alla sua finezza. E' di facile ed immediato impiego. E' attivo anche a basse temperature.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Viticoltura: se usato solo, per i primi trattamenti contro l'Oidio, gr. 100-120 per hl. d'acqua; se aggiunto a prodotti contro la Peronospora, gr. 80-100 per hl. di acqua.

Frutticoltura: contro l'Oidio del melo e del pesco e la Ticchiolatura delle mele e pere gr. 100-120 per hl d'acqua.

Tabacchicoltura e colture floreali: contro l'Oidio del tabacco e delle colture floreali, gr. 100-120 per hl. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SULFOSOL COLLOIDALE è miscibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi della nostra gamma. Non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con gli olii minerali (FITOIL BIANCO e COCCIFOS), con Captano, DDVP, Binapacryl e Diclofluanide. E' particolarmente raccomandata la miscela con Cuprothex S Blu in quanto costituisce una combinazione per combattere contemporaneamente la Peronospora e l'Oidio della vite.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar:

Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

Pere: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

Vite: Sangiovese.

AVVERTENZE

Il SULFOSOL COLLOIDALE come tutti gli zolfi colloidali, va usato con molta oculatezza. Effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano. Nei trattamenti misti insetticidi e fungicidi, gli insetticidi vanno aggiunti alla poltiglia di SULFOSOL COLLOIDALE già pronta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 3971 **Ministero della Sanità del** 20.12.1980

Peso netto Kg.

E/2

3980

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

FITIOS B/77 P

Insetticida agricolo
Per trattamenti a secco

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 3 di Metil-Etoato puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione.

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi. La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

CARATTERISTICHE

Il **Fitios B/77 P** è un insetticida che trova utile impiego nella lotta contro numerose specie di parassiti:

- Piante da frutto: melo, pero, pesco e ciliegio: (Mosca delle ciliegie, mosca della frutta, Afidi).
- Colture ortive: Depressaria e nottua del carciofo, mosca del sedano e dell'asparago.
- Colture floreali in campo: striscino del garofano.
- Barbabietola: Mosca della barbabietola.

L'uso del **Fitios B/77 P** è indicato in tutti i casi in cui, per scarsità di acqua o per mancanza di adeguata attrezzatura, risultano onerosi o di difficile esecuzione i trattamenti liquidi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **Fitios B/77 P** deve essere somministrato alle piante per mezzo delle comuni solforatrici (a mano, a zaino, o a motore), curando che la nube polverulenta penetri tra il fogliame, in modo da ricoprire interamente le foglie e i frutti di un sottile velo di polvere insetticida.

E' preferibile eseguire i trattamenti nelle prime ore del mattino o dopo l'imbrunire, per utilizzare la rugiada.

Scegliere, per l'esecuzione dei trattamenti, giornate non ventose.

La dose di impiego per trattamento è in relazione al tipo di coltura e allo sviluppo delle piante.

Mediamente si impiegheranno kg. 20-30 di **FITIOS B/77 P** per ettaro.

AVVERTENZA

Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e utensili agricoli, adoperati per l'impiego del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. E' nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n3980 Ministero della Sanità del 11.9.1981
E/1

3983

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

DELFITHEX BLU

Fungicida organico per la prevenzione e la lotta contro la Peronospora della vite e malattie crittogamiche di seguito indicate, del pomodoro, del garofano e del pioppo

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 65 Zineb puro
Sostanze coloranti, coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— *in caso di ingestione*
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
— *per l'irritazione della cute e delle mucose:*
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 3983 **Ministero della Sanità del** 20.12.1980
E/1

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Il **DELFITHEX BLU** è un fungicida efficace, di facile impiego, possiede adesività, non macchia e non ustiona la vegetazione.

Versare il prodotto in poca acqua e mescolare accuratamente; indi aggiungere la quantità d'acqua necessaria tenendo la miscela costantemente agitata. L'aggiunta di Bagnante Adesivo Liquido 2 (gr. 50/hl) assicura una migliore distribuzione della miscela sulle piante.

Dosi: gr. 200-300 per 100 lt. d'acqua.

A queste dosi si possono efficamente controllare le seguenti malattie crittogamiche:
— Peronospora della vite;
— Peronospora, Alternariosi del pomodoro solo fino alla prima fioritura;
— Ruggine del garofano;
— Marssonina del pioppo: impiegare kg. 5,5 per ettaro e per trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il **DELFITHEX BLU** è miscibile con Sulfosol e Viricuivre e gli insetticidi della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

MITEX 50

Contro uova e ninfe di Ragnetti rossi
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 Fenson puro
Sostanze disperdenti e bagnanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gl indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Intossicazione acuta: *lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno* controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi *in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0.1-0.2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ed eliminazione completa del tossico.*

Controindicazioni:
La morfina per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool.

CARATTERISTICHE

Il **MITEX 50** è un ovicida specifico e selettivo per la lotta contro le uova primaverili-estive e le forme giovanili del ragnetti rossi e cioè consente di combattere efficacemente e di distruggere le uove e le ninfe degli acari durante la primavera e l'estate, che infestano:

Agrumi: aranci, mandarini, limoni e pompelmi (compreso l'Eriofide delle « Meraviglie » o Aceria Sheldoni), meli, peri, mandorli, viti, cotone, pomodori (compreso l'Eriofide « Vasates »). Piante da fiori: rosa, garofano, gerbera e crisantemo, in pieno campo.

Il **MITEX 50** in base alle caratteristiche della sua azione ovicida va impiegato dopo che si sarà sviluppata la prima generazione di acari. Effettuando allora il trattamento, si distruggeranno le uova deposte e i giovani acari. Per un trattamento completo contro uova, ninfe e adulti, si consiglia di abbinare il **MITEX 50** al Fitofos 20, nelle dosi sottoindicate. Con trattamento ben eseguito si avrà la completa distruzione dell'infestazione, in quanto il **MITEX 50** avrà esplicato la sua azione contro le uova e contro le ninfe, mentre il Fitofos 20 avrà distrutto gli adulti.

Il **MITEX 50** svolge azione specifica contro le uova e le ninfe di ragnetti rossi.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Il **MITEX 50** va normalmente impiegato alla dose di 100 gr. in 100 litri d'acqua.

La dose sopra indicata va aggiunta alla quantità di acqua richiesta (es. gr. 100 in 100 litri d'acqua), agitando lentamente per qualche minuto. Si consiglia di aggiungere contemporaneamente gr. 20-30 di Bagnante Adesivo L. 2 per 100 lt. d'acqua. La sospensione ottenuta va spruzzata sulle piante a mezzo delle comuni pompe a mano o a motore, curando una perfetta nebulizzazione in modo da assicurare una uniforme copertura di entrambe le pagine delle foglie.

Il **MITEX 50** va impiegato esclusivamente nel periodo primaverile-estivo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **MITEX 50** può essere miscelato con insetticidi di sintesi, Parathion, con zolfi bagnabili o con fungicidi organici (carbammati).
Non è miscibile con poltiglia bordolese, con polisolfuri e con altri prodotti o miscele a reazione decisamente alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3934 Ministero della Sanità del . 13.1.1981. . .

E/1

3985

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

SULFOSOL 60

Zolfo bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 60 zolfo puro (esente da selenio)
Sostanze disperdenti e bagnanti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il SULFOSOL 60 è un prodotto disperdibile in acqua con la quale forma una sospensione stabile.
Il SULFOSOL 60 presenta vantaggi per attività e praticità di impiego.

PRINCIPALI IMPIEGHI

In viticoltura: contro l'Oidio o Mal bianco nei trattamenti iniziali primaverili gr. 500-600 per hl., nei trattamenti successivi gr. 300-400 per hl.

In frutticoltura: contro l'Oidio del Melo: gr. 500-600 per hl. d'acqua, nei trattamenti pre-florali gr. 250-300 nei trattamenti post-florali.
Contro l'Oidio dell'Albicocco: gr. 300 per hl. d'acqua durante il periodo vegetativo. Con la stagione calda e per trattamenti tardivi su albicocchi da conserva utilizzare il Karathane WD gr. 70-80 per hl. d'acqua.
Contro l'Oidio del pesco: dalla fine della fioritura gr. 300 per hl. d'acqua. Se la temperatura decorre calda preferire gr. 70-80 di Karathane WD.

In orticoltura e floricoltura: contro l'Oidio e Mal Bianco del pomodoro, peperone, melanzana: gr. 300-400 per hl. d'acqua. Per le colture sensibili (Meloni, Zucchine, Cocomeri) e quando la temperatura oltrepassa i 25°C preferire gr. 70-80 di Karathane WD.

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire bene il prodotto in una piccola quantità d'acqua (poco più di mezzo lt. per kg. di prodotto) e poi aggiungere il volume d'acqua totale agitando accuratamente.
Nel caso di trattamenti misti mescolare preferibilmente il prodotto alla polvere insetticida o fungicida e poi procedere come per la preparazione di una poltiglia semplice.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SULFOSOL 60 è miscibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi della nostra gamma. Non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali (FITOIL BIANCO e COCCIFOS), con Captano, DDVP, Binapacryl e Diclofluanide. E' particolarmente raccomandata la miscela con Cuprothex S Blu in quanto costituisce una combinazione per combattere contemporaneamente la Peronospora e l'Oidio della vite.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il SULFOSOL 60 può essere fitotossico per le cucurbitacee. Può arrecare danno alle seguenti cultivar

Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

Pere: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

Vite: Sangiovese.

AVVERTENZE

Con temperatura elevata il SULFOSOL 60 va usato alle dosi inferiori e il trattamento va effettuato nelle prime ore del mattino o nel pomeriggio. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3985 **Ministero della Sanità del** 13.1.1981

E/1

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Erbicida a base di Bromacile
Per il diserbo selettivo degli Agrumeti
e per il diserbo totale.
Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 di Bromacile puro
Ingredienti inerti q.b. a 100.

***Marchio reg. E.I. du Pont de Nemours e Co. (Inc)**

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Non contaminare acque di uso domestico.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Diserbo selettivo degli agrumeti.

HYVAR-X deve essere impiegato in agrumeti di almeno 4 anni di età.

— **Controllo di erbe annuali:** Quando il problema dell'agrumeto è limitato al controllo delle erbe annuali, il miglior periodo di applicazione è la primavera (febbraio-aprile) subito prima o subito dopo la germinazione delle infestanti.

Applicare da **2 a 3 kg. per Ha.** di **HYVAR-X** su tutta la superficie. Usare la dose inferiore in terreni leggeri e la dose più alta in terreni pesanti o molto ricchi di sostanza organica.

Controllo di erbe perenni: Quando il problema principale da risolvere è l'eliminazione delle erbe perenni, è preferibile un trattamento in post-emergenza, in aprile-maggio oppure alla fine dell'estate (agosto-settembre), usando da 5 kg. **per Ha. nei terreni sciolti a 7 kg. per Ha. in terreni pesanti**, arrivando ad un massimo di 8 Kg. per Ha. in terreni molto pesanti ed in presenza di gravi infestazioni.

Nel caso si abbiano delle erbe perenni e annuali insieme, effettuare il trattamento primaverile consigliato per le annuali e, in seguito, trattare a macchia le perenni alle dosi indicate per queste ultime. Il prodotto non ha azione sul Convolvulus arvensis (convolvolo) ed ha qualche azione di contenimento su Cynodon dactilon (Gramigna) e Cyperus spp. (Cipero). In caso di infestazione da Convolvolo esso può essere facilmente controllato con una applicazione autunnale di un erbicida ormonico non volatile (MCPA sale sodico 2,4-D sali amminici).

Diserbi totali

Il trattamento può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno. I risultati migliori si hanno se le applicazioni sono fatte nel periodo di attiva crescita delle erbe infestanti, quando tuttavia queste non hanno ancora raggiunto un tale stadio di sviluppo da rendere difficile la penetrazione della miscela nel terreno.

Distribuire il prodotto nel modo più uniforme possibile, avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

L'irrorazione va eseguita con le normali pompe munite di agitatore.

Per le piccole superfici possono essere utilizzate anche le comuni pompe a spalla.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DOSI D'IMPIEGO

Tipo d'infestazione	quantità di prod. kg./ha.	quantità di acqua lt./ha.	quantità di prod. gr./mq.	quantità di acqua lt./mq.
Aree poco infestate	3- 6	1000-1500	0,3-0,6	0,100-0,150
Aree mediamente infestate	7-12	1000-1500	0,7-1,2	0,100-0,150
Aree notevolmente infestate	15-30	1000-1500	1,5-3	0,100-0,150

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto va distribuito uniformemente con un quantitativo di acqua tale da assicurare una perfetta bagnatura (minimo lt. 1000/ha.).

Assicurarsi che il sistema di agitazione della miscela negli apparecchi di distribuzione sia perfettamente funzionante.

Nel caso di trattamenti primaverili, qualora al trattamento non seguano piogge, è indispensabile per la buona riuscita del trattamento, l'effettuazione di una irrigazione.

Nei trattamenti di post-emergenza delle infestanti è indispensabile, onde ottenere la migliore efficacia, l'aggiunta di Bagnante Adesivo Liquido 2.

Nei trattamenti di pre-emergenza delle infestanti assicurarsi che il terreno sia stato ben preparato e libero da zolle.

Non effettuare trattamenti in terreni sabbiosi.

Nelle aree sulle quali l'**HYVAR-X** è già stato applicato in precedenza le dosi possono essere gradualmente diminuite.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Per l'**HYVAR-X**, come per gli altri erbicidi totali, sono necessarie alcune precauzioni per prevenire danni alle piante utili.

Non deve pertanto, essere impiegato:

— sopra o presso alberi ed altre colture utili;
— su zone nelle quali si estendono presumibilmente radici di colture utili;
— in luoghi dai quali può essere dilavato e condotto fino alle radici di piante utili;
— senza opportuna cautela per prevenire che spruzzi o polvere finiscano su foglie e frutti degli stessi agrumi.

Il prodotto può essere fitotossico se non usato secondo le norme e sulle colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

AVVERTENZE

Dopo il trattamento lavare accuratamente le attrezzature impiegate.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Non infiammabile, non corrosivo, non volatile.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

Reg. n. 3986 **Ministero della Sanità del** 16.10.1980
E/1

3987

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

SULFOSOL

Zolfo bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 40 zolfo puro (esente da selenio)
Sostanze disperdenti e bagnanti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **SULFOSOL** è un prodotto disperdibile in acqua con la quale forma una sospensione stabile.
Il **SULFOSOL** presenta vantaggi per attività e praticità di impiego.

PRINCIPALI IMPIEGHI

In viticoltura: contro l'Oidio o Mal bianco nei trattamenti iniziali primaverili gr. 650-750 per hl., nei trattamenti successivi gr. 400-500 per hl.

In frutticoltura: contro l'Oidio del Melo: gr. 650-750 per hl. d'acqua nei trattamenti pre-florali, gr. 250-300 nei trattamenti post-florali.
Contro l'Oidio dell'Albicocco: gr. 400 per hl. d'acqua durante il periodo vegetativo. Con la stagione calda e per trattamenti tardivi su albicocchi da conserva utilizzare il Karathane WD gr. 70-80 per hl. d'acqua.
Contro l'Oidio del pesco: dalla fine della fioritura gr. 400 per hl. d'acqua. Se la temperatura decorre calda preferire gr. 70-80 di Karathane WD.

In orticoltura e floricoltura: contro l'Oidio e Mal Bianco del pomodoro, peperone, melanzana: gr. 400-500 per hl. d'acqua. Per le colture sensibili (Meloni, Zucchine, Cocomeri) e quando la temperatura oltrepassa i 25°C preferire gr. 70-80 di Karathane WD.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3987 **Ministero della Sanità del** 13.1.1981
E/1

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire bene il prodotto in una piccola quantità d'acqua (poco più di mezzo lt. per kg. di prodotto) e poi aggiungere il volume d'acqua totale agitando accuratamente
Nel caso di trattamenti misti mescolare preferibilmente il prodotto alla polvere insetticida o fungicida e poi procedere come per la preparazione di una poltiglia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **SULFOSOL** è miscibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi della nostra gamma. Non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali (**FITOIL BIANCO** e **COCCIFOS**), con Captano, DDVP, Binapacryl e Diclofluanide. E' particolarmente raccomandata la miscela con **Cuprothex S Blu** in quanto costituisce una combinazione per combattere contemporaneamente la Peronospora e l'Oidio della vite.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il **SULFOSOL** può essere fitotossico per le cucurbitacee. Può arrecare danno alle seguenti cultivar:

Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

Pere: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

Vite: Sangiovese.

AVVERTENZE

Con temperatura elevata il **SULFOSOL** va usato alle dosi inferiori e il trattamento va effettuato nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

DELFITHEX POLVERE

Anticrittogamico acuprico per la lotta contro le malattie crittogamiche delle colture di seguito indicate

Polvere per trattamenti a secco

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 6,5 Zineb puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— in caso di ingestione

Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

— per l'irritazione della cute e delle mucose:

lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 3988 Ministero della Sanità del 20.12.1980
E/1

CARATTERISTICHE

Il **DELFITHEX POLVERE** trova impiego contro molte malattie già combattute con la tradizionale poltiglia bordolese.

E' in particolare indicato per trattamenti alle piante ovunque, per mancanza di acqua o di adeguata attrezzatura, non sia possibile o conveniente effettuare trattamenti liquidi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

In media kg. 20-30 per ha. a seconda dello sviluppo raggiunto dalla pianta.

Il **DELFITHEX POLVERE** va somministrato sulle piante a mezzo di normali solforatori (a mano, a zaino e a motore) curando l'uniforme distribuzione della polvere su entrambe le pagine delle foglie.
I trattamenti vanno eseguiti preferibilmente al mattino o dopo il tramonto, per favorire l'adesione della polvere a mezzo della rugiada.

Il **DELFITHEX POLVERE** viene impiegato per combattere la Peronospora del tabacco. L'applicazione può farsi sia sul fogliame asciutto che umido. Per combattere la Peronospora del tabacco in pieno campo, le dosi di impiego in media si aggirano sui 25-30 kg. per ha. a seconda dello sviluppo raggiunto dalle piante. Il ritmo delle applicazioni si aggirerà secondo i casi su due o tre alla settimana od anche una se la virulenza del parassita non è elevata.

APPLICAZIONI

IN SEMENZAIO:
Tabacco: per combattere la Peronospora tabacina, iniziare le applicazioni quando le piantine di tabacco sono alte 1 cm.; oppure quando viene segnalata la malattia in zone vicine. Polverizzare regolarmente due volte la settimana, oppure tre nel caso di un andamento climatico particolarmente favorevole allo sviluppo della malattia; immediatamente dopo la pioggia dilavante, ripetere una polverizzazione. Le dosi di impiego del prodotto variano da kg. 0,600 a 1,900 per ogni 100 mq. di semenzaio, a seconda dello sviluppo delle piantine.

IN FLORICOLTURA:
Contro: Ruggine del garofano.

IN ORTICOLTURA:
Contro: Peronospora, del pomodoro solo fino alla prima fioritura.

IN PIENO CAMPO:

a) **Trattamenti primaverili:** subito dopo la messa a dimora delle piantine delle colture di cui sopra, dovranno iniziare le polverizzazioni per difendere le stesse dalla Peronospora, con un ritmo di intervento bisettimanale qualora dovessero persistere le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Il quantitativo di **DELFITHEX POLVERE**, in questo caso, varierà da 15 a 20 kg. per ettaro.

b) **Trattamenti estivi:** la quantità di prodotto varia da kg. 25 a 30 per ha., a seconda dello sviluppo raggiunto dalla pianta.

Il numero di applicazioni si aggirerà, secondo i casi, a due o tre alla settimana, oppure ad una sola applicazione se le condizioni non sono molto favorevoli allo sviluppo della malattia.

AVVERTENZE

Il **DELFITHEX POLVERE** non agisce contro il Mal Bianco o Oidio delle piante.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con prodotti della nostra gamma.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg. 25

4013

SANDOZIR

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di ziram

Composizione
gr. 88 di ziram puro;
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

Informazioni per il medico
- Sintomi di intossicazione
  L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
  In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
  Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
  Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Frutticoltura		
— Pomacee (melo e pero)	Ticchiolature	0.2-0.25% = gr. 200-250
— Drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio e mandorlo)	Coryneum Bolla	0.4-0.5% = gr. 400-500 (in trattamenti invernali)
	Cancro da Fusicoccum	0.2-0.25% = gr. 200-250 (in trattamenti sulla vegetazione)
Orticoltura (cavolo, fagiolo, peperone, pomodoro, cucurbitacee, lattuga, scarola e patata)	Antracnosi Septoriosi	0.2-0.25% = gr. 200-250
Floricoltura in campo	Ruggini Septoriosi	0.2-0.25% = gr. 200-250

Le dosi più elevate si consigliano solo per condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle citate crittogame.

Preparazione della poltiglia
Stemperare bene il SANDOZIR in poca acqua, onde ottenere una poltiglia senza grumi e diluire sino alla concentrazione desiderata, sempre rimescolando.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il SANDOZIR è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ, nonché con altri antiparassitari reperibili in commercio.
Per la preparazione di poltiglie miste con olii, eseguire l'emulsione del prodotto oleoso (FLAVINA SANDOZ, OLIO BIANCO SANDOZ) sino a 3/4 del volume previsto e poi aggiungere il SANDOZIR, dopo averlo sospeso a parte in poca acqua. Mescolare il tutto a fondo, completando con l'acqua necessaria.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Varietà di peri sensibili allo ZIRAM: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4013 **del** 12.11.1980 **del Ministero della Sanità.**
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

4038

TIOTOX "50"

Anticrittogamico in polvere bagnabile
a base di THIRAM (T.M.T.D.)

Composizione
gr. 49,5 di thiram puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

Informazioni per il medico
- Sintomi di intossicazione
  L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
  In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
  Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
  Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
In trattamenti « al verde »:		
● Drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio e mandorlo)	Coryneum	0,2-0,3% = gr. 200-300 ripetendo gli interventi tutte le volte che la biologia dei parassiti e l'andamento stagionale lo impongono.
● Pesco	bolla	
● Pomodoro	Ruggini, Botrytis Cladosporiosi	
In trattamenti invernali:		
● Drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio e mandorlo)	Coryneum	0,5-0,6% = gr. 500-600 eseguendo gli interventi, come norma generale, alla caduta delle foglie e al termine dell'inverno, prima dell'apertura delle gemme.
● Pesco	bolla	

Preparazione della poltiglia
Versare il TIOTOX « 50 » in poca acqua, rimescolando energicamente onde ottenere una sospensione senza grumi; diluire, in seguito, aggiungendo acqua fino al volume desiderato oppure versare la poltiglia concentrata nella rimanente acqua nel serbatoio della motopompa, facendo funzionare l'agitatore.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il TIOTOX « 50 » è miscibile con gli antiparassitari di produzione Sandoz, tranne EUFITANA ESTIVA e quelli contenenti rame. Per la preparazione di poltiglie miste con OLIO BIANCO SANDOZ oppure con FLAVINA SANDOZ, approntare a parte le singole poltiglie (TIOTOX « 50 » - olio prescelto) con poca acqua, miscelarle assieme e portare, con acqua, al volume desiderato. Per le poltiglie miste con gli altri antiparassitari aggiungere, questi ultimi, alla poltiglia di TIOTOX « 50 » già pronta per l'uso, mescolando energicamente.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Può essere fitotossico per le cv. di pesco Red-Haven, Cardinal e Dixired.

Rischi di nocività
E' tossico per i pesci, gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. · MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4032 **del** 12-11-19[illegible] **del Ministero della Sanità.**
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

4039

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ZIREX 90

Anticrittogamico Acuprico
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 90 Ziram puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— in caso di ingestione
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;
— per l'irritazione della cute e delle mucose:
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. N. 4039 **Ministero della Sanità del** 11.12.80
E/1

CARATTERISTICHE

Lo **ZIREX 90** è un fungicida organico micronizzato al 90% di Ziram per la lotta contro Bolla e Vaiolatura (Coryneum) del pesco e del mandorlo. E' altresì efficace contro Fusicoccum e Ticchiolatura del pesco, del melo e del pero.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

Contro Bolla e Coryneum del pesco e del mandorlo. Per trattamenti autunno-invernali gr. 300-400 in 100 lt. d'acqua.
Per trattamenti primaverili-estivi gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua.
Sospendere i trattamenti su pesco nei periodi più caldi.
Contro Ticchiolatura del melo e del pero e del pesco: per trattamenti prefiorali gr. 200 in 100 lt. d'acqua. Per trattamenti post-fiorali gr. 100-150 in 100 lt. d'acqua.

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere allo **ZIREX 90**, nella dose occorrente, poca acqua agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea.
Aggiungere poi il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.
Irrorare la soluzione così preparata sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Lo **ZIREX 90** non è compatibile con la poltiglia solfocalcica e la poltiglia bordolese.
Il prodotto è compatibile con il Sulfosol, Fitoil Bianco, Fitofos 20, Ovomitex K, Kelthane.
Per le miscele con prodotti in emulsione si consiglia di preparare prima la soluzione normale di Zirex 90 e quindi aggiungere la dose occorrente del prodotto emulsionabile, agitando.
Per le polveri bagnabili si consiglia di miscelare prima i due prodotti a secco, preparando quindi la poltiglia acquosa, come illustrato nelle norme d'impiego.
Le eventuali miscele sono comunque da prepararsi al momento dell'impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Lo **ZIREX 90** è fitotossico per le varietà di pere: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona e Spadona d'estate.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

4(

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Anticrittogamico Acuprico
Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 Ziram puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, diarrea, apatia, irritazione nervosa. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

— *In caso di ingestione*
Provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche;

— *per l'irritazione della cute e delle mucose:*
lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii e grassi.*

CARATTERISTICHE

Lo ZIREX è un fungicida organico micronizzato all'80% di Ziram per la lotta contro Bolla e Vaiolatura (Coryneum) del pesco e del mandorlo. E' altresì efficace contro Fusicoccum e Ticchiolatura del pesco, del melo e del pero.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

Contro Bolla e Coryneum del pesco e del mandorlo: per trattamenti autunno-invernali: gr. 340-450 in 100 lt. d'acqua. Per trattamenti primaverili-estivi: gr. 150-200 in 100 lt. d'acqua. Sospendere i trattamenti su pesco nei periodi più caldi.
Contro Ticchiolatura del melo, del pero e del pesco: per trattamenti pre-florali gr. 200-250 in 100 lt. d'acqua. Per trattamenti post-florali gr. 150-200 in 100 lt. d'acqua.

NORME D'IMPIEGO

Aggiungere allo ZIREX, nella dose occorrente, poca acqua agitando la miscela a mezzo di un bastone fino ad ottenere una poltiglia omogenea.
Aggiungere poi il rimanente dell'acqua necessaria per ottenere la voluta concentrazione.
Irrorare la soluzione così preparata sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Lo ZIREX non è compatibile con la poltiglia solfocalcica e la poltiglia bordolese.
Il prodotto è compatibile con il Sulfosol, Fitoil Bianco, Fitofos 20, Ovomitex K, Kelthane.
Per le miscele con prodotti in emulsione si consiglia di preparare prima la soluzione normale di Zirex e quindi aggiungere la dose occorrente del prodotto emulsionabile, agitando.
Per le polveri bagnabili si consiglia di miscelare prima i due prodotti a secco, preparando quindi la poltiglia acquosa, come illustrato nelle norme d'impiego.
Le eventuali miscele, sono comunque da prepararsi al momento dell'impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Lo ZIREX è fitotossico per le varietà di pere: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona e Spadona d'estate.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 4042 Ministero della Sanità del 11.12.1980

E/1

Contenuto netto Kg.

4045

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ANTIRUGGINE BPD

Anticrittogamico specifico per la lotta contro la Ruggine del garofano

Polvere bagnabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 46,2 Zineb puro
gr. 2 Rame puro (da Ossicloruro Tetrarameico)
gr. 30 Zolfo puro (esente da selenio)
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: *alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.*
In caso di ingestione del prodotto può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DOSI E NORME D'IMPIEGO

La dose normale d'impiego dell'**Antiruggine BPD** è di gr. 300 per 100 lt. d'acqua.

Per condurre una razionale ed efficace lotta contro la ruggine del garofano, è necessario eseguire un trattamento ogni 10-15 giorni, secondo l'andamento stagionale e la gravità degli attacchi della Ruggine, con inizio nel mese di luglio fino a tutto ottobre e dalla fine di gennaio ad aprile.

Aggiungere l'**Antiruggine BPD** nella dose occorrente, a poca acqua e, dopo aver agitato, versare la poltiglia ottenuta nella restante quantità di acqua necessaria per raggiungere la voluta concentrazione.

Per l'esecuzione dei trattamenti può essere impiegata una qualsiasi pompa a mano o a motore, avendo cura di irrorare uniformemente e completamente le piante.

E' consigliabile aggiungere alla miscela pronta per l'uso 15-20 gr. di Bagnante Adesivo Liquido 2 per ettolitro.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 4045 **Ministero della Sanità del** 12.11.1980

Contenuto netto Kg.

E/1

4049

MAN 50

POLVERE BAGNABILE A BASE DI MANEB

COMPOSIZIONE gr 100 contengono: MANEB puro gr 50 - Sospensivanti, bagnanti ed inerti q.b. a gr 100. CLASSE III ATTENZIONE! Manipolare con prudenza.
NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezioni utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontana dall'umidità e calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Consigli terapeutici: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: Il MAN 50 si prepara versando la dose necessaria nel totale quantitativo d'acqua agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea. VITE: Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero: g 300/350 per 100 litri d'acqua. - POMACEE: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella: g 300/350 per 100 litri d'acqua. - POMODORO solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Speptoriosi, Cladosporiosi: g 300/350 per 100 litri d'acqua. - PIOPPO: Marssonina, Ticchiolatura: g 400/450 per 100 litri d'acqua. - TABACCO: Peronospora tabacina: g 300 per 100 litri d'acqua. - GAROFANO: Ruggine, Eterosporiosi, Alternariosi: g 300/350 per 100 litri d'acqua.
DIVIETO D'IMPIEGO: Divieto d'impiego in serre. - Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Il MAN 50 è compatibile con i comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione acida o alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può produrre fenomeni di fitotossicità su germinelli di tabacco e su alcune varietà di Pero sensibili al Maneb (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna).
RISCHI DI NOCIVITA': E' tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Reg. N. 4049 dell'11-12-1980 del Ministero della Sanità.

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 8
TELEFONI N.: (0444) 55.81.60 - 55.81.80

officina di produzione DIACHEM S.p.A.
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

4072

Anticrittogamico acuprico a base di Ziram in formulazione liquida

COMPOSIZIONE - gr. 100 di prodotto contengono:
— ZIRAM puro gr. 27
— Adesivanti, bagnanti, ausiliari e inerti q.b. a gr. 100

CLASSE TOSSICOLOGICA III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
— conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e dagli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevade o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, brochite. Il cotatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

S.C.A.M. s.r.l. MODENA
Officina di Produzione: TERRANALISI s.n.c. in Renazzo di Cento (FE)
Reg. Ministero Sanità n. 4072 del 29-11-1980

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO:
Il SELEZIR L è dotato di forte adesività e resistenza all'azione dilavante delle piogge. E' specifico per la lotta alle seguenti malattie:
Frutticoltura:
— trattamenti invernali e di fine inverno contro corineum (balion) ed exoascus (bolla), fusicoccum, cytospora del pesco: gr. 1200-1400 per ettolitro;
— trattamenti primaverili ed estivi contro corineum e bolla del pesco, ticchiolatura del melo e del pero: gr. 500-600 per ettolitro.

Orticoltura: contro seccume e nebbia del sedano, alternaria del pomodoro: gr. 500-600 per ettolitro.
Floricoltura: contro alternaria del garofano: gr. 500-600 per ettolitro.
Versare il SELEZIR L direttamente in tutta la quantità d'acqua occorrente ed agitare leggermente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': il SELEZIR L non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri) e con oli minerali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': può arrecare danno alle seguenti cultivar di pesco: red-haven, cardinal, dixired; e di pero: cannellina, gentil bianca, gentilona, spadona d'estate.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni, è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO KG.**

BI-ZETA 40

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO A BASE DI ZINEB E ZIRAM IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE gr 100 contengono: ZINEB puro gr 40 - ZIRAM puro gr 40 - Bagnanti, sospensivi ed inerti q.b. a gr 100.

CLASSE III **ATTENZIONE! Manipolare con prudenza.**
NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontana dall'umidità e calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Consigli terapeutici: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello **ZINEB** può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: Il BI-ZETA 40 si versa nel totale quantitativo d'acqua agitando alcuni minuti fino a formazione di una poltiglia omogenea. TABACCO: Peronospora Tabacina: g 250/300 per 100 litri d'acqua. POMODORO solo fino alla prima fioritura: Peronospora: g 250/300 per 100 litri d'acqua.
DIVIETO D'IMPIEGO: Divieto d'impiego in serre. - Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione acida o alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Reg. N. 4073 del 29-11-1980 del Ministero della Sanità.

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

Officina di produzione **Bimex** s.p.a. — Isola Vicentina (VI)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO gr**

4075

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione di elevate quantità di permethrin può causare tremori.
Trattamenti terapeutici: indurre il vomito. Trattamenti sintomatici.

COMPATIBILITA'

'AMBUSH' è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi di uso comune.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

È tossico per le api e per i pesci.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
mele, pesche, uva, ciliegie, prugne, agrumi: 10 giorni
pere: 5 giorni
olivo: 10 giorni
ortaggi (solanacee, brassicacee, cucurbitacee, lattuga, porri, carote, spinaci): 2 giorni
funghi: 2 giorni
mais, frumento, tabacco, patate, barbabietola da zucchero: 10 giorni
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

'AMBUSH'

Insetticida in emulsione concentrata ad azione immediata e prolungata. Agisce per contatto e ingestione contro una vasta gamma di insetti

COMPOSIZIONE

Permethrin puro . . . g 26,3
Bagnanti, emulsionanti, solventi . . q.b.a g 100
(contiene Trimetilbenzene tecnico)

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Coltura	Parassiti	Dose consigliata (g/100 l)
Melo. Drupacee	Litocollete, cemiostoma, minatrici, cydia, anarsia, afidi, tentredini, tingidi, tortrice, tignola, ricamatrici, mosca, cicadelle	20-40
Pero	Psilla	40-80
Vite	Tignola e tignoletta dell'uva, cicaline	30-40
Solanacee, Brassicacee, cucurbitacee, lattuga, porri, carote, spinaci	Cavolaia, nottue, mosca, afidi, tripidi, aleurodide, vanessa	20-40
Fiori in pieno campo e in serra	Afidi, tripidi, aleurodide, bega	30-40
Mais	Piralidi	30-40
Tabacco	Nottua	30-40
Cereali	Afidi, lema	30-40
Olivo	Mosca, tignola	20-40
Agrumi	Mosca, tignola	20-40
Barbabietola da zucchero	Afidi, mamestra, nottue	20-40
Funghi	Ditteri, collemboli	20-40

MODALITA' DI IMPIEGO

1. Impiegare la dose maggiore nei casi di forte infestazione.
2. Bagnare accuratamente tutte le parti della pianta.
3. Ripetere il trattamento secondo le nacessità.
4. Si consiglia di aggiungere il bagnante 'AGRAL' g 50/100 litri acqua, contro psilla e per le colture ortive.
5. Contro tignola della vite, microlepidotteri minatori, ecc. è necessario trattare prima che le larve penetrino nei tessuti vegetali.
6. Contro la psilla intervenire durante il periodo tra uova color arancio e prima della melata.
7. Per informazioni più dettagliate è consigliabile interpellare un tecnico di fiducia.
8. Conservare a temperatura superiore a 5°C.

NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA.

Da non applicare con mezzi aerei.

ICI Solplant SpA

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 4075 del 11-11-1980
'AMBUSH' marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

DA NON VENDERSI SFUSO

4080

REMILATE BIANCO

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, il pomodoro e la patata

Composizione
gr. 3,5 di cymoxanil* puro
gr. 30 di rame metallo (di cui:
gr. 23 sotto forma di ossicloruro tetraramico
gr. 7 sotto forma di solfato)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il REMILATE BIANCO è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro.
Il REMILATE BIANCO agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
- Peronospora della vite
  Usare gr. 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
  Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
- Peronospora della patata e pomodoro
  Usare gr. 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere una azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con il TIOTOX 50.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Sulle colture indicate occorre che il prodotto, come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante da trattare.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4080 **del** 9-12-1980 **del Ministero della Sanità.**

DA NON VENDERSI SFUSO — **Contenuto netto kg. 1**

* Contiene fungicida CURZATE, ® marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.)

4081

REMILATE

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, la patata ed il pomodoro

Composizione
gr. 3,5 di cymoxanil* puro
gr. 30 di rame metallo (di cui:
gr. 23 sotto forma di ossicloruro tetraramico
gr. 7 sotto forma di solfato)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il REMILATE è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro.
Il REMILATE agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
— Peronospora della vite
Usare gr. 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
— Peronospora della patata e pomodoro
Usare gr. 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere una azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con il TIOTOX 50.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Sulle colture indicate occorre che il prodotto, come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante da trattare.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4031 **del** 9.12.1980 **del Ministero della Sanità.**
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg. 1**

* Contiene fungicida CURZATE, ® marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.)

4082

KALIRAM P BIANCO

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, la patata ed il pomodoro

Composizione
gr. 3,5 di cymoxanil* puro
gr. 32,20 di rame metallo sotto forma di ossicloruro tetraramico
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il KALIRAM P BIANCO è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro.
Il KALIRAM P BIANCO agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
- Peronospora della vite
  Usare gr. 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
  Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
- Peronospora della patata e pomodoro
  Usare gr. 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere una azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con il TIOTOX 50.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Sulle colture indicate occorre che il prodotto, come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante da trattare.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4032 **del** 9.12.1980 **del Ministero della Sanità.**
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

* Contiene fungicida CURZATE, ® marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.)

4101

Insetticida in formulazione liquida a base di Carbaril, per la difesa di fruttiferi (melo, pero, pesco, noce); vite, agrumi (limone, arancio, mandarino, clementino); olivo, ortaggi (patata, cavolo, cavolfiore, carciofo, asparago, insalata, cipolla, pisello, fagiolo, fagiolino, pomodoro, melanzana, peperone); bietola, medicai, fiori, colture ornamentali e vivai.
Si usa per trattamenti liquidi contro Tignola e Tignoletta della vite, Tignola e Cocciniglie dell'olivo e degli agrumi, Dorifora della patata, Carpocapsa, Capua, Eulia, Cacoecia ed altre tortrici, Cidia ed Anarsia del pesco, Bega o Tortrice del garofano, Lepidotteri e Coleotteri in genere.
Il prodotto agisce nei confronti dei vari parassiti per contatto e per ingestione con prontezza e persistenza d'azione.

COMPOSIZIONE

— Carbaril puro . . . . (esente da Betanaftolo)	g.	47,5
— Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a .	g.	100

Contiene Glicol etilenico

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A. - Viale G. Galeazzo, 3 Milano -

Officina di produzione:
CHEMIA - SpA
S. Agostino (FE)

Registrazione n. 4101 del 29/11/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua, non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi)

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazioni, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare

Consigli terapeutici:

Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocivi
Ossigenoterapia se vi è cianosi

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un efficace insetticida per la lotta contro i vari Lepidotteri e Coleotteri nocivi e va impiegato alle seguenti dosi per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale:

— Contro Tignola e Tignoletta della vite **g. 150-200**

— Contro Tignola e larve di Cocciniglie dell'olivo e degli agrumi (limone, arancio, mandarino, clementino) **g. 150-200**

— Contro Dorifora della patata **g. 200-250**

— Contro Altica e Mamestra delle bietole, Fitonomo e Misurino dei Medicai **g. 200-250**

— Contro Carpocapsa del melo, pero, noce **g. 120-150**

— Contro Cidia del pesco, Anarsia, Capua, Archips, Eulia ed altre Tortrici **g. 200-250**

— Contro Cavolaia e Lepidotteri o Coleotteri di colture orticole (Cavolo, Cavolfiore, Carciofo, Asparago, Insalata, Cipolla, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Pomodoro, Melanzana, Peperone) e floreali **g. 150-250**.

— Contro Bega o Tortrice del garofano **g. 200-250**

Si impiega comunemente durante la stagione primaverile-estiva o comunque quando si ha la necessità di combattere i parassiti

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione dei prodotti alcalini quali Polisolfuri, Poltiglia bordolese, calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Non impiegare in fioritura.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

SIPCAM

410

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MANEB 80

Fungicida a base di Maneb per la lotta contro malattie crittogamiche del tabacco, pomodoro, garofano e per la disinfezione delle sementi.

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 Maneb puro
Sostanze diluenti e bagnanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

PRINCIPALI IMPIEGHI

Alla dose di gr. 200 per hl. di acqua distribuendo 10 hl. di miscela per ettaro (corrispondente a circa kg. 2 di prodotto per ettaro).

PERONOSPORA DEL TABACCO:
Da impiegarsi in pieno campo. Con clima favorevole alla Peronospora trattare ogni 7-8 giorni.

POMODORO:
Solo fino alla prima fioritura contro Alternariosi, Cladosporiosi, Septoriosi e Peronospora.

COLTURE FLOREALI:
Contro la Ruggine del garofano. Trattare dalla apparizione dei primi sintomi. Ripetere ogni 7-8 giorni.

Disinfezione delle sementi: Contro Carie, Carbone, Elmintosporiosi alla dose di gr. 150-200 per q.le di seme.

RACCOMANDAZIONI

Per le piante difficili a bagnarsi è raccomandabile aggiungere alla poltiglia di **Maneb 80** pronta per l'impiego il Bagnante Adesivo Liquido 2 alla dose di gr. 30 per hl.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il **Maneb 80** è compatibile con tutti gli insetticidi e acaricidi. Non mescolarlo con la poltiglia solfocalcica.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

E' tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

E/2 Reg.n.4102 del 11.12.1980

4123

REMILTINE

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, il pomodoro ed il tabacco

Composizione
gr. 4 di cymoxanil* puro
gr. 46,5 di mancozeb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
- Sintomi di intossicazione
  L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
  In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
  Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
  Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Caratteristiche
Il REMILTINE è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, del pomodoro (solo fino alla prima fioritura) e del tabacco.
Il REMILTINE agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
- Peronospora della vite
  Usare gr. 250-300 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
  Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
- Peronospora del pomodoro (solo fino alla prima fioritura)
  Usare gr. 300 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
- Pernospora del tabacco
  Usare gr. 300 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere una azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non impiegare in serra.

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con concimi fogliari contenenti boro.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4123 **del** 20.12.1980 **del Ministero della Sanità.**
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg. 1**

* Contiene fungicida CURZATE, ® marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.)

4124!

TRI-MILTOX P BIANCO

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite ed il pomodoro

Composizione
gr. 3,5 di cymoxanil* puro
gr. 12 di mancozeb puro
gr. 13 di rame metallo (di cui:
gr. 10 sotto forma di ossicloruro tetraramico
gr. 3 sotto forma di solfato)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
— Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Caratteristiche
Il TRI-MILTOX P BIANCO è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite e del pomodoro.
Il TRI-MILTOX P BIANCO agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
— Peronospora della vite
Usare gr. 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
— Peronospora del pomodoro (solo fino alla prima fioritura)
Usare gr. 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere una azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con il TIOTOX 50.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non impiegare durante la fioritura.
Occorre che il prodotto, come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante da trattare.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4124 del 15.12.1980 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

* Contiene fungicida CURZATE, ® marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.)

4135

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MANEB P 8

Anticrittogamico acuprico per trattamenti a secco

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 6,4 Maneb puro
Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenze, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.*

CARATTERISTICHE

Il **Maneb P8** è indicato per la lotta contro la Peronospora del tabacco in pieno campo, tuttavia può trovare impiego anche contro la Peronospora del pomodoro (solo fino alla prima fioritura), specialmente in quelle zone ove, per mancanza di acqua o di adeguata attrezzatura, non sia possibile o conveniente effettuare trattamenti liquidi.

ISTRUZIONI PER L'USO E DOSI

CONTRO LA PERONOSPORA DEL TABACCO IN PIENO CAMPO:

1) **Trattamenti primaverili:** dose kg. 15-20 per ettaro. Iniziare le applicazioni subito dopo la messa a dimora delle piantine effettuando tre o più trattamenti a settimana, a seconda che le condizioni ambientali siano più o meno favorevoli allo sviluppo della malattia.

2) **Trattamenti estivi:** dose kg. 25-30 per ettaro, secondo lo sviluppo delle piante.

Il numero delle applicazioni continuerà ad essere di tre o più alla settimana secondo le condizioni ambientali. Nel caso di condizioni sfavorevoli allo sviluppo della malattia, sarà sufficiente una sola applicazione settimanale.

Effettuare i trattamenti subito dopo e non prima dell'irrigazione.

N.B. Nella lotta contro la Peronospora del tabacco in semenzaio usare Dithane M 45.

CONTRO LA PERONOSPORA DEL POMODORO solo fino alla prima fioritura: Dose: kg. 15-20 per ettaro.

Eseguire i trattamenti alle stesse epoche in cui vengono applicati, per identiche malattie, gli usuali anticrittogamici (poltiglia bordolese, acuprici).

Dopo ogni pioggia ripetere il trattamento.

NORME D'IMPIEGO

Il **MANEB P8** va somministrato alle piante per mezzo delle comuni solforatrici (a mano, a zaino o a motore), curando che la nube polverulenta penetri nel fogliame, in modo da ricoprire le foglie, su ambedue le pagine, di un sottile velo di polvere fungicida.

Preferire, per l'esecuzione dei trattamenti, le ore del primo mattino o le ore serali, per ottenere una migliore adesione della polvere sulle piante bagnate dalla rugiada.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti gli insetticidi polverulenti.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 4135 **Ministero della Sanità del** 2.12.1980

E/1

4136

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

DITHEX POLVERE P 25

Polvere per trattamenti a secco contro la Peronospora del tabacco

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 16 Zineb puro
Diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: *alcool, olii, grassi. Nel casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.*
In caso di ingestione del prodotto può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

ISTRUZIONI PER L'USO E DOSI

IN SEMENZAIO:
Dose: gr. 600-1.900 per 100 mq. di semenzaio, secondo lo sviluppo delle piantine.
Iniziare i trattamenti quando le piantine sono alte circa 1 cm., effettuando regolarmente due polverizzazioni alla settimana. In caso di condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo della Peronospora tabacina, elevare a tre il numero dei trattamenti.
Ripetere il trattamento in caso di pioggia.

IN PIENO CAMPO:
1) Trattamenti primaverili:
Dose: kg. 15-20 per ettaro.
Iniziare le applicazioni subito dopo la messa a dimora delle piantine effettuando due trattamenti alla settimana.
2) Trattamenti estivi:
Dose: kg 20-30 per ettaro, secondo lo sviluppo delle piantine.
Il numero delle polverizzazioni continuerà ad essere di due o tre alla settimana.
Nel caso di condizioni sfavorevoli allo sviluppo della malattia, sarà sufficiente una sola applicazione settimanale.
Effettuare i trattamenti subito dopo e non prima delle irrigazioni.

NORME D'IMPIEGO

Il **DITHEX POLVERE P 25** va somministrato alle piante per mezzo delle comuni solforatrici (a mano, a zaino o a motore) curando che la nube polverulenta penetri tra il fogliame, in modo da ricoprire le foglie, su ambedue le pagine, di un sottile velo di polvere fungicida.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 4136 **Ministero della Sanità del** 20.12.1980

Contenuto netto Kg.

E/1

4137

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

DELFITHEX RAMATO

Fungicida organico contro malattie crittogamiche della vite, delle pomacee, del pomodoro e del garofano

Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:

gr. 60 Zineb puro

gr. 4 Rame metallo (da carbonato basico)

Sostanze diluenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Conservare la confezione ben chiusa.

— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

— Non operare contro vento.

— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*

— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*

— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*

— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.

Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.*

In caso di ingestione del prodotto può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

INTERNAZIONALE B.P.D.

BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.

Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

CARATTERISTICHE E DOSI

Il **DELFITHEX RAMATO** è un fungicida organico con tracce di rame, impiegato contro le malattie crittogamiche delle piante di seguito indicate in sostituzione della poltiglia bordolese.

Dose d'impiego gr 250-300 in 100 lt d'acqua

APPLICAZIONI

IN FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

Contro Ticchiolatura del pero e del melo, Peronospora della vite.

In orticoltura:

Contro Peronospora, del pomodoro solo fino alla prima fioritura

In floricoltura:

Contro Ruggine del garofano

Nell'effettuare i trattamenti, curare un'uniforme irrorazione delle piante operando con getto ben nebulizzato in modo che queste risultino completamente bagnate dal liquido e protette in ogni loro parte dai principi attivi del **DELFITHEX RAMATO**.

Preparazione della miscela acquosa.

Aggiungere il **DELFITHEX RAMATO** nella dose occorrente a poca acqua e, dopo aver agitato, versare la poltiglia ottenuta nella quantità di acqua necessaria per portare alla richiesta concentrazione

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con altri prodotti della nostra gamma

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Su varietà di melo Abbondanza • Bedford • - Black Ben Davis Black Stayman - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winecap - Black Davis - King Davis - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan);

e di pero

Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Butirra Giffard, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Kaiser, Mora, Passacrassana, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, B.C. William, Zecchermanna.

cuprosensibili allo zineb, se ne sconsiglia l'impiego.

Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

• **Attenzione** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato •

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 4137 **Ministero della Sanità del** 20.12.1980

Contenuto netto Kg.

E/1

4138

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

DELFITHEX

Fungicida organico di sintesi per la prevenzione e la lotta contro malattie delle pomacee, pomodoro, garofano, tabacco.

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 65 Zineb puro
Sostanze coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.

Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: *alcool, olii, grassi. Nel casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.*
In caso di ingestione del prodotto può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 4138 **Ministero della Sanità del** 20.12.1980

E/1

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il **DELFITHEX** è un fungicida efficace, di facile impiego.
Versare il prodotto in poca acqua e mescolare accuratamente; indi aggiungere la quantità d'acqua necessaria tenendo la miscela costantemente agitata.
L'aggiunta di Bagnante Adesivo Liquido 2 (gr. 20 per hl.) assicura una migliore distribuzione della miscela sulle piante.

In frutticoltura: Contro la Ticchiolatura del pero, del melo nei trattamenti preventivi a gr. 200-300 per hl. d'acqua.

In orticoltura: Contro la Peronospera, l'Alternariosi del pomodoro solo fino alla prima fioritura: gr. 200-300 per hl. d'acqua.

In floricoltura: Contro la Ruggine del garofano: gr. 200-300 per hl. d'acqua.

In tabacchicoltura: Contro la peronospora del tabacco: gr. 200-300 per hl. di acqua.

In pioppicoltura: Contro Marssonina: kg. 5-5,5 per ettaro e per trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA

Il DELFITHEX è miscibile con i prodotti anticrittogamici, insetticidi e acaricidi della nostra gamma di produzione.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per le seguenti varietà di pere sensibili allo zineb: Abate Fetel, Amelia, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

4165

DITHIOVIT

Anticrittogamico, in polvere bagnabile, a base di zolfo e mancozeb per la lotta contro le malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali

Composizione
gr. 53,5 di zolfo puro (selenio assente)
gr. 21,5 di mancozeb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
— Sintomi di intossicazione
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc).
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione Purganti salini Cure sintomatiche
Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Modalità di impiego
Contro malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali (Oidio, Ruggini, Septoriosi) kg. 5 - 7 di DITHIOVIT per ettaro
L'intervento deve essere effettuato alla comparsa delle prime pustole di Oidio sull'ultima foglia.
Distribuire la dose prescelta in 600-800 litri per ettaro con un mezzo irroratore funzionante ad una pressione di 12-15 atmosfere, alfine di ottenere la migliore bagnatura possibile dell'apparato aereo della coltura.

Preparazione della poltiglia
Versare la quantità necessaria di DITHIOVIT nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore, portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando

Da non applicare con mezzi aerei.

Non impiegare in serra.

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Per la preparazione di miscele (DITHIOVIT + insetticidi) basta aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di DITHIOVIT, già pronta per l'uso, mescolando a fondo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4165 del 20.12.19[illegible] del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg** [illegible]

UTAZINEB S CAFFARO

Polvere secca a base di zineb e zolfo

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Zineb puro	g 30
Zolfo puro (esente da selenio)	g 8
Coformulanti	q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla umidità e calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia:
In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.
In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in Centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
Vite
Peronospora, Oidio . . . . kg 15-25/ha
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)
Peronospora, Alternariosi, Septoriosi . . . . kg 15-25/ha
Garofano
Ruggine, Septoriosi . . . . kg 15-25/ha

Distribuire il prodotto uniformemente con polverizzatori.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con Olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, con Diclofluanide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 4175 del Ministero della Sanità del 17-2-1981

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO Kg**

4186

ZIMANEB 60

POLVERE BAGNABILE A BASE DI MANEB E ZINEB
COMPOSIZIONE gr 100 contengono: MANEB puro gr 55; ZINEB puro gr 5; Bagnanti, sospensivanti ed inerti q.b. a gr 100.
CLASSE III **ATTENZIONE! Manipolare con prudenza.**

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: — Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. — Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontana dall'umidità e calore. — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. — Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Consigli terapeutici: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello **ZINEB** può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: Lo ZIMANEB 60 si prepara versando la dose necessaria nel totale quantitativo d'acqua ed agitando alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea. Viene impiegato alle seguenti dosi: VITE: Contro Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero: gr 250 350 per ettolitro. POMACEE: tro. POMODORO solo fino alla prima fioritura: Contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi: gr 200 250 per ettolitro. PIOPPO: Contro Marsonina, Ticchiolatura: gr 400 per ettolitro. TABACCO: Contro Peronospora Tabacina: gr 200 per ettolitro. GAROFANO in pieno campo: Contro Ruggine, Alternariosi: gr 200 250 per ettolitro. CEREALI IN CAMPO: Contro Elminthosporium sp., Rhynchosporium secalis, Alternaria sp., Dilosphospora alopecuri, Fusarium sp., Cladosporium sp., Ustilago sp., Tilletia sp., Ophiobolus sp., Cercosporella sp., Rhizoctomia sp., Drechslera sp., Cochliobolus savitus, Pithium sp., Aspergillus Flavus: Kg 2-2,5 per ettaro su 10 hl di acqua.
CONCIA DEI SEMI
GRANO: Contro Carie (Tilletia tritici), Fusariosi (Fusarium nivale): gr 200 per Q.le di seme. MAIS: Contro Fusariosi (Fusarium moniliformi), Gibberella (Gibberella zeae): gr 400 per Q.le di seme. RISO: Contro Brusone (Pericularia Oryzae), Fusarium sp.): gr 250/350 per Q.le di seme. BARBABIETOLA: Contro Mal del Piede (Phoma batae), Fusariosi (Fusarium sp.), Mal vinato (Rhizoctonia solani), Cercosporiosi (Cercospora beticola): gr 800 per Q.le di seme. SEMENTI ORTICOLE: Contro Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Phitium sp.,: gr 300/800 per Q.le di seme a secondo del tipo di seme.
DIVIETO D'IMPIEGO: — Divieto d'impiego in serre. — Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Lo ZIMANEB 60 è compatibile con i più comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione acida o alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può produrre fenomeni di fitotossicità su alcune varietà di Pero sensibili allo Zineb (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna). Può provocare fitotossicità sui germinelli di Tabacco. —
RISCHI DI NOCIVITA' Il prodotto è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Reg. N. 4186 del 17-2-81 del Ministero della Sanità

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 8
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

officina di produzione DIACHEM S.p.A. **ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)**

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso g**

RAME BLEU "50"

Anticrittogamico a base di ossicloruro tetraramico contenente il 50% di rame metallo

Composizione

gr. 50 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- — Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- — conservare la confezione ben chiusa;
- — non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- — non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- — non operare contro vento;
- — evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- — dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Viticoltura	Peronospora	0,3 - 0,4% = gr. 300 - 400
Olivicoltura	Occhio di pavone	0,3 - 0,4% = gr. 300 - 400
Bieticoltura	Cercospora	0,3 - 0,4% = gr. 300 - 400
Frutticoltura		
— trattamento pre-floreale del melo e del pero	Ticchiolatura	0,25 - 0,3% = gr. 250 - 300
— trattamento invernale delle drupacee	Coryneum, Bolla	0,8 - 1% = gr. 800 - 1000
Orticoltura (pomodoro - patata - carciofo - cardo - cavolo - cipolla - pisello - fagiolo - spinacio - sedano - cucurbitacee)	Peronospore Antracnosi Septorie	0,25 - 0,4% = gr. 250 - 400
Floricoltura	Septorie Alternarie	0,25 - 0,3% = gr. 250 - 300

Preparazione della poltiglia

Stemperare il quantitativo stabilito di RAME BLEU « 50 » in poca acqua, mescolare e portare al volume previsto.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità

Il RAME BLEU « 50 » è miscibile con gli insetticidi e acaricidi SANDOZ (esclusa EUFITANA ESTIVA) ed in genere con tutti gli antiparassitari, normalmente consigliati per le colture sulle quali viene utilizzato lo stesso RAME BLEU « 50 ».

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non si deve trattare durante la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) = Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonatham, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

(**) = Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Rischi di nocività

E' tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
SANDOZ Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4213 del 17-2-1981 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg. 10

4216

SUMICIDIN

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Insetticida, sotto forma di concentrato emulsionabile, ad azione rapida di contatto ed ingestione a dosi ridotte e con effetto prolungato, associando all'azione diretta un effetto repellente sugli insetti.

COMPOSIZIONE

— fenvalerate, puro . . . . g 11
— coadiuvanti (emulsionanti, diluenti) e solventi . q.b. a g 100

CONTIENE XILOLO

SUMICIDIN è un marchio registrato della Sumitomo Chemical Co., Osaka (Giappone)

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Evitare di respirarne i vapori;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva);
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione e per contatto.

Sintomi di intossicazione:

Nervosismo, ansietà, tremori e convulsioni. Depressione respiratoria e delle funzioni cardiovascolari e renali.

Consigli terapeutici:

Se ingerito provocare il vomito o provvedere con debita cautela a lavanda gastrica. Impiegare sedativi del sistema nervoso centrale quali barbiturici a rapida azione, a piccole dosi oppure benzodiazepan per via endovenosa. Sostenere opportunamente la respirazione, controllando ed aiutando le funzioni cardiovascolari e renali.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero in centro di rianimazione per attuare la terapia suddetta.

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento: S.I.A.P.A. S.p.A. - S. Vincenzo di Galliera (Bologna)

Registrazione del Ministero della Sanità n.4216 del 27/1/1981

MODALITA' DI IMPIEGO

Il modo specifico di azione per contatto ed ingestione prevede che le irrorazioni siano effettuate con cura per bagnare bene le parti vegetative della coltura infestata.

Dosi di applicazione

Colture	Parassiti combattuti	Dosi di impiego cc per 100 litri d'acqua di soluzione
Arancio	Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) Ceroplaste (Ceroplastes rusci)	25
	Aleurode (Aleurodes citri)	150
Pero	Psilla (Psylla piri)	100 trattamenti alla fine inverno 150-200 trattamenti inizio attacco
Melo	Carpocapsa (Carpocapsa pomonella)	50
Pesco	Afide verde (Myzus persicae) Nota - Applicazioni all'inizio dell'infestazione quando le foglie non sono accartocciate	25
	Tignola orientale (Cydia molesta)	50
Vite	Tignole (Lobesia botrana, Clysia ambiguella)	25

Modalità di applicazione

Diluire la quantità precisata occorrente di SUMICIDIN in poca acqua, e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SUMICIDIN è compatibile con i normali antiparassitari usati per impieghi contro altri parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e molto tossico per le api.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti.
— 60 giorni, prima della raccolta degli aranci.
— 30 giorni, prima della raccolta delle altre colture indicate in etichetta.

«**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

«**DA NON VENDERSI SFUSO**» Contenuto: l

4226

SELEVIT C

POLVERE BAGNABILE A BASE DI ZINEB E ZOLFO COLLOIDALE

Composizione gr 100 di prodotto contengono: ZINEB puro gr **45**; ZOLFO puro (esente da Selenio) gr **20**; Coformulanti q.b. a gr **100**
CLASSE III **ATTENZIONE! Manipolare con prudenza.**

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontana dall'umidità e calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Consigli terapeutici: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello **ZINEB** può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: Il SELEVIT C si prepara versando la dose necessaria nel totale quantitativo d'acqua ed agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea. VITE: Peronospora, Oidio gr 300-400 per 100 litri d'acqua. POMACEE: Ticchiolatura, Mal Bianco, gr 300-400 per 100 litri d'acqua. POMODORO solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Antracnosi, Verticillosi, Alternariosi gr 300-400 per 100 litri d'acqua. GAROFANO: Ruggine, Alternariosi gr 300-400 per 100 litri d'acqua.
DIVIETO D'IMPIEGO: Divieto d'impiego in serre. - Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione acida o alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, Calce, ecc.) e di quelli a base di olii minerali semplici o attivati, Captano, Binapacryl, Euparen, DDVP, DNOC. Sono da sconsigliare miscele con Dodina. Il suo impiego deve essere distanziato di almeno tre settimane da quello degli olii minerali e del Captano.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap - di PERE: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Buona L. Davranches, Conference, Coscia, Contessa di Parigi, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Kaiser Alexander, Mora, Olivier de Serres, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, William, Zucchermanna - di VITE: Sangiovese. Miscelato a prodotti ftalimidici può causare fitotossicità su Stark delicious, Starking e Stayman Winesap. Si consiglia di eseguire i trattamenti nelle ore fresche della giornata, specialmente in piena estate.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Reg. N. 4226 del 27-03-1981 del Ministero della Sanità.

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.89 - 55.81.90

Officina di produzione: bimex s.p.a. - via cogolla, 5 - isola vicentina (vi)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg**

4246

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

DITHANE* Z - 78

Fungicida organico di sintesi per la prevenzione e la lotta contro malattie di seguito indicate delle pomacee, del pioppo, del pomodoro (solo fino alla prima fioritura) e del tabacco.

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 65 Zineb puro
Sostanze coadiuvanti e disperdenti quanto basta a 100.

*Marchio reg. Rohm & Haas - Philadelphia, U.S.A.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: *alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.*
In caso di ingestione del prodotto può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 4246 **Ministero della Sanità del** 27.3.1981

E/1

MODALITA' D'IMPIEGO

Il DITHANE Z 78 è un fungicida efficace, di facile impiego, possiede adesività, non macchia e non ustiona la vegetazione.
Versare il prodotto in poca acqua e mescolare accuratamente; indi aggiungere la quantità d'acqua necessaria tenendo la miscela costantemente agitata.
L'aggiunta di Bagnante Adesivo Liquido 2 (gr. 50 per hl.) assicura una migliore distribuzione della miscela sulle piante.

Principali impieghi del Dithane Z-78

Contro la Ticchiolatura - del pero, del melo nei trattamenti preventivi a gr. 200-300 per hl. d'acqua
Contro la Peronospora, l'Alternariosi del pomodoro solo fino alla prima fioritura gr. 200-300 per hl. d'acqua
Contro la ruggine del garofano: gr. 200-300 per hl. d'acqua.
Contro la peronospora del tabacco gr. 200-300 per hl. d'acqua
In pioppicoltura: contro Marssonina Kg 5-5,8 per ettaro e per trattamento.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il DITHANE Z-78 è miscibile con i prodotti anticrittogamici, insetticidi e acaricidi della ns. gamma di produzione

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'

Varietà di peri sensibili allo Zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

424

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

BENFRUT B

Fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura del pero e del melo
Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 10 Benomyl* puro
gr. 32,5 Dodina pura
Coformulati quanto basta a 100

p.a. del Benlate
marchio reg. E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea. Eczemi cutanei resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione.

Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il **BENFRUT B** è un fungicida organico a base di Benomyl e di Dodina, indicato nella lotta preventiva e curativa contro la ticchiolatura del melo e del pero.

Grazie all'azione sistemica del Benomyl, unita all'azione citotropica della Dodina, il **BENFRUT B** può impiegarsi a cadenza fissa, dal primo all'ultimo trattamento.

APPLICAZIONI E DOSI

Contro la ticchiolatura del melo e del pero:
a) trattamenti pre-florali e primi post-florali: cadenza 8 giorni;
b) trattamenti post-florali e successivi: cadenza 8-10 giorni.

Dose d'impiego: gr. 100/hl.

Il prodotto si può usare inoltre negli interventi curativi (entro 72 ore dall'inizio della pioggia infettante); e come eradicante sulle macchie di ticchiolatura a gr. 190/hl.

Diluire la dose del prodotto in poca acqua, indi versare la miscela così ottenuta nell'irroratrice già riempita, mescolando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

« L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta ».

COMPATIBILITA'

E' generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Naftene, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con gli olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività;
evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° C.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non deve essere distribuito durante la fioritura.

Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 gg prima del raccolto

AVVERTENZA

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. N. 4249 **Ministero della Sanità del** 27.3.81

E/1

4276

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

SUMITHION GRANULARE

Insetticida

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 3 Fenitrothion puro
Supporti ad inerzia chimica quanto basta a 100.

prodotto dalla SUMITOMO Chemical Co.
OSAKA (Giappone)
Formulato e distribuito dalla RAVIT S.p.A.
TORINO

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni

Morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.

La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

CARATTERISTICHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **SUMITHION GRANULARE** è efficace contro insetti e piccoli crostacei presenti in risaia, quali Chironomi e Coppette (Criops), nonché contro la Piralide del mais.

RISAIA
Contro Chironomi, Coppette, alla dose di kg. 15 per ettaro.

MAIS
Contro Piralide, alla dose di kg. 20-30 per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n 4276 **Ministero della Sanità del** 27.3.81
E/1

4279

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

FITOIL BIANCO

Emulsione insetticida di olii minerali per la lotta contro le cocciniglie e le uova svernanti del ragno rosso e di altri parassiti

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 80 Olio minerale (di cui il 95% di insulfonabili)
Sostanze emulsionanti e disperdenti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **FITOIL BIANCO** è un prodotto composto di olii minerali raffinati (95% di insulfonabili). Non produce ustioni ed è tollerato perfino da piante delicatissime coltivate in serra; può essere impiegato anche nei trattamenti estivi nei climi più caldi.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il **FITOIL BIANCO** può essere vantaggiosamente impiegato sia in trattamenti invernali che in trattamenti primaverili-estivi da solo o in unione con il **FITOFOS 20**.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. N. 4279 Ministero della Sanità del 20.3.1981
E/1

DOSI

In frutticoltura:

Pomacee: melo e pero.

Drupacee: Pesco, albicocco, susino e ciliegio.

Al risveglio vegetativo: contro l'Aspidiotus Perniciosus, Diaspis, Petnagona, uova snervanti di Ragno Rosso, di Afidi, uova di Psilla, crisalidi di Cemiostoma: kg. 2-2,5 per hl. di acqua.

Drupacee nel periodo estivo: contro la Diaspis Pentagona in corrispondenza della fuoriuscita delle Neanidi di prima e seconda generazione a kg. 0,400-0,600 per hl. d'acqua.

In viticoltura:

Al risveglio vegetativo contro le Cocciniglie: kg. 2-2,5 per hl. d'acqua più **FITOFOS 20** gr. 200-300 per hl. d'acqua.

In agrumicoltura:

Contro l'Acaro delle Meraviglie alla fine della vegetazione autunnale a kg. 2 per hl. d'acqua.

Contro le Cocciniglie degli agrumi nel periodo maggio-agosto a kg. 1-1,5 più **FITOFOS 20**, gr. 100-200 per hl. d'acqua.

Floricoltura in campo:

Contro le Cocciniglie (Aspidiotus Hederae, Parlatoria Pergandei, Biancarossa, Aonidiella Perniciosa, Aulacaspis rosae e Cocciniglia bianca a kg. 1-1,200 più gr. 200 di **FITOFOS 20**.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **FITOIL BIANCO** è miscibile al Viricuivre Micronisé, Delfithex, Dithane Z 78, Dithane M-45, Zirex 90, Fitofos 20, Delfos M. Non è miscibile con prodotti a base di Zolfo, di Karathane e alla Poltiglia Bordolese o Solfocalcica.

« **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il trattamento di **FITOIL BIANCO** deve essere distanziato di almeno 15 giorni dal trattamento con Zolfi bagnabili, con Polisolfuri, con Poltiglia Bordolese o con prodotti contenenti Zolfo o Karathane.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

4280

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

HERBIDAL 80

Diserbante selettivo a base di sale sodico dell'acido 2,4 D utilizzabile nel diserbo dei cereali, dei canali di bonifica

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 80 di 2,4 D puro (da sale sodico)
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere innocue dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per la dermatosi.

Controindicazioni:
E' sconsigliata la digitale.

CARATTERISTICHE

L'HERBIDAL 80 ha uno spettro d'azione erbicida sulle infestanti dicotiledoni. E' selettivo per i cereali.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN CEREALICOLTURA: l'HERBIDAL 80 si impiega per il diserbo dei cereali, siano essi di semina autunnale che primaverile; in ogni modo è indispensabile che il trattamento venga effettuato tra la fine dell'accestimento e lo stadio che precede la formazione della botticella.

La dose di impiego va da kg. 0,8 a kg. 1,3 per ettaro.

DISERBO CANALI: La flora infestante le sponde dei canali di bonifica è molto varia; essa è rappresentata in gran parte da canna, tifa, ma anche da piante dicotiledoni quali artemisia, poligonum spp., romice, menta, ortica. Mentre sulle canne e monocotiledoni si agisce con prodotti ad azione specifica (GRAMITOX), sulle dicotiledoni si agisce con l'HERBIDAL 80 che viene impiegato alla dose dello 0,3-0,4%.

DISERBO DEGLI AGRUMETI: Viene effettuato con prodotti specifici: Agrumex. Tuttavia possono manifestarsi ricacci di convolvolo che è sensibile all'HERBIDAL 80. Pertanto si dovranno trattare le chiazze ricoperte di Convolvolo con l'HERBIDAL 80 alla dose di kg. 1,3 per ettaro, facendo bene attenzione che anche le più minute particelle di prodotto non vadano a contatto con le foglie delle piante di agrumi.

DISERBO PRATI E PASCOLI: Contro Ferula e Romice kg. 0,800-1,300 per ettolitro per trattamenti localizzati sulle infestanti; non irrigare il prato nei 6 gg. successivi al trattamento.

Spollonatura chimica del nocciuolo: l'HERBIDAL 80 si può impiegare per la spollonatura chimica del nocciuolo. Impiegare gr. 400-500 di prodotto per 100 litri di acqua, localizzando scrupolosamente il getto sui polloni erbacei dell'annata da distruggere, per evitare danni alla piante madre.

Effettuare il trattamento quando i polloni erbacei hanno emesso la quinta foglia.

CONDIZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO

L'HERBIDAL 80 ha un'azione non immediata; è necessario che il prodotto permanga sulla pianta per un certo periodo prima della pioggia. Si raccomanda pertanto di eseguire il trattamento quando non si temono piogge imminenti.

La quantità di poltiglia da distribuire può variare a seconda del tipo di irroratrice di cui si dispone.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con altri erbicidi secondo suggerimenti dei tecnici di zona e, comunque, dopo averne saggiato il comportamento.

« **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Causa la sua attività, anche minime quantità di prodotto possono provocare danni alle colture sensibili vicine a quelle da trattare come vite, leguminose, alberi da frutta, ortaggi, ecc.

Evitare, pertanto che il prodotto giunga a contatto con le colture anche sottoforma di vapori portati dal vento.

Pur essendo il prodotto poco volatile, si raccomanda di non trattare in prossimità di colture sensibili agli ormonici. Operare con irroratrici a debole pressione in modo da evitare la formazione di gocce troppo piccole che possono essere trasportate da deboli correnti d'aria sulle colture vicine. Dirigere i getti scrupolosamente sulle colture da trattare.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZE

Trattare durante le giornate senza vento e con temperatura dolce.

Non gettare i residui della soluzione in acqua che debba servire per la preparazione di poltiglie per trattamenti antiparassitari e per irrigazione.

Pulire accuratamente gli apparecchi e gli attrezzi usati per il trattamento con soda al 5%.

I recipienti di legno e quelli porosi non sono più utilizzabili per la preparazione e distribuzione di insetticidi o anticrittogamici.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 4280 Ministero della Sanità del 1-10-1981
E/2

EFISAN F.P.

Anticrittogamico, in polvere bagnabile, costituto da: rame e folpet

Composizione
gr. 20 di rame metallo (sotto forma di solfato, ossicloruro tetraramico e carbonato basico)
gr. 30 di folpet puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Sintomi di intossicazione

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Viticoltura	Peronospora e Botrytis	0,25 - 0,4% = gr. 250 - 400
Orticoltura (patata, pomodoro, melanzana, peperone, cipolla e altre colture ortive)	Alternarie, Antracnosi, Peronospore, Septoria e Botrytis	0,25 - 0,4% = gr. 250 - 400
Floricoltura	Septoria, Alternaria e Botrytis	0,25 - 0,4% = gr. 250 - 400

Versare lentamente l'EFISAN F.P. nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.
Intervenire secondo le necessità dettate dall'andamento stagionale e dalla biologia del parassiti.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
L'EFISAN F.P. è miscibile con gli antiparassitari normalmente utilizzati sulle culture ove viene impiegato lo stesso EFISAN F.P., ad eccezione di: TIOTOX « 50 » e poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco.
Per la preparazione delle politiglie miste, ad esempio EFISAN F.P. + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di EFISAN F.P. da solo, soltanto che, prima di portare a volume con acqua, si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione dell'EFISAN F.P. con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di EFISAN F.P., già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: Devono trascorrere 20 gorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.

Fitotossicità
Sulle culture indicate occorre che l'EFISAN F.P.,come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante al momento del trattamento.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta e sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4295 del 1.4.19[illegible]1 .... del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

4297

Fumigante nematocida per il controllo di tutte le specie di nematodi viventi nel terreno.

II CLASSE

Composizione (riferita a 100 g):

- 1.3 dicloropropene puro	g 92.3
- Prodotti correlati	g 6.7
- Coformulanti	q. b. a g 100.0

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Tenere lontano dal fuoco e dalle fonti di calore.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico — tempo di latenza: anche parecchie ore.
Sintomi neurologici: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.
Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero da epatite tossica.
Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse, congestione e edema polmonare.
Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea.
Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.

Consigli terapeutici di massima e condizionati dal caso:

Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone.
Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici. Lavare gli occhi con molta acqua corrente per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione, e se non è presente vomito, praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da instillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 gr. di solfato di sodio o di magnesio. Terapia sintomatica.
In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena: cortisonici; ossigeno se necessario; se è presente edema polmonare somministrare anche diuretici (tiazide).
Nei casi gravi è indispensabile il ricovero in Centro di rianimazione.

Controindicazioni: non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte e olio.

Modalità d'impiego:

Caratteristiche: il TELONE* II libera il terreno da tutte le specie di nematodi, tra cui: l'Anguillula della bietola, l'Anguillula della patata, l'Anguillula delle piante erbacee e floreali, l'Anguillula delle radici, l'Anguillula del frumento.

Dosi e modalità d'impiego:

Le dosi d'impiego del TELONE* II sono di 100-130 litri operando su terreni leggeri e di 130-170 litri operando su terreni pesanti o di medio impasto. Per il controllo dei nematodi cisticoli si consigliano le dosi più alte, mentre per il controllo delle forme libere si suggeriscono le dosi più basse.
I trattamenti si effettuano iniettando il prodotto nel terreno previamente lavorato, mediante pali iniettori. Le buche debbono raggiungere la profondità di 10-15 cm ed essere distanziate di 30-40 cm.
Dopo aver eseguito il trattamento, il terreno deve essere rullato ed irrigato onde evitare l'evaporazione del prodotto. I migliori risultati si ottengono effettuando i trattamenti quando la temperatura del terreno si aggira sui 15°C ed il terreno possiede il grado di umidità necessario per una buona semina.
Avvertenza: chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).
Divieto d'impiego in serra ed in ambienti chiusi.

«Da non applicare con mezzi aerei».

Compatibilità: il TELONE* II non è compatibile con altri principi attivi e deve essere applicato da solo.

Fitotossicità:

Essendo i vapori del TELONE* II fitotossici i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili quali pesco, vite, pioppi, ecc.
Rischi di nocività: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Intervallo da rispettare:

Tra l'applicazione del fumigante e la semina o il trapianto sul terreno trattato dovrà intercorrere un periodo di almeno 28 giorni.
Prima di effettuare la semina o il trapianto, sarà bene sottoporre il terreno trattato con fumigante ad una leggera lavorazione.
«Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

* Marchio registrato - The Dow Chemical Company

Prodotto nello Stabilimento della **The Dow Chemical Co. di Stade - Germania**

DA NON VENDERSI SFUSO

ATTENZIONE! PRODOTTO MOLTO INFIAMMABILE!

Dow Chemical S. p. A.
Via R. Lepetit, 8 - Milano

Registrazione del Ministero della Sanità N. 4297 del 18-5-1981

Confezione da Kg

CHIMICLOR

DISERBANTE SELETTIVO PER IL MAIS

COMPOSIZIONE

Allachlor puro	g 43,2
Emulsionanti e solventi	q.b. a 100
(contiene Xilolo ed alcool isobutilico)	

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il CHIMICLOR agisce per assorbimento radicale sulla maggior parte delle infestanti annuali da seme, particolarmente le graminacee (Giavone, Poa), comprese Digitaria, Sotaria, Panico Americano (Panicum dicotoniflorum), nonchè su alcune dicotiledoni (Amaranto, Capsella, Camomilla, Erba porcellana, Senape, Veronica).

MODALITA' DI IMPIEGO
Il diserbo si effettua in pieno campo, localmente su strisce larghe 20-25 cm. lungo le file. In quest'ultimo caso la dose di impiego va rapportata all'effettiva superficie trattata.
Preparare accuratamente il terreno affinchè non rimangano zolle e zollette.
Impiegare il prodotto subito dopo la semina o qualche giorno dopo, ma prima della nascita delle infestanti, alla dose di lt. 3 in associazione a kg. 2/ha di Malermais; il prodotto può essere anche usato da solo dove predominano le graminacee resistenti all'Atrazina, e nel mais di seconda raccolta alle dosi di lt. 6/ha, che possono essere ridotti a lt. 5/ha nei terreni sciolti e aumentati a lt. 7/ha nei terreni organici.

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Diluire il prodotto in 4-5 o più Hl di acqua e distribuire l'emulsione uniformemente a mezzo delle comuni irroratrici a mano o meccaniche.
Perchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 8-10 mm. cada entro 2 settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad una irrigazione a pioggia superficiale.
Le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento per rompere la crosta o per arieggiare il terreno, devono essere molto superficiali per non portare in superficie il terreno con semi non contenenti il CHIMICLOR.

Preparazione dell'emulsione: versare il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Avvertenza: le coltivazioni di mais trattate con il formulato non possono essere consociate ad altre colture.
Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione dell'emulsione erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con altri erbicidi a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dall'applicazione del diserbante alla semina delle altre colture fare intercorrere 3-4 mesi quindi procedere ad un'aratura prima della semina.

— Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
— Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero

della Sanità n. 4298 **del** 1 - 4 - 1981

CHIMIBERG
BERGAMO

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO Kg.5

Prodotto nello Stabilimento « DIACHEM S.p.A. »
di Albano S. Alessandro (Bergamo)

4304

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

OSSICLORURO DI RAME CREMA 25

Anticrittogamico

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 25 di rame metallico (Sottoforma di Ossicloruro)
gr. 30 di Olio minerale (Insulfonabilità 95%).
Acqua, Sostanze diluenti e coadiuvanti quanto basta a 100

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

L'Ossicloruro di rame crema 25 può essere impiegato contro la maggior parte delle malattie crittogamiche delle piante.

E' indicato per la lotta contro le seguenti malattie, alle dosi di seguito precisate:

Peronospora della vite: gr. 800-1000 per 100 litri d'acqua.

Occhio di Pavone e Lebbra dello olivo: gr. 600-1000 per 100 litri d'acqua.

Bolla e gommosi del pesco, albicocco, ciliegio, susino e mandorlo: gr. 1500-2000 per 100 litri d'acqua.

In trattamenti al bruno:

Ticchiolatura del melo e del pero in trattamenti pre-florali: gr. 500-1000 per 100 litri d'acqua.

In trattamenti post-florali: gr. 500 per 100 litri d'acqua.

In trattamenti invernali: gr. 2000 per 100 litri d'acqua.

Aggiungere, alla dose occorrente di prodotto, poca acqua, agitando con un bastone fino ad ottenere una emulsione omogenea. Aggiungere quindi la quantità di acqua necessaria per ottenere la concentrazione voluta.

Irrorare l'emulsione sulle piante a mezzo di comuni pompe a mano o a motore, curando ua perfetta nebulizzazione, in modo che risultino bagnate entrambe le pagine delle foglie.

Da non applicare con mezzi aerei

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.

Su pesco, susino e varietà di melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana; e di pero: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard; cuprosensibili: il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

Reg. n. 4304 **Ministero della Sanità del** 1.4.1981

E/1

ATRASAN

Erbicida selettiva a base di atrazina per il diserbo del mais e del sorgo

Composizione
gr. 47,5 di atrazina pura
bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità di azione
Il prodotto agisce per assorbimento radicale e, secondariamente, per assorbimento fogliare su un gran numero di infestanti annuali, come Giavoni, Erba morella, Borsa pastore, Amaranto, Poe, Farinello, Persicaria, Stellaria.
Risultano resistenti al prodotto le infestanti ad apparato radicale profondo, rizomatoso o in genere perenni, quali: Viluschie, Gramigne, Sorgo selvatico, Digitaria.

Modalità di impiego
L'ATRASAN può essere impiegato in pre-emergenza e in post-emergenza della coltura.
La dose consigliata è di 4 kg/ha di ATRASAN in 600-1000 l/ha di acqua.
I trattamenti di pre-emergenza sono da preferirsi in quanto consentono di eliminare le infestanti già dal momento della loro germinazione, sfruttando esclusivamente l'azione per assorbimento radicale del prodotto; i risultati conseguiti da tali interventi sono condizionati da un certo grado di umidità del terreno o comunque da una pioggia o irrigazione entro i primi 10 giorni dopo il trattamento.
In post-emergenza intervenire quando le infestanti non superano i 6-8 cm di altezza, sfruttando così anche l'azione per assorbimento fogliare del prodotto; l'aggiunta di 10-12 kg/ha di olio bianco facilita l'assorbimento fogliare dell'atrazina. Il trattamento di post-emergenza con aggiunta di olio bianco è indispensabile qualora si debba operare su terreni torbosi o comunque ricchi di sostanza organica. Si consigliano prove parcellari per varietà poco note o di recente acclimatazione.

Preparazione della poltiglia
Stemperare bene il quantitativo prescelto di ATRASAN in poca acqua onde ottenere una poltiglia senza grumi; diluire poi sino alla concentrazione desiderata, sempre rimescolando.
Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con i più comuni diserbanti e con gli olii bianchi, ma non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichette e per tanto non si devono contaminare tali colture. Le pompe e gli utensili impiegati per il diserbo non devono essere usati per altri trattamenti antiparassitari se non siano stati preventivamente lavati con acqua e soda.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per i pesci e per tanto non va impiegato come diserbante acquatico e non devono essere contaminati fiumi, laghi e canali.

Avvertenza
Dal trattamento erbicida alla semina di culture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre culture (es. bietole, tabacco, ecc.). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi. Tale intervallo deve essere rispettato anche per le ripetizioni del trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4322del ..16.4.1981.............. del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

4330

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

IPRODIAL M

Fungicida organico di contatto
Polvere bagnabile

Composizione:

gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 20 di Iprodione * puro
gr. 60 di Mancozeb ** puro
Coformulanti quanto basta a 100

* principio attivo del Rovral * - marchio reg. Rhône Poulenc
** brevetto Rohm and Haas

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: *alcool, olii, grassi. Nel casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.*
In caso di ingestione del prodotto può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 4330 **Ministero della Sanità del** 18.5.1981
E/1

CARATTERISTICHE

L'IPRODIAL M è un fungicida organico ad azione di contatto contro: Botrite e Peronospora della vite; Monilia, Botrite, Ruggine e Alternaria del garofano e della rosa.

APPLICAZIONI E DOSI

— **Viticoltura:** contro Botrite e Peronospora a kg. 3,8 per ettaro, distribuiti con 10-15 ettolitri d'acqua.
Il prodotto va impiegato durante l'intero periodo vegetativo della vite.
Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti; esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del mal bianco.
— **Ornamentali:** contro Botrite, Ruggine e Alternaria del garofano e della rosa a gr. 350/hl.

Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea.
Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono loltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

43:

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

GRANUREX

Per il diserbo selettivo del frumento. Consigliato in particolare per la lotta contro l'Alopecurus (coda di volpe) nonché contro altre graminacee infestanti e la maggior parte delle dicotiledoni annuali

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 60 di Neburon puro
Sostanze inerti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

bpd

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 4331 **Ministero della Sanità del** 18.5.1981

E/1

Il GRANUREX è un erbicida particolarmente indicato per il diserbo del frumento in trattamenti di pre-emergenza del frumento e delle infestanti in grado di prevenire l'insediamento delle infestanti stesse, agendo per assorbimento radicale. Se favorito dalla umidità penetra negli strati sottosuperficiali del terreno sviluppando un'azione erbicida rapida e prolungata. Non è consigliabile l'impiego nei terreni sabbiosi. Consigliato pure per il diserbo di rosai.

L'efficacia del GRANUREX è molto ridotta in terreni contenenti oltre il 35% di argilla o oltre il 3,5% di sostanza organica.

MODALITA' D'IMPIEGO

Diserbo del frumento: il trattamento deve essere eseguito subito dopo la semina e nei giorni che seguono immediatamente. Il terreno deve essere ben preparato, non zolloso. La distribuzione della miscela deve essere fatta nel modo più uniforme possibile.

Dose d'impiego: kg. 5 ad ettaro con almeno 500 lt. d'acqua. Questa dose può essere aumentata fino a kg. 7 per ettaro nel caso di terreni molto argillosi o ricchi di materia organica.

AVVERTENZE

Non impiegare il GRANUREX su grani duri.

Evitare trattamenti su terreni sabbiosi. Non mescolare il GRANUREX con i concimi, insetticidi, fungicidi od altri erbicidi. Non traseminare leguminose nel frumento.

Se, dopo la coltura diserbata con GRANUREX, si seminano in secondo raccolto fagioli o fagiolini, eseguire prima della semina un'aratura profonda.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'

Non ripetere il trattamento prima di sei mesi.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

4335

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ROVRAL M

Fungicida organico di contatto

Polvere bagnabile

Composizione:

gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 20 di Iprodione * puro
gr. 60 di Mancozeb ** puro
Coformulanti quanto basta a 100

* principio attivo del Rovral * - marchio reg. Rhône Poulenc
** brevetto Rohm and Haas

Natura del rischio:

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

FRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: *alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.*
In caso di ingestione del prodotto può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

CARATTERISTICHE

Il ROVRAL M è un fungicida organico ad azione di contatto contro: Botrite e Peronospora della vite Botrite, Ruggine e Alternaria del garofano e della rosa.

APPLICAZIONI E DOSI

- **Viticoltura:** contro Botrite e Peronospora a kg. 3,8 per ettaro, distribuiti con 10-15 ettolitri d'acqua.
  Il prodotto va impiegato durante l'intero periodo vegetativo della vite.
  Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti; esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del mal bianco.
- **Ornamentali:** contro Botrite, Ruggine e Alternaria del garofano e della rosa a gr. 350/hl.

Per la preparazione della miscela mettere la dose occorrente di prodotto in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 4335 **Ministero della Sanità del** 25.5.81

E/1

ID 5740

ANTICRITTOGAMICO RAMEICO

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

Rame Metallo (sottoforma di Ossicloruro)	gr.	44
Coformulanti	q.b. a gr.	100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. fitofarmaci
Via Tolara di Sotto 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61 - 79.94.62
Telex 511046

Registrazione N. 4367
del 25/5/1981
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
CAFFARO S.p.A.
ADRIA (Rovigo)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Caratteristiche: fungicida rameico caratterizzato dalla estrema finezza delle sue particelle, dalla forte adesività e resistenza al dilavamento

Malattie combattute: peronospora, ticchiolatura, bolla, corineo, mal secco, occhio di pavone, cancri delle branche e dei rametti, alternariosi, septoriosi, cercosporiosi, vaiolatura, antracnosi, marciumi radicali.

Colture protette e dosi d'impiego:

Vite	gr.	400- 600/hl
Olivo	gr.	400- 600/hl
Pomacee: trattamenti invernali	gr.	800-1000/hl
trattamenti primaverili: pre-fiorali	gr.	250- 300/hl
post-fiorali	gr.	150- 250/hl
Drupacee: trattamenti autunnali ed invernali	gr.	1000-1500/hl
Agrumi	gr.	200- 500/hl
Barbabietola da zucchero	gr.	700-1000/hl
Colture ortive (patata, pomodoro, cavoli, rapa, ravanello, carciofo, sedano, fagiolo, fava, pisello, cece, lenticchia, cipolla, aglio, porro, asparago	gr.	400- 600/hl
Fragola	gr.	400- 600/hl

Epoche d'impiego: a scopo preventivo, secondo il calendario d'incubazione delle malattie.

Modalità d'impiego: bagnare bene ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una loro perfetta copertura

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Sconsigliate sono le miscele con TMTD, carbaryl, dicloran, diazinone, triclorphon, dinocap
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e sulle varietà di melo e di pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. **Varietà di melo cuprosensibili:** Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. **Varietà di pero cuprosensibili:** Abate Fétel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di melo e di pero, saggiare la selettività del formulato su alcune piante prima della applicazione a pieno campo.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

4373

AFILENE® 50

Insetticida-aficida formulato come liquido emulsionabile in acqua per la lotta contro afidi di colture frutticole (melo, agrumi, pesco, susino), colture erbacee (bietola da zucchero e da foraggio, pomodoro, fagioli, cavoli, insalate), colture floreali ed ornamentali in pieno campo, e contro la Mosca bianca degli agrumi.

COMPOSIZIONE

- Butocarboxim* puro .... g 47,5
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a .... g 100
- contiene Xilolo

(R) Marchio registrato SIPCAM–Milano

(*) sostanza attiva originale brevettata della Wacher Chemie GmBH Monaco di Baviera

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255

SIPCAM–Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

I CLASSE

VELENO

Registrazione n. 4373 del 25.5.1981 - Ministero della Sanità

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirare i vapori, non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle e gli occhi, durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; dopo la manipolazione od in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di Atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si usa alle seguenti dosi indicate in grammi per 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale.

Contro afidi di colture arboree frutticole (melo, agrumi, pesco, susino), di colture erbacee (bietola da zucchero e da costa, pomodoro, fagioli, cavoli, insalate), di fiori e colture ornamentali in campo : g 100–150.

Irrorare sufficiente miscela in modo da coprire interamente le piante specie nel caso di trattamenti con infestazioni di afidi già sviluppate.

Per la lotta contro l'Aleurotrixus floccosus (mosca bianca degli agrumi) impiegare 100-200 g/hl di prodotto in un'adeguata quantità di acqua avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle sostanze alcaline, come Polisolfuri, Poltiglia bordolese e Calce.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : su colture orticole, floricole ed ornamentali, stante il grande numero di varietà colturali esistenti aventi diverso grado di sensibilità, è consigliabile effettuare prima un saggio su una piccola superficie e solo dopo i risultati positivi passare ai trattamenti di larghe superfici.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Evitare i trattamenti durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

440

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
È obbligatorio l'uso di occhiali e guanti nella preparazione ed impiego della soluzione diserbante.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi d'intossicazione:
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.
Consigli terapeutici:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.
Il contatto con il prodotto potrebbe causare irritazione agli occhi ed alla pelle.
In caso di contaminazione, lavare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA — Del gruppo Imperial Chemical Industries PLC — ICI

LONTREL* NUOVO

Diserbante sistemico selettivo ad assorbimento fogliare e radicale contro le infestanti a foglia larga per il diserbo dei cereali

COMPOSIZIONE

Ac. 3,6-dicloropicolinico puro	g 1,48
Mecoprop puro	g 38,10
M.C.P.A. puro	g 8,47
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione: ICI SOLPLANT S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 4400 del 25-5-1981
*Marchio Registrato - The Dow Chemical Company

Il Lontrel* Nuovo è un erbicida di post-emergenza per il grano ed altri cereali (orzo, avena, segale) che raggruppa i seguenti vantaggi:
- agisce per via fogliare e radicale sulle infestanti;
- possiede un ampio spettro d'azione erbicida: distrugge le infestanti a foglia larga ed in particolare quelle resistenti ai comuni erbicidi quali: camomilla, papavero, bifora, fumaria, veronica, crisantemo, gallio, senape, veccia, stellaria, anagallide, sonco, cirsio, poligonacee, capsella, c·.epina, cerastio, rafano;
- è dotato di un lungo periodo di intervento.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il Lontrel* Nuovo si impiega a partire dallo stadio di pieno accestimento, sino a fine levata, comunque prima che inizi il rigonfiamento della botticella.
I migliori risultati si ottengono **intervenendo precocemente su infestanti giovani** avendo l'avvertenza di distribuire l'erbicida prima che il cereale, ricoprendole, impedisca al diserbante di colpirle.
L'azione del prodotto è favorita da temperature miti.
Utilizzare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una uniforme bagnatura delle infestanti ad esempio 400 l/ha nei primi trattamenti su infestanti piccole e 500-600 l/ha nei trattamenti più tardivi.
Evitare di trattare con temperatura inferiore al 10°C.

DOSI DI IMPIEGO
3,5 kg/ha nei trattamenti precoci e su infestanti giovani.
4 kg/ha quando le condizioni climatiche non sono favorevoli e in trattamenti più tardivi su infestanti più sviluppate e più difficili da controllare (papavero, camomilla).

Da non impiegare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
Si sconsiglia di usare il prodotto in miscela.
In caso di necessità consultare un tecnico di fiducia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Lontrel* Nuovo contiene un formulato ormonico.
Può danneggiare colture sensibili, quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi e floreali in genere, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Trattare in giornate calme e senza vento.
Attenzione: ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg

4401

Caratteristiche: erbicida di post-emergenza attivo per assorbimento fogliare e traslocazione per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle infestanti perennanti. Il GLIFOSAN è rapidamente disattivato a contatto del suolo. La manifestazione dell'effetto erbicida è lenta e graduale (ingiallimento, appassimento e morte) perché interessa anche gli apparati radicali profondi. Poiché non ha azione pre-emergenza, per controllare le infestanti provenienti da seme che possono nascere dopo il trattamento, effettuare dopo l'applicazione del GLIFOSAN un intervento con un erbicida ad azione persistente nel terreno.

Infestanti combattute: mono e dicotiledoni annuali e perenni. Particolarmente importante è la sua azione contro le principali erbe perennanti quali: Sorghetta (Sorghum halepense), Stoppione (Cirsium arvense), Cipero (Cyperus rotundus), Gramigna (Cynodon dactylon), Romice (Rumex), Vilucchio (Convolvolus arvensis), Artemisia (Artemisia vulgaris).

Colture protette: vite, agrumi. Il GLIFOSAN si usa inoltre per il diserbo delle stopple dei cereali, degli incolti (ripe, scoline, strade, sedi ferroviarie, piazzali per depositi industriali, aree incolte in genere).

Dosi ed epoche d'impiego:

Vite - agrumi: contro la maggior parte delle infestanti annuali lt. 3-5/ha. Contro le perennanti attenersi alle seguenti dosi riferite allo stato vegetativo: gramigna alta 25-30 cm. lt. 10/ha. Stoppione alto 40-50 cm lt. 6/ha. Vilucchio alla fioritura lt. 12/ha. Sorghetta alta 40-50 cm lt. 5-6/ha. Cipero alla fioritura lt. 6/ha. Artemisia alta 30-40 cm lt. 7/ha. Romice alto 30-40 cm lt. 6/ha. Il trattamento può essere eseguito a partire dagli stadi sopraindicati fino all'autunno su erbe in attiva crescita. L'applicazione dell'erbicida residuale integrativo contro erbe provenienti da seme deve essere effetuato nei vigneti in autunno od in primavera, negli agrumeti in inverno o prima dell'irrigazione estiva su terreno privo di infestanti Il GLIFOSAN non deve essere impiegato in miscela con l'erbicida residuale.

Stopple dei cereali: usare il GLIFOSAN su infestanti in attiva crescita sia prima della coltura (primavera) sia dopo (estate ed autunno). La lavorazione del terreno e la semina possono essere effettuati 2-3 settimane dopo il trattamento. Le dosi sono le stesse indicate sopra in riferimento allo stadio delle infestanti

Diserbo totale di incolti: applicare il prodotto alle dosi indicate sopra, su infestanti in vegetazione. Se queste sono molto sviluppate e fitte usare sino a 1000 lt. d'acqua/ha. Per il controllo nel tempo delle infestanti nate da seme, far seguire all'applicazione di GLIFOSAN un trattamento con erbicida residuale.

Modalità d'impiego: le piogge che cadono 6-8 ore dopo il trattamento ne riducono l'efficacia. Usare pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere) e barre o lance con ugelli che distribuiscono gocce relativamente grosse. Evitare la deriva e quindi il contatto con la vegetazione delle colture. Prima del trattamento, in vigneti ed agrumeti, asportare i succhioni ed i ricacci alla base delle piante. Non bagnare i tronchi non ben lignificati o con ferite. Arature, fresature, sfalci o pascolo prima del trattamento ne riducono l'efficacia. Evitare inoltre di lavorare il terreno per 2-3 settimane dopo il trattamento. Lasciar trascorrere almeno 1-2 settimane fra il trattamento con GLIFOSAN e quello con erbicidi residuali

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: usare il prodotto da solo.

Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare di tutte le colture. Se si irrorano vigneti allevati bassi, usare ugelli schermati. Non trattare tronchi non ben lignificati, succhioni e ricacci. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe ed i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

Nocività a seguito del trattamento: durante i trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

GLIFOSAN®

VERCHIM ASTERIAS

ERBICIDA TOTALE

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

GLIFOSATE (sale isopropilamminico) puro		gr. 41
Coformulanti	q.b. a	gr. 100

Tipo di formulazione: liquido solubile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/2 - Telex 511046

Registrazione N. 4401
del 25-5-1981
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. **Non applicare e non conservare o miscelare il GLIFOSAN in contenitori galvanizzati (es. zincati) o di acciaio non protetti da apposite vernici. Il GLIFOSAN potrebbe reagire con questi materiali sviluppando un gas altamente infiammabile che potrebbe essere pericoloso in presenza di fiamma (es. anche una sigaretta accesa). Non lasciare nelle irroratrici per lunghi periodi la miscela di GLIFOSAN pronta per l'uso; dopo l'applicazione assicurarsi che le stesse siano accuratamente ripulite.**

INFORMAZIONI MEDICHE: *In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.1

44

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

KARATHANE L.C.

Fungicida
Liquido concentrato

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 37,44 di Dinocap puro
Emulsionanti e solventi q.b. a 100

Contiene Xilolo e Cicloesanone

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere la ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.

Controindicazioni:
Atropina.

GENERALITA'

Il **KARATHANE L.C.** - (Liquido concentrato) è efficace nel controllo di tutte le forme di oidio con qualche attività secondaria contro alcune specie di ragnetti rossi.
Il **KARATHANE L.C.** è concentrato e pertanto le dosi d'impiego suggerite devono essere scrupolosamente osservate.
Per ottenere un buon controllo dell'oidio è necessario impiegare una forte quantità di soluzione in modo da bagnare completamente le piante da difendere. Per le colture sottoriportate impiegare il **KARATHANE L.C.** nelle dosi indicate aggiungendo alla soluzione 50 gr. del bagnante adesivo Etaldyn.

DOSI ED EPOCA DEI TRATTAMENTI

Melo e Pero
Per controllare l'oidio e diverse specie di ragni rossi impiegare 50-60 centimetri cubici di **KARATHANE L.C.** per 100 litri di acqua.
Iniziare i trattamenti alla schiusura delle gemme e continuare fino dopo la fioritura alla caduta dei petali, ripetendo le irrorazioni almeno ogni 14 giorni in caso di forti attacchi. Assicurarsi che i rami terminali colpiti da oidio siano bene irrorati.

Albicocco
Contro l'oidio impiegare **KARATHANE L.C.** nella dose di centimetri cubici 50 per ettolitro di acqua.

Pesco
Contro l'oidio impiegare 50 centimetri cubici di prodotto per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti alla schiusura delle gemme e continuarli fino alla caduta dei petali.

Ortaggi: Carciofo, fragola, sedano, carota, finocchio, cardo, pisello, fagiolo, fagiolino, melanzana, peperone, pomodoro.

Cucurbitacee: Melone, cocomero, cetriolo, zucchino.
Contro il mal bianco impiegare da 40 a 45 centimetri cubici di **KARATHANE L.C.** per ettolitro di acqua. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e ripeterli a 7-10 giorni di intervallo a seconda della neccessità.
E' importante la completa copertura delle foglie specie nella pagina inferiore.

ROSE - contro l'oidio:

a) In Serra: Impiegare il **KARATHANE L.C.** nella dose di 30-50 centimetri cubici per ettolitro di acqua. Iniziare la lotta al primo apparire della malattia e ripetere i trattamenti ad intervalli di 5-7 giorni a seconda della necessità. Trattare con precauzione quando la temperatura si avvicina ai 30° C. **e non trattare** a temperature superiori ai 32° C.

b) In pieno campo: Impiegare il **KARATHANE L.C.** nella dose di centimetri cubici 30-50 per ettolitro di acqua alla prima comparsa della malattia e ripetere i trattamenti a 7-10 gg. di intervallo. Irrorare accuratamente tutta la pianta dirigendo lo spruzzo specialmente verso la pagina inferiore delle foglie. Quando necessario, per combattere ruggine o altre malattie, aggiungere Dithane Z-78.

FIORI - In particolare Aster, Begonia e Begonia Rex, Crisantemo, Dalia, Delphinium contro l'oidio.

Dosi: In serra 30 centimetri cubici, e in pieno campo da 30-40 centimetri cubici di **KARATHANE L.C.** per ettolitro di acqua.
Iniziare i trattamenti alla comparsa dell'oidio e ripeterli a distanza di 7-10 giorni a seconda della necessità.

VIVAI - (Melo - pero - pesco - ciliegio - mandorlo)
Contro l'oidio usare il **KARATHANE L.C.** alla dose di 50-60 centimetri cubici per ettolitro di acqua, iniziando i trattamenti alla apertura delle gemme e ripetendoli successivamente a distanza di 7-10 giorni secondo necessità.

VITE - Contro l'oidio e gli acari. Irrorare con **KARATHANE L.C.** nella dose di centimetri cubici 40-60 per ettolitro di acqua iniziando i trattamenti al primo allungamento del germoglio e ripetere in seguito i trattamenti a distanza di 10-14 giorni. Con l'avanzare della stagione è bene sostituire il **KARATHANE L.C.** con quello in polvere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica ed alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri), con Promecarb, Carbo-Fenothion, Dimeton-Metile, Triclorfon, Olii minerali (estivi ed invernali), T.M.T.D., con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacryl.

Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura non deve essere miscelato con Parathion.

E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, Zolfo.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Durante la stagione calda, utilizzare il **KARATHANE L.C.** solo alle dosi minime e nelle prime ore del mattino e della sera. Non impiegare il **KARATHANE L.C.**:

— quando la temperatura supera i 32°C;
— durante la fioritura.

Sul melo, nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura, usare il Parathion separatamente da **KARATHANE L.C.**.

Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.
Deve essere impiegato a distanza di tre settimane dalla distribuzione di olii minerali e di qualunque formulato emulsionabile.

NOCIVITA'

E' tossico per acari ed insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non potrette, animali domestici e bestiame.

— Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto sulle cucurbitacee, e 20 giorni prima, sulle altre colture.

AVVERTENZE

E' infiammabile - tenere quindi lontano dalla fiamma.

Non impiegare il **KARATHANE L.C.** quando la temperatura ambiente è superiore al 32° C. Con temperatura elevata utilizzare il **KARATHANE L.C.** alle dosi minime consigliate ed effettuare i trattamenti nelle prime ore del mattino e della sera.

Deve essere impiegato a distanza di tre settimane dalla distribuzione di oli minerali e di qualunque formulato emulsionabile.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68

STAB.TO: Paganica (AQ)
Reg. n. 4.4.1**Ministero della Sanità del** 25.7.81 . . . . .
E/1

4434

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.
Consigli terapeutici:
Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari, fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
Controindicazioni: la morfina, l'alcool e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITA'
È tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'ACARKIL'

Acaricida specifico contro uova, neanidi, adulti

COMPOSIZIONE

Tetradifon puro	g 5,9
Dicofol puro	g 13,6
Solventi, adesivanti, emulsionanti (contiene Xilolo)	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione: CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 4434 del 26-9-1981
ACARKIL' marchio registrato - ICI Solplant S.p.A.

'ACARKIL' è un acaricida a base di Tetradifon e di Dicofol, per trattamenti primaverili-estivi.

CAMPI DI IMPIEGO
Frutticoltura: pero, melo, pesco, ciliegio, agrumi.
Orticoltura: fagiolo, fava, fragola, pomodoro.
Floricoltura in pieno campo: ciclamino, garofano, rosa.
Dose: g 200 per 100 litri di acqua.

Avvertenze:
In caso di infestazione in atto si consiglia di ricorrere a due trattamenti ravvicinati a 4-5 giorni l'uno dall'altro.
La dose può essere aumentata senza pregiudizio sino a 250 g per 100 litri di acqua.
Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
'ACARKIL' è compatibile con la massima parte degli insetticidi e degli anticrittogamici di uso comune. Non è compatibile con la poltiglia bordolese, con i polisolfuri di calcio e di bario e in genere con prodotti a reazione alcalina.
La miscela con ossicloruri di rame e con Colloidox va fatta con precauzione. La miscela con Captan 50 Solplant va fatta aggiungendo anche Agral.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg

4462

BAYLETON 25 P.B.

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro l'oidio (mal bianco) del melo e della vite e contro l'oidio e la ruggine di cereali, ortaggi, piante ornamentali e da fiore in campo

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Bayleton 25 P.B. contengono:
g 25 di triadimefon puro
sospensivanti, bagnanti ed inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non caratteristici; vomito, difficoltà di respirazione, effetto eccitante oppure sedativo.

Terapia sintomatica: lavanda gastrica.

Alcune controindicazioni: bevande alcooliche, grassi, olii e latte.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Melo: contro l'oidio: 0,01-0,0125% (10-12,5 g in 100 lt d'acqua).

Vite: contro l'oidio: 0,01-0,0125% (10-12,5 g in 100 lt d'acqua). In caso di impiego su varietà di uve da tavola particolarmente sensibili all'oidio elevare la dose allo 0,015% (15 g in 100 lt d'acqua).

N.B.: Per melo e vite le dosi si riferiscono all'impiego di 10 hl di sospensione per ettaro.

Cereali (grano-orzo): contro mal bianco e ruggine: 0,5 kg/ha diluiti in 600-800 litri d'acqua intervenendo preventivamente dalla fase di spigatura fino alla fioritura, oppure alla comparsa dei primi sintomi.

Ortaggi: contro mal bianco del melone, cetriolo, peperone e pomodoro: 0,01-0,02% (10-20 g in 100 lt d'acqua).

Piante ornamentali e da fiore in campo: contro ruggine e mal bianco della rosa: 0,06-0,08% (60-80 g in 100 lt d'acqua); contro ruggine dei gerani, mal bianco e ruggine del crisantemo: 0,04-0,06% (40-60 g in 100 lt d'acqua).

N.B.: Usare la dose più elevata nei casi di maggiore sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio, e nei casi in cui gli intervalli tra i trattamenti siano superiori agli 8-10 giorni.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Bayleton 25 P.B. può essere miscelato con fungicidi e insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per ortaggi, 10 giorni prima del raccolto per melo, 15 giorni prima del raccolto per vite, 30 giorni prima del raccolto per i cereali.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Cotignola (RA) - Via S. Francesco
Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana

Registrazione Ministero Sanità n. 4462 del 8/10/81

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g 500

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

4479

MILCOZEBE® BLU

anticrittogamico, in polvere bagnabile, a base di mancozeb

Composizione

gr. 60 di mancozeb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico

— Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausee, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
— Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Viticoltura	Peronospora	0,25-0,3% = gr 250-300
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternaria, Ruggine, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi	0,25-0,4% = gr 250-400
Pioppicoltura	Marssonina brunnea	0,5-0,65% = gr 500-650
Floricoltura: garofano e rosa in pieno campo	Ruggine, Ticchiolatura, Alternaria, Botrytis, Septoria	0,2-0,3% = gr 200-300

Intervenire secondo le necessità dettate dall'ambiente stagionale e dalla biologia dei parassiti, attenendosi ai calendari dei trattamenti suggeriti in zona. Le dosi più elevate si consigliano solo in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle crittogame citate. Sulle colture nelle quali il deposito di poltiglia colorata può dar luogo ad inconvenienti ai fini della commercializzazione del raccolto, dare la preferenza, negli ultimi trattamenti, a formulati a base di Mancozeb privi di colorante.

Per la preparazione della poltiglia: versare la quantità necessaria di MILCOZEBE BLU nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità

IL MILCOZEBE BLU è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ; è incompatibile con la poltiglia solfo-calcica, il permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro ed in genere con le poltiglie a reazione alcalina.

Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio MILCOZEBE BLU+ TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di MILCOZEBE BLU da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del MILCOZEBE BLU con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di MILCOZEBE BLU già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4479 del 8-10-1981 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

® MILCOZEBE è marchio registrato dalla Rhom and Haas Co. Philadelphia U.S.A.

4486

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ACARTHANE EC

Acaricida ad azione collaterale antioidica

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 18,2 di Dicofol puro
gr. 9,1 di Dinocap puro
Solventi ed emulsionanti quanto basta a 100
Contiene Xilolo

* Marchio reg. ROHM & HAAS Co.
Philadelphia - U.S.A.

Natura del rischio:

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

Nausea, mal di capo, convulsioni, astenia intensa, vertigini. Il prolungato o ripetuto contatto con la pelle provoca irritazione, sensibilizzazione e temporaneo ingiallimento della cute. Il contatto con gli occhi provoca irritazione.

Consigli terapeutici

Portare il paziente in luogo fresco e ben arieggiato. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se persiste irritazione il trattamento è sintomatico. In caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua e quindi lavare con acqua e sapone. In caso di ingestione non indurre il vomito; praticare accurata lavanda gastrica. Se il paziente ha uno scarso stadio di coscienza, e ancor più se è in coma, la lavanda gastrica può essere praticata soltanto se il paziente viene in precedenza intubato. Terapia sintomatica. In caso di convulsioni somministrare diazepam endovenosa o barbiturici (fenobarbital o tiopental sodico al 2,5%) dopo avere intubato il paziente. Nei casi gravi ricovero in Reparto di rianimazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

L'ACARTHANE EC è un acaricida di elevata efficacia contro i più importanti acari delle colture frutticole ed agrarie. Esso ha una rapida azione, una lunga persistenza ed assicura un controllo degli acari.

L'ACARTHANE EC è un ottimo rimedio per controllare all'inizio delle infestazioni, le specie di acari quali il Metatetranychus ulmi (Koch) e il Tetranychus urtacae. Dà altresì un prolungato controllo del Tetranychus telarius e delle specie estive simili. Un'accurata applicazione è efficace per diverse settimane e, sotto determinate condizioni, anche per qualche mese.

L'ACARTHANE EC esplica pure una collaterale azione antioidica Per ottenere i migliori risultati è necessario irrorare abbondantemente tutte le parti delle piante in modo da ottenere una perfetta copertura della vegetazione. Nel caso si debba trattare foglie difficilmente bagnabili, è consigliabile aggiungere un buon bagnante adesivo tipo Etaldyn.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 4486 Ministero della Sanità del 1.10.81

E/1

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

FRUTTIFERI: Melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio, mandorlo, e nocciolo.

All'inizio della stagione per controllare gli acari impiegare gr. 200-300 di **ACARTHANE EC** per 100 lt. d'acqua. In primavera effettuare il trattamento prima e dopo la fioritura, alla schiusura della maggior parte delle uova invernali dei ragnetti rossi. Per controllare gli attacchi dei ragnetti rossi durante l'estate iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti.

VITE:
Contro i ragnetti gialli e rossi della vite impiegare 200 gr. di **ACARTHANE EC** per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti, se necessario, in primavera quando i getti sono lunghi 2-5 cm.. In tale periodo avviene la fuoriuscita degli adulti. Nei trattamenti estivi iniziare le applicazioni al primo comparire degli adulti sulle foglie.

FRAGOLA:
Contro il Tetranychus telarius e simili, nonché contro lo Steneotarsonemus pallidus impiegare **l'ACARTHANE EC** alla dose di 200 gr. per 100 litri di acqua. Ripetere il trattamento ad intervalli di 10-20 giorni se necessario.

ORTAGGI: Pomodoro, peperone, cocomero, melone, cetriolo e zucchino. Iniziare i trattamenti al primo comparire dei ragnetti rossi e gialli impiegando 150-200 gr. di **ACARTHANE EC** per 100 litri d'acqua.

PIANTE ORNAMENTALI: Solo in pieno campo.

Per il controllo degli acari delle rose, azalee, cactus, astri, crisantemi, ciclamini, dalie, gigli, gardenie, gerani, gladioli, edera, ortensie, petunie, oleanlri, usare da 150 a 200 gr. per 100 litri di acqua. Sulle piante sensibili usare la dose più bassa. Con forti attacchi si raccomanda di usare le dosi alte. Ripetere i trattamenti a seconda della necessità.

COMPATIBILITA'

L'ACARTHANE EC è compatibile con la maggior parte dei nostri prodotti antiparassitari. Non è miscibile con formulati a reazione basica od alcalina (es. Poltiglia bordolese e polisolfuri), con oli minerali (estivi ed invernali), con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacryl. E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethinate, Dicloran, Zolfo.

Tuttavia per ottenere i migliori risultati si consiglia di usarlo da solo con abbondante irrorazione.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathion separatamente. Nel caso di impiego di oli non trattare con Dinocap a distanza inferiore di tre settimane.

Non impiegare con temperature superiori a 32° C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

NOCIVITA'

E' tossico per alcuni acari ed insetti utili.

— Sospendere i trattamenti sulle cucurbitacee 15 giorni prima del raccolto e 20 giorni prima sulle altre colture.

• **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato •.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

4499

TRIMIFOL P bianco

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, il pomodoro e la patata

Composizione
gr. 3,5 di cymoxanil * puro
gr. 12 di folpet puro
gr. 13 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico e di solfato tetraramico tricalcico)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

Informazioni per il medico
- Sintomi di intossicazione

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia
- Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

Caratteristiche
Il TRIMIFOL P BIANCO è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro.
Il TRIMIFOL P BIANCO agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
- Peronospora della vite
  Usare gr. 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
  Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono
- Peronospora della patata e pomodoro
  Usare gr. 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere una azione bloccante, adottare la dose più elevata

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamento con questi ultimi, distanziare l'intervento con TRIMIFOL P BIANCO di 2-3 settimane.
Il formulato non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura. Occorre che il formulato, come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante da trattare.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci e gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Dipartimento Agro
Officina di produzione:
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4499 del 22.10.81 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto netto kg.

* Contiene fungicida CURZATE, ® marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.)

4566

PURIVEL

Disseccante del fogliame della patata e del pomodoro da industria

Composizione
gr. 80 di metoxuron puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il PURIVEL agisce come disseccante delle foglie delle piante trattate, facilitando, nelle colture di patata e di pomodoro, la raccolta meccanica sia attraverso l'azione disseccante diretta che attraverso l'effetto erbicida secondario sulle eventuali erbe infestanti presenti.

Dosi o modalità di impiego
— Patata: 2-3 kg/ha di PURIVEL distribuiti il più uniformemente possibile in litri 400-600 di acqua.
— Pomodoro: 3 kg/ha di PURIVEL distribuiti il più uniformemente possibile in litri 600-800 di acqua.

Epoca di impiego
— Patata: intervenire all'inizio della maturazione naturale della pianta, quando le foglie basali incominciano ad ingiallire.
— Pomodoro: intervenire dopo la prima raccolta delle bacche, da 20 a 14 giorni prima della raccolta finale.

Preparazione e applicazione della poltiglia
Stemperare il quantitativo necessario di PURIVEL in poca acqua sino ad ottenere una sospensione senza grumi, versare questa poltiglia concentrata nel rimanente quantitativo di acqua, agitando energicamente. Evitare che la nebbia della poltiglia raggiunga o si distribuisca sulle colture confinanti. Dopo l'uso lavare bene il mezzo irroratore.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Non si ritiene utile aggiungere al PURIVEL alcun antiparassitario; solamente nelle colture di patate, nel caso di condizioni ambientali particolarmente favorevoli ad un attacco tardivo di Phytophtora infestans, è consigliabile la miscelazione con un anticrittogamico adatto.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
La fitotossicità che si manifesta a livello del fogliame è voluta, in quanto al prodotto è richiesta una azione disseccante.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4566 del 3.12.1981 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg. 1**

4593

TRIMIFOL P

Antiperonosporico in polvere bagnabile per la vite, il pomodoro e la patata

Composizione
gr. 3,5 di cymoxanil * puro
gr. 12 di folpet puro
gr. 13 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico e di solfato tetraramico tricalcico)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

Informazioni per il medico
— Sintomi di intossicazione
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

Caratteristiche
Il TRIMIFOL P è un anticrittogamico in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro.
Il TRIMIFOL P agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.

Modalità di impiego
Contro:
- Peronospora della vite
  Usare gr. 300-350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.
  Iniziare i trattamenti al verificarsi delle condizioni per la comparsa della malattia e proseguire fino a quando queste persistono.
- Peronospora della patata e pomodoro
  Usare gr. 350 di formulato per ogni 100 litri di acqua.

In viticoltura, su varietà molto sensibili, con andamento stagionale particolarmente favorevole allo sviluppo delle crittogame e quando è necessario ottenere una azione bloccante, adottare la dose più elevata.

Preparazione della poltiglia
Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semi-liquida, stemperando in poca acqua la quantità di prodotto da distribuire; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamento con questi ultimi, distanziare l'intervento con TRIMIFOL P di 2-3 settimane.
Il formulato non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura. Occorre che il formulato, come tutti i fitofarmaci, sia razionalmente impiegato, tenendo conto, tra l'altro, delle fasi fenologiche che presentano le piante da trattare.

Rischi per la fauna utile
E' tossico per i pesci e gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione:
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4593 del 28.12.81 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

* Contiene fungicida CURZATE, ® marchio registrato E.I. Du Pont De Nemours & Co. (Inc.)

4612

AGERCARB 50

Polvere bagnabile insetticida a largo campo di azione

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

CARBARYL Puro (esente da B-Naftolo)	gr. 47,5
Disperdenti e bagnanti q.b. a	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto, Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

Modalità d'impiego: Iniziare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti e ripeterli in relazione ad eventuali reinfestazioni.

Dosi di impiego per 100 litri di acqua:
Melo e Pero: gr. 200-250 contro Carpocapsa o Verme, Cacoecia e Eulia.
Pesco: gr. 200-250 contro la Lidia o Tignola Orientale.
Noci: gr. 150 contro la Carpocapsa.
Mandorlo: gr. 150 contro la Campa.
Vite: gr. 200 contro la Tignora dell'uva.
Agrumi (aranci, mandarini, limoni e pompelmi): gr. 200 contro la Tignola.
Olivo: gr. 200 contro la Tignola.
Bietola: gr. 200 contro Mamestra, Caradrina e Altica.

Versare la dose di prodotto necessaria in poca acqua e mescolare bene. Aggiungere poi la rimanente quantità di acqua sempre continuando a mescolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile per tutti i prodotti fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Non trattare durante la fioritura non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano passati almeno sette giorni dal trattamento.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 7 GIORNI.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGER CHEMICAL s.r.l.

Via Nomentana, 299 ROMA

Officina di produzione: Stabilimento VISPLANT CHIMIREM - RENAZZO DI CENTO (FE)

Registrazione Ministero della Sanità N. 4612 del 30-12-81

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG.

4623

CLASSE III

BRANDOL® 2 P

Composizione

gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 2 di BRANDOL® puro
q.b. a gr. 100 di supporti e coadiuvanti

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:

Sintomi di intossicazione: sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, ipertermia, colorazione gialla delle sclere.
Terapia: in caso di intossicazione acuta, ricorrere alla lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% (non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni all'esofago, molto frequenti in caso di ingestione). Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Analettici (tipo simpatolo, veritolo o coramina) somministrati per via parenterale, se esiste una lieve sindrome ipotensiva; qualora questa fosse di grado elevato il paziente va ricoverato in reparto di rianimazione per trattamento più idoneo. Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche in caso di collasso ed ipotensione grave.
Metil e propiltiouracile fa ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.
E' controindicata l'atropina.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Dosi e modalità d'impiego

Il BRANDOL 2 P combatte efficacemente le varie forme di Oidio che colpiscono sia le piante da frutto che quelle ornamentali di seguito indicate.
L'azione antioidica del BRANDOL 2 P oltrechè preventiva è anche curativa.
Effettuare trattamenti a mezzo di polverizzazioni alle seguenti dosi:
— fiori, melo, pesco e vite Kg. 20/40 per ha.
I trattamenti possono essere ripetuti ad intervalli di una decina di giorni, ed anche meno, e con le dosi minime nei mesi più caldi.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non è previsto abbinamento con altri prodotti.

Fitotossicità:

Evitare i trattamenti alla vite alla comparsa dei primi segni della maturazione del grappolo.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione, da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S. p. A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
S.I.L.I.A. S.p.A. - APRILIA (LT) - Via Nettunense Km. 23,4

Registrazione Ministero della Sanità n. 4623 del 23-1-1982

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO kg

® Marchio e brevetto SARIAF

4637

GRILLOVAL

ESCA INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO NOTTUIDI, GRILLOTALPE, GRILLI E AGROTIDI NEI TERRENI NON DESTINATI A COLTURE ALIMENTARI

Composizione gr 100 di prodotto contengono: CARBARYL puro (esente da ß-Naftolo) gr **2** - Inerti ed attrattivi q.b. a gr **100**.

CLASSE III **ATTENZIONE: Manipolare con prudenza.**

NATURA DEL RISCHIO: **Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.**
NORME PRECAUZIONALI: **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

MODALITA' D'IMPIEGO: Il **GRILLOVAL** agisce per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti. E' particolarte indicato contro larve di lepidotteri (specie quelle dei Tortricidi) e contro la Dorifora. E' caratterizzato da una buona persistenza all'aria. Il **GRILLOVAL** viene impiegato alla seguente dose: Contro Nottuidi, Grillotalpe, Agritidi e Grilli: kg 25-30 per ettaro. La distribuzione deve effettuarsi a spaglio verso sera o dopo una pioggia ogni qualvolta si notano danni alle colture dovuti ai suddetti insetti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto si usa da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile deggli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Reg. N. 4637 dell'11-02-1982 del Ministero della Sanità.

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 63.81.63 - 63.81.63

Officina di produzione: bimex s.p.a. - via cogolla, 5 - isola vicentina (vi)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

4668

CUPROCLOR

FUNGICIDA ORGANICO IN POLVERE BAGNABILE PER COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO O IN SERRA

COMPOSIZIONE gr 100 di prodotto contengono: CLORTALONIL puro gr 15. - RAME METALLICO puro gr 30 (sotto forma di Ossicloruro Tetraramico). - Coformulanti e Coloranti q.b. a gr 100. CLASSE III ATTENZIONE! Manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO: Il CUPROCLOR è un fungicida organico dotato di ampio spettro d'azione e persistenza. Il suo impiego permette di combattere le principali malattie fungine tranne l'Oidio.
DOSI: COLTURE FLOREALI (Rosa, Garofano, Gladiolo, Crisantemo) ED ORNAMENTALI in pieno campo o in serra: Contro Peronospora, Ticchiolatura, Alternaria, Septoriosi: gr 400/600 per Ettolitro intervenendo soprattutto con trattamenti preventivi secondo i normali calendari dei trattamenti. Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose prescelta in poca acqua, aggiungendo poi la miscela così ottenuta al totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente fino alla formazione di una poltiglia omogenea.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli a reazione alcalina come Polisolfuri, Poltiglia Bordolese e Calce. Si sconsigliano le miscele con i liquidi emulsionabili.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprì del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Reg. N. 4668 del 25-2-1982 del Ministero della Sanità

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cegolla, 8
TELEFONI N.: (0444) 55.81.09 - 55.81.29

officina di produzione DIACHEM S.p.A.
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO gr**

4(

STIRYL P 5

Insetticida formulato in polvere secca

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

CARBARYL puro, esente da β-naftolo 5 gr.
Supporti inerti q.b. a 100 gr.

CARATTERISTICHE

Insetticida in polvere che agisce contro una vasta gamma di insetti e particolarmente contro le larve di tutti i Lepidotteri.

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
Conservare la confezione ben chiusa;
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion; ecc.) che potrebbero essere nocive.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

POMACEE: 30-40 Kg. per ettaro contro Carpocapsa (verme), Capua, Cacoecia ed Eulia.

UVA, AGRUMI e OLIVO: 20-25 Kg. per ettaro contro la Tignola e larve dei lepidotteri in genere.

COLTURE FLOREALI in pieno campo: 18-20 Kg. per ettaro contro Bega, Cavolaia, Sputacchina.

PATATA, POMODORO, MAIS, COTONE e BIETOLA: 18-20 Kg. per ettaro contro Dorifora, Nottua, Piralide, Tignole, Sesamia, Verme rosa, Afidi, Cimici e Altica.

FORAGGERE (COLZA, ERBA MEDICA, TIFOGLIO): 20-25 Kg. per ettaro contro Fitotomo, Misurino, Apion, Afidi, Meligete, Sminturide.

COLTURE ORTICOLE (ASPARAGO, CARCIOFO, CAVOLO, INSALATA): 25-40 Kg. per ettaro contro Gasteropodi, Crostacei, Afidi, Cassida, Cavolaia e larve di Lepidotteri defogliatori in genere.

Intervenire alla prima comparsa degli insetti, ripetendo il trattamento in concomitanza di nuovo attacchi.

Distribuire lo STIRYL P 5 con comuni polverizzatori a mano o meccanici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Lo STIRYL P 5 è compatibile con molti fitofarmaci eccetto quelli fortemente alcalini come la poltiglia Bordolese, il polisolfuro di calcio e di bario e la calce.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Non eseguire trattamenti durante la fioritura.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO
7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.

Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA
Stabilimento di produzione: Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4675 **del** 24.02.1982

PESO NETTO Kg. 25

4703

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

R6 ERRESEI STOP® M

FUNGICIDA
Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 8 di CIMOXANIL puro
Gr. 68,6 di MANCOZEB puro
Sostanze inerti e colorante q.b. a 100

® Marchio registrato RAVIT S.p.a.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.

Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 4703 **Ministero della Sanità del** 24.2.82
E/1

CARATTERISTICHE

L'R6 ERRESEI STOP M è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite e del pomodoro, solo fino alla prima fioritura.
Agisce sia per contatto che per penetrazione nella foglia, combattendo sia le zoospore germinanti che il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione

MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Peronospora del pomodoro solo fino alla prima fioritura: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
Usare la dose di 200 gr. ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di Peronospora e di Alternaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida.
Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione a prodotti con reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato »

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

470

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

FUNGICIDA

Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 8 di CIMOXANIL puro
Gr. 68,6 di MANCOZEB puro
Sostanze inerti e colorante q.b. a 100

® Marchio registrato Antiparassidari BPD

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.

Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 4704 **Ministero della Sanità del** 24.2.82

E/1

CARATTERISTICHE

Il COPERAL M è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite e del pomodoro, solo fino alla prima fioritura.
Agisce sia per contatto che per penetrazione nella foglia, combattendo sia le zoospore germinanti che il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Peronospora del pomodoro solo fino alla prima fioritura: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
Usare la dose di 200 gr. ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di Peronospora e di Alternaria.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida.
Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione a prodotti con reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

4705

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Fungicida sistemico e di contatto
per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi
della vite
Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 40 di FOSETYL ALLUMINIO puro
Gr. 24 di MANCOZEB puro
Adiuvanti e coloranti q.b. a 100

® Marchio registrato Antiparassitari BPD

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.

Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.

Nei confronti della Peronospora se ne consiglia l'impiego come preventivo pur possedendo il prodotto anche efficacia curativa.

Tale attività è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.

La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.

Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi.

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Peronospora: dose gr. 350/hl il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.

Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.

Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame.

Escoriosi: Dose gr. 350/hl effettuare due trattamenti: il primo nella fase di « gemma mossa » (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con BENLATE, KARATHANE LC, KARATHANE WD, IPRODIAL, SULFOSOL 80, DRINFOS 20, LANNATE 25, LANNATE L, DELFOS M 20, FITOFOS 20, OVOTEK, SUMIFOS, EMMATON 50, ZOLONE 25 PB, ZOLONE L 25, AZOFOL L.

Per miscele con altri prodotti si consigliano saggi preliminari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 4705 **Ministero della Sanità del** 24.2.82

E/2

Peso netto Kg.

4706

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 40 di FOSETYL ALLUMINIO puro
Gr. 24 di MANCOZEB puro
Adiuvanti e coloranti q.b. a 100

® Marchio registrato RAVIT S.p.A.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.

Controindicati alcool, olii, grassi. Nel casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 4706 **Ministero della Sanità del** 24.2.82
E/2

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
Nei confronti della Peronospora se ne consiglia l'impiego come preventivo pur possedendo il prodotto anche efficacia curativa.
Tale attività è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi.

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Peronospora: dose gr. 350/hl il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.
Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame.
Escoriosi: Dose gr. 350/hl effettuare due trattamenti: il primo nella fase di « gemma mossa » (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con BENLATE, KARATHANE LC, KARATHANE PB, ROVRAL, SOFRIL 80, FOSFENE 20, LANNATE 25, LANNATE L, METILON 20, PARAFENE ROSSO, SPINTOX, SUMIFENE E, ZITIOL E, ZOLONE 25 PB, ZOLONE L 25, FOLGREEN L.

Per miscele con altri prodotti si consigliano saggi preliminari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

4707

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

COPERAL® R

FUNGICIDA

Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 4,20 di CIMOXANIL puro
Gr. 39,75 Rame metallico sottoforma di ossicloruro tetraramico
Sostanze inerti e colorante q.b. a 100

® Marchio registrato Antiparassidari BPD

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **COPERAL R** è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.

Agisce sia per contatto che per penetrazione nella foglia, combattendo sia le zoospore germinanti che il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione

MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 300 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura

Peronospora della patata e pomodoro: usare 300 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida.

Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione a prodotti con reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 4707 **Ministero della Sanità del** 24.2.82
E/1

4'

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

R6 ERRESEI STOP® R

FUNGICIDA

Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 4,20 di CIMOXANIL puro
Gr. 39,75 Rame metallico sottoforma di ossicloruro tetraramico
Sostanze inerti e colorante q.b. a 100

® Marchio registrato RAVIT S.p.A.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

MEDICHE

INFORMAZIONI ~~PER IL MEDICO~~

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 4708 **Ministero della Sanità del** 24.2.82
E/1

CARATTERISTICHE

L'R6 ERRESEI STOP R è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.

Agisce sia per contatto che per penetrazione nella foglia, combattendo sia le zoospore germinanti che il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanze con la fioritura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 300 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua. I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.

Peronospora della patata e pomodoro: usare 300 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida.

Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione a prodotti con reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

4709

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

ALIETTE® BPD

Antiperonosporico sistemico
Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 80 di FOSETYL ALLUMINIO puro
Coformulanti quanto basta a 100

® Marchio registrato Antiparassidari BPD

NORME PRECAUZIONALI

— Consèrvare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente. Tale attività è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attività crescita.

La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA
Contro PHYTOPHTORA CINNAMONI di CHAMAECYPARIS e altre conifere, di Rododendro e altre ericacese, Poinsettia, St. Padia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con gr. 5-10 per mq. una volta al mese in primavera.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Per miscele con altri prodotti si consigliano saggi preliminari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali, prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Ravit

Reg. n. 4709 **Ministero della Sanità del** 24.2.82
E/2

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

ALIETTE® RAVIT

Antiperonosporico sistemico
Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE:

Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 40 di FOSETYL ALLUMINIO puro
Coformulanti quanto basta a 100

® Marchio registrato RAVIT S.p.A.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Ravit

Reg. n. 4710 Ministero della Sanità del 24-2-82

£/2

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente. Tale attività è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attività crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA
Contro PHYTOPHTORA CINNAMONI di CHAMAECYPARIS e altre conifere, di Rododendro e altre ericacee, Poinsettia, St. Padia e Crisantemo, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con gr. 5-10 per mq. una volta al mese in primavera.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Per miscele con altri prodotti si consigliano saggi preliminari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali, prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

4767

DITHIOVIT A

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di zolfo e mancozeb per la lotta contro le malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali per trattamenti con mezzi aerei e da terra

Composizione
gr. 53,5 di zolfo puro (selenio assente)
gr. 21,5 di mancozeb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.

Cure sintomatiche
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Modalità di impiego
Contro malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali (Oidio, Ruggini, Septoriosi) kg. 5-7 di DITHIOVIT A per ettaro.
L'intervento deve essere effettuato alla comparsa delle prime macchie di Oidio sull'ultima foglia.
— Con mezzi da terra
Distribuire la dose prescelta in 600-800 litri per ettaro con un mezzo irroratore funzionante ad una pressione di 12-15 atmosfere, al fine di ottenere la migliore bagnatura possibile dell'apparato aereo della coltura.
— Con mezzi aerei
Distribuire la dose prescelta in 40-60 litri di acqua per ettaro.

Preparazione della poltiglia
Versare la quantità necessaria di DITHIOVIT A nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.

Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

AVVERTENZA: il prodotto è utilizzabile anche con mezzi aerei, previo consenso delle Autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo. In tal caso è consentita la miscelazione solo con altri prodotti autorizzati per l'impiego con mezzi aerei.
Quando impiegato con mezzi aerei è vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette al lavoro ed agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti.

Compatibilità
Per la preparazione di miscele basta aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di DITHIOVIT A, già pronta per l'uso, mescolando a fondo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 4767 del 26.4.1982 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

4772

AGER ALACHLOR

Diserbante selettivo per il Mais

Composizione:

ALACHLOR puro . .	. gr. 43
Emulsionanti e solventi q.b. a	. gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti o bevande e corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare di respirarne i vapori; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità di impiego: il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti annuali da seme, in via di germinazione, soprattutto graminacee (Giavone Poa): comprese Digitaria, Setaria, Panico Americano (Panicum dicothomiflorum) nonchè su alcune dicotiledoni (Amaranto, Capsella, Camomilla, Porcellana; Senape, Veronica), il prodotto è poco efficace su Stellaria, Ortica, Poligonacee ed è inoltre inefficace sulle malerbe perennanti munite di rizomi, bulbi, bulbili, stoloni (Gramigna, Convolvolo, Sorghetta, Stoppione, Artemisia).
Il diserbo si può effettuare su tutta la superficie del campo, oppure in forma localizzata a fasce larghe cm. 20/25 lungo le file; in quest'ultimo caso la dose di impiego va rapportata all'effettiva superficie trattata.

- Preparare accuratamente il terreno in modo che non rimangano zolle e zollette.
- Impiegare il prodotto immediatamente dopo la semina o qualche giorno dopo, ma prima della nascita delle infestanti, alla dose di Lt. 3 in associazione a Kg. 2 di Ager Atra; il prodotto può essere usato anche da solo dove predominano le graminacee resistenti all'atrazina o nei Mais di seconda raccolta alla dose di Lt. 6 per ettaro, che possono essere ridotte a Lt. 5/Ha in terreni sciolti od aumentati a Lt. 7-8/Ha nei terreni organici.
- Diluire il prodotto in 4-5 Hl. di acqua e distribuire la poltiglia uniformemente a mezzo delle comuni irroratrici a mano o meccaniche.
- Perchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che entro due settimane dal trattamento cada una pioggia di almeno 9-10 mm. altrimenti occorre effettuare una irrigazione a pioggia superficiale.
- Eventuali sarchiature che vengano effettuate dopo il trattamento, devono essere molto superficiali per non far affiorare semi non contenenti l'AGER ALACHLOR.

Preparazione della poltiglia: versare il totale quantitativo del prodotto nell'acqua rimescolando con cura.

Avvertenze: le coltivazioni di Mais trattate con Ager Alachlor non possono essere consociate con altre colture. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida, prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: l'Ager Alachlor è miscibile con Atrazina, Simazina e Atrazina liquida.
In caso di miscela con altri prodotti, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare che il prodotto venga a contatto con colture non indicate in etichetta. Dall'applicazione del diserbante alla semina di altre colture devono intercorrere 3-4 mesi e si procede ad una buona aratura prima della semina.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante ed agli animali.

AGER CHEMICAL s.r.l.
Roma - Via Nomentana, 299
Officina di produzione: S.C.A.M. s.r.l. - MODENA, Via Bellaria 164

Registrazione Ministero della Sanità n. 4772 del 10-5-1982.

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG. 5

4779

CARATTERISTICHE

Il SIMAQUAT PASTA è un disseccante-diserbante indicato per il diserbo dei fruttetl, vigneti, agrumeti, oliveti, asparagiaie, argini di canali e corsi d'acqua in genere, argini delle risaie e diserbo totale. Il SIMAQUAT PASTA deve essere distribuito su terreno inerbito, in quanto esplica una pronta azione disseccante sulla parte aerea delle infestanti presenti ed impedisce, per assorbimento radicale, la nascita di nuove malerbe annuali per un periodo di circa 6-8 mesi; tale azione residua non si esplica nei confronti delle infestanti perenni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fruttetl (melo, pero), **vigneti, agrumeti** (limone, arancio, mandarino, clementine), **oliveti:** kg 6-8 / ha in 800-1000 litri d'acqua; kg 5-6 / ha in terreni sciolti o su impianti giovani in 800-1000 litri d'acqua.
Le epoche più idonee per eseguire il trattamento sono la primavera o l'autunno con infestanti che non abbiano superato i 15-20 cm. d'altezza e possibilmente con terreno umido. Curare di non bagnare con il liquido diserbante le parti verdi delle piante coltivate: se ciò dovesse accadere si provocherebbe il disseccamento della porzione colpita dallo spruzzo senza conseguenze ulteriori.

Asparagia: kg 4-5 / ha in 500-600 litri di acqua; il trattamento va eseguito in primavera prima che emergano i turioni o dopo la fine della raccolta.

Argini di canali e di risaie: kg 10-12 / ha in 400-500 litri di acqua.

Diserbo totale di aree incolte: kg 15-20 / ha in 800-1000 litri di acqua in relazione allo sviluppo delle infestanti.

È vietato l'impiego diretto sui foraggi.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Aggiungere la quantità di SIMAQUAT PASTA direttamente nell'acqua necessaria

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il SIMAQUAT PASTA viene impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fitotossico per tutte le parti verdi delle piante con le quali viene a contatto

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA: dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno di 12 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Da impiegare solo su colture specializzate.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg 5

SIMAQUAT PASTA

Disseccante-diserbante in pasta ad azione immediata e residua per fruttetl, vigneti, agrumeti e oliveti

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

- Paraquat puro (sotto forma di dicloruro)	g 8,5
- Simazina pura	g 33,2
- Coformulanti	q.b. a g 100
"Contiene GLICOLE ETILENICO"	

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es.: interrando in fosse profonde più di 1 metro e cospargendo con calce viva) In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Attenzione : sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata). L'introduzione nell'organismo anche di poche gocce del prodotto può essere fatale non attendere la comparsa dei sintomi per provvedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perchè sia praticata l'emodialisi Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza assorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra afollone, la terra di Fuller, ecc

INTOSSICAZIONE PER INGESTIONE E PER INALAZIONE

I primi sintomi sono epistassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei test di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato renali. L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria
L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat nel sangue

INTOSSICAZIONE PER CONTATTO

Occhi forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).
Cute irritazione con comparsa, anche molto tardiva di vescicole
Unghie macchie bianche con lesioni trasversali e caduta
Terapia sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico
In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del paraquat e sulla terapia possono essere richieste direttamente alla società produttrice di questo presidio sanitario

CAFFARO S.P.A. - MILANO

CAFFARO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della CAFFARO S.p.A. nello stabilimento di: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) S.S. 255 Km 46

Registrazione n. 4779 del Ministero della Sanità del 10-5-1982

Anticrittogamico, in polvere bagnabile, a base di folpet, captano e captafol

Composizione
gr. 34 di Folpet puro
gr. 8 di Captano puro
gr. 8 di Captafol puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— durante la manipolazione e l'impiego usare guanti e occhiali protettivi;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

— Sintomi di intossicazione
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	*Parassiti combattuti*	*Dosi di impiego in litri 100 di acqua*
VITICOLTURA	Peronospora Muffa grigia (Botrytis),	0,2 — 0,25% = gr. 200-250
	Antracnosi ed Escoriosi	0,2 — 0,3% = gr. 200-300
ORTICOLTURA	Peronospora, Alternaria, Muffa grigia del pomodoro Peronospora e Antracnosi della lattuga, cetriolo Peronospora e Alternaria della patata Peronospora della cipolla	0,2 — 0,25% = gr. 200-250

Intervenire secondo le necessità dettate dall'andamento stagionale e dalla biologia dei parassiti, attenendosi ai calendari dei trattamenti suggeriti in zona. Le dosi più elevate si consigliano solo in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle crittogame citate e, in viticoltura, anche negli ultimi due interventi.

Preparazione della poltiglia

Versare la quantità necessaria di CODICAP in un volume di acqua circa 2 volte maggiore del peso dell'anticrittogamico; lasciare che la polvere si bagni; agitare e poi versare il tutto nel serbatoio della motopompa già riempito per metà di acqua; portare infine a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il prodotto non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco. AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio CODICAP + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di CODICAP da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del CODICAP con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto, stemperato a parte in poca acqua, alla poltiglia di CODICAP al termine del riempimento del serbatoio, mantenendo la poltiglia sempre agitata.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per tutte le colture, compresa l'uva da tavola. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CODICAP® marchio registrato Chevron Chemical Company

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

SANDOZ

Registrazione n. 4797 del 5-6-1982 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

4805

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

FANATE M

ANTICRITTOGAMICO

Composizione per 100 grammi di prodotto:

— Tiofanate-Metile puro . . . . g. 33,25

— Coformulanti . . . . q. b. a g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

FITOCHIMICA GIULIANA

Corso Verdi, 69 - 34170 GORIZIA

Prodotto nello stabilimento CHEMIA spa di S. Agostino (Fe) - S. S. 255 - Km. 46

Reg. n. 4805 del 21/5/82 del Ministero della Sanità

Peso Kg. 1

Il FANATE M si impiega in frutticultura e viticultura per la lotta contro: Muffa grigia. Monilia, Fusariosi, Verticilliosi, Oidio, Ticchiolatura, Cercospora, Sclerotinia Septoria.

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

— Melo e Pero: contro Ticchiolatura; Melo: contro oidio. Trattamenti ogni otto giorni pel periodo primaverile alla dose di g. 100 - 120 per hl. Nella fase estiva i trattamenti saranno eseguiti ogni 10 - 15 giorni.

— Mele e Pere: contro Lusariosi, Cloeosporium in trattamenti estivi g. 120 - 140 per hl.

— Pesche - Susino - Albicocco: contro Monilia e Sclerotinia, oidio e ticchiolatura g. 120 - 140/hl.

— Vite: contro Botrytis o Muffa grigia g. 150 - 200 per hl.

Stemperare il prodotto in poca acqua e diluire poi nel totale quantitativo di acqua.
L'impiego è consentito solo in campo e solo per le colture indicate in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con la maggior carte dei fitofarmaci, eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione. informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e che per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

481!

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

GLIFOBEN

Fungicida organico ad azione di contatto e sistemica

Composizione:

gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 25 di Iprodione puro
gr. 25 di Benomyl puro
Coformulati quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il GLIFOBEN è un fungicida organico ad azione di contatto e sistemica, particolarmente indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle colture di seguito indicate.

APPLICAZIONI E DOSI

- **Viticoltura**: contro la Botrite a kg. 1,5/2 per ettaro, distribuiti con 10-15 ettolitri d'acqua. Trattare alla sfioritura, prima della chiusura dei grappoli, all'inizio dell'invaiatura, e 2-3 settimane dopo l'invaiatura.

Per le varietà sensibili alla Botrite del peduncolo, effettuare un trattamento anche in pre-fioritura.

Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti; esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del mal bianco.

- **Frutticoltura** pesco, albicocco, susino: contro la Monilia a gr. 150/hl. Trattare prima, durante e dopo la fioritura.

L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le coltura indicate in etichetta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insettidici e fungicidi della nostra gamma.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto della vite e 40 giorni prima del raccolto delle pesche, albicocche e susine

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 4819 Ministero della Sanità del 7.6.1982
E/2

4838

ZANTIR AZZURRO

Anticrittogamico micronizzato per trattamenti in polvere sulla vite

COMPOSIZIONE

— Rame puro (sotto forma di ossicloruro)	g 4,58
— Zineb puro	g 2,4
— Zolfo puro (esente da selenio)	g 49,75
— Disperdenti, inerti, adesivanti e coloranti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza turbe nervose, bronchite il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite congiuntivite faringite, ecc.)

TERAPIA: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente, se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione Purganti salini Cure sintomatiche Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti

CONTROINDICAZIONI alcool, olii, grassi

AVVERTENZA. consultare un Centro Antiveleni.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue

CARATTERISTICHE

Lo ZANTIR AZZURRO è un fungicida formulato in polvere secca, da distribuire tal quale. E' particolarmente indicato contro l'Oidio e per la lotta complementare contro la Peronospora.

Lo ZANTIR AZZURRO è prodotto specifico per la vite, indicato per zone a clima asciutto ed a scarsa disponibilità d'acqua, ove rende possibile l'attuazione di una valida difesa contro Oidio e Peronospora In queste condizioni trova impiego particolarmente nel periodo estivo quando si formano sulla vegetazione rugiade che creano le condizioni ideali per attacchi di Peronospora sui grappoli.

Lo ZANTIR AZZURRO consente una uniforme copertura della superficie fogliare e può penetrare anche nelle parti interne dei grappoli. La sua colorazione permette un'evidente « marcatura » della vegetazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Lo ZANTIR AZZURRO va distribuito con polverizzatrici che consentano una regolare fuoriuscita della polvere in modo da formare una nube e da coprire uniformemente la vegetazione anche nelle parti più interne.

La dose media è di 20 kg/ha. Tale quantitativo è da aumentare a 40-50 kg/ha in relazione al tipo di allevamento, allo sviluppo vegetativo della coltura, alla gravità delle infezioni. Intervallare ai trattamenti polverulenti con ZANTIR AZZURRO trattamenti con ANTIR e Microzolfi, specie in periodi con andamento stagionale particolarmente favorevole alla Peronospora.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

ATIBILITA': Lo ZANTIR AZZURRO è compatibile con tutti gli antiparassitari preparati in polvere secca

TENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere ate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il › della miscelazione compiuta.

SSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.

I DI NOCIVITA: Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
piega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
etto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO
Officina di produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa
Stabilimento di Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4838 del 21 Giugno 1982

ON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

ZANTIR®

Anticrittogamico micronizzato per trattamenti in polvere sulla vite

COMPOSIZIONE

— Rame puro . . . . . . (sotto forma di ossicloruro)	g 4,58
— Zineb puro	g 2,4
— Zolfo puro (esente da selenio) .	g 49,75
— Disperdenti, inerti, adesivanti .	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscenza la lavanda gastrica va pratica previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Lo **ZANTIR** è un fungicida formulato in polvere secca, da distribuire tal quale. E' particolarmente indicato contro l'Oidio e per la lotta complementare contro la Peronospora.

Lo **ZANTIR** è prodotto specifico per la vite, indicato per zone a clima asciutto ed a scarsa disponibilità d'acqua, ove rende possibile l'attuazione di una valida difesa contro Oidio e Peronospora. In queste condizioni trova impiego particolarmente nel periodo estivo quando si formano sulla vegetazione rugiade che creano le condizioni ideali per attacchi di Peronospora sui grappoli.

Lo **ZANTIR** consente una uniforme copertura della superficie fogliare e può penetrare anche nelle parti più interne dei grappoli.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Lo **ZANTIR** va distribuito con polverizzatrici che consentano una regolare fuoriuscita della polvere in modo da formare una nube e da coprire uniformemente la vegetazione anche nelle parti più interne.

La dose media è di **20 kg/ha**. Tale quantitativo è da aumentare a **40-50 kg/ha** in relazione al tipo di allevamento, allo sviluppo vegetativo della coltura, alla gravità delle infezioni. Intervallare ai trattamenti polverulenti con **ZANTIR** trattamenti liquidi con ANTIR e Microzolfi, specie in periodi con andamento stagionale particolarmente favorevole alla Peronospora.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA': Lo **ZANTIR** è compatibile con tutti gli antiparassitari preparati in polvere secca.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicaziono, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per évitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO
Officina di Produzione: AGRINDUSTRIA
Stabilimento di S. Cipriano Po, - Pavia

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4839 de 21 Giugno 1982

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

4859

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ORTHOZEB

Fungicida organico
Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 40 di Mancozeb puro
gr. 25 di Captan puro
Sostanze inerti quanto basta a 100

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: *l'ingestione provoca: bruciori esofagei, nausea, conati di vomito, coliche addominali, diarrea, apatia, irritazione nervosa, aritmia, cianosi, collasso cardiocircolatorio.*
Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, fotodermatosi, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia. *In caso di ingestione provocare il vomito; lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua); il vomito e la lavanda gastrica sono controindicati se esistono lesioni gastroesofagee. Inoltre, digitale, purganti salini, cure sintomatiche.*
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: *alcool, olii, grassi.*

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 4859 **Ministero della Sanità del** 21.6.1982
E/1

APPLICAZIONI

L'ORTHOZEB è un fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura delle promacea.

DOSI D'IMPIEGO gr 200-300/hl

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

L'Orthozeb è miscibile con i prodotti della nostra gamma. Non è miscibile con i prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) con olii e con zolfi, la sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili al (Mancozeb) Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna, per le quali si sconsiglia; può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canadà)

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ERISAN B

Fungicida organico
Polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 34,32 Maneb puro
gr. 5,68 Zineb puro
gr. 25 Captan puro
Coformulanti quanto basta a 100

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca: bruciori esofagei, nausea, conati di vomito, coliche addominali, diarrea, apatia, irritazione nervosa, aritmia, cianosi, collasso cardiocircolatorio.
Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, fotodermatosi, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione: provocare il vomito; lavanda gastrica con magnesia usta (gr 30 per litro d'acqua); il vomito e la lavanda gastrica sono controindicati se esistono lesioni gastroesofagee. Inoltre, digitale, purganti salini, cure sintomatiche.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni

Alcool, olii, grassi.
In caso di ingestione, in quanto il formulato contiene Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz ed anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 4860 Ministero della Sanità del 21.6.82

E/1

APPLICAZIONI

L'ERISAN B è un fungicida organico raccomandato per la lotta contro la Ticchiolatura e contro il Gloeosporium delle pomacee.
Dosi d'impiego: gr. 200-250/hl.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) con olii e con zolfi.

La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo:
Stark Delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canadà; e di pero: Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna, Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zeccher-manna; per le quali se ne sconsiglia l'impiego.

Sospendere i trattamenti 28 gg. prima del raccolto

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

4879

Anticascola Cifo

CLASSE TOSSICOLOGICA III

Fitoregolatore liquido per le pomacee

Composizione

NAA puro gr. 3
Coformulanti e solventi q.b. a 100

L'ANTICASCOLA CIFO a base di NAA (acido alfanaftalenacetico) impedisce la formazione del tessuto di separazione alla base del picciolo causa del distacco dei frutti dalla pianta.

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Dosi e modalità d'impiego

Per le pomacee diluire gr. 20-40 di ANTICASCOLA CIFO in 100 litri di acqua e con tale soluzione bagnare uniformemente la parte aerea delle piante, in particolare i frutti. Si consiglia di effettuare il trattamento su piante asciutte e nelle ore meno calde della giornata, quando si riscontrano i primi sintomi della cascola (generalmente 15-20 giorni prima del raccolto).
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: non mescolare il formulato con altri prodotti.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Sede legale e officina di produzione:
CIFO S.p.a. - San Giorgio di Piano (Bo)

Reg. Min. Sanità n. 4879 del 7/9/1982

Da non vendersi sfuso. Peso netto:

4895

STIRYL PB 50

INSETTICIDA FORMULATO IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
CARBARYL (esente da B-naftolo) puro 49,5 gr.
Supporti, inerti, bagnanti e disperdenti q.b. a 100 gr.

CARATTERISTICHE:
Insetticida che agisce per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti, indicato per la difesa di pomacee, drupacee, vite, agrumi, colture orticole, floreali in pieno campo e mais.
Lo **STIRYL PB 50** non lascia sulle parti trattate odori o sapori sgradevoli.

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
Conservare la confezione ben chiusa;
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicaedia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion; ecc.) che potrebbero essere nocive.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
— **Pomacee** (melo e pero): 150-200 gr./hl. contro Carpocapsa (verme), Capua, Cacoecia ed Eulia; 200 gr./hl. contro le cocciniglie in genere.
— **Pesco:** 200 gr./hl. contro la Cydia (tignola orientale).
— **Uva e Agrumi** (limone): 150-200 gr./hl. contro la Tignola.
— **Olivo:** 150-200 gr./hl. contro la Tignola; 200-250 gr./hl. contro la Cocciniglia « Mezzo grano di pepe ».
— **Patata:** 150-200 gr./hl. contro la Dorifora.
— **Carciofo:** 200-250 gr./hl. contro la Depressaria.
— **Pomodoro e Insalata:** 150-200 gr./hl. contro la Nottua.
— **Garofano** in pieno campo: 150-200 gr./hl. contro la Cavolaia e la Bega.
— **Barbabietola:** 150-200 gr./hl. contro l'Altica, Cassida, e Mamestra.
— **Mais:** 3-4 Kg. per ettaro contro la Piralide e la Nottua.

Intervenire alla prima comparsa dei fitofagi, ripetendo il trattamento in concomitanza di nuovi attacchi.
Per la preparazione della sospensione: Sciogliere il prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
Lo **STIRYL PB 50** è compatibile con molti fitofarmaci eccetto quelli fortemente alcalini come la poltiglia Bordolese, il polisolfuro di calcio e di bario e la calce.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':
Non eseguire trattamenti durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO
7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.

Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA
Stabilimento di produzione: Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4895 **del** 8/09/82

PESO NETTO Kg. 5

4897

Rigenal L

CLASSE TOSSICOLOGICA III

Ormone radicante liquido

Composizione

NAA puro	gr. 0,5
Coformulanti e solventi	q.b. a gr. 100

Il RIGENAL L è a base di un auxinosimile sintetico, l'acido alfanaftalenacetico, che promuove il naturale trasporto discendente degli ormoni col risultante accumulo di auxine nella regione basale della talea e la produzione delle prime radici. Ciò rende il RIGENAL L particolarmente indicato per tutte le talee erbacee, legnose e arbustive e per talee di viti.

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Dosi e modalità d'impiego

Diluire gr. 2-4 di RIGENAL L per ogni litro di acqua ed immergere le talee, riunite in mazzetti, per una profondità di 2-3 cm.
Le talee erbacee devono rimanere immerse nel bagno per almeno 12 ore, mentre le talee legnose devono rimanere immerse per 24 ore. Dopo tale trattamento si consiglia di sciacquare le talee con acqua e di porle a dimora nel più breve tempo possibile.

Compatibilità: non mescolare il formulato con altri prodotti.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Sede legale e officina di produzione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)

Reg. Min. Sanità n. 4897 del 7/9/1982

Da non vendersi sfuso

Peso netto:

491

STIURON PB 47,5

Diserbante selettivo per le colture orticole

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
LINURON puro 47,5 gr.
Bagnanti, disperdenti e supporti
inerti q.b. a 100 gr.

CARATTERISTICHE
Lo **STIURON PB 47,5** è un diserbante, formulato in polvere bagnabile, selettivo per il diserbo delle colture orticole dalle più comuni infestanti annuali, quali: Persicaria, camomilla, veronica, plantaggine, euforbia, capsella, setaria, chenopodio, senape, amaranto, papavero, digitaria, borsa del pastore, morella, poligono, portulaca, ranuncolo, gavone e matricaria. Alle dosi selettive per le colture lo **STIURON PB 47,5** non controlla le erbe perenni.

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
Conservare la confezione ben chiusa;
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
Non contaminare, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.
Consigli terapeutici: Per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epato-protettori.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Lo **STIURON PB 47,5** si impiega alle seguenti dosi per ettaro:
DISERBO DELLA FRAGOLA: 1,5-2,5 Kg., effettuando il trattamento a partire dal 2.o anno d'impianto, poco prima della ripresa vegetativa primaverile.
DISERBO DELLA CAROTA: in pre-emergenza 1,5-2 Kg., nell'intervallo fra la semina e 2-3 giorni prima dell'emergenza della coltura ponendo il seme ben coperto nel terreno; in post-emergenza 1,5-2,5 Kg. quando le carote hanno completamente formato il 2° palco fogliare (quattro foglie vere).
DISERBO DELLA PATATA: 1,5-3 Kg., in pre-emergenza, nell'intervallo tra il collocamento a dimora dei tuberi e l'emergenza della coltura.
DISERBO DEL CARCIOFO: 1,5-2,5 Kg., prima della ripresa vegetativa.
DISERBO DEL SEDANO E DEL FINOCCHIO: 1-2 Kg., intervenendo dopo la posa a dimora, non appena le piantine hanno superato la crisi del trapianto.
DISERBO DEL PREZZEMOLO: 1,5-2,5 Kg., in pre-emergenza della coltura.
DISERBO DI FAGIOLI, FAGIOLINI E SOJA: 0,8-1,5 Kg. in pre-emergenza subito dopo la semina.
Le dosi minime consigliate si riferiscono a terreni leggeri, sabbiosi e moderatamente dotati di sostanza organica, quelle massime a terreni pesanti, argillosi o ricchi di sostanza organica.
L'opportuna dose di prodotto va prima stemperata in poca acqua e quindi diluita al volume desiderato (400-700 lt. d'acqua per ettaro) agitando energicamente.
Prima di procedere al trattamento è opportuno livellare e sminuzzare bene la superficie del terreno, irrorarlo quindi uniformemente, tenendo in costante agitazione la miscela dentro le pompe.
Evitare di effettuare i trattamenti in periodi molto caldi o su terreni molto sabbiosi e secchi. L'azione del diserbante risulta favorita da una leggera pioggia o irrigazione.
Terminati i trattamenti, lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Lo **STIURON PB 47,5** non è compatibile con gli anticrittogamici e gli insetticidi; può invece essere miscelato con altri diserbanti a base di Paraquat, Diquat, Diuron, Trifluralin e Atrazina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Lo **STIURON PB 47,5** può causare fitotossicità per colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO
60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto in luogo asciutto e fresco.

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.
Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA
Stabilimento di produzione: Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4916 **del** 25/09/82

Peso netto: gr.

4943

DELAN® - K

Composizione per 100 grammi:
gr. 14,2 DITHIANON puro
gr. 22,4 RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b. a gr. 100

CLASSE II NOCIVO

Fungicida cuproorganico per la lotta contro la Peronospora della vite, la Ticchiolatura del melo e pero, Corineo e Bolla del pomodoro, Peronospora, Phythophtora ed Alternaria della patata, Peronospora, Antracnosi e Cilindrosporiosi del pisello, Peronospora fogliare del peperone e spinacio.

Natura del rischio:
Avvelenamento grave per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirare i vapori
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrare in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva)
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

Informazioni per il medico:
Possibilità d'intossicazione per ingestione e contatto cutaneo.
Sintomologia: irritazioni cutanee, vomito, diarrea.
Terapia: sintomatica. Trattamento topico delle manifestazioni cutaneo con pomate antiistaminiche e cortisoniche. AVVERTENZA Consultare un centro anti

Modalità d'impiego:
Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua rimanente.

Campi d'applicazione e dose d'impiego:

Viticoltura: 300-500 gr/hl contro la Peronospora della vite. Per trattamenti ritardati e specialmente in previsione di attacchi massicci di peronospora è opportuno adattare la dose più elevata.

Frutticoltura: 300-500 gr/hl contro la ticchiolatura del melo e pero.

Pesco: contro Corineo e Bolla gr. 400/hl per trattamenti al „bruno" gr. 300/hl per quelli al „verde"

Orticoltura: 300-400 gr/hl contro la peronospora, septoria, alternaria, cladosporiosi del pomodoro, Phythoptora ed alternaria della patata, Peronospora fogliare del peperone e spinacio, Antracnosi e Cilindrosporiosi del pisello.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Delan K è miscibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi.
In trattamenti combinati, evitare la miscela di formulati liquidi con formulati in polvere.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Evitare l'uso durante la fioritura sulle seguenti varietà **di melo:** Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, renetta del Canadà, Rosa Mantovana, **e di pero:** Abate Fetel, Buona Luigia d'Avaranches, Butirra, Clargeau, Passa Crassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra giffard, cuprosensibile e su pesco e susino. Il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischio di nocività:
Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

„Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso."
„Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato."
„Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali."

J. & A. MARGESIN S.p.A. - Fitofarmaci - Lana d'Adigo (BZ)
Officina di produzione: Lana d'Adige (BZ)

Registrazione del Ministero della Sanità No. 4943 del 23-9-1982

DA NON VENDERSI SFUSO

4948

TOTERBA

DISERBANTE TOTALE

COMPOSIZIONE
Clorato di sodio puro . . . . gr. 94
Coformulanti q.b. a . . . . gr. 100

CLASSE IV

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Tenere in luogo sicuro, lontano dal calore e dalle fiamme libere.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PROPRIETA' E IMPIEGO
E' un diserbante per la distruzione di ogni erba in fase attiva di crescita. Per il diserbo totale di bordi stradali, viali, cortili, aree non coltivate, aree industriali, sedi ferroviarie, mura, ovunque si voglia eliminare malerbe non desiderate.

USO E DOSI
Kg. 1 per 40 lt. d'acqua.
Distribuire circa 1 lt. di soluzione per ogni mq. di superficie da trattare. Per erbacce tenaci (tipo gramigna) o molto sviluppate radoppiare la dose oppure ripetere il trattamento dopo 15 giorni. E' opportuno, prima di effettuare il diserbo, inaffiare il terreno con semplice acqua. Meglio se il trattamento è fatto dopo una abbondante pioggia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

MISCIBILITA'
Il prodotto si usa da solo.

AVVERTENZE
Evitare che il TOTERBA venga a contatto con piante ornamentali, arbusti, alberi ed altre colture Tenere il prodotto lontano dall'acqua destinata ad usi domestici o irrigazioni.
Evitare il contatto con i semi, fungicidi e fertilizzanti.
Usare sempre la stessa pompa per l'uso di TOTERBA e non usarla per fertilizzanti, insetticidi e disinfettanti, ricordandosi di lavarla accuratamente dopo l'uso.

ATTENZIONE: Impiegare il prodotto in assenza di colture agricole, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGROZOOFARMA s. r. l. - MORTEGLIANO (UD)

OFFICINA DI PRODUZIONE: AGROZOOFARMA - MORTEGLIANO (UD)

Reg. Min. San. n. 4948 del 15 - 10 - 1982

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g

4977

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

ROM L 20

INSETTICIDA - AFICIDA

Composizione per 100 grammi di prodotto:

— Dimethoato puro	g. 19
— Coformulanti	q. b. a g. 100
Contiene Xilolo	

CLASSE III

ATTENZIONE:

MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMIA S.p.A.

Prodotto nello stabilimento CHEMIA S.p.A. di S. Agostino (FE) - S.S. 255 - Km. 46

Registraz. n. 4877 del 15-10-81 del Ministero della Sanità.

Peso Kg. 0,100

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto possiede una azione citotropica per cui penetra nei tessuti dei vegetali esplicando la sua azione tossica anche contro i parassiti più nascosti.

DOSI D'IMPIEGO

Il ROM L 20 è impiegato in pieno campo e in serra su:

— **pero** contro: afidi, psilla, tingide, cecidomia, zeuzera, mosca alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua;

— **melo** contro: afidi, carpocapsa, cemiostoma, mosca alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua;

— **pesco** contro: afidi, mosca, anarsia, tignola alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua;

— **susino** contro: afidi, mosca alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua;

— **ciliegio** contro: mosca alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua (effettuare il trattamento quando i frutti cambiano il colore);

— **mandorlo** contro: afidi, campa alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua;

— **olivo** contro: mosca, tignola, tripidi, punteruolo, oziorrinco, cocciniglia alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua. (Per la mosca i trattamenti si eseguono all'inizio della ovoposizione quando si notano le prime punture);

— **vite** contro: ragno giallo, tignola, acaro giallo, maggiolino alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua;

— **arancio, mandarino, pompelmo, limone, mandarancio** contro: mosca, ragno rosso, afidi, cocciniglia bianca, cocciniglia cotonosa, cocciniglia bianca rossa alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua

— **pioppo** contro: crisomela, gemmaiola, punteruolo, farfalla bianca alla dose di g. 200-250/Hl. di acqua;

— **mais, grano, avena, orzo, riso** contro: afidi alla dose di kg. 1,3-1,5/Ha.;

— **erba medica** contro: afidi, fitonomo, misurino, apion alla dose di kg. 1,3-1,5/Ha.;

— **bietola** contro: mosca, afidi alla dose di kg. 1,3-1,5/Ha.;

— **patata, pomodoro, tabacco, peperone, melanzana, insalata, lattuga, sedano, carota,** contro: afidi, mosca, tripidi, aleurodidi, depressaria, ragno rosso alla dose di g. 150-200/Ha.;

— **carciofo contro:** depressaria, nottua alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua;

— **gladiolo, rosa, garofano** contro: afidi, tripidi striscino del garofano alla dose di g. 150-200/Hl. di acqua.

Nei trattamenti in serra diminuire leggermente le dosi. Stemperare il prodotto in poca acqua e diluirlo poi nel totale quantitativo di acqua.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina: polisolfuri e solfato di rame.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci, il bestiame e per gli insetti utili e pertanto non trattare durante la fioritura.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.

ATTENZIONE

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

4983

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ISOLIN

Polvere Bagnabile
Erbicida selettivo di pre-emergenza del frumento tenero contro monocotiledoni e dicotiledoni annuali

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di Isoproturon puro
gr. 13 di Linuron puro
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Irritante per la cute
L'ingestione può provocare bruciori gastro-esofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Terapia
Per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche.
Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi flucosate, potassio, epato-protettori.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 4983 **Ministero della Sanità del** 25.10.82

CARATTERISTICHE

L' **ISOLIN** è un erbicida selettivo di pre-emergenza del frumento tenero.
L'associazione dei due principi attivi (Isoproturon + Linorun) fornisce il controllo delle principali infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali.

Infestanti sensibili

a) **Graminacee:** Agrostis, Alopecurus, Avena ludoviciana, Avena fatua (nascite autunnali), Phalaris, Lolium (nascite autunnali), Poa annua, Poa trivialis;

b) **Dicotiledoni:** Adonis, Matricaria, Papaver, Polygonum (nascite precoci), Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria, Veronica.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato subito dopo la semina del frumento tenero, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.
Il terreno, al momento del trattamento deve essere ben sistemato, livellato, privo di zolle, di infestante di avvallamenti.
Si raccomanda una profondità di seme regolare, avendo cura di evitare che parte dei semi dei cereali rimangano scoperti, perché potrebbero essere danneggiati dal diserbante.
Dosi: Dose normale: Kg. 3/ha, distribuiti con almeno 500 litri d'acqua.
La dose deve essere portata a Kg. 3,5/ha se si vuole combattere la Phalaris, l'Avena a nascita autunnale o il Lolium a nascita tardiva.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Diluire la dose di prodotto in un volume doppio d'acqua, indi versare la poltiglia nell'irroratrice in corso di riempimento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

Avvertenza: Non trattare su terreni sabbiosi, sciolti e filtranti.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

E/1

4995

ORTHENE (R)
DIBROM F

Insetticida liquido emulsionabile per la difesa di Fragola, Ortagg. (pomodoro, melanzana, peperone, insalate, spinacio, bietole da costa e da foglia, pisello, fagiolo, fagiolino, carota, prezzemolo, sedano, cipolla, aglio, melone, cocomero, zucchino, cetriolo), Patata, Colture floricole ed ornamentali in pieno campo, Colture forestali e loro vivai.
Si impiega in trattamenti liquidi contro Afidi, Mosche bianche od Aleurodidi, Nottue, Tignole, Mosche minatrici, Oziorrinco e larve di Cocciniglie.

COMPOSIZIONE

– Acefate puro	g	14,4
– Naled puro	g	14,4
– Coadiuvanti e Solventi: quanto basta a	g	100

- contiene Cloruro di metilene e Etilcellosolve

(R) Marchio registrato Chevron Chemical Company-USA

SIPCAM—Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Registrazione n. 4885 del 5.11.82 Ministero della Sanità

Natura del rischio; sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali; conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione;
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni; morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza; consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto possiede una pronta efficacia ed una buona persistenza d'azione contro numerosi insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si usa alla dose di g 250-300 per 100 litri di acqua, pari a Kg. 2,5-3 per ettaro di superficie a colture erbacee, irrorati con pompe a volume normale.
Nel caso si usino atomizzatori a basso volume, la dose verrà aumentata in rapporto alla minore quantità di acqua distribuita.
Ripetere i trattamenti, se necessario, in relazione allo sviluppo dei parassiti.

Preparazione della poltiglia; versare il prodotto direttamente nel recipiente della pompa irroratrice, contenente già acqua, sempre agitando e mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità; il prodotto è miscibile con i comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come Polisolfuri e Calce.
Avvertenza; in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità; dato l'elevato numero di varietà orticole, floricole ed ornamentali, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccola superficie prima di passare a trattare superfici più ampie.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per le api, non impiegarlo in fioritura.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta;

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

500

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ZEACLON

Polvere Bagnabile
Erbicida selettivo di pre-emergenza
del frumento tenero contro monocotiledoni
e dicotiledoni annuali

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di Isoproturon puro
gr. 13 di Linuron puro
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Irritante per la cute

L'ingestione può provocare bruciori gastro-esofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Terapia

Per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche.
Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi flucosate, potassio, epato-protettori.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 5000 Ministero della Sanità del 25.10.1982

E/1

CARATTERISTICHE

Lo ZEACLON è un erbicida selettivo di pre-emergenza del frumento tenero.
L'associazione dei due principi attivi (Isoproturon + Linorun) fornisce il controllo delle principali infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali.

Infestanti sensibili

a) **Graminacee:** Agrostis, Alopecurus, Avena ludoviciana, Avena fatua (nascite autunnali), Phalaris, Lolium (nascite autunnali), Poa annua, Poa trivialis;

b) **Dicotiledoni:** Adonis, Matricaria, Papaver, Polygonum (nascite precoci), Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria, Veronica.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato subito dopo la semina del frumento tenero, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.
Il terreno, al momento del trattamento deve essere ben sistemato, livellato, privo di zolle, di infestante di avvallamenti.
Si raccomanda una profondità di seme regolare, avendo cura di evitare che parte dei semi dei cereali rimangano scoperti, perché potrebbero essere danneggiati dal diserbante.
Dosi: Dose normale: Kg. 3/ha, distribuiti con almeno 500 litri d'acqua.
La dose deve essere portata a Kg. 3,5/ha se si vuole combattere la Phalaris, l'Avena a nascita autunnale o il Lolium a nascita tardiva.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Diluire la dose di prodotto in un volume doppio d'acqua, indi versare la poltiglia nell'irroratrice in corso di riempimento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

Avvertenza: Non trattare su terreni sabbiosi, sciolti e filtranti.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

5008

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

REDREX SN/L

Acaricida in pasta fluida
Per la lotta contro le forme mobili degli acari, compresi quelli resistenti ai fosforganici ed ai comuni acaricidi

Composizione:

gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 51,8 Cyhexatin puro
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso, e con i mezzi più idonei, le confezioni che contengono il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Nocivo per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**
— **Sintomi d'intossicazione:**
Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi.

— **Consigli terapeutici di massima e condizioni al caso**
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale. Terapia sintomatica.

NORME AGRARIE - CARATTERISTICHE DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **REDREX SN/L** è un acaricida caratterizzato da una struttura chimica, efficace per il controllo delle forme mobili del ragno rosso che infestano le piante da frutto (melo, pero e piante ornamentali in pieno campo).

Il **REDREX SN/L** agisce per contatto sia contro gli acari sensibili sia contro quelli che si dimostrano resistenti ai prodotti fosforganici ed ai cloroderivati comunemente impiegati o come acaricidi specifici o come prodotti ad azione generica per la lotta contro i fitofagi.

Il **REDREX SN/L** si impiega alle dosi di 50-70 gr per hl d'acqua per trattamenti a volume normale, usando la dose minore nel caso di lievi infestazioni e la dose massima quando la popolazione degli acari da combattere è molto numerosa.

In ogni caso si dovrà aver cura di bagnare completamente le piante. I trattamenti da effettuare sono normalmente due per stagione (sulle piante di melo e pero). Il primo trattamento va eseguito alla prima comparsa degli acari sulle foglie (1-2 acari per foglia). Il secondo trattamento va effettuato alla distanza di 2-4 settimane dal primo a seconda della intensità dell'attacco. Solo in caso di precoce comparsa delle forme mobili o di forti infestazioni può rendersi necessario un terzo trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **REDREX SN/L** è compatibile con la maggior parte dei prodotti usati in fitoiatria; è invece sconsigliabile miscelarlo con i polisolfuri di calcio e di bario o con la poltiglia bordolese.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il prodotto sulle rose in serra.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili in generale, per il bestiame, i pesci e gli animali domestici. Non fare pascolare nelle zone trattate e non alimentare il bestiame ed animali domestici con prodotti trattati direttamente od accidentalmente almeno fino a 30 giorni dopo il trattamento.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n.5008 Ministero della Sanità del 25.10.1982

Peso netto Kg.

E/1

501

/

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non contaminare acque di uso domestico.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione ricorrere al medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA' Il prodotto si usa da solo

FITOTOSSICITA' Evitare il contatto con le foglie e i frutti degli agrumi, inoltre evitare il contatto con le piante vicine (in modo particolare con le radici); può essere fitotossico se non usato secondo le norme e sulle colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA' Il prodotto è tossico per i pesci. Tenere lontani, durante i trattamenti, persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione ad impiegare esclusivamente per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Attenzione: da non usare su terreni destinati a colture alimentari.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'TORAM'

Disserbante totale "a carica residua" in formulazione granulare per eliminare infestazioni erbacee ed arbustive in genere.

COMPOSIZIONE

Bromacile puro	g 1,1
Picloram puro	g 0,3
Coadiuvanti, inerti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI SOLPLANT S.p.A. - Crespellano (BO)
Confezionato presso:
SICOPA S.n.c. - Pianello Val Tidone (PC)
Registrazione Ministero della Sanità n. 5013 del 25-10-1982
'TORAM' - Marchio registrato ICI SOLPLANT S.p.A.

'TORAM' è un erbicida totale a base di bromacile e picloram caratterizzato da lunga persistenza sul terreno.
Agisce sistemicamente (cioè attraverso il sistema vascolare delle piante) dopo essere stato assorbito attraverso le radici, su piante erbacee, suffruticose arbustive ed arboree come rovi, robine, ginepri, romici, cardi, poligoni.
La formulazione in granuli ne rende possibile l'impiego anche in località e situazioni in cui manchi l'acqua.
'TORAM' è indicato per: diserbo di canali, fossi, capezzagne e simili. Diserbi in luoghi incolti (strade, stazioni, depositi, spiazzi, raffinerie, recinti industriali, aree militari, zone archeologiche). Diserbo totale in luoghi in cui è sconsigliabile ricorrere a trattamenti liquidi per la presenza di linee elettriche sotto tensione ed in luoghi dove si temano danni da umidità a impianti e manufatti. Diserbo su piccole superfici (distributori di benzina, stazioni di servizio, piazzali e parchi macchine, marciapiedi, cortili).

MODALITÀ D'IMPIEGO

Epoca: il trattamento può essere fatto in qualsiasi periodo dell'anno ma preferibilmente quando le piante sono in fase di vegetazione attiva, e cioè in primavera o in autunno e in presenza di umidità nel terreno.
Metodo: Distribuzione uniforme, a spaglio, del prodotto tal quale sulla superficie interessata dalle infestanti.
Mezzi: A mano (alla volata) o con spandiconcimi portati o trainati dalla trattrice.
Dosi:
— Su infestazioni fitte costituite da piante con apparato radicale profondo . . . kg 450-500/ha
— Su infestazioni medie costituite da piante con apparato radicale superficiale . . . kg 300-350/ha
— Su infestazioni modeste o superfici precedentemente trattate. . kg 200-250/ha

Avvertenze:
— Evitare di operare contro vento.
— È normale che, su terreni asciutti ed in assenza di pioggia, gli effetti di 'TORAM' si manifestino più lentamente e solo dopo un certo tempo.
— Sulle superfici trattate con 'TORAM' si sconsiglia di impiantare colture per almeno 18 mesi dal trattamento. In ogni caso è sempre consigliabile eseguire una prova su superficie ridotta.
— Non distribuire il prodotto in prossimità di piante sensibili o in zone in forte pendenza da cui, per dilavamento, potrebbe essere traslocato verso piante utili.
— Nel diserbo dei canali, scoline e corsi d'acqua, accertarsi che le acque presenti o immesse a breve scadenza dal trattamento, non vengano destinate alla irrigazione.

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

5101

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

MARLATE® 50

Insetticida a base di metossicloro

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 44 di Metossicloro puro
Ingredienti inerti q.b. a 100.

*** Marchio Reg. E.I. Du Pont de Nemours & Co. Inc. - U.S.A.**

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Intossicazione acuta: *lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno* controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi *in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0.1-0.2 gr.) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.*

Controindicazioni:
La morfina, l'alcool, e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5101 **Ministero della Sanità del** 29.10.79

E/2

ISTRUZIONI PER L'USO

Per colture agrarie: Nei trattamenti liquidi sono generalmente raccomandate dosi di 250-350 gr. in 100 litri d'acqua. Per i trattamenti polverulenti diluire da 5 a 10 kg. di « Marlate 50 » in 40-50 kg. di talco, pirofillite o zolfo. L'applicazione va fatta su tutta la superficie delle foglie e dei frutti eseguendo 2 o più trattamenti a 7-14 giorni d'intervallo. Per i fruttiferi le applicazioni vanno iniziate con un trattamento alla caduta dei petali.

IMPIEGHI E DOSI

Frutticoltura: mele, pere, pesche, albicocche, ciliege, susine: contro verme delle mele e delle pere, antonomo, tignola orientale, mosca della frutta, adulti di fillominatori, mosca delle ciliege, tignola della vite gr. 250-350 per 100 lt.

Orticoltura: piselli, fagioli, zucche, pomodori, patate, asparago, cavoli, peperoni, melanzane, insalate, cetriolo, contro: cercopidi, maggiolini, altiche, dorifora della patata, tonchi dei piselli e fagioli, mosca e criocera dell'asparago, cavolaia, coccinellidi gr. 250-350 per lt.

Colture foraggere: erba medica, trifoglio, soia, veccia, favino, lupino, contro: cercopidi, fitonomo, miaurino, cicadellidi: gr. 250-350 per 100 lt. d'acqua.

Disinfestazione di depositi per cereali vuoti:
Per la disinfestazione di magazzini vuoti, usare 5 kg. di « Marlate 50 » in 100 litri di soluzione ogni 100 mq. di superficie, prima dellimmagazzinamento del prodotto. In tal modo si può efficacemente lottare contro gli insetti infestanti i cereali immagazzinati (Calandre, Tonchi, Tignole).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il « Marlate 50 » è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e anticrittogamici di uso più comune.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

Pasta anticrittogamica per la cicatrizzazione delle ferite del legno su piante fruttifere, ornamentali e d'alto fusto

Composizione
gr. 1 di captafol puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi;
— evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito.

Informazioni per il medico
— Sintomi di intossicazione.
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
— Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua) e digitale.

Modalità di impiego
Il SANTAR SM è una pasta, pronta per l'uso, ad effetto cicatrizzante e disinfettante che trova impiego nella protezione delle ferite provocate da eventi atmosferici, da potatura, da tagli di risanamento in seguito ad attacchi parassitari, da attacchi fungini (es. Nectria), da grandine, da roditori o da altre cause accidentali su piante fruttifere, ornamentali e di alto fusto. Con una lama ben affilata pulire le ferite levigando accuratamente la superficie dei tagli, quindi, per mezzo di un pennello a peli duri, stendere il SANTAR SM sulla ferita ricoprendola con uno strato sottile di pasta e facendo in modo che questo strato superi i bordi della ferita stessa.
Prima dell'uso, soprattutto se il prodotto è stato conservato a lungo, rimescolare la pasta a fondo.
Il SANTAR SM è particolarmente indicato nella protezione delle piante di viali alberati e parchi cittadini (platani, cipressi).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità
Il prodotto è fitotossico se applicato sugli innesti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 5106 del 29.11.1983 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

5198

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZA

FOLTAPET L 27-7 può essere irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi. In soggetti particolarmente sensibili, si possono verificare manifestazioni anche vistose, ma transitorie e non preoccupanti dato che presenta un rischio trascurabile per l'uomo.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione. Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili e per i pesci.
Su uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti. Su uve da tavola e sulle altre colture sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

'FOLTAPET' L 27-7

Fungicida liquido a base di Folpet e Captafol per trattamenti in:
VITICOLTURA - FRUTTICOLTURA
ORTICOLTURA - FLORICOLTURA

COMPOSIZIONE

Folpet puro	g 26,7
Captafol puro	g 6,7
Coadiuvanti, inerti	q.b. a g 100

CLASSE IV

'FOLTAPET' L 27-7 è un'associazione di due fungicidi organici, il Folpet ed il Captafol. Ciò lo rende indicato per una lotta efficace contro le più comuni malattie fungine delle colture erbacee ed arboree.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite a 100 l di acqua)

Orticoltura: g 300 contro Peronospora e Alternariosi del pomodoro, Peronospora e Antracnosi d· la lattuga, cetriolo e melone; g 400 contro Peronospora e Alternariosi della patata, Botrytis della melanzana, Peronospora della cipolla.
Viticoltura: g 300-400 contro Peronospora e Botrytis (muffa grigia). Per i trattamenti antiperonosporici si raccomanda di seguire il "calendario d'incubazione" proprio della zona.
Per i trattamenti anti-botritici si raccomandano interventi continui, in condizioni favorevoli di sviluppo della malattia.
Piante ornamentali in pieno campo: g 500 contro Antracnosi, Alternariosi, Botrytis; g 300 contro Fusariosi del garofano.
Frutticoltura:
Pomacee: g 200-300 contro ticchiolatura (solo trattamenti prefiorali). E fitotossico per le seguenti cultivar: Pere (Butirra d'Anjou) - Mele (Red delicious, Winesap) - g 300 contro marciumi di magazzino (Gleosporium)
Albicocco: g 300 contro sclerotinia.
Nespolo: g 300 contro ticchiolatura.
Pesco: g 600 contro bolla, corineo, cancro dei rametti e monilia (trattamenti al bruno).
Olivicoltura: g 400 contro occhio di pavone e antracnosi.

COMPATIBILITÀ

È miscibile con la maggior parte degli antiparassitari di uso comune. Non è miscibile con Poltiglia bordolese. Può essere applicato solo 20 giorni dopo un trattamento a base di olii minerali o polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Alcune cultivar di vite, tipo Schiava, risultano particolarmente sensibili. Per ridurre eventuali fenomeni fitotossici si suggerisce:
- non superare kg 4 di Foltapet L 27-7 per ettaro
- trattare nelle ore meno calde della giornata
- usare pompe che distribuiscano uniformemente il prodotto, senza sgocciolamento.

ICI Solplant SpA

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 5198 del 1-2-1983
'FOLTAPET' marchio registrato Chevron Chemical Company

DA NON VENDERSI SFUSO

ALASIP (R)

Diserbante selettivo per mais.

Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in via di germinazione.

COMPOSIZIONE

- Alaclor puro	g	45
- Coadiuvanti e solventi:quanto basta a	g	100
- contiene Monoclorobenzolo		

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM-Soc.It.Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 5199 del 10/2/1983 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme, soprattutto graminacee (Giavone, Poa) comprese Digitaria, Setaria, Panico americano (Panicum dichotomiflorum) nonchè su alcune dicotiledoni (Amaranto,Capsella,Camomilla,Porcellana,Senape,Veronica); il prodotto impiegato da solo, senza aggiunta di MAIZINA, è poco efficace su Stellaria,Ortica,Poligonacee ed è inoltre inefficace sulle malerbe perennanti munite di rizomi, bulbi, bulbilli, stoloni (Gramigna, Convolvolo, Sorghetta, Stoppione, Artemisia).
Il diserbo si effettua su tutta la superficie del campo, oppure in forma localizzata a fasce larghe 20-25 cm. lungo le file: in quest'ultimo caso la dose di impiego va rapportata alla effettiva superficie trattata.
Il prodotto si impiega su terreno ben affinato subito dopo la semina,o qualche giorno dopo, ma prima della nascita delle infestanti, alle seguenti dosi, valide per terreni da leggeri a medi:
a) quando non esistono infestanti resistenti alle Triazine ma per prevenire la comparsa, **lt. 3 di ALASIP + Kg. 2 di MAIZINA per ettaro;**
b) quando sono presenti Setarie, Digitarie e biotipi di giavoni resistenti, **lt. 4-5 di ALASIP + Kg. 1,5-2 di MAIZINA per ettaro;**
c) quando è presente giavone americano **6 l/ha di ALASIP + Kg. 1,5-2 di MAIZINA per ettaro;**
d) quando è presente la Sorghetta e si debbono combattere i semi di questa infestante, **lt. 6-7 di ALASIP + Kg. 1,5-2 di MAIZINA per ettaro.**
aumentare le dosi sopra indicate di **1 l/ha** in caso di trattamenti su terreni pesanti.
Il prodotto ha un'efficacia parziale e spesso insufficiente nei terreni organici e torbosi.
Il prodotto si può distribuire alle seguenti epoche di impiego:
- pre-semina, con o senza leggera incorporazione
- pre-emergenza, da subito dopo o qualche giorno dopo la semina
- post-emergenza, ma con infestanti graminacee resistenti all'Atrazina e con mais di altezza inferiore a 10 cm.

Eventuali lievi fenomeni di ustioni osservabili solo in trattamenti di post-emergenza sono comunque senza conseguenza per lo sviluppo ed il raccolto della coltura.
Per un impiego ottimale del prodotto tenere inoltre presenti i seguenti punti:
- diluire il prodotto in 4-5 o più Hl di acqua e distribuire la poltiglia uniformemente a mezzo delle comuni irroratrici a mano o meccaniche;
- perchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 8-10 mm. cada entro 2 settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad un'irrigazione a pioggia superficiale;
- le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento per rompere la crosta o per arieggiare il terreno, devono essere molto superficiali per non portare, in superficie terreno con semi non contenenti la sostanza attiva erbicida.

Preparazione della poltiglia: versare il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Avvertenze: le coltivazioni di mais trattate con il prodotto non possono essere consociate ad altre colture. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: l'ALASIP è miscibile con MAIZINA, MAIZINA S e MAIZINA L e con i prodotti a base di Atrazina e Simazina. Quando l'ALASIP si usa con MAIZINA o MAIZINA S, stemperare prima la MAIZINA in un limitato quantitativo di acqua, e poi diluire nel totale quantitativo di acqua; con MAIZINA L, diluire la MAIZINA L nel totale quantitativo di acqua mantenendo sempre la poltiglia in movimento entro la botte irroratrice. In ogni caso diluire a parte l'ALASIP in poca acqua ed agitare bene,infine versare la miscela acquosa di ALASIP nel totale quantitativo di acqua contenente la MAIZINA precedentemente disciolta.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine. Alle dosi normali d'impiego non si hanno residui dannosi per le colture seminate, purchè dall'applicazione del diserbante alla semina delle altre colture, intercorrono 3-4 mesi e si proceda ad una buona aratura prima della semina.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt.

5210

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MANTION

Fungicida organico
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 14,3 Ditalimfos puro (esente da sulfotep)
gr. 57 Mancozeb* puro
Coformulanti q.b. a 100.

*Marchio reg. Rohm & Haas - Philadelphia, U.S.A.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Informazioni per il medico:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni edema polmonare. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Consigli terapeutici:

In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche.

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigeno terapia; iniezione endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg. per gli adulti - 0,2 - 1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore. Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.

Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico, pomate oftalmiche.

Controindicazioni:

Morfina, teobillina, aminifillina, coramina, latte, olii, grassi e alcool. La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

CARATTERISTICHE

IL MANTION è un fungicida organico per la lotta contro l'Oidio e la ticchiolatura delle panacee e contro malattie di colture ornamentali in impianti stabili.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Ornamentali - Garofano e Rosa in pieno campo: contro Oidio, Peronospora, Ruggine, Alternaria, Ticchiolatura, Septoria, gr. 250 per ettolitro.

Frutticoltura: contro l'Oidio e la Ticchiolatura delle pamacee, gr. 250-300 per ettolitro.

Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua, indi versare nell'irroratrice e portare a volume.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con Dimetoil, Drinfos, Delfos, Fitofos, Sumifos, Zolone PB ed L. Emmaton.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Sulla varietà di melo Golden Delicious il prodotto può provocare rugginosità.

Non impiegare il prodotto sulle seguenti varietà di pero ZINEB sensibili: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti su tutte le colture 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 5210 Ministero della Sanità del 23.2.1983

E/2

Peso netto Kg.

521

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MANTION S

Fungicida organico
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 14,3 Ditalimfos puro (esente da sulfotep)
gr. 48,9 Maneb puro
gr. 8,1 Zineb puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Informazioni per il medico:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni edema polmonare. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Consigli terapeutici:

In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche.

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigeno terapia; iniezione endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg. per gli adulti - 0,2 - 1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzzazione può essere continuata per 24 - 48 ore. Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.

Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico, pomate oftalmiche.

Controindicazioni:

Morfina, teobillina, aminifillina, coramina, latte, olii, grassi e alcool. La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

CARATTERISTICHE

IL **MANTION S** è un fungicida organico per la lotta contro l'Oidio e la ticchiolatura delle panacee e contro malattie di colture ornamentali in impianti stabili.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Ornamentali - Garofano e Rosa in pieno campo: contro Oidio, Peronospora, Ruggine, Alternaria, Ticchiolatura, Septoria, gr. 250 per ettolitro.

Frutticoltura - Pomacee: contro Oidio e Ticchiolatura gr. 250-300 per ettolitro.

Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua, indi versare nell'irroratrice e portare a volume.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con Dimetoil, Drinfos, Delfos, Fitofos, Sumifos, Zolone PB ed L, Emmaton.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. .

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Sulla varietà di melo Golden Delicious il prodotto può provocare rugginosità.

Non impiegare il prodotto sulle seguenti varietà di pero ZINEB sensibili: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5211 **Ministero della Sanità del** 23.2.1983

E/2

Peso netto Kg.

5225

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Erbicida di pre-emergenza delle infestanti
per colture di vite, melo, pero, agrumi, olivo,
asparago e rose in pieno campo
Liquido

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Simazina pura
Coformulanti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il SIMAVIT L è un diserbante selettivo per colture di vite, melo, pero, agrumi, olivo, asparago e rose in pieno campo contro le infestanti annuali.

Agisce per assorbimento radicale.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Vite, melo, pero, agrumi, olivo
Il trattamento deve essere effettuato prima dell'emergenza delle infestanti, alla fine dell'inverno, dopo le consuete lavorazioni, su terreno ben preparato, sminuzzato, pulito da infestanti e umido, alla dose per ettaro di
— terreni leggeri: litri 3;
— terreni di medio impasto: litri 4,5;
— terreni pesanti: litri 6; distribuiti in 500-1.000 litri d'acqua.
Sul pero innestato non superare la dose di litri 4/ha.

Asparago (di almeno 3 anni)
Effettuare il trattamento in primavera, subito dopo la rincalzatura, prima che emergano i turioni, alla dose di litri 4/ha., oppure dopo la raccolta dei turioni, su terreno privo di infestanti alla dose di litri 2/ha.

Rose in pieno campo (di almeno 3 anni)
Si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di effettuare l'applicazione.
Trattare in primavera dopo la lavorazione del terreno, in pre-emergenza delle infestanti, alla dose di litri 3-4/ha.
La dose bassa è indicata per i terreni leggeri.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Diluire la dose di prodotto in poca acqua; versare nell'irroratrice e portare a volume agitando

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo

FITOTOSSICITA'

Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive e quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.
Trattare in assenza di vento per evitare che l'erbicida venga trasportato su colture vicine.

AVVERTENZE

— Non impiegare il prodotto sui terreni torbosi perché viene da essi inattivato.
— Non trattare su terreni siccitosi perché il prodotto non esplica la sua attività.
— Dopo il trattamento si consiglia di non lavorare il terreno.
— Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5225 **Ministero della Sanità del** 10.2.83
12/1982

Contenuto netto lt.

5:

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MANDEL

Fungicida organico
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 14,3 Ditalimfos puro (esente da sulfotep)
gr. 57 Mancozeb* puro
Coformulanti q.b. a 100.

*Marchio reg. Rohm & Haas - Philadelphia, U.S.A.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Informazioni per il medico:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni edema polmonare. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Consigli terapeutici:

In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche.

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigeno terapia; iniezione endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg. per gli adulti - 0,2 - 1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore. Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.

Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico, pomate oftalmiche.

Controindicazioni:

Morfina, teobillina, aminifillina, coramina, latte, olii, grassi e alcool. La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5233 **Ministero della Sanità del** 16.3.83
E/2

CARATTERISTICHE

IL **MANDEL** è un fungicida organico per la lotta contro l'Oidio e la ticchiolatura delle panacee e contro malattie di colture ornamentali in impianti stabili.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Ornamentali - **Garofano e Rosa in pieno campo:** contro Oidio, Peronospora, Ruggine, Alternaria, Ticchiolatura, Septoria, gr. 250 per ettolitro.

Frutticoltura: contro l'Oidio e la Ticchiolatura delle pamacee, gr. 250-300 per ettolitro.

Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua, indi versare nell'irroratrice e portare a volume.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con Dimetoil, Drinfos, Delfos, Fitofos, Sumifos, Zolone PB ed L, Emmaton.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Sulla varietà di melo Golden Delicious il prodotto può provocare rugginosità.

Non impiegare il prodotto sulle seguenti varietà di pero ZINEB sensibili: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti su tutte le colture 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericòloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

5234

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Fungicida organico
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 14,3 Ditalimfos puro (esente da sulfotep)
gr. 48,9 Maneb puro
gr. 8,1 Zineb puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Informazioni per il medico:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni edema polmonare. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Consigli terapeutici:

In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica, purganti salini, cure sintomatiche.

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale e ossigeno terapia; iniezione endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg. per gli adulti - 0,2 - 1 per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzzazione può essere continuata per 24 - 48 ore. Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.

Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico, pomate oftalmiche.

Controindicazioni:

Morfina, teobillina, aminifillina, coramina, latte, olii, grassi e alcool. La somministrazione di taluni tranquillanti potrebbe essere controindicata.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5234 **Ministero della Sanità del** 16.3.83
E/2

CARATTERISTICHE

IL **MANDEL S** è un fungicida organico per la lotta contro l'Oidio e la ticchiolatura delle panacee e contro malattie di colture ornamentali in impianti stabili.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Ornamentali - Garofano e Rosa in pieno campo: contro Oidio, Peronospora, Ruggine, Alternaria, Ticchiolatura, Septoria, gr. 250 per ettolitro.

Frutticoltura - Pomacee: contro Oidio e Ticchiolatura gr. 250-300 per ettolitro.

Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua, indi versare nell'irroratrice e portare a volume.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con Dimetoil, Drinfos, Delfos, Fitofos, Sumifos, Zolone PB ed L. Emmaton.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Sulla varietà di melo Golden Delicious il prodotto può provocare rugginosità.

Non impiegare il prodotto sulle seguenti varietà di pero ZINEB sensibili: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

5:

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Fungicida organico per la lotta contro la Peronospora della vite e contro altre malattie in colture diverse
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 30 di Maneb puro
gr. 15 di Folpet puro
gr. 9 di Captafol puro
Coformulanti q.b. a 100.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.
— Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polveri durante la sua manipolazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

L'ingestione provoca:

nausea - irritazione del tratto gastrointestinale - conati di vomito - bruciori gastrici con dolori addominali - turbe nervose e diarrea - possibilità di collasso cardiocircolatorio.

Il contatto con la cute e le mucose provoca:

Irritazioni delle mucose - eczemi cutanei da fotosensibilizzazioni resistenti alle terapie.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI PRIMO INTERVENTO

In caso di ingestione:

— *provocare il vomito*
— *lavanda gastrica con carbone attivo (25 gr/litro di acqua)*
— *cure sintomatiche*

Per il contatto con cute e mucose:

— *lavaggi con acqua semplice, pomate oftalmiche, pomate cortisoniche per le forme eczematose.*

Controindicazioni:

Olii - Grassi - Alcool.

OSPEDALIZZARE IN CASI GRAVE

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5244 **Ministero della Sanità del** 16.2.83

E/3

CARATTERISTICHE

Il TRIVIT è un fungicida organico nel quale sono presenti tre principi attivi per la lotta contro la Peronospora della vite.
Possiede inoltre una qualche azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Viticoltura:
— contro la Peronospora gr. 400/hl.

Avvertenza:
Nei vigneti il cui prodotto è destinato alla vinificazione, la sua applicazione deve essere sospesa 40 gg. prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Orticoltura:
— Pomodoro solo fino alla prima fioritura: contro Peronospora, Alternaria, Septoriosi gr. 400/hl.

Floricoltura in pieno campo:
— contro la Peronospora della rosa gr. 400/hl.

Tabacchicoltura:
— contro la Peronospora, gr. 400/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

E compatibile con i prodotti della nostra gamma. Non è compatibile con poltiglia bordolese, polisolfuri, olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili e i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta sulle uve da vino e 28 giorni prima su tutte le altre colture.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

5246

BETAMYN

DISERBANTE SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE PER IL DISERBO DELLE BIETOLE DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO

Agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali: sui semi in germinazione e sulle plantule appena spuntate.

COMPOSIZIONE su gr. 100:

CLORIDAZON (ex Pirazon) puro	gr 67,2
Coadiuvanti e inerti quanto basta a	gr 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in pre-semina, pre-emergenza e post emergenza a dosi variabili da 3 a 6 Kg/Ha, a seconda della natura del terreno:
su terreni leggeri: Kg 3/Ha - su terreni medio impasto: Kg 4/ Ha - su terreni pesanti, argillosi o torbosi: Kg 5-6/Ha.
Diluire la prestabilita quantità di prodotto in 3-8 ettolitri di acqua per ettaro irrorando con pompe a volume normale.
Il terreno deve essere finemente preparato, fresco e umido per permettere al prodotto di distribuirsi uniformemente sullo strato superficiale e venire assorbito dai semi in germinazione e dalle prime radici delle infestanti.
Qualora si operi su terreno asciutto e non si abbiano successive piogge è necessario procedere a una irrigazione entro 8/10 giorni dal diserbo.
Preparazione della poltiglia: stemperare la quantità di prodotto richiesta in poca acqua e versare poi nel totale quantitativo di acqua da spargere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è miscibile con gli altri diserbanti per bietole impiegati in pre e post emergenza. E' miscibile pure con gli insetticidi per la lotta contro gli insetti della bietola.
« **Avvertenze:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. »
Fitotossicità: quando si usa in post-emergenza si consiglia il trattamentto nel periodo che va dall'emergenza della bietola fino all'emissione della seconda foglia vera.
La selettività del *BETAMYN* può essere compromessa da attacchi di insetti o di funghi che determinano lesioni sulle radici o sulle foglie aprendo vie alla penetrazione del prodotto. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture sensibili vicine.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

« *ATTENZIONE:* da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207

Stabilimento di produzione: S.C.A.M. S.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena
Reg. n. 5246 del 23/2/1983 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO PESO NETTO kg.

526

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Ti Kappa Di - S 3

Erbicida ad azione totale
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 12 Atrazina pura
Gr. 16 Diuron puro
Gr. 42,5 Dalapon puro
Sostanze bagnanti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Non contaminare acqua di uso domestico.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Erbicida ad azione totale; agisce per assorbimento radicale e fogliare; rimane a lungo attivo nel terreno.
Contiene 3 principi attivi il cui dosaggio è stato studiato al fine di creare un diserbante ad azione polivalente.
Il prodotto è efficace contro le infestanti sia annuali che poliennali, monocotiledoni ed a foglia larga quali: gramigne, giavoni, connuccia, avena, plantago, coda di cavallo, romice e poligono.
Per la preparazione della poltiglia erbicida, diluire dapprima il prodotto in poca acqua fino a formare una poltiglia omogenea; quindi versare nell'apparecchio di distribuzione e portare a volume.
Distribuire il prodotto nel modo più uniforme possibile, avendo cura di bagnare abbondantemente la vegetazione.
L'irrorazione può essere eseguita con qualsiasi tipo di apparecchio irrorante, anche con le comuni pompe a spalla.
Si consiglia, nel caso si usino serbatoi di notevole capacità, di mantenere la poltiglia costantemente in agitazione onde impedire eventuali depositi.
Dopo l'uso l'apparecchiatura deve essere accuratamente lavata, specie se destinata ad impieghi diversi dal diserbo.

DISERBO ARGINI E RIPE DELLE RISAIE:
a) **diserbo degli argini nudi o appena infestati**, quando cioè le malerbe non hanno oltrepassato l'altezza di cm. 7-10 impiegare kg. 20 di prodotto per ettaro (pari a gr. 200 per 100 metri lineari di argine, con sviluppo in larghezza di m. 1, diluiti in 16-18 litri d'acqua).
b) **diserbo delle ripe**, quando le infestanti sono in ripresa vegetativa e prima che abbiano assunto uno sviluppo notevole, impiegare kg. 30-35 di prodotto per ettaro (pari a gr. 300-350 per 100 metri lineari di ripa, con sviluppo in larghezza di m. 1, diluiti in 32-36 litri d'acqua).

Una pioggia successiva al trattamento favorisce la penetrazione del prodotto nel terreno e quindi l'assorbimento da parte delle radici delle infestanti.
Le dosi consigliate consentono il controllo delle infestanti per 4-5 mesi.
Aumentando le dosi si prolunga in proporzione la durata del controllo.

DISERBO DELLE AREE NON AGRICOLE
— Aree poco infestate: kg. 30/ha di prodotto, pari a 3 gr./mq
— Aree mediamente infestate: kg. 40/ha di prodotto, pari a 4 gr./mq
— Aree notevolmente infestate: kg. 50/ha di prodotto, pari a 5 gr./mq
Per la distribuzione impiegare un quantitativo d'acqua non inferiore a lt. 2000-2500 per ettaro.
Il prodotto può essere usato in qualsiasi periodo dell'anno.
I risultati migliori si hanno se le applicazioni sono fatte nel periodo di attiva crescita delle erbe infestanti, quando tuttavia queste non hanno ancora raggiunto un tale stadio di sviluppo da rendere difficile la penetrazione della miscela nel terreno.
Nella quasi totalità dei casi una sola applicazione assicura la devitalizzazione delle infestanti per circa un'intera stagione di crescita.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Irrorare tenendo bassa la barra.
Trattare in giornate senza vento.
Non impiegare il prodotto in vicinanza di colture utili (pioppi, salici, olivo, vite, agrumi, colture erbacee, ecc.), o su zone nelle quali si presume si estendano le loro radici.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Non ripetere i trattamenti prima di 2 anni

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5261 **Ministero della Sanità del** 23.2.83

1/83

5264

FOLTA-FOL

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI CAPTAFOL E FOLPET, PER TRATTAMENTI IN ORTICOLTURA, VITICOLTURA, FRUTTICOLTURA, FLORICOLTURA, FRAGOLICOLTURA.

COMPOSIZIONE gr 100 di prodotto contengono: CAPTAFOL puro gr 24 - FOLPET puro gr 56 - Coadiuvanti q.b. a gr 100. **CLASSE IV**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZA: Il **FOLTA-FOL** può essere irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi. In soggetti particolarmente sensibili si possono verificate manifestazioni anche vistose, ma transitorie e non preoccupanti dato che presenta un rischio trascurabile per l'uomo. Evitare tuttavia il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed evitare anche di sollevare polvere nel maneggio del preparato.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi di intossicazione: Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Consigli terapeutici: Lavanda gastrica con magnesia usta (gr 30 per litro di acqua) e digitale.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: Il **FOLTA-FOL** deriva dall'associazione di due fungicidi organici, il Folpet ed il Captafol, e permette di combattere contemporaneamente Peronospora e Botrytis. Combatte, inoltre, altre malattie come Ticchiolatura delle Pomacee, Bolla del Pesco, Occhio di pavone e Antracnosi dell'Olivo, Sclerotinia dell'Albicocco, Fusariosi del Garofano, Cancro delle pomacee, Peronospora ed Alternaria della Patata e del Pomodoro. Il **FOLTA-FOL** viene impiegato alle seguenti dosi: **VITICOLTURA:** Contro Peronospora, Botrytis (Muffa Grigia), Antracnosi e Rossore della foglia: gr 150-200 per ettolitro. Per trattamenti anti-peronosporici seguire il «Calendario di incubazione» della zona ed aumentare leggermente la dose per i due ultimi trattamenti. Per trattamenti anti-botritici intervenire con continuità, in condizioni favorevoli di sviluppo della malattia.

FRUTTICOLTURA: POMACEE: Contro Ticchiolatura (effettuare solo trattamenti pre-fiorali: gr 100-150 per 100 litri d'acqua. - ALBICOCCO: Contro Sclerofinia: gr 150 per 100 litri d'acqua. - NESPOLO: Contro Ticchiolatura: gr 150 per 100 litri d'acqua. - PESCO: Contro Bolla e Gommosi: gr 300 per 100 litri d'acqua.

OLIVICOLTURA: Contro Occhio di Pavone e Antracnosi dell'Olivo: gr 200 per 100 litri d'acqua.

ORTICOLTURA: POMODORO: Contro Peronospora ed Alternaria: gr 150 per 100 litri di acqua. - LATTUGA: Contro Peronospora e Antracnosi: gr 150 per 100 litri d'acqua. - CETRIOLO: Contro Peronospora e Antracnosi: gr 150 per 100 litri d'acqua. - MELONE: Contro Peronospora e Antracnosi: gr 150 per 100 litri d'acqua. - PATATA: Contro Peronospora ed Alternaria: gr 200 per 100 litri d'acqua. - MELANZANA: Contro Botrytis: gr 200 per 100 litri d'acqua. - CIPOLLA: Contro Peronospora: gr 200 per 100 litri di acqua.

FRAGOLICOLTURA: Contro Botrytis e Vaiolatura (effettuare i trattamenti solo fino a fine fioritura): gr 100-150 per 100 litri d'acqua. - **AGRUMICOLTURA:** Contro Allupatura e Melanosi: gr 400-500 per 100 litri d'acqua. - **PIANTE ORNAMENTALI** in pieno campo: Contro Antracnosi, Alternariosi e Botrytis: gr 250 per 100 litri d'acqua. - **FLORICOLTURA** in pieno campo: Contro Fusariosi: gr 300 per 100 litri d'acqua. Per la preparazione della poltiglia, versare la dose prescelta in circa la metà dell'acqua necessaria, agitando per alcuni minuti; si aggiunge quindi la rimanente quantità d'acqua ripetendo l'agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il **FOLTA-FOL** è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri) e di quelli a base di Oli minerali semplici ed attivati. L'impiego deve essere distanziato di almeno 20 giorni da quello degli Oli minerali e dei Polisolfuri.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altriformulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il **FOLTA-FOL** è fitotossico per la varietà di PERO: Btirra d'Anjon. Sul MELO non deve essere usato dopo la fioritura perché può manifestare fitotossicità.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. SU UVE DA VINO SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA PER EVITARE DI OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. N. 5264 del 3-3-1983 del Ministero della Sanità.

BIMEX S.p.A.

36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.51.49 - 55.51.99

Officina di produzione Bimex s.p.a. — Isola Vicentina (VI)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO gr**

5265

DAZOVAL P.S. 98

DISINFESTANTE DEL TERRENO PER IL CONTROLLO DI NEMATODI, FUNGHI, MALERBE ED INSETTI TERRICOLI. SI IMPIEGA IN ASSENZA DI COLTURE
Composizione gr 100 di prodotto contengono: — DAZOMET puro gr 98
ATTENZIONE! Manipolare con prudenza **CLASSE III**

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: Il **DAZOVAL P.S. 98** è un fumigante impiegato in pieno campo, in serra e per la disinfestazione dei terricciati. Incorporato nel terreno si trasforma in composti gassosi attivi contro parassiti animali e vegetali. L'azione disinfestante del **DAZOVAL P.S. 98** si esplica verso Nematodi, Funghi, Malerbe ed insetti del terreno quali: marciumi radicali, morie, attacchi al colletto, marciumi degli steli, avvizzimenti dovuti a Fusarium sp., Verticillium sp., Phoma, Nematodi (liberi, galligeni, a cisti e anguillule degli steli), larve di Maggiolini ed Elateridi; inoltre combatte le infestanti mono e dicotiledoni che si propagano per seme, rizomi e bulbilli, mentre i semi vengono distrutti solo nella fase di germinazione. Il **DAZOVAL P.S. 98** viene impiegato alle seguenti dosi: In pieno campo ed in serra: 40/70gr per mq (400/700 Kg/Ha) - Terricciati: 250/300 gr per mc. Le dosi minime e massime devono essere impiegate in relazione al grado di infestazione del terreno e per una profondità di incorporamento di 20 cm. Volendo trattare strati più profondi di terreno bisogna aumentare le dosi prescelte di 15/20 gr/mq (150/200 Kg/Ha) per ogni 10 cm di maggiore profondità. Al momento del trattamento il terreno deve essere ben livellato, sminuzzato e sufficientemente umido; inoltre deve essere privo di residui vegetali grossolani. Per il trattamento contro Nematodi galligeni delle radici bisogna far trascorrere un certo periodo tra la raccolta ed il trattamento stesso in modo che i nematodi, liberati dalle galle a causa della decomposizione vegetale, vengano a contatto con i gas del **DAZOVAL P.S. 98.** Per favorire l'azione erbicida del prodotto, bisogna irrigare abbondantemente il terreno 5/7 giorni prima del trattamento in modo da facilitare la germinazione dei semi. Il letame deve essere distribuito almeno 5/6 settimane prima del trattamento disinfestante ed a partire da 2 settimane prima del trattamento fino a tutto il periodo durante il quale il prodotto rimane nel terreno trattato non distribuire concimi organici o fertilizzanti azotati a base di ammoniaca. In pieno campo osservare una distanza di applicazione di 50/100 cm da radici di alberi, cespugli, arbusti e siepi. Non distribuire il **DAZOVAL P.S. 98** con temperature inferiori agli 8 10°C. L'umidità ottimale del terreno per il trattamento deve essere simile a quella necessaria per la semina. Subito dopo la distribuzione incorporare il **DAZOVAL P.S. 98** nel terreno alla profondità prestabilita impiegando un motocoltivatore o una fresa; quindi effettuare una rullatura se il terreno si presenta soffice. Intervenire infine con una irrigazione per aspersione in modo da favorire la decomposizione del prodotto; eventualmente ripetere l'irrigazione dopo 2 o 3 giorni. Dopo 15/20 giorni dal trattamento (in caso di basse temperature aumentare questo periodo fino a 30 giorni) bisogna arieggiare il terreno mediante fresatura, in modo da permettere la fuoriuscita dei vapori tossici. Trascorse 1 o 2 settimane (anche 3 in caso di basse temperature) da questa operazione accertarsi dell'assenza dei vapori del **DAZOVAL P.S. 98** prima di procedere alla messa a coltura del terreno. Quando si opera in serra si deve aver cura di chiudere ermeticamente tutte le fessure e bisogna mantenere l'isolamento fino alla scomparsa dei vapori; la temperatura deve essere intorno ai 25°C e l'umidità del terreno ad un livello piuttosto elevato. Per i terricciati stendere il terreno su di un supporto impermeabile in strati di 20/25 cm di altezza distribuire la dose prescelta ed incorporare il prodotto nel terreno. Sovrapporre un secondo strato e procedere come detto sopra fino a raggiungere una altezza massima di 1 mt Ricoprire poi il cumulo umido con materiale plastico per trattenere i vapori di **DAZOVAL P.S. 98.** Dopo circa 15 giorni dal trattamento togliere la copertura, arieggiare il terreno, ed accertarsi che i vapori siano completamente assenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto si usa da solo.
FITOTOSSICITA': I vapori del **DAZOVAL P.S. 98** sono fitotossici per le colture in atto e pertanto va impiegato su terreno nudo.
ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante(alle persone ed agli animali.

Reg. N. 5265 del 3-3-83 del Ministero della Sanità

B I M E X S . p . A .
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 8
TELEFONI N.: (0444) 98.81.23 - 98.81.23

officina di produzione DIACHEM S.p.A.
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg**

5271

BAVISTIN FL

Fungicida sistemico polivalente ad azione preventiva e curativa.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Carbendazim	g 41,7
Coformulanti q.b. a	g 100

(contiene etilen glicole)

CLASSE TOSSICOLOGICA III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA IN ITALIA:

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwingshafen/Rhein
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N. 5271 del 16-3-1983

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

BAVISTIN FL è una sospensione concentrata contenente g. 500 di Carbendazim per litro di prodotto.
E' indicato per la lotta contro diverse malattie crittogamiche quali Ticchiolatura, Oidio, Verticillosi, Fusariosi, Muffa Grigia, Monilia, Sclerotinia, Cercospora, Septoria, Gleosporiosi, Cladosporiosi.

EPOCHE, MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI (per 100 litri di acqua)

Melo e Pero:
Ticchiolatura
Trattamenti pre florali: 80-100 cc
Trattamenti post-florali: 50-60 cc
Trattamenti settimanali nella fase primaverile (infezioni primarie) ed intervalli più ampi successivamente.
Trattamenti curativi entro 48-72 ore dall'inizio dell'infezione.

Gleosporium: trattamenti di pre-raccolta: 80-100 cc
1-2 trattamenti rispettivamente 30 e 15 giorni prima della raccolta.
Trattamenti di post-raccolta (per immersione o aspersione dei frutti per non oltre 30 secondi): 100-130 cc.
I trattamenti di post-raccolta dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate, che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo-conservazione.
La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da Ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

Pesco, Albicocco, Susino e Mandorlo: 60-80 cc
— Monilia dei rami e dei fiori: trattamenti preventivi all'inizio, durante e dopo la fioritura.
— Monilia dei frutti: trattamenti rispettivamente a 30 e 15 giorni prima della raccolta.

Vite: Botrytis (muffa grigia): 50-100 cc
4 trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, chiusura del grappolo, invaiatura, 2-3 settimane prima della raccolta.
Su varietà di vite a maturazione precoce possono essere sufficienti 3 trattamenti: inizio fioritura, chiusura del grappolo e 2-3 settimane prima della raccolta. In presenza di condizioni metereologiche favorevoli allo sviluppo della malattia bisognerà aumentare il numero dei trattamenti.
Il BAVISTIN FL manifesta una discreta attività antioidica.
Il BAVISTIN FL non influisce sulla fermentazione.

Frumento: 0,5-0,6 l/ha
Trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso fra la levata e la spigatura.

Bulbose da fiori: 300 cc
Trattamento per immersione del bulbo della durata di 20-30 minuti.

Garofano in pieno campo: Phialophora
Immersione delle talee per 8-12 ore: 300 cc

Avvertenza: L'impiego del prodotto è consentito solo per le colture indicate in etichetta.
Per limitare l'insorgenza di ceppi fungini resistenti si consiglia di non usare il BAVISTIN FL da solo in modo continuativo ma di intervallare i trattamenti con altri fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione o di usarlo in miscela con i suddetti fungicidi.
Nelle zone o località ove si rilevi la presenza di ceppi resistenti ai benzimidazolici va evitato l'impiego di tali prodotti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il BAVISTIN FL è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi attualmente in commercio ed in particolare con i prodotti BASF.
Il BAVISTIN FL è miscibile anche con urea, fertilizzanti fogliari quali Basfoliar 34, Hakaphos e Fetrilon-Combi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO; PI !L FRUMENTO 30 GIORNI PRIMA.
MELO E PERO IN POST-RACCOLTA 15 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

I.

5:

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

VIDDEN D-RAVIT

Fumigante - Nematocida

INFIAMMABILE

Composizione

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 Dicloropropene puro
Dicloropropano ed isomeri quanto basta a 100

Natura del rischio:
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo l'uso distruggere le confezioni, oppure decontaminarle lavandole accuratamente con acqua calda e soda caustica al 3-4% risciacquandole ripetutamente con cura.
- Non utilizzare assolutamente le confezioni per la conservazione di bevande o di prodotti alimentari.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
- Tenere lontano dal fuoco e dalle fonti di calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico — tempo di latenza: anche parecchie ore. Sintomi neurologici: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.

Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero da epatite tossica. Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse, congestione e edema polmonare.

Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea.

Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone.

Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici. Lavare gli occhi con molta acqua corrente per almeno 15 minuti.

In caso di ingestione, e se non è presente vomito, praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da instillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 gr. di solfato di sodio o di magnesio. Terapia sintomatica.

In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg.) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena: cortisonici; ossigeno se necessario: se è presente edema polmonare somministrare anche diuretici (tiazide).

Nei casi gravi è indispensabile il ricovero in centro di rianimazione.

Controindicazioni:

Non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte e olio.

CARATTERISTICHE

Liquido fumigante per la lotta contro i nematodi viventi nel terreno e destinato al reimpianto di vite, pesco ed agrumi.

MODALITA' D'IMPIEGO

I trattamenti debbono essere effettuati in terreni umidi (adatti alla semina) ben sminuzzati e preparati e quando la temperatura del terreno è compresa fra 10° e 25° C. Applicare il prodotto ad una profondità di 20-25 cm. su tutta la superficie. Se si usano pali iniettori le iniezioni devono essere eseguite in quadrato, a 25-30 cm. di distanza; usando invece assolcatori, questi devono essere distanziati di 30 cm. tra loro.

Subito dopo il trattamento sminuzzare o rullare lo strato superficiale del suolo per sigillare il terreno ed impedire la fuoriuscita dei vapori.

Prima della messa a coltura effettuare una leggera lavorazione del terreno onde rimuovere eventuali vapori residui.

In ogni caso prima del reimpianto assicurarsi che una manciata di suolo prelevata alla profondità di 10-15 cm. non lasci percepire l'odore del prodotto.

DOSI

Nei terreni forti il prodotto nella lotta contro i Nematodi, si impiega alla dose di kg. 3-4 per 100 metri quadrati (kg. 300-400 per ettaro) e va distribuito ad una profondità di cm. 15; nei terreni leggeri e di medio impasto si impiega alla dose di kg. 2-3 per 100 metri quadrati (kg. 200-300 per ettaro) e va distribuito alla profondità di cm. 25. Con palo iniettore queste dosi corrispondono rispettivamente a cc 3-4 e 2-3 per iniezione.

PRECAUZIONI

Dopo il trattamento per evitare reinfestazioni del terreno non concimare ne interrare immondizie, non irrigare per scorrimento e non lavorare con attrezzi non perfettamente puliti. Le eventuali concimazioni si consiglia di eseguirle prima delle applicazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Non effettuare i trattamenti in vicinanza di colture erboree.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Far trascorrere almeno 28 giorni tra il trattamento ed il reimpianto

AVVERTENZE

Il **VIDDEN D - RAVIT** è corrosivo; non usare recipienti di alluminio, magnesio e loro leghe.

Non pulire le attrezzature con acqua, ma con nafta.

Durante l'intervallo di agibilità degli appezzamenti trattati (48 ore), chi utilizza il prodotto, deve provvedere in modo idoneo a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette.

E' vietato l'impiego in serra ed in ambienti chiusi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5286 **Ministero della Sanità del** 15.4.83
E/2

5329

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

TELONE II*

INFIAMMABILE

Nematocida del terreno e per reimpianti di vite, pesco ed agrumi

COMPOSIZIONE
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 92,3 di 1,3 Dicloropropene puro
Coformulati quanto basta a 100

®
Marchio registrato dalla The Dow Chemical Company
Midland Michigan - USA

Natura del rischio:
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo l'uso distruggere le confezioni, oppure decontaminarle lavandole accuratamente con acqua calda e soda caustica al 3-4% risciacquandole ripetutamente con cura.
— Non utilizzare assolutamente le confezioni per la conservazione di bevande o di prodotti alimentari.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.
— Tenere lontano dal fuoco e dalle fonti di calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico — tempo di latenza: anche parecchie ore. Sintomi neurologici: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.
Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero da epatite tossica.
Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse, congestione e edema polmonare.
Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea.
Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone.
Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici. Lavare gli occhi con molta acqua corrente per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione, e se non è presente vomito, praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da instillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 gr. di solfato di sodio o di magnesio. Terapia sintomatica.
In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg.) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena: cortisonici; ossigeno se necessario: se è presente edema polmonare somministrare anche diuretici (tiazide).
Nei casi gravi è indispensabile il ricovero in centro di rianimazione.

Controindicazioni:
Non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte e olio.

CARATTERISTICHE

Il **TELONE II** libera il terreno da tutte le specie di nematodi tra cui quelli che formano galle (Meloydogyne spp), cisti (Heterodera spp), lesioni (Pratylenchus spp) ed in generale tutte le anguillule che infestano terreni destinati a colture floreali, tabacco, fragola, patata, barbabietola, ortaggi, vite, pesco, agrumi, vivai.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltivazioni erbacee:
— terreni leggeri: litri 120-160/ha.
— Terreni di medio impasto o leggermente forti: litri 160-200/ha.
Frutteti
Per il reimpianto dopo breve periodo (1-2 anni) di vite, pesco, agrumi litri 350-500/ha.
Le dosi più alte, in ogni caso, sono consigliate nelle colture con radici profonde, terreni pesanti con alto contenuto di sostanze organiche nel terreno, e presenza di nematodi e cisti.

TEMPO E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato sempre su terreno nudo.
Il **TELONE II** può essere applicato durante l'anno quando la temperatura del terreno è fra i 5°C ed i 27°C.
Al tempo del trattamento il terreno deve essere ben lavorato e privo delle zolle e delle sostanze organiche indecomposte; inoltre, deve possedere il giusto grado di umidità come per la semina.

Il **TELONE II** si inietta sul terreno, mediante pali iniettatori e macchine fumigatrici. Le iniezioni vanno fatte alla distanza di 30-40 cm. fra loro ed alla profondità di:
a) cm. 15-25 (in funzione della profondità delle radici della coltura da impiantare), **per l'impianto delle colture erbacee;**
b) cm. 25-35 **per impianto di colture arboree.**

Trattamento di pieno campo
Per il trattamento di grandi superfici impiegare apparecchi fumigatori a traino a distribuzione continua e regolabile del liquido fumigante il quale scendendo lungo coltelli assolcatori viene immesso nel terreno.
Dopo il trattamento il terreno deve essere rullato o irrigato, onde evitare l'evaporazione del **TELONE II**.

Aereazione del Terreno e Semina - Trapianto
Ad una distanza di 7 o 14 giorni dopo il trattamento praticare una zappatura od una erpicatura profonda allo scopo di liberare il terreno dai vapori residui.
La semina o il trapianto della coltura dovrà essere fatta da 7 a 10 giorni dopo l'aereazione del terreno e almeno 28 giorni dopo il trattamento con il **TELONE II**.
Nel caso in cui, nel periodo successivo al trattamento, si verificassero basse temperature o eccessive precipitazioni sarà bene **attendere 21 giorni** prima di seminare o trapiantare la coltura.
Nel caso di applicazioni con dosi elevate (330 litri/ha.) attendere almeno 60 giorni prima di seminare o trapiantare la coltura.
In ogni caso prima della semina o impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia **nessun odore di TELONE II.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Essendo i vapori del **TELONE II** fitotossici, i trattamenti debbono essere fatti su terreno privo di vegetazione e nelle cui vicinanze non vi siano piante sensibili.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Far trascorrere almeno 28 giorni tra il trattamento e semine e reimpianti

AVVERTENZE

E' vietato l'impiego del prodotto in serra ed in ambienti chiusi.
Chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità: **48 ore.**
Il **TELONE II** può danneggiare i contenitori e le attrezzature fabbricati con alluminio, magnesio e loro leghe.
Il **TELONE II** non è indicato nei terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica.
I fertilizzanti a base di azoto ammoniacale possono impiegarsi soltanto quando la coltura si è ben consolidata e la temperatura del terreno è superiore a 18°C.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 5329 **Ministero della Sanità del** 9.5.1983
E/1

5354

CARATTERISTICHE

L'ATRALAX è un diserbante selettivo per mais, attivo contro la maggior parte delle infestanti annuali, graminacee e dicotiledoni.
La miscela dei due principi attivi contenuti in ATRALAX, consente di controllare tra l'altro anche Setaria, Digitaria, Sorghum Halepense (da seme), Giavone americano, infestanti solitamente resistenti o poco sensibili ai normali trattamenti con atrazina.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

L'ATRALAX si impiega in pre-emergenza, contemporaneamente alle operazioni di semina o nell'intervallo che intercorre tra queste e la nascita delle piantine.
Il prodotto va distribuito su terreno uniforme e ben livellato, meglio se inumidito da una pioggia o da un'irrigazione.
L'ATRALAX si impiega alla dose media di 6-8 kg/ha in 500-600 litri d'acqua. Elevare la dose a 9-10 kg/ha in presenza di forte infestazione di Sorghetta, Digitaria o Setaria.
Se entro 15 giorni dal trattamento non si verificasse una abbondante pioggia (almeno 10 cm.) occorre provvedere ad una irrigazione.

AVVERTENZE

Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per le altre colture (es. bietole, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Attenersi alle dosi indicate.
Dopo la raccolta effettuare arature profonde prima di procedere alla semina di altre colture.
Aver cura di lavare abbondantemente i mezzi di distrbuzione prima di destinarli ad altri usi agricoli.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

L'ATRALAX non è miscibile con i formulati di origine organica.
Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il formulato può essre fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO kg 5

ATRALAX

Diserbante a largo spettro d'azione selettivo per il mais

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Alachlor puro	g 23,3
Atrazina pura	g 11,4
Conformulanti . . . . (contiene monoclorobenzene)	q.b.a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi di acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5354 del 11-5-1983

5379

II CLASSE

SILPRENE II

(FUMIGANTE)

CONTRO LE ANGUILLULE (NEMATODI) ED INSETTI TERRICOLI

Registrazione Ministero Sanità n° 5379 del 30-6-1983

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— 1,3-dicloropropene puro	g 92,3
— Prodotti correlati	g 5,6
— Epicloridrina	g 2,1

NATURA DEL RISCHIO
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto. (Per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico - tempo di latenza: anche parecchie ore.
Sintomi neurologici: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.
Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero da epatite tossica.
Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse, congestione e edema polmonare.
Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea.
Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone. Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici. Lavare gli occhi con molta acqua corrente per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione, e se non è presente vomito, praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da instillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 gr. di solfato di sodio o di magnesio. Terapia sintomatica.
In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena; cortisonici; ossigeno se necessario; se è presente edema polmonare somministrare anche diuretici (tiazide).
Nei casi gravi è indispensabile il ricovero in Centro di rianimazione.
Controindicazioni: non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte e olio.
AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è una formulazione che, iniettata nel terreno, vi libera dei vapori che, diffondendosi in tutti i più piccoli meati, raggiungono i parassiti uccidendoli in breve tempo.
E' particolarmente attivo contro Nematodi, Insetti (Maggiolino, Grillotalpa, Cavallette, Formiche, Elateridi, Agrotidi, Bibio e Tipule), Millepiedi, Talpe, semi di erbe infestanti e, inoltre, riduce la carica dei germi di varie malattie fungine, generatori di marciumi radicali (Fusarium, Phoma, Rhizoctonia, Verticillium e Pythium).
Esercita inoltre una azione favorevole sull'attività benefica di alcuni gruppi di microrganismi del suolo e sulla mobilitazione degli elementi nutritivi.

DOSI DI IMPIEGO
Le dosi di impiego del SILPRENE II variano da 100 a 150 litri per ettaro.
La dose minima si impiega nei terreni mediamente infestati da Nematodi, la massima nei terreni fortemente infestati o di natura molto sciolta. Nella scelta della dose di impiego si seguirà un analogo criterio a seconda del grado di infestazione e della specie dei Nematodi presenti nel terreno. Contro i Nematodi a cisti si impiegheranno, ovviamente, le dosi maggiori.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il SILPRENE II si inietta nel terreno, preventivamente lavorato, mediante pali iniettori. Le iniezioni vanno fatte alla distanza di cm. 30-40 fra loro alla profondità di 15-20 cm. Dopo il trattamento si dovrà rullare il terreno e, comunque, irrigarlo per renderlo il più possibile impermeabile ed evitare così una rapida esalazione del nematocida. Affinché il prodotto esplichi un'azione completa si consiglia di operare quando la temperatura del terreno si aggira intorno ai 15° C e quando il terreno stesso non è nè troppo umido nè troppo secco.
Il giusto grado di umidità è quello richiesto per la semina.

PRECAUZIONI
La fumigazione deve essere fatta su terreno nudo in quanto i vapori di SILPRENE II sono fitotossici. Pertanto si dovrà aver cura di non effettuare i trattamenti in vicinanza di piante arboree (vite, pesco, ecc.); per la stessa ragione, tra l'applicazione del fumigante e la semina od il trapianto nel terreno trattato, dovranno trascorrere 28 giorni, comunque, prima della messa a coltura sarà opportuno sottoporre il terreno ad una leggera lavorazione.

AVVERTENZA
Chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

E' VIETATO L'IMPIEGO DEL PRODOTTO IN SERRA ED IN AMBIENTI CHIUSI.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto è fitotossico per tutte le colture in atto.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per l'uso consentito; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SIAPA S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

CONTENUTO KG.

FENASIP (R) COMBI

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa della vite e del melo.

Si impiega in trattamenti liquidi per la lotta contro l'Oidio o Mal bianco della vite e del melo e contro la Ticchiolatura del melo.

COMPOSIZIONE

– Fenarimol puro	g	1,8
– Zolfo puro (selenio assente)	g	50
– Coadiuvanti, Inerti:quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano

Officina di produzione: CLASSE IV

VERCHIM ASTERIAS - SpA
Ozzano Emilia (BO)

Registrazione n. 5428 del 4/7/1983 Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche :

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un antioidico specifico ad azione multipla: endoterapica e protettiva.

Malattie combattute: Oidio o Mal bianco della vite, Oidio e Ticchiolatura del melo.

Dosi ed epoche di impiego:

Vite da vino: impiegare a 7-14 giorni di intervallo fra i trattamenti alla dose di 100 g per ogni 100 litri di acqua fino alla sfioritura dopo di che aumentare fino a 200 g.

Vite da tavola: impiegare a 7-10 giorni d'intervallo fra i trattamenti alla dose di 100 g per ogni 100 litri di acqua fino alla sfioritura dopo di che aumentare a 200 g.

Melo:impiegare a 7-10 giorni d'intervallo fra i trattamenti alla dose di 150-200 g per ogni 100 litri di acqua. Il prodotto esercita anche una buona attività antiticchiolatura e può essere utilmente miscelato con altri fungicidi anti-ticchiolatura (es. Mancozeb, Dodina, Clorotalonil).

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile in miscela con gli antiparassitari di uso primaverile-estivo, eccezione fatta per le miscele alcaline (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, Captano, DDVP, Binapacril, Diclofluanide. Inoltre deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità: il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di **Mele:**Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Vite: varietà "Sangiovese"
Nel caso di miscela con principi attivi con i quali il prodotto è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'eventuale impiego degli olii minerali. Non effettuare i trattamenti in estate nelle ore più calde del giorno.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizion essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

5444

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Erbicida di pre-emergenza delle infestanti per colture di vite, melo, pero, agrumi, olivo, asparago e rose in pieno campo
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Simazina pura
Coformulanti q.b. a 100.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il SIMADAL P.B. è un diserbante selettivo per colture di vite, melo, pero, agrumi, olivo, asparago e rose in pieno campo contro le infestanti annuali.

Agisce per assorbimento radicale.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Vite, melo, pero, agrumi, olivo
Il trattamento deve essere effettuato prima dell'emergenza delle infestanti, alla fine dell'inverno, dopo le consuete lavorazioni, su terreno ben preparato, sminuzzato, pulito da infestanti e umido, alla dose per ettaro di:
— terreni leggeri: kg. 3;
— terreni di medio impasto: kg. 4,5;
— terreni pesanti: kg. 6; distribuiti in 500-1.000 litri d'acqua.
Sul pero innestato su cotogno non superare la dose di kg. 4/ha.

Asparago (di almeno 3 anni)
Effettuare il trattamento in primavera, subito dopo la rincalzatura, prima che emergano i turioni, alla dose di kg. 4/ha., oppure dopo la raccolta dei turioni, su terreno privo di infestanti alla dose di kg. 2/ha.

Rose in pieno campo (di almeno 3 anni)
Si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di effettuare l'applicazione.
Trattare in primavera dopo la lavorazione del terreno, in pre-emergenza delle infestanti, alla dose di kg. 3-4/ha.
La dose bassa è indicata per i terreni leggeri.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire la dose di prodotto in poca acqua; versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo

FITOTOSSICITA'

Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.
Trattare in assenza di vento per evitare che l'erbicida venga trasportato su colture vicine.

AVVERTENZE

— Non impiegare il prodotto sui terreni torbosi perché viene da essi inattivato.
— Non trattare su terreni siccitosi perché il prodotto non esplica la sua attività.
— Dopo il trattamento si consiglia di non lavorare il terreno.
— Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5444 Ministero della Sanità del 6.12.1983

Peso netto kg.

12 / 1982

5452

SANDOZOLFO

Zolfo bagnabile colloidale all'87% di zolfo

Specifico contro gli oidi

Composizione
gr. 87 di zolfo puro (esente da selenio)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali
- *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;*
- *non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;*
- *dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità di impiego

Campi di impiego	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
• Viticoltura	0,08 – 0,1% = gr. 80 – 100 Abbinare il SANDOZOLFO a tutti gli interventi antiperonosporici.
• Frutticoltura (pomacee)	0,08 – 0,1% = gr. 80 – 100 Nella lotta contro la Ticchiolatura unire gr. 150-200 di SANDOZOLFO agli specifici prodotti consigliati contro detta malattia: MILTOX, SANDOZIR, TIOTOX "50", Z 72, ottenendo così una poltiglia mista particolarmente attiva.
• Orticoltura (fragola)	0,08 – 0,1% = gr. 80–100
• Colture ornamentali e floreali in pieno campo	0,08 – 0,1% = gr. 80 –100 Eseguire il numero di trattamenti ritenuti necessari secondo le colture e le necessità ambientali.

In tutti i campi di applicazione, in caso di forti infezioni, elevare la dose di SANDOZOLFO di gr. 50 per ettolitro di acqua, mentre si devono sospendere i trattamenti durante le ore di grande calore e di forte insolazione e non irrorare colture che soffrono di siccità.

Preparazione della poltiglia
Versare il SANDOZOLFO direttamente nel volume di acqua stabilito, rimescolando.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il SANDOZOLFO può essere usato da solo o in miscela con anticrittogamici, insetticidi e acaricidi di produzione Sandoz e, in genere, con tutti gli antiparassitari normalmente consigliati per le colture sulle quali viene utilizzato lo stesso SANDOZOLFO.
Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con 3inapacril, diclofluanide.

AVVERTENZA: Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Per la preparazione delle poltiglie miste versare il SANDOZOLFO nella poltiglia antiparassitaria prescelta e già pronta all'uso, agitando bene.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro

SANDOZ

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 5452 del 24.7.1983 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto netto kg

5460

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

RHODAX S

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite

Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 44 di Fosetyl alluminio puro
Gr. 26 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni

Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente

L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.

Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.

La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.

Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi, ~~[illegible]~~.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora:

Dose: gr. 300-350/hl.

Il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.

Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.

~~[illegible]~~.

Escoriosi:

Dose gr. 300/hl.

Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di « gemma mossa » (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5460...... **del Ministero della Sanità del** ...9..11.. 1983

Peso netto kg.

3/82

547

Negran® S

Diserbante di pre-emergenza per frumento e orzo.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
chlortoluron puro g 30
neburon puro g 20
coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua o sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5476 **del** 19.4.83
® marchio depositato

Caratteristiche
Agisce attraverso il terreno, per assorbimento radicale ed è dotato di una persistenza di azione sufficiente a prevenire anche le reinfestazioni tardive da parte di quelle malerbe che germinano alla fine dell'inverno.
È efficace contro infestanti sia graminacee, quali: Alopecurus, Apera, Poa, Lolium e dicotiledoni: Capsella, Cerastium, Galeopsis, Lamium, Matricaria, Papaver, Polygonum, Raphanus, Rumex (solo se nato da seme), Stellaria.
Non controlla infestanti provenienti da organi di propagazione vegetativa quali: Convolvulus, Cirsium, Rumex, Artemisia.

Dosi ed epoche d'impiego
Kg 4-5 per ettaro, secondo la natura del terreno, riservando le dosi più alte ai terreni pesanti o meglio dotati di sostanza organica. Per la distribuzione del prodotto, si utilizza un quantitativo di acqua di 400 litri o più per ettaro.
Il trattamento si effettua solo in pre-emergenza ossia subito dopo la semina o nei primi giorni successivi o comunque ancora prima che inizi l'emergenza della coltura. Il terreno deve essere ben lavorato, sminuzzato e soprattutto accuratamente livellato per evitare ristagni d'acqua. I terreni torbosi sono esclusi dal trattamento. Non ripetere il trattamento sulle colture prima di 6 mesi.

Avvertenze
Evitare superdosaggi e accumuli della miscela erbicida. Nei terreni trattati non deve essere effettuata la trasemina con leguminose foraggere. Si sconsiglia di effettuare trattamenti su orzi appartenenti a varietà distiche.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Non è prevista la miscela con altri prodotti.

Fitotossicità
Il trattamento non è consigliabile nei terreni molto sabbiosi, ghiaiosi ed in quelli facilmente soggetti a ristagni di acqua nel periodo invernale.
Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni di sofferenza della coltura; si tratta però di fenomeni transitori che in condizioni normali scompaiono in breve tempo e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg 20

Il presidio sanitario suddetto è registrato al N. 5476

- 2 -

5482

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Polvere tipo Bordolese per la lotta contro la Peronospora e contro l'Occhio di pavone
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Rame metallico (sottoforma di solfato basico di rame).
Coformulanti q.b. a 100.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il BORDOVIT è un fungicida rameico dotato di lunga persistenza di azione e resistenza al dilavamento, per:
— Vite, Pomodoro, Patata, Cipolla: contro Peronospora.
— Olivo: contro Occhio di pavone.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Kg. 1/hl. d'acqua ad intervalli di 8-12 giorni.
Sciogliere la dose in poca acqua, versare nell'irroratrice, e portare a volume agitando.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5482 Ministero della Sanità del 3.10.83

12 / 1982

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con Sofril 80, Benlate, Karathane LC, Kelthane MF, Metilon 20, Zolone Liquido 25, Zolone PB 25, Lannate 25, Naftil.
Per quanto riguarda la miscela con Karathane PB oppure con Parafene Rosso, onde ottenere la migliore compatibilità, è necessaria l'aggiunta del Bagnante Adesivo Etaldyn seguendo queste modalità:
— stemperare in acqua il prodotto indi versare nell'irroratrice già riempita a metà;
— aggiungere Etaldyn a gr. 50/hl;
— aggiungere il Karathane PB oppure il Parafene Rosso e portare a volume agitando.
Per miscele con esteri fosforici (Parafene, Metilon, Zolone) aumentare la loro dose del 20% ed irrorare le miscele appena pronte.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

548

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Fungicida organico
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 40 di Mancozeb puro
Gr. 25 di Captan puro
Sostanze inerti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: *l'ingestione provoca: bruciori esofagei, nausea, conati di vomito, coliche addominali, diarrea, apatia, irritazione nervosa, aritmia, cianosi, collasso cardiocircolatorio.*

Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, fotodermatosi, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia. *In caso di ingestione provocare il vomito; lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua); il vomito e la lavanda gastrica sono controindicati se esistono lesioni gastroesofagee. Inoltre, digitale, purganti salini, cure sintomatiche.*

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: *alcool, olii, grassi.*

APPLICAZIONI

L'ERISAN è un fungicida organico raccomandato per la lotta contro la ticchiolatura delle pomacee.

Dosi d'impiego: gr. 200-300/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA

DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con prodotti della nostra gamma ad eccezione degli olii e degli zolfi. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, etc.). La sua applicazione deve rispettare un intervallo di 3 settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili al prodotto: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna.

Il prodotto inoltre può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo: (Stark delicious, Winesap, Stayman, Ranetta del Canadà), per le quali si sconsiglia.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5484 **Ministero della Sanità del** 3.10.83
12 / 1982

5512

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MIKAL RAME

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la peronospora della vite
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 30 di Fosetil Alluminio puro.
Gr. 30 di Rame puro (da ossicloruro tetrarameico).
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

E' un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.

L'attività nei confronti della peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.

La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

Queste caratteristiche, unite alla persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la peronospora della vite anche con interventi distanziati a cadenza fissa.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Il prodotto va impiegato sulla vite dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di « chiusura del grappolo » compresa.

Il primo trattamento va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.

Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo.

Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di «chiusura del grappolo» compresa.

Per evitare interferenze nella fecondazione si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza della fioritura. Dovendo eseguire trattamenti antiperonosporici in tale periodo sono consigliabili miscele contenenti mancozeb anziché rame.

Dose: gr. 400/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

E' miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto durante la fioritura.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5512 **del Ministero della Sanità del** 10.1.83

Peso netto kg.

4/83

552:

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SHADOW

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
DISERBANTE SELETTIVO PER IL MAIS

Registrazione Ministero Sanità n. 5525 del 23.11.83

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Alachlor puro	g. 43,2
— Coformulanti *	q.b. a g. 100,0

* Contiene mono-clorobenzolo.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto agisce su un numero molto elevato di infestanti provenienti da seme, particolarmente su quelle appartenenti alla famiglia delle Graminacee quali Echinochloa spp. (Giavone), Poa spp. (Gramigna della vite), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Setaria spp. (Panicastrelle), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano), Sorghum halepense (Sorghetta) da seme. Fra le infestanti a foglia larga controlla Amarantus retroflexus (Amaranto), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Matricaria chamomilla (Camomilla), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Sinapis arvensis (Senape), Veronica spp. (Veroniche). Il prodotto è invece poco efficace su Stellaria media (Stellaria), Urtica spp. (Ortiche), Polygonum spp. (Persicaria, Coreggiola) e non controlla le malerbe perenni munite di rizomi, bulbi, stoloni quali Cynodon dactylon (Gramigna), Convolvulus arvensis (Convolvolo), Sorghum halepense (Sorghetta), Cirsium arvense (Stoppione), Artemisia vulgaris (Artemisia).

Per ottenere i migliori risultati è opportuno operare attenendosi alle seguenti modalità:
— Preparare accuratamente il terreno affinché non rimangono zolle;
— Applicare il prodotto **subito dopo la semina o qualche giorno dopo ma prima della nascita delle infestanti;**
— Diluire il prodotto in 4-6 o più ettolitri di acqua e distribuire la miscela uniformemente;
— Provvedere ad una leggera irrigazione a pioggia se entro 2 settimane non si è verificata una precipitazione di 8-10 mm.;
— Non effettuare eventuali lavorazioni a profondità tali da portare in superficie terreno non raggiunto dall'erbicida.

DOSI DI IMPIEGO

Il prodotto può essere usato da solo, dove predominano le Graminacee resistenti all'Atrazina o nel mais di secondo raccolto, alle dosi di lt. 6/ha che possono essere ridotti a lt. 5/ha nei terreni sciolti ed aumentati a lt. 7-8/ha nei terreni ricchi di sostanza organica.

Più frequentemente la composizione floristica dei campi di mais richiede l'unione dell'Atrazina all'Alachlor e pertanto le dosi/ha saranno di lt. 4-5/ha di prodotto e di Kg. 2/ha di un formulato commerciale al 50% di Atrazina.

Quando si usa il prodotto da solo è sufficiente versarlo nel quantitativo di acqua necessario mescolando con cura.

Nel caso di miscela con prodotti a base di Atrazina è preferibile sciogliere i due prodotti in poca acqua separatamente, versare nella botte prima il prodotto a base di Atrazina e successivamente, sempre mescolando con cura, questo formulato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con gli altri diserbanti impiegati sulla coltura di mais.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture diverse dal mais.

Alle dosi normali d'impiego non si hanno residui dannosi per le colture seminate purché dall'applicazione dell'erbicida alla semina di altre colture intercorrano 3-4 mesi e si proceda ad una buona aratura prima della semina.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

Via di Tor Sapienza, 172 - ROMA

Contenuto lt.

5528

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

MIKAL · RAME BLU

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la peronospora della vite
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 30 di Fosetil Alluminio puro.
Gr. 30 di Rame puro (da ossicloruro tetrameico).
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

E' un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
L'attività nei confronti della peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la peronospora della vite anche con interventi distanziati a cadenza fissa.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Il prodotto va impiegato sulla vite dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di « chiusura del grappolo » compresa.
Il primo trattamento va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo.
Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di «chiusura del grappolo» compresa.
Per evitare interferenze nella fecondazione si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza della fioritura. Dovendo eseguire trattamenti antiperonosporici in tale periodo sono consigliabili miscele contenenti mancozeb anziché rame.
Dose: gr. 400/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

E' miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto durante la fioritura.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5528 **del Ministero della Sanità del** 10.10.83

Peso netto kg.

4/83

553

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Fungicida cupro-organico per la lotta contro la Peronospora della vite e contro Peronospora del pomodoro
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 19,8 di Rame puro (sottoforma di ossicloruro tetrarameico)
Gr. 12 Mancozeb puro
Gr. 12 Folpet puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

L'ingestione provoca:
Azione irritante del tratto gastro-intestinale, con coliche addominali, bruciori, vomito, diarrea.

Il contatto con cute e mucose provoca:
Dermatiti, congiuntiviti faringiti. Possibilità di collasso cardiocircolatorio.

Consigli terapeutici di primo intervento:
In caso di ingestione:
Sollecitare il vomito, lavanda gastrica con carbone attivo (25 gr/litro di acqua), cure sintomatiche.

Per le forme cutaneo-mucose:
Lavaggio con acqua semplice, pomate oftalmiche, pomate dermatologiche.

Controindicati:
Alcool, olii, grassi.

Nei casi gravi:
Ricovero presso centri di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5532 **Ministero della Sanità del** 9.11.83
12 / 1982

CARATTERISTICHE

L'ERREVIT è un fungicida cupro-organico nel quale sono presenti tre principi attivi: il rame, il mancozeb ed il folpet, per la lotta contro la Peronospora della vite.
Possiede inoltre una qualche azione frenante sullo sviluppo della botrite.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite
— Contro la Peronospora: gr. 500/hl.
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)
— Contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi del Pomodoro: gr. 450-500/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i prodotti della nostra gamma.
Non è compatibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

Avvertenza: devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5534

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

POMARGOL

Prodotto ad azione fisiologica contro la rugginosità delle mele Golden Delicious

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 60 Zolfó puro (esente da selenio).
Sostanze ad azione fisiologica, eccipienti, coadiuvanti ed inerti q.b. a 100.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il POMARGOL è un prodotto formulato in polvere bagnabile che va sciolto in acqua e irrorato sulle piante per combattere la rugginosità delle mele Golden Delicious.

Il POMARGOL contenendo zolfo, possiede anche azione antioidica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Iniziare i trattamenti a partire dall'apertura dei mazzetti florali.

Ripeterli ogni 8-10 giorni fino a cinque settimane dopo la caduta dei petali.

Dosi: kg. 1/hl.

Quando la temperatura è superiore a 20 gradi abbassare la dose a gr. 500-700/hl.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire il POMARGOL in un volume doppio o triplo d'acqua, indi versare la poltiglia così ottenuta nell'irroratrice riempita per metà e portare a volume agitando

Tenere la poltiglia in agitazione durante il trattamento.

Preparare la miscela al momento dell'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Si consiglia di impiegare il prodotto da solo onde facilitarne l'azione. E' comunque compatibile con: Dithane M 45, Zirex 90, Redran PB 25 e Zolone 25.

Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.

Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap; alla Golden Delicious se usato in periodi diversi da quello indicato al paragrafo « Dosi e modalità d'impiego ».

Sospendere i trattamenti cinque giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5534 del Ministero della Sanità del 9.11.1983

Peso netto kg.

3/82

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

COPERAL

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 8 di Cimoxanil puro
gr. 68,6 di Mancozeb puro
Sostanze inerti q.b. a 100

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 5538 **del Ministero della Sanità del** 23.11.83

3/82

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite e del pomodoro.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Sulla vite può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del pomodoro, solo fino alla prima fioritura: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
Usare la dose di 200 gr. ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di Peronospora e di Alternaria.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con: Benlate; Dithane M 45; Karathane WD; Karathane L C; Iprodial; Sulfosol 80; Gutene; Dimetoil E; Drinfos 20; Lannate 25; Lannate L; Delfos M 20; Tortrin 85; Fitofos 20; Ovotek; Sumifos; Emmaton 50; Zolone P.B. 25; Zolone Liquido 25; Azofol L.
Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5539

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di Fosetyl alluminio puro
gr. 25 di Folpet puro
Adiuvanti e coloranti q.b. a 100

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione.
Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.

Terapia.
Lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche che unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati e cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

VITICOLTURA
Contro Peronospora. Il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.
Dose: gr. 250-300/hl.

Contro Escoriosi. Dose gr. 300/hl. — effettuare due trattamenti: il primo nella fase di « gemma mossa » (fase D del Baggiolini) e il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolta

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5539 **del Ministero della Sanità del** 23.11.83

Contenuto netto kg.

3/82

5540

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Polvere bagnabile
Fungicida organico per la lotta contro la Ticchiolatura del Melo e del Pero e contro altre malattie della Vite, del Garofano e della Rosa

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 5 di Benomyl puro
gr. 60 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico formato da due principi attivi (Benomyl + Mancozeb) in proporzioni ben definite, per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee.
Grazie all'azione sistemica del Benomyl, unita all'azione di contatto del Mancozeb il prodotto può impiegarsi a cadenza fissa, indipendentemente dall'andamento stagionale, dal primo all'ultimo trattamento contro la Ticchiolatura.
Il prodotto combatte inoltre altre malattie delle colture sottoindicate.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Melo e Pero - Contro Ticchiolatura gr. 200/hl. — Iniziare i trattamenti appena prima dell'apertura delle gemme e ripeterli a cadenza fissa di 8 giorni nel periodo prefiorale, e di 12 giorni nel periodo post-fiorale.
Vite: contro Peronospora, gr. 300/hl.; esplica inoltre una qualche azione di contenimento su Botrytis.
Rosa in pieno campo: contro Ruggine, Peronospora e Ticchiolatura, gr. 300/hl.
Garofano in pieno campo: contro Ruggine, Alternariosi, Eterosporiosi e Septoria gr. 300/hl.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Compatibile con i prodotti della nostra gamma.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Varietà di pere sensibili al **MANCOZEB:** Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Contenuto netto kg.

Reg. n. 5540 **del Ministero della Sanità del** 23.11.1983

3/82

5541

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

BENZEB

Polvere bagnabile
Fungicida organico per la lotta contro la Ticchiolatura del Melo e del Pero e contro altre malattie della Vite, del Garofano e della Rosa

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 10 di Benomyl puro
gr. 40 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
L'ingestione provoca nausea conato di vomito sonnolenza, turbe nervose bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni:
Alcool, olii, grassi.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico formato da due principi attivi (Renomyl + Mancozeb) in proporzioni ben definite, per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee

Grazie all'azione sistemica del Benomyl, unita all'azione di contatto del Mancozeb il prodotto può impiegarsi a cadenza fissa, indipendentemente dall'andamento stagionale, dal primo all'ultimo trattamento contro la Ticchiolatura.

Il prodotto combatte inoltre altre malattie delle colture sottoindicate.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

- Melo e Pero - Contro Ticchiolatura gr. 200/hl. — Iniziare i trattamenti appena prima dell'apertura delle gemme e ripeterli a cadenza fissa di 8 giorni nel periodo prefiorale, e di 12 giorni nel periodo post-florale.
- Vite: contro Peronospora, gr. 300-350/hl.; esplica inoltre una qualche azione di contenimento su Botrytis.
- Rosa in pieno campo: contro Ruggine, Peronospora e Ticchiolatura, gr. 300/hl.
- Garofano in pieno campo: contro Ruggine, Alternariosi, Eterosporiosi e Septoria gr. 300/hl.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Compatibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ

Varietà di pere sensibili al **MANCOZEB:** Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5541 **del Ministero della Sanità del** 23.11.1983

Contenuto netto kg.

3/82

5:

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 4,20 di Cimoxanil puro.
Gr. 39,75 di rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico).
Sostanze inerti q.b. a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **VITAL R** è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5562 **Ministero della Sanità del** 23.11.83

2/83

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE:
Contro peronospora: usare gr. 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.

PATATA e POMODORO:
Contro peronospora: usare gr. 300 di prodotto ogni 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con: Benlate; Dacostar; Dithane M 45; Karathane PB e LC; Rovral; Sofril 80; Azifene; Dafene; Fosfene; Folgreen L; Lannate 25 ed L; Lorzene; Metilon; Naftil; Parafene; Spintox; Sumifene; Zitiol; Zolone PB e L; Liquid Plant Food.

Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5563

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Fungicida

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 8,4 di Cimoxanil puro.
Gr. 63,99 di Folpet puro.
Sostanze inerti q.b. a 100.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
Azione irritazione sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.

Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata, e del pomodoro.

Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti.

Può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150 gr. di prodotto ogni 100 lt. di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.

Peronospora della patata e del pomodoro: usare 150 gr. di prodotto per 100 lt. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida.

Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Rispettare un intervallo di almeno 20 giorni fra un trattamento con il prodotto ed un trattamento con Olii minerali e Polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto su uve da tavola, patata, pomodoro, e 40 giorni sulle uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5563 **Ministero della Sanità del** 23.11.83

3 / 83

Peso netto kg.

557

FENADOR(R) MIX

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa del melo, della vite, del frumento e dell'orzo.

Si impiega in trattamenti liquidi contro la Ticchiolatura e l'Oidio del melo e la Peronospora e l'Oidio della vite e le malattie della parte aerea dei cereali.

COMPOSIZIONE

– Fenarimol puro	g	1,6
– Tiofanato metile puro	g	14
– Mancozeb puro	g	60
– Coadiuvanti, Inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
VERCHIM ASTERIAS - SpA
Ozzano Emilia (BO)

Registrazione n. 5577 del 15/11/1983 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose : lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega contro le crittogame e alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale ripetendo i trattamenti ad opportuni intervalli.

MELO: contro Ticchiolatura e Oidio : g 200-250

VITE: contro Peronospora e Oidio : g 200-300

FRUMENTO e ORZO: contro malattie dell'apparato aereo del frumento (trattamenti in levata o spigatura) e dell'orzo (trattamenti in botticella) distribuire una dose di 2-2,5 Kg/ha in sufficiente quantità di miscela acquosa.

Preparazione della poltiglia: stemperare accuratamente in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Da non impiegare in serra

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate

Compatibilità: il prodotto non è compatibile in miscela con sostanze alcaline, come Polisolfuri, Poltiglia bordolese, Calce. E' miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo . Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per le api.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

5583

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

COPERAL F

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 8,4 di Cimoxanil puro.
Gr. 63,99 di Folpet puro.
Sostanze inerti e colorante q.b. a 100.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il **COPERAL F** è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti.
Può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua. Indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150 gr di prodotto ogni 100 lt di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.
Peronospora della patata e del pomodoro: usare 150 gr di prodotto per 100 lt d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida. Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco.

Avvertenza:
I trattamenti devono essere distanziati di almeno 20 giorni dai trattamenti con prodotti a base di olii minerali e polisolfuri.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto su uve da tavola, patata, pomodoro, e 40 giorni sulle uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5583 **Ministero della Sanità del** 15.11.1983

Contenuto netto kg.

2/83

558

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

COPERAL RB

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 4,20 di Cimoxanil puro.
Gr. 39,75 di rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico).
Sostanze inerti q.b. a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **COPERAL RB** è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.

Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 5584 **Ministero della Sanità del** 15.11.83

2/83

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE:
Contro peronospora: usare gr. 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.

PATATA e POMODORO:
Contro peronospora: usare gr. 300 di prodotto ogni 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con: Benlate; Dithane M 45; Karathane WD e LC; Iprodial; Sulfosol; Gutene; Dimetoil; Drinfos; Lannate 25 e L; Delfos; Tortrin; Fitofos; Ovotek; Sumifos; Emmaton; Zolone PB e L; Azofol L.

Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5620

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

EPARGOL

Prodotto ad azione fisiologica contro la rugginosità delle mele Golden Delicious

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 60 Zolfo puro (esente da selenio).
Sostanze ad azione fisiologica, eccipienti, coadiuvanti ed inerti q.b. a 100.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'EPARGOL è un prodotto formulato in polvere bagnabile che va sciolto in acqua e irrorato sulle piante per combattere la rugginosità delle mele Golden Delicious.
L'EPARGOL contenendo zolfo, possiede anche azione antioidica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Iniziare i trattamenti a partire dall'apertura dei mazzetti fiorali.
Ripeterli ogni 8-10 giorni fino a cinque settimane dopo la caduta dei petali.
L'EPARGOL non è dannoso per le api e pertanto può essere impiegato anche durante la fioritura.
Dosi: kg. 1/hl.
Quando la temperatura è superiore a 20 gradi abbassare la dose a gr. 500-700/hl.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire l'EPARGOL in un volume doppio o triplo d'acqua, indi versare la poltiglia così ottenuta nell'irroratrice riempita per metà e portare a volume agitando.
Tenere la poltiglia in agitazione durante il trattamento.
Preparare la miscela al momento dell'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Si consiglia di impiegare il prodotto da solo onde facilitarne l'azione. E' comunque compatibile con: Dithane M 45, Zirasan 90, Metilsan, Kilval, Sodiradia, Lorzene Flow e Zolone 25.
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap; alla Golden Delicious se usato in periodi diversi da quello indicato al paragrafo « Dosi e modalità d'impiego ».

Sospendere i trattamenti cinque giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5620 **del Ministero della Sanità del** 6.12.83

Peso netto kg.

3/82

562

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

FOLMANCAP

Fungicida organico per la lotta contro la Peronospora della vite e contro altre malattie delle colture indicate in etichetta Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 30 Maneb puro
Gr. 15 Folpet puro
Gr. 9 Captafol puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.
— Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polveri durante la sua manipolazione.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

L'ingestione provoca:
nausea - irritazione del tratto gastrointestinale - conati di vomito - bruciori gastrici con dolori addominali - turbe nervose e diarrea - possibilità di collasso cardiocircolatorio.
Il contatto con la cute e le mucose provoca:
irritazioni delle mucose - eczemi cutanei da fotosensibilizzazioni resistenti alle terapie.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI PRIMO INTERVENTO

In caso di ingestione:
— *provocare il vomito*
— *lavanda gastrica con carbone attivo (25 gr/litro di acqua)*
— *cure sintomatiche*
Per il contatto con cute e mucose:
— *lavaggi con acqua semplice, pomate oftalmiche, pomate cortisoniche per le forme eczematose.*
Controindicazioni:
Olii - Grassi - Alcool.
In casi gravi ricovero in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il FOLMANCAP è un fungicida organico nel quale sono presenti tre principi attivi per la lotta contro la Peronospora della vite.
Possiede inoltre una qualche azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Vite
— contro la Peronospora: gr. 400/hl.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura.
— contro Peronospora, Alternaria, Septoriosi: gr. 400/hl.
Rosa in pieno campo
— contro la Peronospora: gr. 400/hl.
Tabacco
— contro la Peronospora: gr. 400/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

E' compatibile con i prodotti della nostra gamma. Non è compatibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Olio banco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Da una applicazione con olii minerali e polisolfuri, devono trascorrere 20 giorni.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Peso netto kg.

Reg. n. 5621 **Ministero della Sanità del** 23.11.1983

12 / 1982

5626

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

COPERAL FB

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 8,4 di Cimoxanil puro.
Gr. 63,99 di Folpet puro.
Sostanze inerti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua, e digitale.

CARATTERISTICHE

Il **COPERAL FB** è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.
Agisce sia penentrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti.
Può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 5626 **Ministero della Sanità del** 28.12.83

2/83

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150 gr. di prodotto ogni 100 lt di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.

Peronospora della patata e del pomodoro: usare 150 gr. di prodotto per 100 lt. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida. Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco. I trattamenti devono essere distanziati di almeno 20 giorni dai trattamenti con prodotti a base di olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili e per i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto su uve da tavola, patata, pomodoro, e 40 giorni sulle uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

563

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 8 di Cimoxanil puro
gr. 68,6 di Mancozeb puro
Sostanze inerti q.b. a 100

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite e del pomodoro.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Sulla vite può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del pomodoro, solo fino alla prima fioritura: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
Usare la dose di 200 gr. ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di Peronospora e di Alternaria.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con Benlate, Dacostar, Dithane M 45, Karathane PB, Karathane LC, Rovral, Sofril 80, Azifene, Dafene, Fosfene, Lannate 25, Lannate L, Lorzene Flow, Metilon 20, Naftil Micronizzato, Parafene Rosso, Spintox, Sumifene 50 E, Zitiol E, Zolone P.B. 25, Zolone Liquido 25, Folgreen L.
Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5633 **del Ministero della Sanità del** 28.12.83

Peso netto kg.

3/82

5634

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

SIMAVIT P.B.

Erbicida di pre-emergenza delle infestanti
per colture di vite, melo, pero,
agrumi, olivo, asparago e rose in pieno campo
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 50 di Simazina pura
Coformulanti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **SIMAVIT P.B.** è un diserbante selettivo per colture di vite, melo, pero, agrumi, olivo, asparago e rose in pieno campo contro le infestanti annuali.

Agisce per assorbimento radicale.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Vite, melo, pero, agrumi, olivo
Il trattamento deve essere effettuato prima dell'emergenza delle infestanti, alla fine dell'inverno, dopo le consuete lavorazioni, su terreno ben preparato, sminuzzato, pulito da infestanti e umido, alla dose per ettaro di:
- terreni leggeri: kg. 3;
- terreni di medio impasto: kg. 4,5;
- terreni pesanti: kg. 6; distribuiti in 500-1.000 litri d'acqua.

Sul pero innestato su cotogno non superare la dose di kg. 4/ha.

Asparago (di almeno 3 anni)
Effettuare il trattamento in primavera, subito dopo la rincalzatura, prima che emergano i turioni, alla dose di kg. 4/ha., oppure dopo la raccolta dei turioni, su terreno privo di infestanti alla dose di kg. 2/ha.

Rose in pieno campo (di almeno 3 anni)
Si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di effettuare l'applicazione.
Trattare in primavera dopo la lavorazione del terreno, in pre-emergenza delle infestanti, alla dose di kg 3-4/ha.
La dose bassa è indicata per i terreni leggeri.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire la dose di prodotto in poca acqua; versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.
Trattare in assenza di vento per evitare che l'erbicida venga trasportato su colture vicine.

AVVERTENZE

- Non impiegare il prodotto sui terreni torbosi perché viene da essi inattivato.
- Non trattare su terreni siccitosi perché il prodotto non esplica la sua attività.
- Dopo il trattamento si consiglia di non lavorare il terreno.
- Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5634 **Ministero della Sanità del** 28.12.83

Peso netto kg.

12 / 1982

564

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

RESTANOX

(SOSPENSIONE ACQUOSA)
ACARICIDA IN SOSPENSIONE ACQUOSA

Registrazione Ministero Sanità n. 5644 del 6-12-83

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Neostanox	g. 50
— Coformulanti *	q.b. a g. 100
* Contiene glicole etilenico.	

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:

Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità effettuando, in relazione alla via di contaminazione, abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale.

Terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il RESTANOX è un acaricida di superficie attivo nei confronti delle forme mobili degli acari (Metatetranychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f. vitis, E. pomi), che infestano pero, melo, pesco, susino, albicocco, ciliegio, vite, agrumi nonché le colture floreali ed ornamentali in pieno campo, pomodori e cetrioli.
L'attività acaricida del RESTANOX aumenta progressivamente dopo il trattamento e mantiene valori elevati per un periodo di 4-6 settimane. Nei trattamenti di estate inoltrata si previene quindi, in buona misura, con conseguente minor infestazione nella primavera successiva, la deposizione delle uova d'inverno che ha luogo verso la fine stagione da parte delle femmine di P. ulmi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il RESTANOX nei trattamenti a volume normale, si impiega alla dose di 100 grammi ogni 100 litri di acqua. L'intervento va effettuato alla comparsa dei primi sintomi d'infestazione bagnando accuratamente tutta la pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari normalmente impiegati sulle colture citate.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In applicazioni su colture di rose, è raccomandabile eseguire dei saggi preliminari, poiché alcune varietà potrebbero risultare sensibili all'acaricida.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMACEE, DRUPACEE, POMODORO, CETRIOLO - 45 GIORNI PER LA VITE - 60 GIORNI PER GLI AGRUMI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Contenuto Kg.

5674

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 8,4 di Cimoxanil puro.
Gr. 63,99 di Folpet puro.
Sostanze inerti e colorante q.b. a 100.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

L'R6 STOP F è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti.
Può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150 gr. di prodotto ogni 100 lt. di acqua.
Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.
Peronospora della patata e del pomodoro: usare 150 gr di prodotto per 100 lt. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida. Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco.

Avvertenza:
I trattamenti devono essere distanziati di almeno 20 giorni dai trattamenti con prodotti a base di olii minerali e polisolfuri.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto su uve da tavola, patata, pomodoro, e 40 giorni sulle uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5674 **Ministero della Sanità del** 28.12.73

Contenuto netto kg.

2/83

56

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLICRITT M

FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA E DI CONTATTO
PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FUNGINE
DEL FRUMENTO E PER LA CONCIA DELLE SEMENTI

Registrazione Ministero Sanità N. 5688 del 12.1.1984
marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Carbendazim puro	g. 6,0
— Maneb puro	g. 50
— Coformulanti	q.b. g. 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il POLICRITT M è fungicida che presenta associati due principi attivi ad ampio spettro d'azione: il Carbendazim, ad azione sistemica ed attività preventiva e curativa, ed il Maneb, ad azione di contatto ed attività preventiva.
Tale composizione assicura un buon controllo delle malattie fungine, dovute a diversi agenti patogeni, che colpiscono il frumento nelle diverse fasi del suo ciclo vegetativo e che vengono comunemente indicate come: marciumi delle cariossidi e dei germinelli, mal del piede, malattie della parte aerea (foglie e spighe).

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Trattamento di concia delle sementi (cereali, barbabietola da zucchero, orticole e floricole).
Dose d'impiego: 250 g per quintale di seme.
Questo intervento difende la coltura nelle delicate fasi vegetative di germinazione, emergenza e iniziali stadi di accrescimento, in particolare da attacchi di septoriosi, fusariosi, elmintosporiosi, cercosporella, rizoctonia, ofiobolo, carie e carboni.
Trattamenti sul frumento
Dose d'impiego: 3-4 Kg/ha, in relazione all'intensità dell'attacco in atto o previsto, distribuiti con 400-600 litri d'acqua per ettaro.
Per una buona difesa della coltura, in particolare in zone o condizioni climatiche favorevoli alle malattie fungine, si rendono opportuni due trattamenti:
a) fine accestimento-levata, per controllo di mal del piede ed infezioni precoci di oidio e septoriosi;
b) spigatura (fuoriuscita della spiga), per il controllo delle malattie delle foglie e della spiga: oidio, ruggini, fusariosi, septoriosi.

MODALITA' D'IMPIEGO
Stemperare il prodotto in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio della irroratrice quasi completamente riempito.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
Il POLICRITT M è miscibile con i formulati di comune impiego, nonché con i fertilizzanti fogliari.
I prodotti ad azione insetticida dovranno essere aggiunti alla poltiglia di irrorazione poco prima dell'applicazione.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.
prodotto nello stabilimento di
San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Contenuto Kg.

5702

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

RHODAX F.B.

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora e l'Escoriosi della vite

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di Fosetyl Alluminio puro
gr. 25 di Folpet puro
Coformulanti q.b. a 100

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione.
Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia.
Lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

IN VITICOLTURA
Contro Peronospora: il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.
Dose: gr. 250-300/hl.
Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame
Contro Escoriosi: dose gr. 300/hl. Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di « gemma mossa » (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Contenuto netto kg.

Reg. n. 5702 **del Ministero della Sanità del** 12-1-1984
3/82

5712

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ISOTRIL

Erbicida selettivo di post-emergenza
del frumento tenero e dell'orzo a semina
autunnale
Pasta Fluida

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 26,08 Isoproturon puro
gr. 5,39 Ioxynil puro
gr. 12,69 Mecoprop puro
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per: ingestione, inalazione, contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

Dosi minori *(da assorbimento percutaneo) danno: stordimento, cefalea, iperpnea e dispnea, senso di costrizione alla gola, salivazione e nausea, ipertensione e bradicardia, alterazioni della motilità e della sensibilità.*

Dosi maggiori *(sia a seguito di inalazione che di ingestione di dosi letali o subletali) danno i seguenti sintomi: breve fase di iperventilazione, gastroenterite e diarrea, convulsioni anossiche, arresto respiratorio, collasso pressorio con aritmie cardiache, infine arresto cardio circolatorio.*

Pronto soccorso:

Allontanare il paziente dal luogo contaminante. Togliere gli abiti e sottoporlo a detersione delle parti contaminate, sia cutanee che mucose, con tempestive abluzioni con soluzioni di bicarbonato di sodio al 2-3% e poi con sola acqua.

In caso di ingestione provocare il vomito o la lavanda gastrica se il paziente è cosciente, se in stato di incoscenza dopo intubazione. Somministrazione di ossigeno e ricovero in ambiente Ospedaliero (Centro di Rianimazione) — Terapia sintomatica.

La somministrazione di ossigeno è di primaria importanza.

Consultare comunque il centro antiveleni.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Agrocnemie - Francia

Reg. n. 5712 **del Ministero della Sanità del** 12.1.84

10/83

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, **contro infestanti annuali graminacee** (Alopecurus, Apera, Avena fatua e ludoviciana, Falaris, Lolium, Poa) e **contro le infestanti annuali dicoltiledoni**, anche quelle più difficili da combattere come il Gallum aparine.

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Il trattamento va effettuato dopo il periodo delle forti gelate, dall'inizio alla fine dell'accestimento dei cereali.
Per la distribuzione delle Avene, del Lolium e della Falaris è necessario intervenire entro lo stadio di due-quattro foglie delle infestanti, prima che le stesse inizino l'accestimento.

Dosi:
- contro Alopecurus, Apera, Poa - litri 5 per ettaro;
- contro Avena, Falaris, Lolium - litri 6 per ettaro;

Distribuire la dose di prodotto con 600-800 litri d'acqua per ettaro.

Preparazione della miscela: Sciogliere il prodotto in poca acqua quindi versare nell'irroratrice già riempita a metà; portare a volume agitando.

Tenere agitata la poltiglia durante il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con Benlate e Dithane M 45.

Per ottenere la compatibilità con Cerealsan è necessario aggiungere all'Isotril il Bagnante Adesivo Etaldyn a gr. 50/hl. prima di miscelare l'Isotril stesso con il Cerealsan.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Non impiegare il prodotto su terreni filtranti.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Lt.

5717

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Erbicida selettivo di post-emergenza
del frumento tenero e dell'orzo a semina
autunnale
Pasta Fluida

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 26,08 Isoproturon puro
gr. 5,39 Ioxynil puro
gr. 12,69 Mecoprop puro
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per: ingestione, inalazione, contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

Dosi minori *(da assorbimento percutaneo) danno: stordimento, cefalea, iperpnea e dispnea, senso di costrizione alla gola, salivazione e nausea, ipertensione e bradicardia, alterazioni della motilità e della sensibilità.*

Dosi maggiori *(sia a seguito di inalazione che di ingestione di dosi letali o subletali) danno i seguenti sintomi: breve fase di iperventilazione, gastroenterite e diarrea, convulsioni anossiche, arresto respiratorio, collasso pressorio con aritmie cardiache, infine arresto cardio circolatorio.*

Pronto soccorso:

Allontanare il paziente dal luogo contaminante. Togliere gli abiti e sottoporlo a detersione delle parti contaminate, sia cutanee che mucose, con tempestive abluzioni con soluzioni di bicarbonato di sodio al 2-3% e poi con sola acqua.

In caso di ingestione provocare il vomito o la lavanda gastrica se il paziente è cosciente, se in stato di incoscenza dopo intubazione. Somministrazione di ossigeno e ricovero in ambiente Ospedaliero (Centro di Rianimazione) — Terapia sintomatica.

La somministrazione di ossigeno è di primaria importanza.

Consultare comunque il centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo di post-emergenza del frumento tenero e dell'orzo a semina autunnale, contro infestanti annuali graminacee (Alopecurus, Apera, Avena fatua e ludoviciana, Falaris, Lolium, Poa) e contro le infestanti annuali dicotiledoni, anche quelle più difficili da combattere come il Galium aparine

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Il trattamento va effettuato dopo il periodo delle forti gelate, dall'inizio alla fine dell'accestimento dei cereali.
Per la distribuzione delle Avene, del Lolium e della Falaris è necessario intervenire entro lo stadio di due-quattro foglie delle infestanti, prima che le stesse inizino l'accestimento.

Dosi:
— contro Alopecurus, Apera, Poa - litri 5 per ettaro.
— contro Avena, Falaris, Lolium - litri 6 per ettaro.

Distribuire la dose di prodotto con 600-800 litri d'acqua per ettaro

Preparazione della miscela: Sciogliere il prodotto in poca acqua quindi versare nell'irroratrice già riempita a metà; portare a volume agitando

Tenere agitata la poltiglia durante il trattamento

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con Benlate e Dithane M 45

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Non impiegare il prodotto su terreni filtranti.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68

Stabilimento Rhône Poulenc
Agrochemie - Francia

Reg. n. 5717 **del Ministero della Sanità del** 12.1.84

Contenuto netto Lt.

10/83

5718

III CLASSE TOSSICOLOGICA

BENTHANE 10 - 40

Polvere bagnabile
Fungicida organico per la lotta contro la Ticchiolatura del Melo e del Pero e contro altre malattie della Vite, del Garofano e della Rosa

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 10 di Benomyl puro
gr. 40 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5718 del Ministero della Sanità del 27-1-84
3/82

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico formato da due principi attivi (Benomyl + Mancozeb) in proporzioni ben definite, per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee.
Grazie all'azione sistemica del Benomyl, unita all'azione di contatto del Mancozeb il prodotto può impiegarsi a cadenza fissa, indipendentemente dall'andamento stagionale, dal primo all'ultimo trattamento contro la Ticchiolatura.
Il prodotto combatte inoltre altre malattie delle colture sottoindicate.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

- **Melo e Pero** - Contro Ticchiolatura gr. 200/hl. — Iniziare i trattamenti appena prima dell'apertura delle gemme e ripeterli a cadenza fissa di 8 giorni nel periodo prefiorale, e di 12 giorni nel periodo post-florale.
- **Vite:** contro Peronospora, gr. 300-350/hl.; esplica inoltre una qualche azione di contenimento su Botrytis.
- **Rosa** in pieno campo: contro Ruggine, Peronospora e Ticchiolatura, gr. 300/hl.
- **Garofano** in pieno campo: contro Ruggine, Alternariosi, Eterosporiosi e Septoria gr. 300/hl.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Compatibile con i prodotti della nostra gamma.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Varietà di pere sensibili al **MANCOZEB:** Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5719

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ROVRASULF

Fungicida per la lotta simultanea contro Botrite e Oidio della Vite
Polvere secca per trattamenti polverulenti

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 3 Iprodione puro.
Gr. 90 Zolfo puro (esente da Selenio).
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **ROVRASULF** è un fungicida costituito dalla miscela di due principi attivi (Iprodione e zolfo) al fine di combattere simultaneamente la Botrite e l'Oidio della Vite.
Il **ROVRASULF** non ha alcun effetto sulla fermentazione dei mosti.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto va impiegato nella dose di kg. 25/30 per ettaro distribuiti omogeneamente mediante solforatrice.
I trattamenti vanno iniziati prima della chiusura del grappolo in modo che il prodotto penetri nell'interno del grappolo stesso.
Ripetere i trattamenti ad intervalli di 2/3 settimane.
Non applicare il prodotto su acini ancora bagnati a causa di pioggia, rugiada o irrigazione.
Il trattamento di **ROVRASULF** può essere fatto dopo un trattamento effettuato con altro prodotto purché le viti ed i grappoli siano asciutti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per la vite Sangiovese.

AVVERTENZA

Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali e del Captano.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5719 **Ministero della Sanità del** 27.1.84

Peso netto kg.

2/83

5720

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

BENTHANE 5 - 60

Polvere bagnabile
Fungicida organico per la lotta contro la Ticchiolatura del Melo e del Pero e contro altre malattie della Vite, del Garofano e della Rosa

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 5 di Benomyl puro
gr. 60 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamante con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5720 **del Ministero della Sanità del** 27.1.84
3/82

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico formato da due principi attivi (Benomyl + Mancozeb) in proporzioni ben definite, per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee.

Grazie all'azione sistemica del Benomyl, unita all'azione di contatto del Mancozeb il prodotto può impiegarsi a cadenza fissa, indipendentemente dall'andamento stagionale, dal primo all'ultimo trattamento contro la Ticchiolatura.

Il prodotto combatte inoltre altre malattie delle colture sottoindicate.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Melo e Pero - Contro Ticchiolatura gr. 200/hl. — Iniziare i trattamenti appena prima dell'apertura delle gemme e ripeterli a cadenza fissa di 8 giorni nel periodo prefiorale, e di 12 giorni nel periodo post-fiorale.

Vite: contro Peronospora, gr. 300/hl.; esplica inoltre una qualche azione di contenimento su Botrytis.

Rosa in pieno campo: contro Ruggine, Peronospora e Ticchiolatura, gr. 300/hl.
Garofano in pieno campo: contro Ruggine, Alternariosi, Eterosporiosi e Septoria gr. 300/hl.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Compatibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Varietà di pere sensibili al **MANCOZEB:** Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5728

RAME SANDOZ

Anticrittogamico, a base di ossidulo di rame, contenente il 50% di rame metallo

Composizione

gr. 50 di rame metallo (sotto forma di ossidulo di rame)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali

- *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;*
- *non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;*
- *dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Settori d'impiego

Agrumi contro mal secco e l'allupatura.
Drupacee contro corineo, bolla e cancri rameali
Vite contro peronospora.
Olivo contro occhio di pavone, lebbra e fumaggine.
Patata contro peronospora.

Dosi di impiego

- In trattamenti « al verde »
  0,3-0,4‰ di RAME SANDOZ (gr 300-400 di RAME SANDOZ per litri 100 di acqua), ripetendo gli interventi tutte le volte che la biologia dei parassiti e l'andamento stagionale lo impongono
- In trattamenti invernali
  0,8-1‰ di RAME SANDOZ (gr 800-1000 di RAME SANDOZ per litri 100 di acqua) contro Corineo delle drupacee, Bolla del pesco, eseguendo gli interventi, come norma generale, alla caduta delle foglie e al termine dell'inverno, prima dell'apertura delle gemme

Preparazione della poltiglia

Versare lentamente il quantitativo necessario di RAME SANDOZ in molta acqua, mescolando energicamente; diluire poi fino al volume previsto oppure versare lentamente il RAME SANDOZ nel serbatoio della pompa a motore munita di agitatore, mentre si sta riempiendo di acqua il serbatoio stesso, tenendo l'agitatore in moto

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari SANDOZ (esclusi EUFITANA ESTIVA e TIOTOX « 50 ») ed in genere con tutti gli antiparassitari normalmente consigliati per le colture sulle quali viene utilizzato lo stesso RAME SANDOZ

Per la preparazione di poltiglie miste con OLIO BIANCO SANDOZ oppure con FLAVINA SANDOZ, è bene approntare prima l'emulsione dell'olio prescelto in molta acqua e poi raggiungere la poltiglia concentrata di RAME SANDOZ completando con acqua fino alla concentrazione prevista e mescolando energicamente. Per la preparazione di poltiglie miste con altri prodotti, non oleosi, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di RAME SANDOZ già pronta per l'uso, agitando sempre a fondo

AVVERTENZA in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità

Non si deve trattare durante la fioritura
Su pesco e susino il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa

Rischi di nocività

E' tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO
Dipartimento Agro
Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 5728 del 2-2-1984 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg. 1**

TILT® 10 EC

Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione per la difesa di malattie dei cereali, della vite, del pesco, dell'albicocco, del susino, del ciliegio, del carciofo, della bietola da zucchero, del peperone, della rosa.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
10,64 g propiconazolo puro (rapporto isomerico cis/trans 1,42)
q.b. a 100 g coformulanti (contiene xilolo) e glicole-etilenico monoetiletere)

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Sintomi di intossicazione:
Non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo.
Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: esoftalmo, posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato.

Terapia:
Sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 5748 del 27.1.84
® marchio registrato

TILT 10 EC è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto.
TILT 10 EC viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti.
TILT 10 EC possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.
TILT 10 EC è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

Modalità e dosi d'impiego
CEREALI (frumento, orzo, segale e avena)
TILT 10 EC è particolarmente efficace contro le seguenti malattie: oidio (= Erysiphe spp.), ruggini (= Puccinia spp.), Septoria spp., rincosporiosi (Rhynchosporium spp.), Helminthosporium (= Drechslera) teres e sativum. È inoltre dotato di buona attività contro Cercosporella, Fusarium spp..
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole.
Per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni rispettivamente alla levata e in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi, può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.

Dosi: 1,2 lt/ha in 300-500 litri di acqua. In caso di forti infezioni di oidio in atto la dose può essere opportunamente elevata fino a 1,5 lt/ha.
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego su cereali, avendo l'avvertenza di versare il TILT 10 EC nella botte riempita a metà e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e completando successivamente il riempimento.

BIETOLA DA ZUCCHERO
Contro la Cercospora, si consigliano da due a quattro trattamenti alla dose di 2-2,5 lt/ha a seconda delle condizioni ambientali e metereologiche. Eseguire comunque il primo trattamento alla comparsa dei primi sintomi della malattia, distanziando i trattamenti successivi ogni 14-16 giorni. Agendo in tal modo risulta completamente controllato anche l'oidio (=Erysiphe betae).

CARCIOFO
Contro oidio: 0,5 lt/ha di prodotto
Iniziare i trattamenti alla comparsa delle primissime infezioni e ripeterli ogni 12-14 giorni.

ROSA contro Oidio
25-30 cc/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con TILT 10 EC possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.

VITE contro Oidio
Per ottenere una completa protezione della coltura si consiglia di praticare il seguente calendario di interventi:
pre-fioritura: per trattamenti distanziati di due settimane: 20 cc/hl
post-fioritura: per trattamenti distanziati di due settimane: 40 cc/hl
In caso di trattamenti settimanali dimezzare le dosi.

DRUPACEE
Pesco: contro Oidio
I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura, alla dose di 40-50 cc/hl.
Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto ed all'andamento metereologico.
Contro Bolla
Per i trattamenti al « bruno » cioè alla caduta delle foglie in autunno e a fine gennaio-febbraio, si impiegano 80-100 cc/hl di TILT 10 EC.
Ai bottoni rosa delle colture e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di 50-60 cc/hl.

Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino
Contro Monilia: Per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre e post-fioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro il marciume dei frutti trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi: 60 cc/hl.

TAPPETI ERBOSI
TILT 10 EC è molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da Sclerotinia homoeocarpa (= Dollar spot), Helminthosporium spp., oidio, ruggini.
La dose d'impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratiche di mantenimento adottate.
Orientativamente si consiglia di utilizzare da 40 a 100 cc di prodotto per 100 mq, pari a 4-10 lt/ha bagnando abbondantemente la vegetazione, con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.

PEPERONE contro Oidio
In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione: 25-30 cc/hl con trattamenti ogni due settimane.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di: drupacee, carciofo, vite; 28 giorni prima della raccolta dei cereali e peperone; 21 giorni prima della raccolta della bietola da zucchero.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO It

5753

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite

Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 44 di Fosetyl alluminio puro
Gr. 26 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
L'ingestione provoca nausea conato di vomito sonnolenza, turbe nervose bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni:
Alcool, olii, grassi.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5753 **Ministero della Sanità del** 23.2.84
3/83

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi, [illegible].

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora:
Dose: gr. 300-350/hl.
Il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.
[illegible].

Escoriosi:
Dose gr. 300/hl.
Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di « gemma mossa » (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5755

FIRODAL® 25 EC

Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione per la difesa di malattie dei cereali, della vite, del pesco, dell'albicocco, del susino, del ciliegio, del carciofo, della bietola da zucchero, del peperone, della rosa.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
25,25 g propiconazolo puro (rapporto isomerico cis/trans 1,42)
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Sintomi di intossicazione:
Non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo.
Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: esoftalmo, posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato.

Terapia:
Sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Varese)

Officina di produzione: *SILIA, Aprilia (LT)*

Registrazione Ministero della Sanità
n. 5755 del 27-1-84
® marchio registrato

FIRODAL 25 EC è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto.
FIRODAL 25 EC viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto al dilavamenti.
FIRODAL 25 EC possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.
FIRODAL 25 EC è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

Modalità e dosi d'impiego

CEREALI (frumento, orzo, segale e avena)
FIRODAL 25 EC è particolarmente efficace contro le seguenti malattie: oidio (= Erysiphe spp.), ruggini (= Puccinia spp.), Septoria spp., rincosporiosi (Rhyncosporium spp.), Helminthosporium (= Drechslera) teres e sativum.
È inoltre dotato di buona attività contro Cercosporella, Fusarium spp.
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole.
Per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni rispettivamente alla levata ed in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.

Dosi: 0,5 lt/ha, in 300-500 litri di acqua. In caso di forti infezioni di oidio in atto la dose può essere opportunamente elevata fino a 0,6 lt/ha.
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego su cereali, avendo l'avvertenza di versare il FIRODAL 25 EC nella botte riempita a metà e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e completando successivamente il riempimento.

BIETOLA DA ZUCCHERO
Contro la Cercospora, si consigliano da due a quattro trattamenti alla dose di 0,8-1 lt/ha a seconda delle condizioni ambientali e metereologiche. Eseguire comunque il primo trattamento alla comparsa dei primi sintomi della malattia, distanziando i trattamenti successivi ogni 14-16 giorni. Agendo in tal modo risulta completamente controllato anche l'oidio (=Erysiphe betae).

CARCIOFO
Contro l'oidio: 0,2 lt/ha di prodotto.
Iniziare i trattamenti alla comparsa delle primissime infezioni e ripeterli ogni 12-14 giorni.

ROSA contro Oidio
10-15 cc/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con FIRODAL 25 EC possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.

VITE contro Oidio
Per ottenere una completa protezione della coltura si consiglia di praticare il seguente calendario di interventi:
pre-fioritura: per trattamenti distanziati di due settimane: 8 cc/hl
post-fioritura: per trattamenti distanziati di due settimane: 15 cc/hl
Nel caso di trattamenti settimanali dimezzare le dosi.

DRUPACEE
Pesco: contro Oidio
I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura, alla dose di 15-20 cc/hl. Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto ed all'andamento metereologico.
Contro Bolla
Per i trattamenti al « bruno » cioè alla caduta delle foglie in autunno e a fine gennaio-febbraio, si impiegano 30-40 cc/hl di FIRODAL 25 EC.
Ai bottoni rosa della coltura e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di 20-25 cc/hl.

Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino
Contro Monilia: Per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre o post-fioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro il marciume dei frutti trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi: 25 cc/hl.

TAPPETI ERBOSI
FIRODAL 25 EC è molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da Sclerotinia homoeocarpa (= Dollar spot), Helminthosporium spp., oidio, ruggini.
La dose d'impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratiche di mantenimento adottate.
Orientativamente si consiglia di utilizzare da 16 a 40 cc di prodotto per 100 mq, pari a 1,6-4 lt/ha bagnando abbondantemente la vegetazione, con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.

PEPERONE contro Oidio
In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione: 12-15 cc/hl con trattamenti ogni due settimane.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di: drupacee, carciofo, vite; 28 giorni prima della raccolta dei cereali e peperone; 21 giorni prima della raccolta della bietola da zucchero.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO It

5760

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Oltre alle consuete norme igieniche proteggere gli occhi quando si maneggia il prodotto concentrato o lo si applica in ambienti chiusi.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'OIDIUMSTOP' COMBI

Fungicida in polvere bagnabile ad azione diretta per la difesa di: melo, pesco, contro il mal bianco

COMPOSIZIONE

Bupirimate puro		g 4
Zolfo puro (esente da selenio)		g 50
Coadiuvanti e inerti	q. b. a	g 100

CLASSE IV

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
CIFO S.p.A. - S. GIORGIO DI PIANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 5760 del 23-2-1984
'OIDIUMSTOP': Marchio depositato ICI Solplant S.p.A.

'OIDIUMSTOP' COMBI è un fungicida specifico contro l'oidio formato da due noti principi attivi: il bupirimate e lo zolfo ad azione preventiva e curativa. Grazie al bupirimate si ottiene un'attività fumigante, translaminare con traslocazione del p. incipio attivo verso margini e apici fogliari; una volta assorbito dai tessuti vitali il bupirimate non può essere dilavato dalla pioggia.
Lo zolfo, inoltre, assicura un completamento dell'azione antioidica, aggiungendo l'effetto "cosmetico" sui frutti di melo facilmente soggetti alla rugginosità.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI
(riferite a 100 litri di acqua):
Melo : g 200-300
Pesco : g 250-500

Epoca di intervento
Melo : pre-fioritura (orecchiette di topo)
Pesco : inizio comparsa della malattia.
Successivamente ad intervalli di 7-10 giorni a seconda dell'andamento della malattia.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

È compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi impiegati in frutticoltura. Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali con Captano, con DDVP, con Binapacril, Diclofluanide.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELE: Black Ben Davis; Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman Red, Winesap.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.
Su pesco fare attenzione alle cultivar sensibili allo zolfo. In modo particolare si consiglia di non trattare le nettarine.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

57

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Fungicida per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee e Peronospora della patata, pomodoro e insalata
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 40 Captan puro
Gr. 10 Folpet puro
Gr. 5 Captafol puro
Coformulanti q.b. a 100

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.
- Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polveri nel maneggio dei prodotti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
Azione irritazione sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE E DOSI

Il DIFOCAP è un fungicida organico di contatto ad azione preventiva contro la Ticchiolatura del melo e del pero e contro la Peronospora della patata, del pomodoro e dell'insalata.
Grazie alle sue proprietà di ridistribuirsi, il prodotto offre una lunga protezione delle foglie e dei frutti.

Si impiega alla dose di gr. 200/hl. durante tutto il periodo dei trattamenti.
Il prodotto, impiegato in prossimità della raccolta delle pomacee, svolge un'azione favorevole alla conservazione della frutta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con:
Benlate, Karathane PB, Karathane LC, Rovral, Sofril, Azifene, Dafene, Fosfene, Kilval, Lannate, Lorzene, Metilon, Naftil, Parafene, Pirenyl, Spintox, Keltane MF, Zolone PB, Epargol.
Per ottenere la compatibilità con Zolone L, Sumifene e Ziticl è necessario aggiungere al Difocap il Bagnante adesivo Etaldyn.
Allo scopo si consigliano le seguenti modalità d'impiego:
1) stemperare in acqua il Difocap, indi versare nell'irroratrice già riempita per metà;
2) aggiungere Bagnante-Adesivo Etaldyn a gr. 50/hl.
3) aggiungere il prodotto da miscelare e portare a volume agitando.
- Evitare la miscela con zolfi sulla varietà di mele rosse.
- Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini e con gli olii.
- Evitare i trattamenti prima che siano trascorsi 20 giorni dall'applicazione degli olii.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious e gruppo Delicious rosse, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà), ed è da non usarsi su melo in genere dopo la fioritura perché può manifestare fitotossicità.
Può risultare fitotossico anche su alcune cultivar di pero quali Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna, per le quali si sconsiglia.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5792 del Ministero della Sanità del 1.3.84

7/83

5793

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

IPROSULF

Fungicida per la lotta simultanea contro Botrite e Oidio della Vite
Polvere secca
per trattamenti polverulenti

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 3 Iprodione puro
Gr. 90 Zolfo puro (esente da Selenio)
Inerte q.b. a 100

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

E' un fungicida costituito dalla miscela di due principi attivi (Iprodione e zolfo) al fine di combattere simultaneamente la Botrite e l'Oidio della Vite. Non ha alcun effetto sulla fermentazione dei mosti.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto va impiegato nella dose di kg 25/30 per ettaro distribuiti omogeneamente mediante solforatrice.
I trattamenti vanno iniziati prima della chiusura del grappolo in modo che il prodotto penetri nell'interno del grappolo stesso.
Ripetere i trattamenti ad intervalli di 2/3 settimane.
Non applicare il prodotto su acini ancora bagnati a causa di pioggia, rugiada o irrigazione
Il trattamento può essere fatto dopo un trattamento effettuato con altro prodotto purchè le viti ed i grappoli siano asciutti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide.
Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali e del Captano.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per la vite Cv. Sangiovese.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5793 del Ministero della Sanità del 1.3.1984

Peso netto kg.

6/83

5797

PHORATE 5G ANICAGRICOLTURA

INSETTICIDA GRANULARE AD AZIONE SISTEMICA PER TRATTAMENTI AL TERRENO.

COMPOSIZIONE:
g 100 di prodotto contengono:

– Phorate puro	g 4,5
– Inerti	q.b. a g 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevende o corsi d'acqua.**
- **Evitare di respirarne i vapori.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.**
- **Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**
- **Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva.)**
- **In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO - In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro rianimazione.
Iniezioni indovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg per gli adulti 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

Il **PHORATE 5G ANICAGRICOLTURA** è un formulato microgranulare efficace per contatto, asfissia ed ingestione contro parassiti ipogei e, per via sistemica, contro parassiti epigei delle colture.

Il **PHORATE 5G ANICAGRICOLTURA** è efficace contro i seguenti parassiti:
– insetti: elateridi, grillotalpa, punteruoli delle radici, maggiolino, atomaria, tipulidi, nottue, afidi, alticini, cassida, larve di ditteri, tripidi, aleurodidi;
– altri artropodi: miriapodi dei generi Scutigerella e Blaniulus, ragnetto rosso;
– nematodi: Meloidogyne e Pratylenchus.

La persistenza di azione del **PHORATE 5G ANICAGRICOLTURA** è di circa 50 giorni e, sopratutto per le colture erbacee, consente un regolare sviluppo della pianta nelle prime e più delicate fasi vegetative.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Nell'impiego a pieno campo il **PHORATE 5G ANICAGRICOLTURA** va distribuito alla dose di 40-60 Kg/ha. Nell'impiego localizzato, sulla fila, il **PHORATE 5G ANICAGRICOLTURA** può essere distribuito con apparecchi microgranulatori opportunamente tarati, in modo da assicurare la giusta e uniforme distribuzione unitamente al necessario incorporamento nel terreno.
Per tale distribuzione che, a seconda delle colture e delle attrezzature disponibili, può essere effettuata nei solchi di semina o ai lati delle file, sono consigliate le dosi seguenti:

	DOSE Kg/ha
Barbabietola da zucchero	10-12 alla semina
Mais, patata	18-22 alla semina
Tabacco	18-22 al trapianto
Ornamentali ed orticole (Cavoli, sedano, zucchine, solanecee, fagiolo, carote, pisello)	20-24 alla semina od al trapianto
Vivai di ornamentali	8-10 grammi per m^2

Onde esaltare la sistemicità del principio attivo, il **PHORATE 5G ANICAGRICOLTURA**, durante o subito dopo la distribuzione, va incorporato nello strato superficiale del terreno.
È sconsigliabile impiegare il **PHORATE 5G ANICAGRICOLTURA** in terreni eccessivamente alcalini. Nel caso di interventi in terreni ad elevato contenuto di sostanza organica (oltre il 30%) è necessario aumentare almeno di 1/3 le dosi consigliate.
COMPATIBILITÀ: Il **PHORATE 5G ANICAGRICOLTURA** è compatibile con la generalità degli antiparassitari secchi o granulari. In particolare può essere miscelato con i fungicidi in polvere usati per la disinfezione del terreno. La sua distribuzione può essere effettuata inoltre unitamente ai concimi granulari in coincidenza delle concimazioni.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il **PHORATE 5G ANICAGRICOLTURA** è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. È pertanto consigliabile applicarlo su terreno nudo in stagione di minore presenza della fauna utile (autunno o fine inverno).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di produzione SIAPA S.p.A.
Stabilimento di S. Vincenzo di Galliera (BO)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5797 del 23 Febbraio 1984

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

5799

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MANCOFOL

Fungicida in polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 45 Mancozeb* puro
Gr. 30 Folpet puro
Coformulanti q.b. a 100.

* Marchio registrato Rohm and Haas

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

l'ingestione provoca bruciori esofagei, nausea, conati di vomito, coliche addominali, diarrea, apatia, irritazione nervosa, aritmia, cianosi, collasso cardiocircolatorio. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, fotodermatosi, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua); il vomito e la lavanda gastrica sono controindicati se esistono lesioni gastroesofagee.
Inoltre digitale, purganti salini e cure sintomatiche.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
Per l'irritazione della cute e delle mucose, lavaggi, pomate oftalmiche e cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni:

alcool, olii, grassi.

CARATTERISTICHE

E' un fungicida ad azione preventiva indicato nella lotta contro la Peronospora, la Botrite e l'Escoriosi della Vite, ed altre malattie fungine del Pomodoro, Garofano e Rosa in pieno campo.

Possiede azione frenante sullo sviluppo degli Acari.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Viticoltura:

- **contro Peronospora, Botrite e Antracnosi** a gr. 250-300/hl. Trattare dall'inizio della vegetazione.
  E' particolarmente indicato durante il periodo florale.
- **contro l'Escoriosi** a gr. 250-300/hl.
- **Pomodoro** (solo fino alla prima fioritura): contro Peronospora, Alternariosi, Antracnosi, Septoriosi a gr. 250-300/hl.
- **Garofano e Rosa** (in pieno campo): contro Ruggine, Alternaria, Septoria, Vaiolo e Botrytis del garofano e Ruggine, Ticchiolatura, Peronospora e Botrytis della Rosa: gr. 250-300/hl.

Mettere la dose in poca acqua; mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ

E' miscibile con la gamma dei nostri prodotti. Non è compatibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olii bianchi.

Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.

• **Avvertenze:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti su tutte le colture 28 giorni prima del raccolto

Sulle uve da vino i trattamenti dovranno essere sospesi 40 giorni prima del raccolto, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5799 **del Ministero della Sanità del** 23.2.84

4/83

581(

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Polvere tipo Bordolese per la lotta contro la Peronospora della vite e contro altre malattie di colture diverse
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Rame metallico (sottoforma di solfato basico)
Coformulanti e coloranti q.b. a 100

Norme precauzionali

— conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il VITERAM è un fungicida rameico dotato di lunga persistenza di azione e resistenza al dilavamento, contro la Peronospora della Vite, Pomodoro, Patata, Cipolla e contro l'Occhio di pavone dell'Olivo.

INTERNAZIONALE B.P.D.
BIOCHIMICI, PESTICIDI, DISERBANTI S.r.l.
Sede legale: Via del Cardinale - L'AQUILA
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

DOSE E MODALITÀ D'IMPIEGO

kg. 1/hl. d'acqua ad intervalli di 8-12 giorni.
Sciogliere la dose in poca acqua, versare nell'irroratrice, e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con Sulfosol 80, Benlate, Karathane LC, Delfos M 20, Zolone Liquido 25, Zolone PB 25, Lannate PB 25, Tortrin.
Per quanto riguarda la miscela con Karathane WD oppure con Fitofos, onde ottenere la migliore compatibilità, è necessaria l'aggiunta del Bagnante Adesivo Liquido 2 seguendo queste modalità:
— stemperare in acqua il prodotto indi versare nell'irroratrice già riempita a metà;
— aggiungere Bagnante Adesivo Liquido 2 a gr. 30/hl;
— aggiungere il Karathane WD oppure il Fitofos e portare a volume agitando.
Per miscele con esteri fosforici (Fitofos, Delfos, Zolone) aumentare la loro dose del 20 per cento ed irrorare le miscele appena pronte.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5816 **del Ministero della Sanità del** 6-4-1984

Peso netto kg.

6/83

5820

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

R6 ERRESEI SISTEM DAC 51-16

Fungicida sistemico per la lotta contro
la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 51 di Fosetyl di alluminio puro
Gr. 16 di Clortalonil puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.

L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.

Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.

La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.

Il prodotto possiede anche azione complementare sull'Escoriosi.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

PERONOSPORA
Dose: gr. 250-300/hl.

Il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.

Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.

Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5820 **del Ministero della Sanità del** 27.3.84

6/83

58

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

R6 ERRESEI SISTEM DAC 44-8

Fungicida sistemico per la lotta contro
la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 44 di Fosetyl di alluminio puro
Gr. 8 di Clortalonil puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione complementare sull'Escoriosi.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

PERONOSPORA
Dose: gr. 250-300/hl.
Il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5821 **del Ministero della Sanità del** 27.3.84

Peso netto kg.

6/83

5822

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

R6 ERRESEI SISTEM DAC 44-16

Fungicida sistemico per la lotta contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 44 di Fosetyl di alluminio puro
Gr. 16 di Clortalonil puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32 68
STAB.TO: Paganica (AQ)

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.

L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.

Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.

La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.

Il prodotto possiede anche azione complementare sull'Escoriosi.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

PERONOSPORA

Dose: gr. 250-300/hl.

Il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.

Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.

Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5822 **del Ministero della Sanità del** 27.3.84

Peso netto kg.

6/83

KELT E 42

ACARICIDA POLIVALENTE

Composizione gr 100 di prodotto contengono: DICOFOL puro gr **42** - Solventi ed emulsionanti q.b. a gr **100** **CLASSE III** **ATTENZIONE: manipolare con prudenza**

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti, bevande, altre colture e corsi d'acqua. - Evitare di respirarne i vapori. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. **Sintomi d'intossicazione:** vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni. **Consigli terapeutici:** Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g. 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questo acaricida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro la ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico. **Controindicazioni:** la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: Il **KELT E 42** è un acaricida efficace contro i più importanti acari delle principali colture. Lasua azione si estende a molte specie di acari resistenti agli altri acaricidi. Agisce per contatto contro gli adulti e le neanidi. Risulta meno efficace contro le uova, ma grazie alla sua azione residua agisce profondamente contro le ninfe in via di formazione. Il **KELT E 42** è caratterizzato da una rapida azione abbattente e da una lunga attività residua (da 1 a 2 mesi). Il **KELT E 42** viene impiegato per la lotta contro le neanidi e gli adulti di Ragni rossi e gialli che infestano le piante da frutto quali: POMACEE - DRUPACEE - AGRUMI - VITE, le colture ortive quali: CARCIOFO - CUCURBITACEE - POMODORO - PEPERONE - PATATA - FINOCCHIO - BIETOLA - SEDANO - SPINACIO, le Colture Floreali in pieno campo o in serra e le Piante Ornamentali.
DOSE D'IMPIEGO: gr 100/125 per 100 litri d'acqua. Si consiglia di effettuare il trattamento all'inizio della Primavera alla schiusura della maggior parte delle uova invernali dei ragnetti rossi. Per controllare gli attacchi durante l'estate, iniziare i trattamenti appena compaiono gli adulti. Nel caso di forte infestazione e con la presenza di numerose uova, effettuare due trattamenti alla distanza di 10/14 giorni allo scopo di distruggere totalmente anche gli adulti nati successivamente. Con i due trattamenti a breve distanza le piante rimarranno immuni per molto tempo. I migliori risultati si ottengono irrorando abbondantemente le piante in modo da ottenere una completa copertura. In caso di foglie difficilmente bagnabili, aggiungere gr 50 di bagnante TENSIOQUAT.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Nei trattamenti primaverili-estivi il **KELT E 42** si può mescolare con un acaricida-ovicida. Il **KELT E 42**, inoltre, è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Si sconsiglia l'impiego del **KELT E 42** sulle melanzane perché fitotossico.
RISCHI DI NOCIVITA': E' tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA, NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. N. 5834 del 27-3-1984 del Ministero della Sanità.

BIMEX S. p. A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.89 - 55.81.99

officina di produzione: TERRANALISI s.a.c.
RENAZZO DI CENTO (FE)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

5841

ERBITANTCA

DISERBANTE TOTALE SPECIFICO CONTRO LE GRAMINACEE E LE PIANTE ACQUATICHE

Composizione gr 100 di prodotto contengono: — TCA Sodium puro gr **95** - — Coformulanti q.b. a gr **100** **CLASSE IV**

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande, o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Durante la manipolazione e l'impiego del prodotto si dovranno indossare abiti ed occhiali protettivi ed, eventualmente, respiratori (o semimaschere).
AVVERTENZA: Consultare un Centro Anti-veleni.
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: L'ERBITANTCA è un erbicida ad azione specifica sulle graminacee annuali e poliennali, comprese le Gramigna ed il Giavone. E' particolarmente indicato per il diserbo di aree incolte, diserbo acquatico, diserbo di superfici destinate alla coltivazione di patate, medica, bietola e per il diserbo di terreni coltivati a frutteti e vigneti. Agisce sulle infestanti annuali quali: Riso selvatico, Avene Selvatiche, Giavone, Digitaria, Setaria, Loglio, Poa; e sulle infestanti perenni come Gramiglia e Cannuccia.

L'**ERBITANTCA** viene impiegato alle seguenti dosi: **VIGNETI** e **FRUTTETI:** Contro infestanti graminacee annuali e perenni, prima della messa a dimora: kg 30-50 per ettaro in 800-1000 litri d'acqua. Impiegare la dose maggiore in terreni pesanti e la minore in terreni leggeri. **RISO:** Contro Lursia Oryzoide e l'Alopecurus geniculatus effettuando il trattamento in autunno-inverno, dopo la raccolta del riso kg 25-30 per ettaro in 800-1000 litri d'acqua. **BARBABIETOLA:** Contro graminacee annuali e perenni, in pre-semina o pre-emergenza della coltura: kg 7-10 per ettaro in 400-800 litri d'acqua. **MEDICA:** Contro graminacee annuali e perenni, in autunno-inverno su medicai di vecchio impianto: kg 7-10 per ettaro in 400-800 litri di acqua. **CANALI:** Contro Canna Palustre in autunno alla emissione delle pannocchie dopo avere portato l'acqua a basso livello: kg 200-300 per ettaro diluiti in 2000-3000 litri d'acqua; contro Giunchi e Carici intervenire su terreno umido e senz'acqua. **TERRENI INCOLTI:** Contro graminacee annuali e perenni dopo l'emergenza delle infestanti nelle fasi iniziali di sviluppo: kg 200 per ettaro diluiti in 800-1000 litri d'acqua.
I trattamenti vanno eseguiti su terreni umidi, in caso di siccità si consiglia di effettuare una irrigazione dopo il trattamento per permettere al prodotto di esplicare la sua azione. Nei terreni trattati lasciar trascorrere almeno 6-8 settimane prima della semina o dei trapianti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

L'**ERBITANTCA** è miscibile con altri diserbanti specifici contro le infestanti a foglia larga (Pyrazon). **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': L'**ERBITANTCA** è fitotossico per le coluture in atto per cui bisogna tenersi ad una adeguata distanza da esse durante il trattamento. **Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta. ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.**

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. N. 5841 del 25 APR. 1984 del Ministero della Sanità.

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogollo, 5
TELEFONI N.: (0444) 03.81.03 - 03.81.03

officina di produzione bimex s.p.a. - via cogollo, 5 - isola vicentina (vi)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

584:

MANCOVAL 60

FUNGICIDA A BASE DI MANCOZEB PER LA CONCIA DELLE SEMENTI
Composizione gr 100 di prodotto contengono: MANCOZEB puro gr **60** - Coformulanti q.b. a gr **100** **CLASSE III** ATTENZIONE! **Manipolare con prudenza**

NATURA DEL RISCHIO:Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli' animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Consigli terapeutici: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Anti-veleni.
MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: Il **MANCOVAL 60** è un fungicida a base di Mancozeb per la concia a secco dei semi di Grano, Mais, Riso, Barbabietole da zucchero e colture orticole. Il **MANCOVAL 60** non altera il potere germinativo del seme anche in presenza di lesioni o dopo una permanenza proluigata in magazzino del seme trattato. Possiede un'ampio spettro di azione per cui è molto efficace contro la maggior parte dei funghi parassiti dei semi.
Il **MANCOVAL 60** si impiega alle seguenti dosi: **GRANO:** Contro Carie (Tilletia tritici); Fusariosi (Fusarium nival) e Carboni esterni: gr 200 per q.le di seme. - **MAIS:** Contro Carbone (Ustilago maydis), Elmintosporiosi (Helmintosporium maydis) e le contaminazioni esterne di Fusarium moniliformi e da Gibberella zeae: gr 300 per q.le di seme. **RISO:** Contro Brusone (Piricularia oryzae), Elmintosporiosi (Helmintosporium aryzae) e le contaminazioni esterne da Fusarium sp: gr 350-400 per q.le di seme. - **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** Contro Mal del piede (Phoma betae), Fusariosi (Fusarium sp.), Mal Vinato (Rhizoctonia solani) e Cercosporiosi (Cercospora beticola): gr 800 per q.le di glomeruli. - **COLTURE ORTICOLE:** Contro le contaminazioni esterne da Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Pythium sp.: gr. 300-800 per q.le di seme in funzione del tipo di seme. Per assicurare una buona azione azione fungicida la concia deve essere eseguita in modo da miscelare intimamente ed uniformemente il **MANCOVAL 60** con i semi da trattare.
Per conciare piccole quantità di seme spargere la quantità di prodotto necessaria sul mucchio di semi posti su di un telo o un pavimento liscio, rimescolando la massa con una pala fino a miscelazione uniforme. Altro sistema comodo è quello di riempire un sacco per tre quarti della sua capacità di semi e **MANCOVAL 60**, capovolgendo ripetutamente fino a miscelazione uniforme. Per la concia di elevate quantità di seme è necessario servirsi di attrezzature specifiche (per es. un cilindro rotante).
COMPATIBILITA': Il **MANCOVAL 60** è compatibile con gli insetticidi impiegati per la concia del seme o per la disinfestazione del terreno.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. N. 5842 del .... del Ministero della Sanità.

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

Officina di produzione: bimex s.p.a. - via cogolla, 5 - isola vicentina (vi)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG.**

5847

SUVIT

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:
— Carbaril puro (esente da b-naftolo) . . . . . . gr. 47,5
— Coformulanti . . . . . q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
Conservare la confezione ben chiusa;
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto,
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento;
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti,
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone;
Evitare di respirare i vapori.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).
Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.
CARATTERISTICHE: il SUVIT è un insetticida che si impiega contro vari insetti che si evolvono sulle piante da frutto (pero, melo, pesco, susino), sulla vite, piante industriali (pioppo), agrumi, fiori e piante ornamentali in pieno campo.
Il SUVIT si impiega per il pesco contro la cydia, per il melo e pero contro carpocapsa, cacecia, ricamatrice ed eulia, per la vite contro tignola e tignoletta, per l'olivo contro tignola e cocciniglia mezzo grano di pepe, per gli agrumi contro tignola e cocciniglia mezzo grano di pepe, per la patata contro dorifora e cavolaia, per il garofano in pieno campo contro la bega, per il mais contro piralide e sesamia, per la bietola contro altica, cassida, mamestra e caradrina, per la foraggere contro fitonomo, misurino, apion ed altri fitofagi.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: il SUVIT si impiega alla dose di 150-200 gr/hl di acqua, elevabile a 250 gr/hl quando deve essere controllata la cydia del pesco. Le dosi indicate si riferiscono ai trattamenti a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere un adesivo bagnante. Sciogliere la giusta dose del prodotto in poca acqua ed aggiungere la rimanente quantità fino ad ottenere la concentrazione prevista.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': il SUVIT è compatibile con la generalità dei fitofarmaci di più comune impiego ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': l'impiego del SUVIT è nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci ed insetti utili. Non trattare durante la fioritura.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

field farm s.r.l.
Via S. Pietro, 2 66010 TOLLO (Chieti)
Officina di produzione: SARIAF S.P.A.
Via S.Silvestro, 1 - 48018 FAENZA (RA)

Registrazione N. 5847 del 25/04/1984 del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO KG.**

585

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di Fosetyl alluminio puro
gr. 25 di Folpet puro
Adiuvanti e coloranti q.b. a 100

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione.
Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia.
Lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche che unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 5851 **del Ministero della Sanità del** 24.5.84

3/82

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

VITICOLTURA
Contro Peronospora. Il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.
Dose: gr. 250-300/hl.

Contro Escoriosi. Dose gr. 300/hl. — effettuare due trattamenti: il primo nella fase di « gemma mossa » (fase D del Baggiolini) e il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolta

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5861

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ATRILATE

Erbicida selettivo per il Mais
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 44,12 di Butylate puro
gr. 14,28 di Atrazina pura
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito.
Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

CONTROINDICAZIONI: *alcool, olii, grassi.*
Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto è un erbicida in polvere bagnabile per il diserbo del mais: agisce per assorbimento radicale.
L'associazione all'Atrazina del principio attivo Butylate, permette di ottenere un ampio spettro d'azione; con questo erbicida infatti vengono colpite le graminacee annuali resistenti all'Atrazina.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 5861 Ministero della Sanità del 6-4-1984
10/84

Spettro d'azione:

a) **Infestanti sensibili:** combatte le infestanti annuali monocotiledoni (Giavone, Poa) e dicotiledoni (Amaranto, Poligono persicaria e aviculare, Ortiche, Portulaca, Stellaria, Solanum nigrum, Gerani, Mercuriale, Veronica, Piantaggine, Matricarie).

b) **Infestanti medio-resistenti:** infestanti perenni ed apparato radicale profondo (Gramigna, Sorgo selvatico, Digitaria, Convolvolo).

Il prodotto possiede una persistenza d'azione abbastanza limitata nel terreno e questa sua caratteristica lo rende indicato sia per le colture di mais a ciclo normale, sia per il mais di secondo raccolto, a breve ciclo vegetativo, in quanto permette la semina autunnale del frumento.

Dosi: Kg. 7-8 per ettaro distribuiti con 6-8 hl. d'acqua.

Il trattamento va effettuato su terreno ben preparato e fresco, prima della semina, con incorporazione immediata (entro 2-3 ore) del prodotto nel terreno mediante fresatrice, erpice e dischi, oppure con passaggio incrociato con erpice a denti. Dopo la semina è bene effettuare una rullatura.

Per la preparazione della miscela, diluire il prodotto in poca acqua, mescolando fino ad ottenere una pasta omogenea; indi versare nella macchina e portare a volume agitando.

Non impiegare il prodotto su terreni molto ricchi di sostanza organica o torbosi.

Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la distribuzione o l'impiego del prodotto.

Se possibile impiegare una pompa adibita solo al diserbo.

AVVERTENZE: dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI •

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con altri erbicidi solo se espressamente consigliato.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare in medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In caso di varietà nuove e poco diffuse, si consiglia di eseguire saggi, preliminari.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture diverse da quelle indicate in etichetta. Evitare quindi che venga a contatto con colture vicine ai campi trattati.

AVVERTENZA

Avvertenze: Non impiegare il prodotto su terreni molto ricchi di sostanza organica o torbosi.

Se possibile, impiegare una pompa adibita solo al diserbo.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

58

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile
Fungicida organico per la lotta contro le malattie fogliari del frumento, per la concia del seme dei cereali, e contro la ruggine della rosa

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 10 Benomyl** puro
Gr. 64 Maneb puro
Coformulanti q.b. a 100

p.a. del BENLATE** marchio reg. E.I. Du Pont de Nemours e Co. (Inc.)

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Prescrizioni particolari

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida ad azione polivalente, studiato per combattere le malattie (mal del piede, fusariosi, septoriosi, alternariosi, rhincosporiosi, oidio e ruggine) che attaccano le parti aeree del frumento e per la concia del seme dei cereali.
Il prodotto è a base di due principi attivi:
- Benomyl: fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa;
- Maneb: fungicida di contatto ad azione preventiva.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

FRUMENTO
Contro le malattie che attaccano le parti aeree: effettuare due trattamenti alla dose di Kg. 2,5-3 per ettaro, distribuiti con 500 litri di acqua, nei seguenti stadi vegetativi della coltura:
1) all'inizio della levata;
2) alla comparsa della spiga.
Effettuare le irrorazioni con gocce molto piccole.
Per evitare perdite e formazione di frumento verde, si consiglia di prevedere passaggi per le ruote dell'apparecchio.
Ciò si potrà ottenere alla semina, chiudendo due tubi conduttori del seme, in corrispondenza delle ruote.
Tale operazione non diminuisce la produzione in quanto le file vicine accestiscono meglio e recuperano per «l'effetto di bordo».
CEREALI
Concia del seme: contro i germi di Carie, Carboni a contaminazione esterna, Elmintosporiosi e Fusariosi presenti nei semi; contro i marciumi (Cercosporella, Fusariosi, Ofiobolo, Rizoctonia) nelle prime fasi di sviluppo delle piante: mescolare gr. 200 di prodotto per ogni quintale di seme. Ciò si può fare a secco oppure ad umido. In questo caso, al momento della semina, inumidire leggermente il cereale da trattare e poi spargervi sopra il prodotto, rimescolando bene in modo da ottenere una uniforme distribuzione sulle cariossidi.
ROSA
Contro Ruggine, gr. 300/hl.

Da non applicare con mezzi aerei
L'impiego del prodotto è consentito solo in campo
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITÀ

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta del frumento

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 5863 del Ministero della Sanità del 6.4.84

6/83

5864

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

CIPOTRIL

Erbicida selettivo del frumento, contro infestanti dicotiledoni
Emulsione

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 24,77 di loxynil puro
Coformulanti quanto basta a 100.
Contiene Xilolo

Natura del rischio
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:

Casi lievi:
sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, faccia rossa.

Casi gravi:
sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea.

Casi molto gravi:
sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Primo soccorso: metere subito il paziente in stato di assoluto riposo in luogo fresco. Togliere ed isolare gli indumenti contaminati. Lavare pelle e capelli con acqua e sapone nel caso in cui siano stati a contatto con l'erbicida.
Se il paziente riesce a bere, somministrargli generosamente acqua o the, ma non latte. Per i pazienti in coma aggiungere flucosio al 5%. L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente (togliere gli indumenti, portare l'infortunato in luogo fresco, applicare compresse bagnate di alcool). Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato. Come sedativi si possono adoperare, a piccole dosi, la cloropromazina (25 mg) e la promazina (50 mg), ma tali farmaci possono provocare un aumento dell'ipertemia.
In caso di ingestione: lavanda gastrica con carbone attivo adsorbente, oppure con soluzione al 5% di bicarbonato di sodio. Purgare con solfato di sodio. Durante il trasporto in ospedale il paziente deve rimanere immobile e tranquillo (eventualmente con l'impiego dei sedativi già ricordati).
Si somministreranno liquidi per via parenterale e si praticherà respirazione artificiale. Ossigenoterapia.
In ospedale, in base alla determinazione degli elettroliti e ad altri controlli ematici, si potrà regolare esattamente il bilancio elettrolitico.
Alcune controindicazioni: morfina, atropina, barbiturici, purganti oleosi.

CARATTERISTICHE

Il **CIPOTRIL** è un erbicida selettivo del frumento, contro le infestanti dicotiledoni annuali.
Agisce per contatto.

Principali infestanti sensibili

— Fino allo stadio di sei foglie
Amaranthus retroflexus
Anagallis arvensis
Anhemis spp
Atriplex patula
Capsella bursa-pastoris
Galinsoga parviflora
Matricaria spp.
Mercurialis annua
Papaver rhoeas
Polygonum convolvulus
Polygonum persicaria
Portulaca oleracea
Raphanus raphanistrum
Senecio vulgaris
Sinapis arvensis
Solanum nigrum
Sonchus oleraceus
Stellaria media
Veronica spp

— Fino alla stadio di quattro foglie.
Fumaria officinalis
Galeopsis tetrahit
Lamium purpurem
Urtica urens

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento
Il prodotto va impiegato dalla fase di 2-3 foglie della coltura fino all'inizio della levata (2 nodi).
Al momento del trattamento la temperatura media dovrà essere superiore a 10 gradi e dovrà essere presente una buona luminosità.
Dosi: litri 1,8-2,5/ha. distribuiti con almeno 500 litri di acqua.
Preparazione della poltiglia:
Versare direttamente il prodotto nell'irroratrice in corso di riempimento

Non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con erbicidi specifici per la lotta contro le graminacee, previ saggi preliminari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulanti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Evitare di trattare su colture sofferenti per freddo, siccità, inondazioni, grandine ed attacchi di parassiti.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i tratamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Lt.

RAVIT S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.63

STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 5864 **del Ministero della Sanità del** 6.4.84
7/83

58

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

FOLMAN

Fungicida in polvere bagnabile

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono.
gr. 45 Mancozeb * puro
gr. 30 Folpet puro
Coformulanti q.b. a 100.

* Marchio reg. ROHM & HAAS Co.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: *l'ingestione provoca: bruciori esofagei, nausea, conati di vomito, coliche addominali, diarrea, apatia, irritazione nervosa, aritmia, cianosi, collasso cardiocircolatorio.*

Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, fotodermatosi, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia. *In caso di ingestione provocare il vomito; lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua); il vomito e la lavanda gastrica sono controindicati se esistono lesioni gastroesofagee. Inoltre, digitale, purganti salini, cure sintomatiche.*

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: *alcool, olii, grassi.*

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà. 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli. 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia. 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 5865 **Ministero della Sanità del** 24.5.84

E/2

CARATTERISTICHE

Il **FOLMAN** è un fungicida ad azione preventiva indicato nella lotta contro la Peronospora e l'Escoriosi della vite.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

VITICOLTURA:

contro Peronospora e Antracnosi: a gr. 250-300/hl. Trattare dall'inizio della vegetazione.

E' indicato durante il periodo florale.

Contro l'Escoriosi: a gr. 250-300/hl.

Pomodoro: (solo fino alla prima fioritura). **Garofano, Rosa:** contro Peronospora, Alternariosi, Antracnosi, Septoriosi, Ruggini, Ramulariosi, Eterosporiosi a gr. 250-300/hl. Mettere la dose in poca acqua; mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea. Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con la gamma dei nostri prodotti.
Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Devono trascorrere 20 giorni dall'applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti su tutte le colture 28 giorni prima del raccolto.
Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

5877

FALTEX

FUNGHICIDA IN POLVERE BAGNABILE
A BASE DI FOLPET

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:

— FOLPET puro	gr. 47,5
— Coadiuvanti e inerti q.b. a	gr. 100

CLASSE IV

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi di intossicazione.
Azione irritante sul tratto gastro intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il **FALTEX** si usa alle dosi di gr. 200-250 per ettolitro di acqua:
- Sulla VITE contro la Muffa grigia e la Peronospora.
- Sulla FRAGOLA contro la Muffa grigia e la Vaiolatura.
- Sul POMODORO e la PATATA contro la Peronospora e la Alternariosi.
- Sulle CUCURBITACEE (Cocomero, Melone, Cetriolo) contro Antracnosi e Marciume da Botrite.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il **FALTEX** è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego .
Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con Olii minerali e prodotti base di Zolfo.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili e i pesci.

INTERVALLO FRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI 10.

Avvertenza: Sulle Uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ».

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizzetti, 2/a - CENTO (Ferrara) - Tel. 90.62.07

Stabilimento di produzione: S.C.A.M. S.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena
Registrazione N. 5877 del 25-4-1984 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO Kg.**

5884

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE: Astenie di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

CONSIGLI TERAPEUTICI: Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

CONTROINDICAZIONI: È sconsigliata la digitale.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

FENORIS

Diserbante selettivo del riso

COMPOSIZIONE

– Diclorprop puro (sotto forma di estere butossietanolico)	g	7,0
– MCPA puro (sotto forma di estere isottilico)	g	19,2
– Emulsionanti, solventi	q.b.a g	100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

Officina di Produzione: SARIAF S.p.A.
Stabilimento di Faenza - Ravenna

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5884 del 25 Aprile 1984

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

CARATTERISTICHE

FENORIS è un diserbante selettivo ormonico efficace verso le più dannose malerbe non graminacee delle risaie (Scirpus mucronatus, Scirpus maritimus, Alisma plantago acquatica, Sagittaria sagittaefolia, Ciperus spp.). Il prodotto agisce sulle infestanti per assorbimento fogliare interferendo negativamente sulla differenziazione dei tessuti meristematici e sul metabolismo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FENORIS si impiega alla dose di 2-3 litri/ha. Il prodotto può venire distribuito in associazione con formulati a base di Propanil (STAM F-34); in tal caso la dose d'impiego è di 2 litri/ha di **FENORIS** + 2-3 l/ha di Propanil al 35%.

L'epoca del trattamento non differisce da quella in cui, di norma, vengono effettuati i trattamenti con gli erbicidi fenossiacetici, cioè dalla 5ª foglia fino all'inizio dell'accestimento oppure dalla fine dell'accestimento sino a fine levata.

Il trattamento deve essere effettuato mantenendo in risaia un sottile strato d'acqua (2-3 cm) che consenta alle malerbe di emergere onde essere colpite dal diserbante.

FENORIS può venir distribuito con qualsiasi tipo di pompa irroratrice. La quantità d'acqua non è determinante ma deve solo consentire una omogenea distribuzione del prodotto sulla superficie da trattare. Di norma sono sufficienti 300-500 litri/ha di acqua operando a bassa pressione (5-8 atmosfere).

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: FENORIS è compatibile con la generalità dei diserbanti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: FENORIS può danneggiare colture sensibili quali vite, alberi da frutto, ortaggi e colture floreali in genere adiacenti ai terreni da trattare. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Per effetto del trattamento, il riso, può subire, per alcuni giorni, una crisi di sviluppo temporanea.

RISCHI DI NOCIVITÀ: FENORIS è tossico per gli animali domestici, il bestiame, i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso impr[illegible] del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

5892

FERVINAL

Graminicida liquido emulsionabile di post-emergenza per il diserbo selettivo delle colture orticole ed industriali « non graminacee », delle colture floricole ed ornamentali e dei vivai di forestali.

Composizione su 100 g:

Setossidim * puro	g 20
Solventi e coadiuvanti	q.b. a 100

* Sostanza attiva prodotta dalla Nippon Soda Co., Tokio (Giappone)

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

SCHERING SpA

Divisione Agricoltura

20131 MILANO - Via Mancinelli, 7/11

Officina di Nova Milanese

Registrazione N. 5892 del 5-4-1984

del Ministero della Sanità

Caratteristiche del prodotto

Il FERVINAL è un erbicida che agisce, prevalentemente per via fogliare, sulle principali specie di graminacee annuali quali Alopecurus (Coda di topo), Avene selvatiche, Bromo, Falaridi, Logli, Digitaria, Setarie, Giavoni (Echinochloa, Panicum, dichotomiflorum, ecc.), Sorghetta da seme, con esclusione della Poa annua. Presenta inoltre una buona azione su alcune graminacee perennanti quali il Sorghum halepense (Sorghetta); è anche attivo sui ricacci di frumento ed orzo.
Il FERVINAL è selettivo nei riguardi delle seguenti colture, indipendentemente dal loro stadio di sviluppo: Barbabietola da zucchero, foraggio e ortaggio (bietola da foglia, da costa e rossa), Spinacio, Finocchio, Sedano, Prezzemolo, Carota, Fava, Favino, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Carciofo, Zucca, Cocomero, Cetriolo, Cipolla, Aglio, Porro, Patata, Pomodoro, Melanzana, Peperone, Tabacco, Ravanello, Colza, Fragola, Girasole, Soia, Cavoli, Insalate, Zucchino, Melone, Leguminose foraggere (medica e trifogli); è inoltre impiegabile per il diserbo di colture floricole ed ornamentali e vivai forestali.
L'azione del FERVINAL sulle graminacee si manifesta gradualmente con variazioni progressive di colore sino al completo disseccamento delle infestanti stesse: l'effetto finale viene raggiunto entro 1-3 settimane dal trattamento, in relazione alle condizioni climatiche. Prima di disseccare le infestanti arrestano il loro sviluppo e non risultano più competitive per la coltura.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il FERVINAL si impiega in post-emergenza delle infestanti che risultano sensibili in qualsiasi stadio di sviluppo. I migliori e più rapidi risultati si ottengono comunque intervenendo quando le graminacee si trovano nei primi stadi di sviluppo (2-3 foglie) in coincidenza dei quali sono sufficienti le dosi più ridotte di prodotto.
Le dosi indicate sono le seguenti:

— Infestanti a nascita autunno-vernina (Avene, Logli, Bromo, Falaridi, Alopecurus)	1-1,5 litri per ha
— Infestanti a nascita primaverile (Alopecurus, Logli, Avene)	1,2-2 litri per ha
— Infestanti a nascita più tardiva (Giavoni, Digitaria, Setarie, Sorghetta da seme e su ricacci di frumento e orzo)	1,5-2,5 litri per ha

Le dosi inferiori si riferiscono a infestanti a 2-3 foglie e comunque non ancora in fase di accestimento. Per ottenere un migliore effetto erbicida e soprattutto su infestanti perenni o su quelle annuali in avanzato stadio di sviluppo è consigliabile aggiungere nel diserbo della bietola, un comune olio bianco, reperibile in commercio alla dose di 1,5-2 kg/ha di prodotto formulato. Il FERVINAL è un graminicida specifico per controllare contemporaneamente anche le infestanti a foglia larga è necessario ricorrere alla associazione con un idoneo erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura che si intende diserbare. Ad esempio nel caso della bietola il FERVINAL sarà associato a Betanal e Tramat. Il FERVINAL può essere inoltre impiegato in successione a qualsiasi erbicida di pre o post-emergenza.
Questo prodotto deve essere distribuito in una quantità d'acqua tale da assicurare una buona bagnatura delle infestanti, ossia variante (300-600 l/ha) in relazione alla densità e allo sviluppo delle stesse.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il FERVINAL è praticamente compatibile con tutti gli antiparassitari comunemente impiegati e con olio bianco.

- **Avvertenza.** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta -.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
- Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso -
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato -
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali -

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO cc. 500

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

58

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Erbicida per la lotta contro le infestanti
Ciperacee ed Alismatacee del riso
Emulsione

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 14,4 di Triclopyr puro (come estere butossiglicolico).
gr. 6 di MCPA puro
gr. 24 di Propanile puro
Coformulanti quanto basta a 100
Contiene Xilolo e Cicloesanone

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni:
E' sconsigliata la digitale.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5895 **del Ministero della Sanità del** 6.4.84

2/84

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida per la lotta contro le infestanti Ciperacee ed Alismatacee del riso.

Infestanti sensibili:
Scirpus maritimus
Scirpus mucronatus
Alisma plantago
Butomus umbellatus (parte epigea)

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Il prodotto s'impiega alla dose di litri 4,5 per ettaro, distribuiti con 400-500 litri d'acqua.
L'applicazione può essere effettuata in due momenti:
1) in post-emergenza del riso, prima dell'accestimento, su risaia non in asciutta, ma con livello dell'acqua di cm. 0,5-1 (in modo che il terreno sia ricoperto d'acqua e le infestanti siano emerse al momento del trattamento);
2) dopo d'accestimento, o meglio alla sua conclusione, circa 50-55 giorni dopo la semina, molto prima della fase di botticella, su infestanti emerse ed in attiva crescita.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non deve essere usato in miscele con ferltilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima e dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi più elevate ed in particolari condizioni può indurre una lieve fitotossicità iniziale che scompare dopo pochi giorni.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Trattare in giornate senza vento in modo che la soluzione nebulizzata non raggiunga colture sensibili (viti, bietole, ecc.).

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto litri

5899

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CORBEL RAVIT

Fungicida per la lotta contro l'oidio e le ruggini di frumento, orzo e cereali minori
Emulsione

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 79,5 di Fenpropimorph puro
Coformulanti quanto basta a 100
Contiene Cicloesanone

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto è un fungicida ad azione preventiva e curativa contro l'oidio e le ruggini del frumento e dei cereali minori (orzo,segale, avena).
Ha azione sistemica ed è dotato di elevata efficacia e di lunga persistenza (alcune settimane). Esplica inoltre azione eradicante su lievi infezioni già in atto al momento del trattamento.

APPLICAZIONI E DOSI

Dose d'impiego:
litri 1 per ettaro distribuiti con almeno 500 litri d'acqua.
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ed eventualmente ripetere il trattamento alla riapparizione dell'infezione.
Normalmente le epoche d'intervento coincidono con gli stadi di « fine accestimento » e « comparsa della spiga », comunque prima dell'inizio della fioritura.
Se si effettua un solo trattamento, intervenire prima dell'inizio della fioritura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con Zolone 25 liquido, Metilon e Sumifene.

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 35 gg. prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Lt.

Reg. n. 5899 **del Ministero della Sanità del** 6-4-84

2/84

5963

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Polvere bagnabile
Fungicida organico per la lotta contro le malattie fogliari del frumento, per la concia del seme dei cereali, e contro la ruggine della rosa

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 10 Benomyl** puro
Gr. 64 Maneb puro
Coformulanti q.b. a 100

p.a. del BENLATE** marchio reg. E.I. Du Pont de Nemours e Co. (Inc.)

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Prescrizioni particolari

- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida ad azione polivalente, studiato per combattere le malattie (mal del piede, fusariosi, septoriosi, alternariosi, rhincosporiosi, oidio e ruggine) che attaccano le parti aeree del frumento e per la concia del seme dei cereali.

Il prodotto è a base di due principi attivi:
- Benomyl: fungicida sistemico ad azione preventiva e curativa;
- Maneb: fungicida di contatto ad azione preventiva.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

FRUMENTO
Contro le malattie che attaccano le parti aeree: effettuare due trattamenti alla dose di Kg. 2,5-3 per ettaro, distribuiti con 500 litri di acqua, nei seguenti stadi vegetativi della coltura:
1) all'inizio della levata;
2) alla comparsa della spiga.
Effettuare le irrorazioni con gocce molto piccole.
Per evitare perdite e formazione di frumento verde, si consiglia di prevedere passaggi per le ruote dell'apparecchio.
Ciò si potrà ottenere alla semina, chiudendo due tubi conduttori del seme, in corrispondenza delle ruote.
Tale operazione non diminuisce la produzione in quanto le file vicine accestiscono meglio e recuperano per «l'effetto di bordo».

CEREALI
Concia del seme: contro i germi di Carie, Carboni a contaminazione esterna, Elmintosporiosi e Fusariosi presenti nei semi; contro i marciumi (Cercosporella, Fusariosi, Ofiobolo, Rizoctonia) nelle prime fasi di sviluppo delle piante: mescolare gr. 200 di prodotto per ogni quintale di seme. Ciò si può fare a secco oppure ad umido. In questo caso, al momento della semina, inumidire leggermente il cereale da trattare e poi spargervi sopra il prodotto, rimescolando bene in modo da ottenere una uniforme distribuzione sulle cariossidi.

ROSA
Contro Ruggine, gr. 300/hl.

Da non applicare con mezzi aerei
L'impiego del prodotto è consentito solo in campo
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITÀ

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta del frumento

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 5863 **del Ministero della Sanità del** 6.4.84

6/83

5964

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

Insetticida polivalente
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 25 di Diflubenzuron puro
Coformulanti q.b. a 100

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

È un insetticida per la lotta contro i parassiti di seguito riportati.
Agisce inibendo la formazione della chitina.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5964...... **del Ministero della Sanità del** 27.6.84

6/83

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Frutticoltura (Melo e Pero):
— Contro Cemiostoma e Litocollete a gr 50-60/hl.
Il trattamento va effettuato sulle uova (durante la fase di volo degli adulti in corrispondenza della ovodeposizione) contro la prima generazione (in fase di caduta dei petali) e contro la seconda generazione (prima quindicina di giugno).
— Contro Carpocapsa, Capua, Archips, Orgia, Psilla del pero a gr. 80/hl. Trattare durante la ovodeposizione e in prossimità della schiusura.

Piante forestali:
— Contro Taumatopea pizlocampa, Limantria dispar, Riaclonia buoliana, Pristifora abietina a gr 50-70/ha durante la ovodeposizione o in prossimità della schiusura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poc'acqua indi versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con formulati in emulsione ed in polvere bagnabile. Si consiglia di dare la preferenza alle miscele con polveri bagnabili.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5966

IV CLASSE TOSSICOLOGIA

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora e l'Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di Fosetyl Alluminio puro
gr. 25 di Folpet puro
Coformulanti q.b. a 100

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua, e digitale.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Peronospora:
Il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.
Dose: gr. 250-300/hl.
Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame.
Escoriosi:
Dose gr. 300/hl. - effettuare due trattamenti: il primo nella fase di « gemma mossa » (fase D del Baggiolini) e il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso del trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5966..... **del Ministero della Sanità del** ..27.-6.-84

Peso netto kg.

4/83

5968

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

R6 ERRESEI SB 30/M-12

Polvere bagnabile
Fungicida Cupro-organico per impieghi in viticoltura, su pomodoro, garofano e rosa

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 29,7 Rame puro (sottoforma di Ossicloruro Tetraramico)
Gr. 12 Mancozeb puro
Complesso ad azione biologica, adiuvanti e coloranti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad ottenere una poltiglia semiliquida e portare a volume con acqua corrente.
— Peronospora della vite: 350-400 gr. per hl. d'acqua.
— Peronospora ed Alternaria del pomodoro, solo fino alla prima fioritura: 350-400 gr. per hl. d'acqua.
— Malattie crittogamiche delle rose e del garofano in pieno campo: 400 gr. hl. d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con Sofril per la lotta contemporanea contro l'Oidio e la Peronospora e può essere miscelato con Kelthane, Zitiol, Parafene, Metilon, Fosfene, per la lotta contro Acari, Tignole, Sigario, Zigene.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.
Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.66
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 5968 **del Ministero della Sanità del** 27.6.84

4/83

599

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

TRIOCORD 5

Insetticida, piretroide di sintesi, sotto forma di concentrato emulsionabile, ad elevata efficacia biologica, a rapida azione di contatto e di ingestione, con effetto prolungato. TRIOCORD 5 associa all'azione diretta un'azione repellente verso forme resistenti ai comuni insetticidi fosforganici e carbammati.

COMPOSIZIONE

— p.a.:
cipermetrina, puro . . . . g 5,0
— coadiuvanti e solventi . q.b. a g 100,0

CONTIENE XILOLO

TRIOCORD è un marchio Shell.

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Evitare di respirarne i vapori;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es.: interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva);
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione e per contatto.

Sintomi di intossicazione (desunti da animali di laboratorio a rapido recupero).
Sedazione, atassia, andatura irregolare, deambulazione irrequieta con tremori occasionali e convulsioni.

Consigli terapeutici:
In caso di contaminazione cutanea: togliere immediatamente gli abiti contaminati e lavare abbondantemente la pelle contaminata con acqua e sapone. Trattamento sintomatico.
In caso di contaminazione oculare: subito lavare abbondantemente con acqua gli occhi per almeno quindici minuti.
In caso di ingestione: provocare il vomito o procedere, con debita cautela, a lavanda gastrica; se il paziente è incosciente dopo averlo intubato. Somministrare sedativi del sistema nervoso centrale e anticonvulsivanti, preferibilmente Diazepam, per via iniettiva se si manifestano convulsioni. Sostenere opportunamente la respirazione, controllando ed aiutando le funzioni cardiovascolari e renali.
Nel casi gravi o sospetti gravi, ricovero a un Centro di rianimazione e consultare comunque un Centro Antiveleni.

Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO - Telefono 02/3885

Stabilimento:

Registrazione Ministero della Sanità N. 2491 in data 21.6.84

MODALITA' DI IMPIEGO

Il modo specifico di azione per contatto e ingestione prevede che le irrorazioni siano effettuate con cura per bagnare bene le parti vegetative della coltura infestata.
Applicare l'insetticida all'inizio delle infestazioni per sfruttarne anche l'azione repellente.

Dosi d'impiego

Coltura	Parassiti combattuti	Dosi	Note
A) cc/100 Litri d'acqua			
Pesco	Afide verde (Myzus persicae)	50	eventualmente con kg 2 di olio bianco (FOLIOL) in trattamenti di fine inverno allo stadio dei bottoni rosa;
		100	in trattamenti primaverili/estivi, (non applicare quando le foglie sono accartocciate)
	Mosca della frutta (Ceratitis capitata)	100	
	Tignole (Anarsia lineatella e Grapholita molesta)	100	
	Tripidi (Thrips spp.)	150 100	stadio bottoni rosa post fioritura
	Ricamatrici (Pandemis heperana)	100-150	
Pero	Psilla (Psylla piri)	150-200 300-400	trattamenti fine inverno inizio attacco primaverile estivo
Vite	Tignole (Lobesia botrana, Clysia ambiguella)	50-100	inizio attacco
Limone, Arancio	Afide brunastro (Toxoptera aurantii)	100	
	Afide verde chiaro (Aphis spirecola)	100	
	Afide verde scuro (Aphis gossypii)	100	
	Verme della Zagara (Prays citri)	150-200	
	Cocciniglie (Saissetia oleae, Ceroplastes rusci, Aonidiella aurantii)	50-100	(eventualmente con kg 1 di olio bianco FOLIOL)
	Mosca (Ceratitis capitata)	100	
Patata	Dorifora (Leptinotarsa decemlineata)	100-200	
	Afide verde (Myzus persicae)	200	trattare con foglie non accartocciate
	Nottue (Agrotis ssp.)	150	
Cipolla	Tripidi (Thrips ssp.)	150-200	
	Afidi (Myzus persicae e Aphis fabae)		
Cavolo	Cavolaia (Pieris brassicae)	100-150	
Garofano	Tripidi (Thrips ssp.)	200	
Pioppo	(Saperda charcarias, Cryptorrhynchus lapati)	300-400	
B) Litri/ha			
Frumento	Afidi	1,5-2	
Mais	Afidi	1,5-2	
	Nottue	1,5-2	
	Piralide	2-3	
Barbabietola da zucchero	Altica (Chaetocnema tibialis)	1,5-2	
	Lisso (Lyxus ssp.) e Cleono (Cleonus ssp.)	1-1,5	
	Cassida (Cassida nobilis, Cassida vittata)	1-1,5	

Le dosi inferiori sono sufficienti all'inizio delle infestazioni o in caso di attacchi meno gravi.

Modalità di applicazione
Diluire la quantità precisata di TRIOCORD 5 in poca acqua e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità d'acqua.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

FITOTOSSICITA' Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'
TRIOCORD 5 è compatibile con i normali antiparassitari usati per impieghi contro altri parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
TRIOCORD 5 è tossico per i pesci e gli insetti utili, in laboratorio.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
— pesco, pero, limoni, arancio, patata, cipolla, cavolo = 14 giorni
— barbabietola da zucchero = 21 giorni
— vite, frumento, mais = 28 giorni

«**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

«DA NON VENDERSI SFUSO»

Contenuto:

6029

Corvit Combi M

Fungicida in polvere bagnabile

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

— Mancozeb puro . . . . gr. 16

— Rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico) gr. 25

— Coformulanti . . . . . . q. b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
Conservare la confezione ben chiusa;
Non mangiare e non fumare durante l'impiego del prodotto,
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento;
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti,
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Evitare di respirare i vapori.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi di avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito.

Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure Sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: Il CORVIT COMBI M è una formulazione cupro-organica. Il CORVIT COMBI M risulta idoneo per la difesa della vite, pomacee e garofani in pieno campo, dalle infezioni di peronospora, ticchiolatura, alternaria, antracnosi, septoria, ruggine.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
Il CORVIT COMBI M si impiega alla dose di 300-450 gr/hl di acqua, intervenendo ogni volta che si manifesta il pericolo di infezione fungine. Tali dosi si intendono per i trattamenti a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Nella difesa della vite i trattamenti di "chiusura" vengono raccomandati alla dose massima.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

DIVIETO D'IMPIEGO:
— divieto d'impiego in serra;
— divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA': Il CORVIT COMBI M è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Il prodotto non può essere usato sulle seguenti varietà di pero sensibili: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia, Butirra Clargeau Passacrassana, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clap, Kaiser, Butirra Giffard, William; e di melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Rome, Beauty, Mogenduft, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

RISCHIO DI NOCIVITA': l'impiego del CORVIT COMBI M è tossico per i pesci. Il prodotto non va impiegato in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizioni essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

field farm s.r.l.
Via S. Pietro, 2 **66010 TOLLO (Chieti)**

Officina di produzione: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
Via S.Francesco, 3 - 48010 COTIGNOLA (RA)

Registrazione N. 6029 del 28/06/1984 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO KG.**

6116

IV CLASSE

FENZOL R

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA ORGANICO PER LA LOTTA ALL'OIDIO DEL MELO, DELLA VITE, DEL PESCO E PER IL CONTROLLO DELLA TICCHIOLATURA DEL MELO E DEL PERO

Registrazione Ministero Sanità n. 6116 del 15.1.1985
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Fenarimol puro	g 1,8
— Zolfo puro (esente da Selenio)	g 50
— Coformulanti	q.b. a g 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COLTURE DIFESE

Il FENZOL R combatte l'oidio del melo (Podosphaera leucotricha), della vite (Uncinula necator), del pesco (Sphaerotheca pannosa) e, impiegato in miscela con altri fungicidi dei quali migliora le possibilità degli interventi, controlla la ticchiolatura del melo (Venturia inaequalis) e del pero (Venturia pirina).

ISTRUZIONI PER L'USO

Modalità d'impiego: il prodotto si usa alle dosi sottoindicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità di acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Per l'impiego con irroratrici a basso volume la concentrazione va proporzionalmente aumentata in modo da mantenere costante la quantità di prodotto per ettaro.

Preparazione della miscela: versare la quantità richiesta di FENZOL R nella botte riempita a metà ed agitare bene durante il completamento del riempimento. Iniziare il trattamento entro 30 minuti dalla preparazione della miscela.

MELO (solo oidio)

Impiegare il FENZOL R alla dose di 150-200 g per 100 lt di acqua ad intervalli di 7-10 gg., iniziando i trattamenti alla fase delle orecchiette di topo ed attenendosi all'intervallo più breve quando maggiore è l'intensità dell'attacco.

MELO E PERO (Oidio e Ticchiolatura)

Impiegare il FENZOL R alla dose di 150-200 g per 100 lt di acqua in miscela estemporanea con GUANIDOL 65 alla dose di 50-60 g. o con CRITTOX MZ 60 a 250 g o CRITTOX MZ 80 a 200 g, sempre per 100 lt di acqua. In linea di massima applicare la miscela ad intervalli di 7-8 gg. dall'apertura delle gemme fino al frutto noce e dopo ad intervalli di 8-12 gg., in relazione all'andamento stagionale. Allo scopo di ottimizzare i risultati si raccomanda di scegliere il fungicida da aggiungere al FENZOL R tenendo presente i fattori ambientali in cui si opera ed in particolare in funzione alla varietà da difendere. La miscela con GUANIDOL 65 è suggerita nei casi di prolungata piovosità. La miscela con CRITTOX è per esempio indicata per frutteti misti.

VITE DA TAVOLA (Oidio)

Impiegare il FENZOL R alla dose di 100 g per 100 lt di acqua ad intervalli di 7-10 gg. Iniziando i trattamenti da quando i germogli sono lunghi 10 cm e continuando fino alla allegagione. Dopo l'allegagione aumentare la dose a 200 g per 100 lt di acqua mantenendo lo stesso intervallo degli interventi. Si raccomanda di impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi critici.

VITE DA VINO (Oidio)

Impiegare il FENZOL R ad intervalli di 7-15 gg. alla dose di 100 g per 100 lt di acqua da quando i germogli sono lunghi 10 cm fino alla allegagione ed alla dose di 150-200 g per 100 lt di acqua dall'allegagione in poi. La lotta antioidica può essere effettuata contemporaneamente a quella contro la peronospora miscelando il FENZOL R all'antiperonosporico ed avendo cura di aumentare la dose del FENZOL R dalla minima alla massima man mano che l'intervallo degli interventi antiperonosporici si allunga.

PESCO (Oidio)

Impiegare il FENZOL R alla dose di g 200 per 100 lt di acqua alla scamiciatura e 7 gg. dopo. Riprendere i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi della malattia attenendosi ad intervalli di 6-8 gg. Si raccomanda di impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve nei periodi critici, in particolare durante il primo accrescimento del frutto, in zone e su varietà molto soggette alla malattia.

COLTURE FLORICOLE IN PIENO CAMPO (Oidio) 100-200 g/Hl.

Iniziare i trattamenti al primo apparire della malattia e ripeterli secondo necessità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il FENZOL R è compatibile con i più comuni fungicidi quali sali rameici, Dodina, Mancozeb, Zineb, Ziram e Metiltiofanate (per le colture consentite) e con i più comuni insetticidi ed acaricidi. Comunque, poichè non sono state provate tutte le possibili combinazioni con i vari formulati commerciali si suggerisce di provare la compatibilità fisica di ciascuna miscela estemporanea preparandone una piccola quantità prima dell'impiego.
Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

FITOTOSSICITA'

Si rimanda alle etichette dei formulati associati per eventuali specifiche controindicazioni. Il FENZOL R può arrecare danno alle seguenti cultivar di **Melo:** Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap. **Pero:** Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio. **Vite:** Sangiovese.
Può inoltre essere fitotossico per le cucurbitacee.
Non effettuare trattamenti durante le ore più calde.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO IN MELE, 14 GIORNI SU UVA, PESCHE E PERE.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del tratamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (BO)

contenuto Kg. .

6150

Acromit F

Acaricida emulsionabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Propargite puro	g 35
Fenson puro	g 20
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.
Consigli terapeutici: intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
Controindicazioni: la morfina e l'alcool, e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.
***AVVERTENZA:** consultare un Centro Antiveleni.*

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 6150 del Ministero della Sanità del 15.1.85

CARATTERISTICHE
L'ACROMIT F è un acaricida specifico dotato di azione ovo-adulticida per contatto e per asfissia, a lunga persistenza, indicato per la lotta contro Acari rossi, gialli, rugginosi o bruni ed Eriofidi in frutticoltura (pomacee, drupacee), viticoltura, floricoltura (in pieno campo), agrumicoltura.

DOSI D'IMPIEGO
L'ACROMIT F si impiega alla dose di 150-200 g/hl.
Dopo il trattamento con oli lasciare trascorrere un mese prima di effettuare applicazioni con ACROMIT F.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio, esclusi quelli fortemente alcalini, che diminuiscono l'efficacia del Propargite.
Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non impiegare su pero, vite (in pre-fioritura), rosa, mele Golden Delicious e Jonathan in condizioni di elevata temperatura, perche fitotossico.
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG

615

CARBARYL 85

INSETTICIDA

CLASSE II

NOCIVO

Composizione:

CARBARYL (esente da B naftolo) puro gr. 85
Coformulanti . q.b. a gr. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile.

NATURA DEL RISCHIO: Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche. S'impiega su: melo e pero, vite, agrumi, olivo, patata, bietola, colture ornamentali e da fiore in pieno campo, **per la lotta contro:** carpocapsa, eulia, cacoecia ed altre tortrici, cidia, anarsia, tignole, dorifora, lepidotteri e coeotteri in genere.

Epoca d'impiego. Il prodotto si impiega alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo i trattamenti in funzione dell'infestazione e a seconda dell'andamento stagionale.

Dosi e modalità d'impiego. Alle dosi di g. 90-150 per ettolito d'acqua, il prodotto va distribuito in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

Preparazione della poltiglia. Il prodotto, nella quantità prestabilita, va stemperato a parte in poca acqua fino a formare una pasta omogenea che va versata nel totale quantitativo d'acqua, mescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, purché non alcalini. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto è fitotossico per la fragola.

Rischio a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per le api e gli altri insetti pronubi; per i pesci, gli animali domestici e il bestiame. Non impiegarlo durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale e in luogo asciutto e fresco.

Kg.

RAFFINERIE ALMAGIA' S.p.A. Legalmente Domiciliata presso curatore Avv. Dante De Angelis- Via Alberoni 24- Ravenna

Stabilimento produttore: Laboratori Chimici CIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 6151 del 15.1.1985

6155

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

Erbicida selettivo
per cereali, frumento tenero e duro,
orzo, segala, avena

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 30 di Ioxynil puro
Emulsionanti, solventi e bagnanti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. es.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
a) casi lievi: *sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, faccia rossa;*
b) casi gravi: *sudorazione e sete intensa, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea;*
c) casi molto gravi: *sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
primo soccorso: *mettere subito il paziente in stato di assoluto riposo in un luogo fresco. Togliere ed isolare gli indumenti contaminati. Lavare pelle e capelli con acqua e sapone nel caso in cui siano stati a contatto con l'erbicida.*
Se il paziente riesce a bere, somministrargli generosamente acqua o the, ma non latte. Per i pazienti in coma aggiungere glucosio al 5%. L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente (togliere gli indumenti, portare l'infortunato in un luogo fresco, applicare compresse bagnate di alcool).
Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato. Come sedativi si possono adoperare, a piccole dosi, la cloropromazina (25 mg.) e la promazina (50 mg.), ma tali farmaci possono provocare un aumento dell'ipertemia.

In caso di ingestione:
lavanda gastrica con carbone attivo adsorbente, oppure con soluzione, al 5% di bicarbonato di sodio. Durante il trasporto in ospedale il paziente deve rimanere immobile e tranquillo (eventualmente con l'impiego dei sedativi già ricordati). Si somministreranno liquidi per via parenterale e si praticherà respirazione artificiale. Ossigenoterapia. In ospedale, in base alla determinazione degli elettroliti e ad altri controlli ematici, si potrà regolare esattamente il bilancio elettrolitico.

Alcune controindicazioni:
morfina, atropina, barbiturici, purganti oleosi.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 6155 **del Ministero della Sanità del** 18.4.85

10/84

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

SENSIBILITA' DELLE MALERBE:
L'ACTRIL agisce in post-emergenza sulle giovani piantine di dicotiledoni annuali; esso penetra nelle malerbe e blocca la fotosintesi. Esso è attivo contro numerose malerbe: Capsella bursa pastoris, Papaver rhoeas, Ranunculus repens, Vicia sp., ed anche su avventizie resistenti agli ormonici, quali Matricaria sp., Fumaria officinalis, Lamium purpureum, Lithospermum arvense, Carastium arvense, Spergula arvensis, Stellaria media, ronica sp., come pure su Bifora a forte dose.

APPLICAZIONI

I cereali a semina autunnale o primaverile possono essere trattati dallo stadio della 2a-3a foglia a poco prima della fine della levata.
I risultati migliori si ottengono quando:
— la temperatura massima della giornata è superiore a 12° C.
— la luminosità è buona.
— in assenza di vento o di pioggia abbondante.

Caso di leguminose consociate a cereali: trascorsi due giorni dal trattamento con **ACTRIL** è possibile traseminare leguminose foraggere tra i cereali trattati. E' sconsigliabile invece l'intervento dopo la trasemina o la emergenza delle leguminose tra i cereali.

DOSI D'IMPIEGO

— da 1 a 1 1/2 litro/ettaro, cereali primaverili.
— da 1 1/2 a 2 litri/ettaro, cereali autunnali.
— in presenza di Bifora o crisantemo delle messi impiegare la dose massima 2 lt./ettaro).

Impiegare 500 litri (400-600) dacqua per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

L'ACTRIL si scioglie istantaneamente nell'acqua; agitare per qualche minuto onde rendere la soluzione omogenea.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti della nostra gamma.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Lt.

6157

METILPARATHION

INSETTICIDA

Composizione:
Metilparathion puro . . . gr. 16
Coformulanti . . . q.b. a gr. 100
« Contiene xilolo »

I CLASSE

VELENO

Attenzione: data l'elevata tossicità del formulato, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n. 1255

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti e maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: Insetticida fosforganico ad azione principalmente per contatto. Agisce inoltre per ingestione ed asfissia. **Combatte i seguenti parassiti:** cecidomie, tingidi, tentredini, afidi in genere, tignole, tripidi, acari, mosche, psille, cocciniglie, bega, carpocapsa, larve minatrici e ricamatrici, punteruolo, agrotidi, altiche, ed altre forme preimmaginali od adulte di insetti ad apparato boccale masticatore, pungente e succhiante.

Colture protette: orticoltura (melanzana, peperone, pomodoro, patata, ravanello, rapa, cavoli, zucca, zucchino, cetriolo, cocomero, melone, cardo, carciofo, indivia, cicoria, radicchio, lattuga, fava, pisello, cece, fagiolo, finocchio, sedano, carota, bietola da costa, fragola, spinacio, asparago, aglio, porro, cipolla), vite, olivo, frutticoltura (pompelmo, mandarancio, limone, arancio, chinotto, cedro, bergamotto, mandarino, pero, melo, ciliegio, albicocco, pesco, susino, mandorlo), barbabietola da zucchero, colture industriali di piante ornamentali e da fiore, pioppo.

Dosi d'impiego: il prodotto viene impiegato alla dose di 150-300 grammi ogni 100 litri d'acqua.

Modalità d'uso: versare l'insetticida nella quantità d'acqua consigliata e mescolare bene. L'applicazione dello stesso viene effettuata con pompe a volume normale.

Epoche d'applicazione: si consiglia l'impiego dell'insetticida alla comparsa dei primi parassiti ed ogni volta che si manifesta una reinfestazione degli stessi.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: è miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati si deve rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci, gli animali domestici, gli insetti utili ed il bestiame.

I trattamenti devono essere sospesi 20 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

RAFFINERIE AIMAGIA' S.p.A. Legalmente Domiciliata presso curatore Avv. Dante De Angelis- Via Alberoni 24- Ravenna

Stabilimento produttore: CIFA - CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6157 **del** 15.1.1985

6158

OSSICLORURO DI RAME

FUNGICIDA

Composizione:

Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) gr. ,50
Supporti, disperdenti . q.b. a gr. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: si impiega per la lotta contro: alternaria, antracnosi, bolla, cancri dei rami, cercospora, corineo, mal secco, marciumi radicali, occhio di pavone, peronospora, septoria, ticchiolatura, vaiolatura.

Epoca d'impiego: preventivamente od alla prima comparsa delle malattie, ripetendo le applicazioni a seconda dell'andamento stagionale e delle infezioni.

Dosi e modalità d'impiego: sulle **pomacee** gr. 800-1000 per 100 litri d'acqua nei trattamenti invernali e gr 300-400 nei trattamenti pre e post-fiorali; sulle **drupacee** gr. 1000-1200 nei trattamenti autunnali-invernali e gr. 250-300 nei trattamenti primaverili; sulle **colture ortive, ornamentali e floreali** in pieno campo, **vite,** gr. 400-600; su **agrumi ed olivo** gr 300-400 per ettolitro d'acqua; sulla **barbabietola** gr. 800-1000.

Il prodotto va distribuito in modo da coprire interamente ed uniformemente la vegetazione; si consiglia di aggiungere gr. 100 di Bagnante Agricolo ad ogni 100 litri di miscela.

Preparazione della poltiglia: il prodotto nella quantità prestabilita, va stemperato in poca acqua e versato nel totale, mescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di uso primaverile-estivo. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. **Varietà di melo cuprosensibili:** Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Johnathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana. **Varietà di pero cuprosensibili:** Abate Fêtel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Juliet Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Rischio a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere il trattamento 20 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Kg.

RAFFINERIE AIMAGIA' S.p.A. Legalmente Domiciliata presso curatore Avv. Dante De Angelis- Via Alberoni 24- Ravenna

Stabilimento produttore: LABORATORI CHIMICI CIFA Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 6158 **del** 15.1.1985

616:

BEZIN 80

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

— Zineb puro . . . . gr. 80
— Coformulanti . . . . . q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone - evitare di respirare i vapori.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore - in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta - durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.
In caso di ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

CARATTERISTICHE: Il BEZIN 80 si impiega per il controllo della ticchiolatura del melo e del pero, della peronospora della vite, del tabacco, del pomodoro solo fino alla prima fioritura e della ruggine del garofano in pieno campo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il BEZIN 80 si impiega alla dose di 200-250 gr/hl di acqua, elevabile a 300 gr/hl nel caso di infezioni particolarmente gravi.
Tali dosi si intendono per i trattamenti ad alto volume. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere, alla miscela, un adesivo bagnante. Il prodotto va diluito in acqua fino ad ottenere una densa crema, il resto dell'acqua si aggiunge successivamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO - Divieto d'impiego in serra - Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA': Il BEZIN 80 è compatibile con la generalità dei fitofarmaci di più comune impiego.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto è sconsigliabile su alcune varietà di pero sensibile allo Zineb come: Spadona, Coscia, Butirra, Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spandoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

EUROZOLFI S.p.A. - 14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - 95030 CATANIA - Tel. (095) 592014

Officina di prod.: **EUROZOLFI S.p.A.** - 14ª Strada - Zona Ind. - 95030 CATANIA

Registrazione n. 6165 del 31.1.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg.**

6167

LAVIS-P AZF

Insetticida per trattamenti polverulenti

per impiego in floricoltura in pieno campo o in serra

COMPOSIZIONE:

Malathion puro . . .	gr. 4
Eccipienti polverulenti q.b. a .	gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'antropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO:
Il LAVIS P AZF trova valido impiego contro gli insetti del terreno quali: formiche, larve di maggiolino, anomala, amphimalus, eleteridi, agrotidi e tutti gli altri insetti che infestano il terreno. Bisogna impolverare tutta la superficie uniformemente incorporandolo nel terreno mediante una leggera zappatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
Il prodotto per il suo particolare impiego va usato da solo.

RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto, è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE:
Da usarsi esclusivamente in colture floreali intensive su pieno campo o serra; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

AGROZOOFARMA s.r.l. - MORTEGLIANO (Ud)
Officina di produzione: AGROZOOFARMA - Mortegliano
Registrazione Ministero Sanità n. 6167 del 15.1.1985
DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto gr.

61

INSETTICIDA A BASE DI CARBARYL

COMPOSIZIONE

Carbaryl puro (esente da ß-Naftolo) . .	. . g 47,5
Disperdenti, supporti e coadiuvanti . .	q.b. a 100

Classe III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva) - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta - Evitare di respirare i vapori - Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).

Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenze: consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

È un insetticida sotto forma di polvere bagnabile. Si impiega su:

pomacee (melo, pero) contro carpocapsa, capua, cacoecia, eulia	g 125-150 per ettolitro d'acqua
drupacee (pesco, ciliegio) contro cidia e anarsia	g 200-250 per ettolitro d'acqua
patata contro cavolaia e dorifora	g 150-200 per ettolitro d'acqua
vite, ulivo e agrumi contro tignola	g 150-200 per ettolitro d'acqua
ulivo contro coccíniglia	g 150-200 per ettolitro d'acqua
garofano contro tortrice	g 150-200 per ettolitro d'acqua

Il FORCARB P.B. si applica alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo i trattamenti a seconda dell'andamento stagionale e delle infestazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con gli antiparassitari di impiego primaverile estivo purché non alcalini come polisolfuri, poltiglia bordolese, calce, ecc.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescitte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

— Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 7 giorni.

— **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

— Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DOTT. S.p.A.

Via Correggio, 45 - MILANO - Tel. 43.43.43

Off. di produz. DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)

Registr. Ministero della Sanità n. 6168 del 31.1.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto gr

6169

CASTRIX PELLETS

esche pellettate per la lotta contro il topo campagnolo

CLASSE I

VELENO

COMPOSIZIONE

g 100 di Castrix Pellets contengono:
g 0,5 di crimidina pura;
grano, eccipienti ed inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, schiacciandole e poi interrando in fosse profonde circa 1 metro. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per ingestione.

Sintomi d'intossicazione: nausea - sete - vomito - diarrea - contrazioni muscolari tonico croniche - irrequietezza - crampi.

Gli stati di eccitazione e i crampi sono interrotti da pause.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica immediata e somministrazione di purganti salini - carbone medicinale e trattamento sintomatico degli stati eccitativi e dei crampi (oscuramento della camera - riposo - barbiturici - eventualmente curarizzazione).

ISTRUZIONI PER L'USO

Dose d'impiego: 10 kg/ha.

Distribuire il prodotto il più uniformemente possibile. Effettuare i trattamenti preferibilmente in Primavera-Autunno, in giornate di sole, quando i topi escono più frequentemente dalle tane.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto deve essere distribuito da solo.

Nocività: il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Bayer AG-Leverkusen (Germ. Occ.)

Registrazione Ministero Sanità n. 6169 **del** 15.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg.

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

61

FORATE ALMAGIA'

GEODISINFESTANTE SISTEMICO

I CLASSE

VELENO

Composizione:

FORATE puro . . . . gr. 4,5
Supporti . . . . q.b. a gr. 100,0

Tipo di formulazione: granulare protetto

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 N. 1255

NATURA DEL RISCHIO: rischio d'intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento e non respirare i vapori nebulizzati e le polveri. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO:

Caratteristiche: s'impiega in trattamenti al terreno, **per la lotta contro gli insetti che attaccano le radici ed il colleto come:** agrotidi, atomarie, blaniuli, elateridi, grillotalpa, maggiolini, mosche e punteruoli delle radici, scutigerelle, tipule e nematodi ed inoltre contro i parassiti delle foglie e degli steli come: afidi, altiche, casside, mosche minatrici, ragno rosso e tripidi.

Epoche d'impiego: il prodotto va distribuito al momento delle semine e dei trapianti.

Dosi e modalità d'impiego: per la **geodisinfestazione totale** si usano kg. 40-60 per ettaro, mentre per la **distribuzione localizzata** sono consigliate le seguenti dosi: **barbabietola** kg. 10-12 per ettaro; **mais, patata, pomodoro e tabacco** kg. 18-22 per ettaro; **ornamentali ed orticole** (come carota, cavoli, fagiolo, melanzana, peperone, pisello, sedano, zucchino) kg. 20-24 per ettaro; **vivai di ornamentali** kg. 8-10 per ettaro. Il trattamento localizzato va eseguito nei solchi di semina o ai lati delle file con macchine (microgranulatori) tarate in modo da distribuire il prodotto in modo preciso ed uniforme incorporandolo nel terreno. In caso di terreni alcalini o ad alto contenuto di sostanze organiche, si può aumentare del 30% la dose suggerita.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: per le colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari in funzione delle specifiche microcondizioni ambientali.

Nocività a seguito del trattamento: è tossico verso insetti utili, bestiame, animali domestici e pesci. Non trattare durante la fioritura; non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente od accidentalmente, prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 60 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Kg.

RAFFINERIE ALMAGIA' S.p.A. Legalmente Domiciliata presso curatore Avv. Dante De Angelis- Via Alberoni 24- Ravenna

Stabilimento produttore: LABORATORI CHIMICI CIFA CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n. 6170 **del** 31.1.1985

6171

COMBIRAM

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

Composizione: Gr. 100 di prodotto contengono:

— Zineb puro		gr. 13
— Rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico)		gr. 30
Coformulanti e coloranti	q.b. a	gr. 100

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone - evitare di respirare i vapori.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umità e dal calore - in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta - durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (bocca e naso).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.
In caso di ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

TERAPIA: Nei casi ricovero urgengente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pamate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

CONTROINDICAZIONI: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: Il COMBIRAM è una formulazione cupro-organica.
Il COMBIRAM risulta idoneo per la difesa della vite, pomacee, garofani in pieno campo dalle infezioni di peronospora, ticchiolatura, alternaria, antracnosi, septoria, ruggine.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il COMBIRAM si impiega alla dose di 400-500 gr/hl di acqua, intervenendo ogni volta che si manifesta il pericolo di infezioni fungine. Tali dosi si intendono per trattamenti ad alto volume. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Nella difesa della vite i trattamenti di « chiusura » vengono raccomandati alla dose massima.
Per aumentare l'efficacia del trattamento aggiungere alla miscela un adesivo-bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare, fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO: divieto d'impiego in serra - divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA': Il COMBIRAM è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Il prodotto non può essere usato sulle seguenti varietà di pero sensibili (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser Butirra Giffard, William), e di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravestein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana).

RISCHIO DI NOCIVITA: Il COMBIRAM è tossico per i pesci. Il prodotto non va impiegato in fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

EUROZOLFI S.p.A. - 14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - 95030 CATANIA - Tel. (095) 592014

Officina di prod.: EUROZOLFI S.p.A. - 14ª Strada - Zona Ind. - 95030 CATANIA

Registrazione n. 6171 del Ministero della Sanità 31.1.85

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg.**

61

PLURAL PS

ANTICRITTOGAMICO-ANTIBOTRITICO IN POLVERE SECCA

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

— Folpet puro		gr. 4
— Rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico)		gr. 6
— Zolfo puro (esente da selenio)		gr. 50
— Coformulanti	q.b. a	gr. 100

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza.
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei per foto-sensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

TERAPIA: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua) e digitale.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Il PLURAL PS è un anticrittogamico combinato con azione contro la Botrytis cinerea (Muffa grigia) della vite, del pomodoro, della melanzana. In viticoltura consente di combattere la Botrytis della caliptra floreale, infezione che costituisce il maggior inoculo all'interno del grappolo e la causa principale degli attacchi massicci di muffa grigia all'inizio della maturazione.
Il PLURAL PS esplica una specifica azione antioidica per il suo contenuto di zolfo.
Il PLURAL PS si impiega alla dose di 30-40 Kg. per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il PLURAL PS non è miscibile con antiparassitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri) olii minerali, Captano, DDVP, Biapacryl, Diclofluanide.

AVVERTENZA: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA: non si deve trattare durante la fioritura.
Può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese.

NOCIVITA': è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni. Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

EUROZOLFI S.p.A. - 14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - 95030 CATANIA - Tel. (095) 592014

Officina di prod.: **EUROZOLFI S.p.A.** - 14ª Strada - Zona Ind. - 95030 CATANIA

Registrazione n. 6172 DEL 31.1.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg.**

6173

CARBODIN

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

— Diazinone puro	. . . gr. 2
— Carbaril (esente da B. naftolo) puro . .	. . . gr. 4
— Coformulanti e inerti	. q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contato con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, crampi muscolari, convulsioni, miosi, bradicardia, ipotensione, cianosi, sudorazione profusa ed edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Se vi è stato contatto lavare abbondantemente la cute e gli occhi. Respirazione artificiale assistita e controllata in caso di evidente ipossia con cianosi e dispnea; lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio; iniezione endovenosa di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti e 0,2-1 mg per i bambini) ogni 10 minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente nei bambini; non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Controindicazioni: Ossime, morfina, teofillina, latte, olio, grassi.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: Il Carbodin è un insetticida a largo spettro di azione, adatto per i trattamenti a secco sulle colture erbacee ed arboree e per la disinfestazione del terreno, dei giardini e delle piante ornamentali in pieno campo. Distribuito uniformemente sulle parti delle piante da proteggere, agisce sui parassiti per contatto e per ingestione.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO

Ortaggi a foglia - Ortaggi a radice - Colture ornamentali in pieno campo - Agrumi - Pomacee - Drupacee contro Dorifore, Nottuidi in genere, Psille, Tignole, Tingidi, Tripidi, Cecidomie, Antonomi, Fitonomo, Cassida, Altica: Kg. 30/50 per ettaro in rapporto alla massa delle vegetazioni da trattare. Nella disinfestazione del terreno contro Cleono, Lixus, Cavallette, Maggiolini, Formiche: Kg. 70 per ettaro.
E' consigliabile eseguire i trattamenti di primo mattino, in quanto l'umidità favorisce l'adesione del prodotto sulle foglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il Carbodin è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

« **Attenzione** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

EUROZOLFI S.p.A. - 14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - 95030 CATANIA - Tel. (095) 592014

Officina di prod.: **EUROZOLFI S.p.A.** - 14ª Strada - Zona Ind - 95030 CATANIA

Registrazione - del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg.**

6174

BUTANET ®

Erbicida selettivo, di pre-semina, liquido emulsionabile, a base di Butilate, efficace contro le infestanti della coltura di mais.

Il prodotto agisce sui semi in via di sviluppo con azione antigerminello; è efficace su tutte le più comuni graminacee annuali da seme infestanti la coltura di mais, come Sorghetta, Giavone americano, Setarie, Digitaria, Gramigna, Giavone comune e su numerose specie a foglia larga quali Chenopodio, Amaranto, Portulaca, Papavero, Atriplex, Senape ed altre.

COMPOSIZIONE

- Butilate puro	g	78
- Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a	g	100
contiene Xilolo		

(r) marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM–Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano SpA Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione: Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n 6174 del 31.1.89 Ministero della Sanità.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza,turbe nervose, bronchiti, effetto Antabuse (in caso di assunzione di alcool), irritazione della cute e delle mucose in caso di contatto (dermatiti, congiuntiviti, faringiti, ecc.) nonchè manifestazioni allergiche cutanee e bronchiali.

Terapia: nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centri di rianimazione.
Molti dei sintomi tossici possono essere provocati dal solventi organici presenti nel formulato; pertanto la terapia deve tener conto anche dei danni causati da questi.
I solventi possono provocare gravi lesioni epatiche, renali e a carico del sistema nervoso centrale e periferico (particolarmente i distillati del petrolio possono causare polmoniti chimiche) ; tutte queste forme richiedono idonee terapie sintomatiche.
Il vomito non va provocato. Somministrare grandi quantità di acqua. Se il paziente vomita spontaneamente, somministrare ancora liquidi, dopo averlo intubato.
Se il paziente è incosciente non somministrare nulla per bocca. Ricoverare il paziente in un Centro di rianimazione.
La lavanda gastrica, a paziente intubato, va praticata con una soluzione di 200-300 ml di acqua in cui siano stati sciolti 30-60 g di carbone attivo.
Purganti salini. Terapie sintomatiche mirate.
Per le manifestazioni cutanee e mucose rimuovere gli abiti contaminati, lavaggio con abbondante acqua della pelle e degli occhi per almeno quindici minuti, pomate oftalmiche e dermatologiche.

Controindicazioni: Alcool, olii, grassi.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Perchè il prodotto agisca, è necessario che le infestanti non siano ancora nate: il prodotto va incorporato al terreno ed usato prima della semina del mais, coltura sulla quale il prodotto è perfettamente selettivo.
Operare su terreno ben sminuzzato ed uniforme incorporando il prodotto al terreno subito dopo il trattamento, mediante attrezzi adatti a fargli raggiungere 5-8 cm. di profondità (apposite attrezzature, frese a organi rotanti, erpici a dischi,ecc.). Possibilmente l'incorporazione al terreno deve seguire immediatamente la distribuzione del prodotto sul terreno.
La semina del mais può essere fatta subito dopo il trattamento fino a qualche giorno dopo.
Il prodotto si impiega alla dose di litri 6-8 diluiti in 400–500 litri di acqua per ettaro, attenendosi alla dose inferiore su terreni leggeri e a quella superiore su terreni pesanti o argillosi o con limitato contenuto di sostanza organica. Non usare il prodotto in terreni contenenti più del 10 % di sostanza organica. poichè questa diminuisce l'attività del prodotto.
Onde ampliare lo spettro di azione del prodotto, in particolare verso le infestanti a foglia larga, si consiglia l'associazione con formulati a base di Atrazina (MAIZINA, MAIZINA L, alla dose di 2 Kg/ha).
In presenza di limitate infestazioni di graminacee ed in associazione all'Atrazina la dose del prodotto può essere ridotta a 4-5 lt/ha.
La pratica di associare al prodotto l'Atrazina in ogni caso è vantaggiosa sia per l'ampliamento dello spettro d'azione che per l'utilità di un impiego dell'Atrazina in modo efficace, a dosi dimezzate rispetto a quelle normali, fatto che permette l'uso della miscela anche su mais a ciclo breve, senza problemi di residui per le colture successive. Rispettare comunque le avvertenze prescritte per l'Atrazina.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i prodotti a base di Atrazina (MAIZINA, MAIZINA L), onde ampliarne lo spettro d'azione.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a contatto di colture sensibili vicine.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

6175

II CLASSE TOSSICOLOGICA

DIPIRIDAL D

Diserbante - Disseccante
Liquido

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 16,93 di DIQUAT puro
Sostanze bagnanti e diluenti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare controvento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso, e con i mezzi più idonei, le confezioni che contengono il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Attenzione:
I sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).
L'introduzione nell'organismo anche di poche gocce *del prodotto può essere fatale:* non attendere la comparsa dei sintomi *per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perché sia praticata l'emodialisi.*
Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza assorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, le bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.

Intossicazione per ingestione e per inalazione
I primi sintomi sono: epitassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola.
Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria.
Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato-renali.
L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria.
L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat (o diquat) nel sangue.

Intossicazione per contatto
Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole.
Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta.
Terapia: sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.
In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del paraquat (o diquat) e sulla terapia possono essere richieste direttamente *alla società produttrice di questo presidio sanitario.*

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

ANTIPARASSITARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 - ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 6175 **Ministero della Sanità del** 31.1.1985
5/84

CARATTERISTICHE

E' un erbicida in emulsione ad azione disseccante sulle parti verdi delle infestanti dicotiledoni e monocotiledoni.
Non agisce sulle parti legnose delle colture.
Non lascia residui nel terreno perché è completamente disattivato a contatto del suolo.
Si può applicare in qualsiasi periodo dell'anno sia con terreno bagnato che siccitoso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Trattare la vegetazione infestante con getto uniforme impiegando 300/800 litri di acqua per ettaro.
Impiegare le dosi più alte con forti infestazioni e nelle prime applicazioni.
DISERBO vigneti, frutteti, agrumeti, oliveti e colture arboree in genere: Kg. 2-4/ha.
DISERBO degli interfilari di colture industriali, orticole e floreali; asparagiaie: Kg. 2-4/ha. (con ugelli schermati).
DISERBO dei terreni da semina senza aratura (sod-seeding): Kg. 4-5/ha.
Miglioramenti dei pascoli: Kg. 5-10/ha.
DISERBO vivai, diserbi pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza; lotta contro la cuscuta: Kg. 3-5/ha.

DISERBO CANALI:
a) vegetazione emersa: Kg. 5-10/ha.
b) vegetazione sommersa: gr. 1-2 per metro quadrato di specchio d'acqua per profondità media d'acqua di cm. 50; gr. 2.5-5 per metro cubo d'acqua da diserbare per profondità media d'acqua superiore a cm. 50.

DISSECCAMENTI:
— riso da seme e da granella: Kg. 1,5-2/ha.
— colture da seme di medica, mais, frumento: Kg. 2-4/ha.
— medica da foraggio, piante da fibra: Kg. 2-4/ha.
— culmi patate: Kg. 3-5/ha (in caso di siccità eseguire il trattamento solo dopo tre giorni da una pioggia che abbia bagnato uniformemente il terreno vicino alle radici).

Nelle applicazioni citate, ad esclusione del diserbo della vegetazione sommersa dei canali, e del disseccamento dei culmi di patate, si consiglia l'aggiunta del Bagnante Adesivo Liquido 2 a gr. 50 per ettolitro di poltiglia.

Divieto di impiego sui foraggi

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli erbicidi; non è compatibile con fungicidi ed insetticidi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Evitare di colpire le colture utili o comunque sensibili.
Trattandosi di un diserbante disseccante ad azione sulla clorofilla il prodotto può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora ben lignificate, delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati e con le precauzioni consigliate.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

6176

CARATTERISTICHE

Il SUPRACAFFARO L.E. è un insetticida liquido emulsionabile, con secondaria azione acaricida, caratterizzato da ampio spettro d'azione e da lunga azione residua.

Il SUPRACAFFARO L.E. agisce per ingestione e per contatto, penetrando in profondità nei tessuti vegetali, contro la quasi totalità dei parassiti delle principali colture.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Nei trattamenti di fine inverno su melo, pero e pesco, contro forme svernanti di Coccinigile, Afidi, Psilla, Lepidotteri, Tortricidi	g 300-350/hl d'acqua
Nei trattamenti normali su melo, pero, agrumi, contro Afidi in genere, Microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Litocollete, Nepticula), Tortricidi (Capua, Cacoecia, Eulia, Pandemis), Carpocapsa, Psilla, Antonomo, Zeuzera, Cossus, Hoplocampa, Anarsia, Tignola della zagara, Mosca della frutta, Aonidiella aurantii e Cocciniglie in genere	g 250-300/hl d'acqua
In olivocoltura contro Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) e altre Cocciniglie, Tignola, Tripide, Fleotribo	g 300/hl d'acqua
In viticoltura contro Tignole e Cicaline	g 200/hl d'acqua
Barbabietola da zucchero contro Cleono, Lixo, Altica e Mosca	kg 2-3/ha
In orticoltura: su carciofo, asparago e pomodoro contro Afidi, Vanessa, Mosca, Criocera, Altica, Cavolaia, Nottue in genere	g 250-300/hl d'acqua
su patata contro Afidi e Dorifora	kg 2-3/ha
Floreali e ornamentali in pieno campo contro Afidi, Tripidi, Tentredini, Bega, Mosche minatrici, Nottue, Lepidotteri dofogliatori, Buprestidi, Coleotteri xilofagi	g 250-300/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SUPRACAFFARO L.E. è compatibile con la generalità degli antiparassitari in commercio, esclusi quelli a reazione spiccatamente alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il SUPRACAFFARO L.E. è fitotossico su pesco se impiegato dopo l'apertura delle gemme.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO Kg

Supracaffaro L.E.

Insetticida citotropico polivalente

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Methidathion puro	g 19
Coformulanti	q.b.a g 100

Contiene Xilolo

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

I CLASSE

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio: interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo

Sintomi di intossicazione: *Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.*

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam Contrathion ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

AVVERTENZA: *consultare un Centro antiveleni*

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6176 del 31.1.85

6177

CLASSE II

NOCIVO

SECAMON

SOLUZIONE LIQUIDA - Diserbante - dissecante ad azione rapida per diserbi in frutti-orticoltura, vivai, di colture industriali, erba medica, mais, asparagi, canali, e disseccamenti di colture da seme e da fibra.

COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: 16,93 g di Diquat puro, Tensioattivi e solventi q.b. a 100 g.

NATURA DEL RISCHIO - Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
—Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici —Conservare la confezione ben chiusa —Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto —Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua —Evitare di respirarne i vapori —Non operare contro vento —Evitare il contatto con la pelle e gli occhi —Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi —Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone —Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio bruciandole o interrandole in buche profonde più di un metro e cospargendole con calce viva) —In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Attenzione: i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata). L'introduzione nell'organismo **anche di poche gocce** del prodotto può essere fatale: **non attendere la comparsa dei sintomi** per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perchè sia praticata l'emodialisi. Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagei) e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, le bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.
Intossicazione per ingestione e per inalazione
I primi sintomi sono: epistassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutazione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei test di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato renali. L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare **grave**, sino alla morte per insufficienza respiratoria. L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat (o diquat) nel sangue.
Intossicazione per contatto Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicolo.
Unghie: macchie bianche con lesioni traversali e caduta.
Terapia: sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.
In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del paraquat (o diquat) e sulla terapia possono essere richieste **direttamente** alla società produttrice di questo presidio sanitario.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE - Il SECAMON è un formulato liquido a base di Diquat, con azione diserbante-dissecante. Esso distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate, mentre non agisce sulle parti legnose delle colture. Disattivandosi con il contatto del terreno non vi lascia residui fitotossici. È resistente alla pioggia è può essere applicato, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura, durante tutto l'anno. Può altresì essere distribuito su terreno bagnato come dopo lunga siccità.

ISTRUZIONI ED AVVERTENZE D'IMPIEGO - In tutti i casi di diserbo il trattamento con SECAMON deve essere effettuato in presenza di vegetazione infestante. Esso può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature a condizione che il getto sia controllato ed uniforme. L'uso degli atomizzatori e sconsigliato per evitare la dispersione con danno alle parti verdi e non ancora ben lignificate delle piante, come anche l'inalazione da parte degli operatori per i quali consigliamo comunque l'uso di maschere protettive. Diluire la dose in 300-800 litri d'acqua per ettaro a seconda dello sviluppo delle infestanti, avendo cura di usare acqua pulita in quanto il SECAMON potrebbe disattivarsi in acque fortemente torbide. Eseguire i trattamenti preferibilmente nelle ore di tardo pomeriggio o della sera.

MODALITA' D'IMPIEGO - Dosi per ettaro:
Diserbi: LT. 4,5-6 diserbo totale o parziale, diserbo controllato e non coltura in frutteto, vigneto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione parziale per oliveto.
Lt. 3-5 diserbo vivai, diserbo pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza: lotta contro la cuscuta, diserbo interfilare ed interparcellare delle colture orticole (patate, bietole), floreali, diserbo asparagiaie.
Lt. 3-4,5 diserbo erba medica (escluso anno di impianto).
Lt. 4,5-6 diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).
Applicazioni speciali: Lt. 5-8 diserbo canali; erbe emerse.
g/mc 2,5-5 diserbo canali; erbe sommerse.
Lt. 6-8 per miglioramento pascoli.
Disseccamenti: Lt. 1,5-2 dissecamento del riso da seme.
Lt. 2-4,3 disseccamento colture da seme (erba medica, mais, grano); disseccamento piante da fibra.
Lt. 5-7,5 disseccamento culmi patate. Questa applicazione non deve essere effettuata in caso di siccità. In tale caso il terreno dovrà essere bagnato profondamente (3 gg. di pioggia) avendo cura che il suolo vicino alle radici risulti uniformemente bagnato.

AVVERTENZE Per una migliore efficacia del prodotto aggiungere lt. 0,5/hl di soluzione di BAGNANTE AMONN. L'aggiunta di Bagnante non va effettuata per le seguenti applicazioni: diserbo canali - erbe sommerse; distruzione parte aerea delle patate.

È vietato l'uso diretto sui foraggi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Il SECAMON può essere miscelato con altri erbicidi solo se espressamente consigliato. È da tener presente che la miscela deve essere utilizzata subito dopo la sua preparazione.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri erbicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Si sconsiglia l'uso del SECAMON in presenza di piante arboree molto giovani. Si raccomanda di evitare che il prodotto venga a contatto con le parti verdi e non ancora ben lignificate delle colture erbacee ed arboree.

Sulle colture orticole o floricole operare con bassa pressione, in giornate senza vento e difendendo le piante con apposite campane o paratoie di protezione.

RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Essendo la lepre particolarmente sensibile è necessario conoscere le sue abitudini nutrizionali eseguendo il trattamento in zone di caccia al mattino durante le prime ore di lavoro.
Sospendere il trattamento 30 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE - AMONN FITOCHIMICA SPA, Bolzano, via Piave 2.

OFFICINA DI PRODUZIONE - AMONN FITOCHIMICA SPA Stabilimento di Bolzano, via Siemens 12.

Registrazione 6177 del 31.1.1985 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg. 1

AMONN FITOCHIMICA SPA

BOLZANO, VIA PIAVE 2

TERSIPLEN (R) C

Diserbante selettivo in formulazione liquida emulsionabile per il controllo in pre-emergenza e post-emergenza di infestanti graminacee e dicotiledoni in alcune colture di cereali a semina invernale.

COMPOSIZIONE

- Trifluralin puro ....g 22
- Clortoluron puro ....g 22
- Coadiuvanti,solventi: q.b. a.g 100
  contiene Glicol etilenico

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officine di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 6178 del 31.1.85 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanze pericolose per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande e corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Infestanti controllate:
Graminacee annuali: Alopecurus spp., Apera spica venti, Briza minor, Lolium multiflorum, Poa annua, Poa spp.
Dicotiledoni: Alchemilla arvensis, Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Fumaria officinalis, Juncus bufonius, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Lithospermum arvense, Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Myosotis arvensis, Myosotis minimum, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Ranunculus spp. Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Specularia speculum, Stellaria media, Thlaspi arvense, Valerianella auricula, Veronica spp.
Alle dosi di impiego più elevate si ottengono anche risultati contro le Avene selvatiche a germinazione autunnale.
Il prodotto non controlla le infestanti perennanti.
Colture protette: Frumento invernale duro e tenero, Orzo a semina invernale, Segale a semina invernale.

EPOCHE DI IMPIEGO
Il prodotto deve essere usato dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura trattata (trattamenti di pre-emergenza) ovvero può essere usato anche dopo l'emergenza della coltura (allo stadio di 2-4 foglia) ma con erbe infestanti, specie graminacee in stato giovanile.
Sistema di distribuzione
Il prodotto deve essere distribuito per irrorazione e non deve essere incorporato nel terreno.

DOSE D'IMPIEGO: 3-4 litri per Ha per ogni tipo di terreno.

Preparazione della poltiglia: usare il prodotto in 200-800 litri di acqua per ha; il prodotto deve essere aggiunto nella botte riempita a metà di acqua ed agitato bene durante il completamento del riempimento. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare una qualsiasi attrezzatura irrorante a bassa pressione (1,5-3,0 atm) provvista di spruzzatori per erbicidi ed una pompa di capacità adeguata ad assicurare una buona agitazione durante l'irroramento.
Una efficiente valvola di chiusura deve essere usata per impedire l'eccessiva fuoriuscita del prodotto quando l'attrezzatura parte, gira e si ferma.
Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati il letto di semina deve essere ben preparato eliminando le zolle grosse, e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme.
AVVERTENZE
Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazionze del Trifluralin e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone,, cocomero, cetriolo e zucca,insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.
Non seminare bietola (da zucchero,da foraggio, da orto,ecc.), nella primavera successiva all'applicazione del prodotto.
Non deve essere applicato in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Non sono stati rilevati problemi di incompatibilità con altri prodotti antiparassitari, ma non tutte le possibili combinazioni sono state provate.
In pre-emergenza può essere miscelato a insetticidi o concimi liquidi (dopo con trollo della compatibilità) mentre in post-emergenza delle colture il prodotto va usato da solo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto è risultato selettivo verso le principali varietà di grano invernale, orzo invernale e segale invernale indipendentemente dal tipo di terreno. Comunque non tutte le varietà sono state sperimentate.
Avvertenze: evitare il congelamento del del preparato. Evitare temperature estreme, conservare il prodotto in locali a temperatura oltre i 5°C. Non conservare presso sorgenti di calore o fuoco.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO lt. 1

SIPCAM

6179

KLINAMON

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

SOLUZIONE ACQUOSA - diserbante liquido per il diserbo di vigneti, agrumeti, stoppie di cereali ed incolti (ripe, scoline, strade, sedi ferroviarie, depositi ed impianti industriali)

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Glyfosate sale isopropilamminico puro g 41
Bagnanti e solventi quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
—Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; —Conservare la confezione ben chiusa; —Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; —Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua; —Non operare contro vento; —Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e gli indumenti; —Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il KLINAMON è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti mono- e dicotiledoni, annuali e perenni (gramigna, Sorghetta, Cipero, Vilucchio). Esso viene assorbito dalle foglie e per via sistemica arriva nelle radici ed organi sotterranei delle perennanti, che così muoiono. Il KLINAMON a contatto con il terreno viene disattivato velocemente e quindi non causa alcun danno alle colture perenni come viti ed agrumi.
Causa la scarsa persistenza non possiede efficacia di pre-emergenza. Per ottenere un diserbo duraturo è necessario usare prima o dopo il trattamento con KLINAMON, un prodotto ad azione persistente sul terreno (a base di Simazina, Diuron) per impedire la nascita delle infestanti provenienti da seme. Dopo il trattamento le infestanti ingialliscono e gradualmente appassiscono morendo anche a livello radicale.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto va usato, irrorando uniformemente le infestanti ben sviluppate, in una quantità di acqua di 300-500 l/ha, evitando inutili perdite per gocciolamento.
Diserbo selettivo della vite e degli agrumi: i trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi variano in funzione della composizione della vegetazione infestante e sono riferite alla superficie effettivamente trattata:
3-5 l/ha : contro la maggior parte delle erbe annuali
4,5-5 l/ha : contro Sorghum halepense, Agropyrum repens, Ranunculus spp.
5,5-7 l/ha : contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris, Potentilla spp, Plantago spp, Taraxacum officinalis, Rumex spp, Felci.
Contro il Cyperus rotundus si ottiene un risultato più duraturo effettuando un secondo trattamento sui ricacci con 4 l/ha.
8-10 l/ha: contro Convolvulus arvensis ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon, Urtica spp, Daucus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannuccia (alte 50-80 cm),
10-12 l/ha : contro Convolvulus arvensis all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm).
Note importanti: Usare pompe a bassa pressione (max 3 atmosfere) e barre o lance munite di ugelli che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Evitare le formazioni di deriva ed in ogni caso non effettuare trattamenti in presenza di vento, in particolare se si irrorano vigneti e frutteti con forme di allevamento basse. Non bagnare i tronchi, specialmente se non ancora ben lignificati o con ferite.
Il trattamento con erbicida residuale integrativo contro le infestanti da seme va eseguito:
nei vigneti: in primavera o autunno.

negli agrumeti: in inverno o prima dell'irrigazione estiva su terreno privo di infestanti o lavorato.
Non impiegare mai il prodotto in miscela con l'erbicida residuo.
Diserbo delle stoppie di cereali: Impiegare il KLINAMON su infestanti in vegetazione sia dopo una coltura (estate, autunno) sia prima della coltura (primavera); nel secondo caso la lavorazione del terreno e la semina possono essere effettuate 2-3 settimane dopo il trattamento. Su Sorghetta alta 30-40 cm usare una dose di 5,5 l/ha mentre se l'infestante è all'inizio della fioritura usare 4 l/ha.
Diserbo totale degli incolti (ripe, scoline, strade, sedi ferroviarie, depositi ed impianti industriali) : usare le stesse dosi per ogni specie infestante come precedentemente esplicato. Per un controllo duraturo delle infestanti nate da seme eseguire in autunno-inverno un trattamento con un diserbante residuale (es. Simazina, Diuron). Se la vegetazione infestante è molto alta e densa usare fino a 100 l/ha evitando di contaminare colture vicine.
Avvertenze Se piove entro sei ore dall'applicazione, l'efficacia del prodotto è ridotta. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitano la crescita delle infestanti, favorendo l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non ostacolano l'azione del prodotto, purchè le infestanti siano ben sviluppate e non essicate. Le perennanti se ben sviluppate al momento del trattamento sono ben controllate; alcune dicotiledoni (es: vilucchio, stoppione, artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Lavori che riducono la parte verde delle infestanti (arature, fresature, tagli delle erbe) diminuiscono l'efficacia del trattamento.
Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar trascorrere 2-3 settimane prima di lavorare il terreno, dando tempo al prodotto di traslocare negli organi sotterranei delle infestanti. Fra l'applicazione di questo prodotto ed altri erbicidi lasciare trascorrere 1-2 settimane.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Agitare la confezione prima dell'uso. Diluire in poca acqua la quantità di prodotto necessaria e versare poi il tutto nella quantità d'acqua occorrente per il trattamento. Dopo l'impiego, lavare accuratamente tutti gli attrezzi (pompa, recipienti, ecc.) risciaquando ripetutamente con cura. Non scaricare le acque utilizzate in acque destinate all'irrigazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il KLINAMON va usato, per la sua particolare formulazione sempre da solo.

FITOTOSSICITA'
Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, i rami non ancora ben lignificati, i succhioni del tronco e del portainnesto di tutte le piante coltivate. Evitare formazioni di deriva non trattando in presenza di vento, ed usando ugelli protetti e schermati da coni od altri apparati.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano, via Piave, 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Stabilimento di Bolzano via Siemens 12

Registrazione N. 6179 del 31.1.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1

AMONN

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

618

ROYALTAC®

CLASSE IV

FITOREGOLATORE AD AZIONE DI CONTATTO PER IL CONTROLLO SELETTIVO DEI GERMOGLI ASCELLARI PRIMARI E SECONDARI DEL TABACCO

Composizione: gr 100 di prodotto contengono:

— N-Decanolo	gr 78,4 di p.a. puro
— Coformulanti	q.b. a 100

Norme precauzionali:
- — conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- — non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua;
- — dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: Il ROYALTAC agisce per contatto e, per essere completamente efficace, deve bagnare i germogli ascellari delle piante.
Il liquido irrorato deve scorrere lungo lo stelo delle piante e, scendendo, venire a contatto con le gemme ascellari.
Il prodotto può essere utilmente applicato su qualsiasi varietà di tabacco senza alterarne le caratteristiche organolettiche.

Modalità d'impiego:
Periodo di applicazione: Il ROYALTAC può essere impiegato sia prima che dopo la cimatura: **a) prima della cimatura:** trattare con ROYALTAC preferibilmente allo stadio fra allungamento dei bottoni florali e l'apertura dei fiori. I migliori risultati si ottengono trattando e cimando entro una settimana. In questo caso raramente i germogli ascellari sono tanto grandi da richiedere l'asportazione manuale; **b) dopo la cimatura:** trattare con ROYALTAC entro e non oltre 2 giorni (preferibilmente entro 24 ore) dalla cimatura asportando nell'operazione di cimatura anche i germogli ascellari più lunghi di 2,5 cm.

Dosi d'impiego: Il ROYALTAC s'impiega alla dose di 4-6 litri di prodotto in 94-96 litri di acqua, utilizzando 15-20 cc. di miscela per pianta. Risulterà una quantità di 1 litro di miscela ogni 50-60 piante nell'applicazione manuale; la quantità di miscela da applicare per unità di superficie dipenderà dal numero di piante presenti nella stessa, generalmente variabile a seconda della varietà coltivata, della pratica colturale adottata. Nell'applicazione con mezzi meccanici generalmente s'impiegherà un volume compreso fra i 600 e gli 800 litri per ettaro.

Metodi di applicazione: Il trattamento con ROYALTAC può essere eseguito sia con mezzi manuali (irroratori a spalla), sia con mezzi meccanici (irroratori a barre). In entrambi i casi si debbono impiegare ugelli producenti un getto grossolano (come gocce di pioggia leggera), mantenuti sopra le piante ad un'altezza tale da fare liberamente scorrere la miscela lungo lo stelo ed evitando di bagnare, sia pure accidentalmente, la pagina inferiore delle foglie.
In particolare nel trattamento con mezzi di irrorazione manuali, la pressione nel serbatoio deve essere tenuta assai bassa (meno di 0,5 atm.), può essere impiegato un solo ugello (raccordato con una curva per facilitarne l'uso), mantenuto a 15-20 cm dalle cime delle piante e rivolto verso il basso.

Nel trattamento con mezzi di irrorazione meccanici, si richiede innanzitutto un'accurata taratura della macchina affinché le condizioni d'applicazione siano rigorosamente osservate ed un impianto assai regolare della coltura. Gli ugelli, in gruppo di tre per fila di piante, sono disposti a 20 cm di distanza uno dall'altro, rivolti verso il basso, quello centrale verticale ed allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati in direzione della cima delle piante. La barra irrorante deve essere mantenuta ad un'altezza tale da assicurare agli ugelli una distanza di 30-40 cm dalla sommità delle piante. La pressione alla barra deve essere di 0,5-1 atm.; si prescrive pertanto l'impiego di un manometro sensibile avente 3 atm. come fondo scala.

Numero di applicazioni: Un solo trattamento con ROYALTAC è sufficiente per la devitalizzazione dei germogli ascellari. In presenza di germogli eccezionalmente vigorosi, può essere utile un secondo trattamento a distanza di 5-10 giorni dal primo. L'impiego del ROYALTAC — avente lo scopo di eliminare i germogli già presenti al momento del trattamento — dovrebbe essere integrato con l'applicazione di un prodotto a base di idrazide maleica, avente azione sistemica e lo scopo di inibire la formazione di nuovi germogli.

Avvertenze:
- — evitare che la miscela vada a contatto con la pagina inferiore delle foglie, sensibile e pertanto soggetta a ustionarsi; si sconsiglia di trattare in giornate ventose e su piante inclinate che vanno anticipatamente raddrizzate;
- — evitare di applicare la miscela nelle ore più calde della giornata. Al mattino attendere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano;
- — il prodotto agisce entro un'ora; una eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare in caso di pioggia e con le foglie bagnate;
- — non trattare piante ammalate, malnutrite e comunque sofferenti;
- — agitare il prodotto prima dell'uso nel suo contenitore;
- — il ROYALTAC va usato da solo. Preparare la miscela subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore;
- — rispettare le dosi consigliate. Esse hanno carattere generico e la tecnica dell'applicazione va messa a punto caso per caso.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: Il ROYALTAC non è compatibile con gli antiparassitari e con i fertilizzanti fogliari. Pertanto va irrorato da solo.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Rischio di nocività: Il prodotto è tossico per i pesci.

« Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta ».

« **Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

UNIROYAL

UNIROYAL CHIMICA S.p.A.
Via delle Industrie, 40
04013 LATINA SCALO

REGISTRAZIONE N. 6180 **DEL** 15.1.85 **DEL MINISTERO DELLA SANITÀ**

® **Marchio Registrato Soc. UNIROYAL INC. - New York (USA)**

Officina di produzione: UNIROYAL - Viale delle Industrie, 40 - 04013 LATINA SCALO

DA NON VENDERSI SFUSO **CONTENUTO NETTO DELLA CONFEZIONE: LT**

6181

Caratteristiche del prodotto

Il FERVINAL S è un erbicida che agisce, prevalentemente per via fogliare, sulle principali specie di graminacee annuali quali Alopecurus (Coda di topo), Avene selvatiche, Bromo, Falaridi, Logli, Digitaria, Setarie, Giavoni (Echinochloa, Panicum dichotomiflorum), Sorghetta da seme, con esclusione della Poa annua. Presenta inoltre una buona azione su alcune graminacee perennanti quali il Sorghum halepense (Sorghetta); è anche attivo sui ricacci di frumento ed orzo.
Il FERVINAL S è selettivo nei riguardi delle seguenti colture, indipendentemente dal loro stadio di sviluppo: barbabietola da zucchero, finocchio, fagiolo, carciofo, patata, pomodoro, melanzana, peperone.
L'azione del FERVINAL S sulle graminacee si manifesta gradualmente con variazioni progressive di colore sino al completo disseccamento delle infestanti stesse: l'effetto finale viene raggiunto entro 1-3 settimane dal trattamento, in relazione alle condizioni climatiche. Prima di disseccare le infestanti arrestano il loro sviluppo e non risultano più competitive per la coltura.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Il FERVINAL S si impiega in post-emergenza delle infestanti che risultano sensibili in qualsiasi stadio di sviluppo. I migliori e più rapidi risultati si ottengono comunque intervenendo quando le graminacee si trovano nei primi stadi di sviluppo (2-3 foglie) in coincidenza dei quali sono sufficienti le dosi più ridotte del prodotto.
Le dosi indicate sono le seguenti:
— Infestanti a nascita autunno primaverile (Alopecurus, Logli, Avene, Bromo, Falaridi) : 1,5-2,0 lirti/ha
— Infestanti a nascita più tardiva (Giavoni, Digitaria, Setarie, Sorghetta da seme e su ricacci di frumento ed orzo) : 1,5-2,5 litri/ha

Per ottenere un buon effetto erbicida su infestanti perenni (es. Sorghum h. da rizoma) è opportuno intervenire con una dose di prodotto di 2,5-3 litri/ha, su piante alte circa 20-25 cm, e ripetendo, all'occorrenza, il trattamento 7-10 giorni dopo.
Il FERVINAL S è un graminicida specifico: per controllare contemporaneamente anche le infestanti a foglia larga è necessario ricorrere alla associazione con un idoneo erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura che si intende diserbare. Ad esempio nel caso della bietola il FERVINAL S sarà associato a Betanal e Tramat. Il FERVINAL S può essere inoltre impiegato in successione a qualsiasi erbicida di pre o post-emergenza.
Questo prodotto deve essere distribuito in una quantità d'acqua tale da assicurare una buona bagnatura delle infestanti, ossia variante (300-600 l/ha) in relazione alla densità e allo sviluppo delle stesse.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il FERVINAL S è praticamente compatibile con tutti gli antiparassitari comunemente impiegati.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo ».
« Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta ».
« Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta ».
« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO l

FERVINAL S

Graminicida liquido emulsionabile di post-emergenza indicato per il diserbo selettivo delle colture orticole.

Composizione su g 100:
— Setossidium * puro g 14,7
— Solventi e coadiuvanti q.b. a 100
« Contiene Xilolo »

* Sostanza attiva prodotta dalla Nippon Soda Co. Tokio (Giappone)

CLASSE III

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SCHERING SpA
Divisione Agricoltura
20131 MILANO - Via Mancinelli, 7/11

Officina di Nova Milanese-MI

Registrazione del Ministero della Sanità
N. 6181 del 15.1.1985

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— *Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;*
— *Conservare la confezione ben chiusa;*
— *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;*
— *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;*
— *Non operare contro vento;*
— *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;*
— *Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

SELECRON®

Soluzione emulsionabile
Insetticida - Acaricida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
23,2 g profenofos puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, eminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
È un insetticida con azione collaterale acaricida a rapido effetto iniziale. Viene assorbito dai tessuti fogliari, ove penetra rapidamente. Agisce per ingestione e per contatto principalmente contro lepidotteri e afidi.

Campi di applicazione e dosi di impiego

Barbabietola da zucchero: 2-3 lt/ha contro afidi, Altica, Cleono, Lisso, nottue.

Patata: 2-3 lt/ha contro afidi, Dorifora, nottue.

Mais: 2-3 lt/ha contro nottue, Piralide ed altri insetti terricoli.

Colture floreali: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro afidi, aleurodidi, nottue, tortricidi (Bega del garofano), tripidi, acari.

Melo (solo in pre-fioritura): contro afidi e tortricidi 0,2-0,3% (200-300 cc/hl).

Pioppo: contro afidi, crisomelidi, Sesamia 0,2-0,24% (200-240 cc/hl); contro Saperda, Punteruolo, Rodilegno, nei trattamenti estivi 0,6-1% (600-1000 cc/hl).

Agrumi: contro Tignola (Prays citri) e afidi nei trattamenti primaverili 0,2% (200 cc/hl).

Pesco: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro afidi (Myzus p., Hyalopterus), cocciniglie, Anarsia, Cidia nei trattamenti primaverili-estivi.

Peperone: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro afidi (Myzus p.), Dorifora e nottue.

Fagiolo / fagiolino / fava: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro Afide nero.

Carciofo: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro afidi, nottue, Cassida, Punteruolo.

Cavolo cappuccio / cavolfiore: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro Mamestra, afidi, nottue.

Il prodotto alle dosi d'impiego svolge una buona attività acaricida contro: Panonychus ulmi, Tetranychus urticae (Ragnetto rosso e giallo).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione spiccatamente alcalina.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed bestiame.

Sospendere i trattamenti prima del raccolto:
14 giorni per patate;
19 giorni per mais;
21 giorni per carciofo, cavolo cappuccio, cavolfiore, fagiolo, fagiolino, fava;
28 giorni per peperone;
60 giorni per pesco;
64 giorni per barbabietola da zucchero;
70 giorni per agrumi.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO It

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)
Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6182 del 15.1.85
● marchio registrato

SELECRON®

Soluzione emulsionabile
Insetticida - Acaricida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
23,2 g profenofos puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, eminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
È un insetticida con azione collaterale acaricida a rapido effetto iniziale. Viene assorbito dai tessuti fogliari, ove penetra rapidamente. Agisce per ingestione e per contatto principalmente contro lepidotteri e afidi.

Campi di applicazione e dosi di impiego

Barbabietola da zucchero: 2-3 lt/ha contro afidi, Altica, Cleono, Lisso, nottue.

Patata: 2-3 lt/ha contro afidi, Dorifora, nottue.

Mais: 2-3 lt/ha contro nottue, Piralide ed altri insetti terricoli.

Colture floreali: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro afidi, aleurodidi, nottue, tortricidi (Bega del garofano), tripidi, acari.

Melo (solo in pre-fioritura): contro afidi e tortricidi 0,2-0,3% (200-300 cc/hl).

Pioppo: contro afidi, crisomelidi, Sesamia 0,2-0,24% (200-240 cc/hl); contro Saperda, Punteruolo, Rodilegno, nei trattamenti estivi 0,6-1% (600-1000 cc/hl).

Agrumi: contro Tignola (Prays citri) e afidi nei trattamenti primaverili 0,2% (200 cc/hl).

Pesco: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro afidi (Myzus p., Hyalopterus), cocciniglie, Anarsia, Cidia nei trattamenti primaverili-estivi.

Peperone: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro afidi (Myzus p.), Dorifora e nottue.

Fagiolo / fagiolino / fava: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro Afide nero.

Carciofo: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro afidi, nottue, Cassida, Punteruolo.

Cavolo cappuccio / cavolfiore: 0,16-0,2% (160-200 cc/hl) contro Mamestra, afidi, nottue.

Il prodotto alle dosi d'impiego svolge una buona attività acaricida contro: Panonychus ulmi, Tetranychus urticae (Ragnetto rosso e giallo).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione spiccatamente alcalina.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed bestiame.

Sospendere i trattamenti prima del raccolto:
14 giorni per patate;
19 giorni per mais;
21 giorni per carciofo, cavolo cappuccio, cavolfiore, fagiolo, fagiolino, fava;
28 giorni per peperone;
60 giorni per pesco;
64 giorni per barbabietola da zucchero;
70 giorni per agrumi.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO It

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)
Officina di produzione: CIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6182 del 15.1.1985
● marchio registrato

6183

DISERBAGRO 2,4-D

Diserbante ormonico selettivo per cereali
(frumento, orzo, segale, avena) a base di 2,4-D.

Composizione percentuale:
2,4-D acido puro (da estere butossiglicolico) .... gr. 32
Coformulanti .... q.b.a. gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione:
Astenia di grado notevole; aritmia; fibrillazione atriale e ventricolare; ipotensione; dermatiti da contatto; senso di costrizione toracica; cefalea; vertigini; convulsioni; coma.

Consigli terapeutici:
Abbondante lavaggio gastrico; ossigenoterapia; sedativi; diuretici; solfato di chinidina; pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni:
È sconsigliata la digitale.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche:
DISERBAGRO 2,4-D è un diserbante ormonico selettivo, a base di esteri pesanti del 2,4-D, utilizzato per la lotta contro le infestanti annuali a foglia larga: Veccia, Ranuncolo, Senape Selvatica, Colza, Ramolaccio, Scardaccione, Papavero, Veronica, Fiordaliso; e le più resistenti: Camomilla, Vilucchio, Fumaria, Stellaria media, Artemisia, presenti nelle coltivazioni di frumento, orzo, segale ed avena.
Il prodotto non viene asportato dalle piogge che dovessero verificarsi poche ore dopo il trattamento.

Dosi e modalità d'impiego:
Preparare l'emulsione versando il prodotto in un recipiente contenente acqua ed aggiungerne altra sino ad ottenere la quantità di soluzione desiderata. Irrorare con pompe a volume normale.
Le dosi d'impiego variano da 0,5 kg sino a 1,3 kg per ettaro a seconda del tipo e della diffusione delle piante infestanti, della temperatura atmosferica (non effettuare trattamenti con temperature inferiori a 12°C) e della natura dei terreni (nei terreni leggeri si consigliano dosi inferiori). I trattamenti vanno eseguiti nello spazio intercorrente tra il termine dell'accestimento del cereale e l'inizio del rigonfiamento della spiga nella guaina fogliare. Se le colture sono infestate in prevalenza da erbe sensibili (es. Papavero, Veccia, Convolvolo) trattare le piantine appena esse hanno formato le foglioline sullo stelo; se invece prevalgono le specie più resistenti (es. Cardi, Stellaria, Romici) irrorare alla comparsa dei primi bottoni floreali.
Non ha importanza la quantità di acqua impiegata (da 50 a 800 litri) purché venga distribuito per ettaro il quantitativo di erbicida indicato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: DISERBAGRO 2,4-D è compatibile con la generalità dei diserbanti in formulazione liquida.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che durante i trattamenti il liquido nebulizzato vada verso colture sensibili quali vite, frutticole, ortaggi, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ITAL-AGRO s.a.s. - TORINO
Produzioni Chimico Agrarie
Via Crevero, 110 - 10095 Grugliasco (TO)
Stabilimento di produzione: **SARIAF S.p.A. - Faenza**

Registrazione Ministero della Sanità n. 6183 del 15.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

618

Gesatop® P

Diserbante delle superfici arborate
(piante da frutto, vite, olivo)

Composizione
100 g di prodotto contengono:
38,8 g simazina pura
9,5 g paraquat dicloruro puro (corrispondente a paraquat catione puro g 6,8)
q.b. a 100 g coformulanti (contiene glicole etilenico)

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

I CLASSE

VELENO

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Va)

Officina di produzione: SIPCAM, Salerano s/Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6184 **del** 15.1.1985
® marchio registrato

Natura del rischio
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio, interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
Attenzione: I sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).
L'introduzione nell'organismo anche di poche gocce del prodotto può essere fatale: non attendere la comparsa dei sintomi per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perchè sia praticata l'emodialisi. Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.

Intossicazione per ingestione e per inalazione
I primi sintomi sono: epitassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutazione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei test di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epatorenali. L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria. L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat nel sangue.

Intossicazione per contatto
Occhi: *forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).*

Cute: *irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole.*

Unghie: *macchie bianche con lesioni trasversali e caduta.*

Terapia: *sintomatica da praticarsi esclusivamente dal medico. In ogni caso, ulteriori informazioni sulla tossicologia del Paraquat e sulla terapia possono essere richieste direttamente alla Società produttrice di questo presidio sanitario.*

Avvertenza
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
Per la natura dei suoi componenti, unisce ad una rapida azione di contatto nei confronti della vegetazione infestante presente al momento del trattamento, un effetto residuale di lunga durata che impedisce la reinfestazione da parte delle infestanti che germinano in epoca successiva al trattamento.
Alcune infestanti particolarmente resistenti e che traggono la loro forza da organi di propagazione vegetativa, come rizomi, stoloni (= Cynodon, Artemisia, Convolvolus, Cirsium) non sono ben controllate in quanto possono ricacciare dopo l'applicazione.

Indicazioni
È indicato per il diserbo delle superfici arborate, quali vigneto, pero, melo, olivo, nocciolo, drupacee.

Dosi ed epoche d'impiego
vite, pero, melo. olivo: impianti giovani - Kg 3-4 per ettaro;
impianti oltre 3 anni - Kg 4-8 per ettaro.
pesco, susino, ciliegio: Kg 2,5-3 per ettaro.
(solo oltre i 3 anni).
Queste dosi si riferiscono a trattamenti a pieno campo; per trattamenti limitati ad una parte della superficie (ad esempio soltanto lungo i filari), le dosi devono essere ridotte in proporzione alla superficie effettivamente trattata.
Ai fini di consentire l'azione attraverso il terreno della componente triazinica, è bene che il trattamento sia effettuato su terreno umido o quanto meno non sia seguito da prolugata siccità. Per questo motivo si consiglia di trattare nel periodo autunno-invernale in Italia Centro-Meridionale, e non oltre l'inizio della primavera in Italia Settentrionale.

Modalità d'impiego
Per la distribuzione del prodotto utilizzare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una distribuzione uniforme della miscela ed una completa bagnatura delle infestanti. Più comunemente sono necessari da 400 a 1000 litri di acqua per ettaro.
Aggiungere un bagnante non ionico (es. Etravon in ragione di 300-400 cc per ettolitro di miscela) per favorire e migliorare il contatto della miscela con le infestanti.
Trattare nelle ore del tardo pomeriggio o della sera.
Non usare atomizzatori od acque torbide.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Non è prevista la miscela con altri prodotti.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Evitare di usare il prodotto in presenza di piante giovani, con fusto non ancora ben lignificato. I trattamenti alle drupacee sono sconsigliati in terreni molto leggeri, sabbiosi o ciottolosi; negli stessi terreni per le altre colture, limitarsi e trattare le piante adulte. Evitare che il prodotto venga a contatto con le foglie delle piante coltivate in quanto determinerebbe il disseccamento delle lamine. Evitare inoltre che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili.
Divieto d'impiego sul foraggi.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg

6185

SELECRON® S

Soluzione emulsionabile
Insetticida - Acaricida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
36,7 g profenofos puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE II

NOCIVO

Natura del rischio
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni

Caratteristiche
È un insetticida con azione collaterale acaricida a rapido effetto iniziale. Viene assorbito dai tessuti fogliari, ove penetra rapidamente. Agisce per ingestione e per contatto principalmente contro lepidotteri e afidi.

Campi di applicazione e dosi di impiego

Barbabietola da zucchero: 1,5-1,8 lt/ha contro afidi, Altica, Cleono, Lisso, nottue.

Patata: 1,5-1,8 lt/ha contro afidi, Dorifora, nottue.

Mais: 1,5-1,8 lt/ha contro nottue, Piralide ed altri insetti terricoli.

Colture floreali: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro afidi, aleurodidi, nottue, tortricidi (Bega del garofano), tripidi, acari.

Melo (solo in pre-fioritura): 0,125-0,18% (125-180 cc/hl) contro afidi e tortricidi.

Pioppo: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro afidi, crisomelidi, Sesamia; 0,4-0,6% (400-600 cc/hl) contro Saperda, Punteruolo, Rodilegno nei trattamenti estivi.

Agrumi: 0,12% (120 cc/hl) contro Tignola (Prays citri) nei trattamenti primaverili.

Pesco: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro afidi (Myzus p., Hyalopterus), cocciniglie, Anarsia, Cidia nei trattamenti primaverili-estivi.

Peperone: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro afidi (Myzus p.), Dorifora e nottue.

Fagiolo / fagiolino / fava: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro Afide nero.

Carciofo: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro afidi, nottue, Cassida, Punteruolo.

Cavolo cappuccio / cavolfiore: 0,1-0,12 (100-120 cc/hl) contro Mamestra, afidi, nottue.

Il prodotto alle dosi d'impiego svolge una buona attività acaricida contro Panonychus ulmi, Tetranychus urticae (Ragnetto rosso e giallo).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione spiccatamente alcalina.
- Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed bestiame

Sospendere i trattamenti prima del raccolto:
14 giorni per patate;
19 giorni per mais;
21 giorni per carciofo, cavolo cappuccio, cavolfiore, fagiolo, fagiolino, fava;
28 giorni per peperone;
60 giorni per pesco;
64 giorni per barbabietola da zucchero;
70 giorni per agrumi.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO R

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6185 del 15.1.85
® marchio registrato

SELECRON® S

Soluzione emulsionabile
Insetticida - Acaricida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
36,7 g profenofos puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE II

NOCIVO

Natura del rischio
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
È un insetticida con azione collaterale acaricida a rapido effetto iniziale. Viene assorbito dai tessuti fogliari, ove penetra rapidamente. Agisce per ingestione e per contatto principalmente contro lepidotteri e afidi.

Campi di applicazione e dosi di impiego

Barbabietola da zucchero: 1,5-1,8 lt/ha contro afidi, Altica, Cleono, Lisso, nottue.

Patata: 1,5-1,8 lt/ha contro afidi, Dorifora, nottue.

Mais: 1,5-1,8 lt/ha contro nottue, Piralide ed altri insetti terricoli.

Colture floreali: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro afidi, aleurodidi, nottue, tortricidi (Bega del garofano), tripidi, acari.

Melo (solo in pre-fioritura): 0,125-0,18% (125-180 cc/hl) contro afidi e tortricidi.

Pioppo: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro afidi, crisomelidi, Sesamia; 0,4-0,6% (400-600 cc/hl) contro Saperda, Punteruolo, Rodilegno nei trattamenti estivi.

Agrumi: 0,12% (120 cc/hl) contro Tignola (Prays citri) nei trattamenti primaverili.

Pesco: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro afidi (Myzus p., Hyalopterus), cocciniglie, Anarsia, Cidia nei trattamenti primaverili-estivi.

Peperone: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro afidi (Myzus p.), Dorifora e nottue.

Fagiolo / fagiolino / fava: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro Afide nero.

Carciofo: 0,1-0,12% (100-120 cc/hl) contro afidi, nottue, Cassida, Punteruolo.

Cavolo cappuccio / cavolfiore: 0,1-0,12 (100-120 cc/hl) contro Mamestra, afidi, nottue.

Il prodotto alle dosi d'impiego svolge una buona attività acaricida contro Panonychus ulmi, Tetranychus urticae (Ragnetto rosso e giallo).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione spiccatamente alcalina.
- Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed bestiame.

Sospendere i trattamenti prima del raccolto:
14 giorni per patate;
19 giorni per mais;
21 giorni per carciofo, cavolo cappuccio, cavolfiore, fagiolo, fagiolino, fava;
28 giorni per peperone;
60 giorni per pesco;
64 giorni per barbabietola da zucchero;
70 giorni per agrumi.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO R

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SCHERING, Nova Milanese (MI)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6185 del 15-1-1985
® marchio registrato

SELECRON® E

Soluzione emulsionabile
Insetticida - Acaricida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
44,2 g profenofos puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE II

NOCIVO

Natura del rischio:
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
È un insetticida con azione collaterale acaricida a rapido effetto iniziale. Viene assorbito dai tessuti fogliari, ove penetra rapidamente. Agisce per ingestione e per contatto principalmente contro lepidotteri e afidi.

Campi di applicazione e dosi di impiego

Barbabietola da zucchero: 1-1,5 lt/ha contro afidi, Altica, Cleono, Lisso, nottue.

Patata: 1-1,5 lt/ha contro afidi, Dorifora, nottue.

Mais: 1-1,5 lt/ha contro nottue, Piralide ed altri insetti terricoli.

Colture floreali: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro afidi, aleurodidi, nottue, tortricidi (Bega del garofano), tripidi, acari.

Melo (solo in pre-fioritura): contro afidi e tortricidi 0,1-0,15% (100-150 cc/hl).

Pioppo: contro afidi, crisomelidi, Sesamia 0,1-0,12% (100-120 cc/hl); contro Saperda, Punteruolo, Rodilegno nei trattamenti estivi 0,3-0,5% (300-500 cc/hl).

Agrumi: contro Tignola (Prays citri) e afidi nei trattamenti primaverili 0,1% (100 cc/hl).

Pesco: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro afidi (Myzus p., Hyalopterus), cocciniglie, Anarsia, Cidia nei trattamenti primaverili-estivi.

Peperone: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro afidi (Myzus p.), Dorifora e nottue.

Fagiolo / fagiolino / fava: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro Afide nero.

Carciofo: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro afidi, nottue, Cassida, Punteruolo.

Cavolo cappuccio/cavolfiore: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro Mamestra, afidi, nottue, Cavolaia.

Il prodotto alle dosi d'impiego svolge una buona attività acaricida contro: Panonychus ulmi, Tetranychus urticae (Ragnetto rosso e giallo).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione spiccatamente alcalina.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed bestiame.

Sospendere i trattamenti prima del raccolto:
14 giorni per patate;
19 giorni per mais;
21 giorni per carciofo, cavolo cappuccio, cavolfiore, fagiolo, fagiolino, fava;
28 giorni per peperone;
60 giorni per pesco;
64 giorni per barbabietola da zucchero;
70 giorni per agrumi.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO R

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SIPCAM, Salerano s/Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6186 del 15.1.1985
● marchio registrato

SELECRON® E

Soluzione emulsionabile
Insetticida - Acaricida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
44,2 g profenofos puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE II

NOCIVO

Natura del rischio:
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
È un insetticida con azione collaterale acaricida a rapido effetto iniziale. Viene assorbito dai tessuti fogliari, ove penetra rapidamente. Agisce per ingestione e per contatto principalmente contro lepidotteri e afidi.

Campi di applicazione e dosi di impiego

Barbabietola da zucchero: 1-1,5 lt/ha contro afidi, Altica, Cleono, Lisso, nottue.

Patata: 1-1,5 lt/ha contro afidi, Dorifora, nottue.

Mais: 1-1,5 lt/ha contro nottue, Piralide ed altri insetti terricoli.

Colture floreali: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro afidi, aleurodidi, nottue, tortricidi (Bega del garofano), tripidi, acari.

Melo (solo in pre-fioritura): contro afidi e tortricidi 0,1-0,15% (100-150 cc/hl).

Pioppo: contro afidi, crisomelidi, Sesamia 0,1-0,12% (100-120 cc/hl); contro Saperda, Punteruolo, Rodilegno nei trattamenti estivi 0,3-0,5% (300-500 cc/hl).

Agrumi: contro Tignola (Prays citri) e afidi nei trattamenti primaverili 0,1% (100 cc/hl).

Pesco: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro afidi (Myzus p., Hyalopterus), cocciniglie, Anarsia, Cidia nei trattamenti primaverili-estivi.

Peperone: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro afidi (Myzus p.), Dorifora e nottue.

Fagiolo / fagiolino / fava: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro Afide nero.

Carciofo: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro afidi, nottue, Cassida, Punteruolo.

Cavolo cappuccio/cavolfiore: 0,08-0,1% (80-100 cc/hl) contro Mamestra, afidi, nottue, Cavolaia.

Il prodotto alle dosi d'impiego svolge una buona attività acaricida contro: Panonychus ulmi, Tetranychus urticae (Ragnetto rosso e giallo).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione spiccatamente alcalina.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed bestiame.

Sospendere i trattamenti prima del raccolto:
14 giorni per patate;
19 giorni per mais;
21 giorni per carciofo, cavolo cappuccio, cavolfiore, fagiolo, fagiolino, fava;
28 giorni per peperone;
60 giorni per pesco;
64 giorni per barbabietola da zucchero;
70 giorni per agrumi.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO R

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6186 del 15.1.85
● marchio registrato

6187

A G I B E R

Acido Gibberellico in compresse

COMPOSIZIONE

– Acido Gibberellico (GA_3) puro	g 9
– Inerti, disperdenti, bagnanti	q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

– *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici*
– *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua*
– *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone*

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

L'**ACIDO GIBBERELLICO** è un fitoregolatore, presente come ormone naturale nelle piante, che applicato su esse determina numerosi effetti: stimolo accrescimento; interruzione dormienza gemme, semi, bulbi, tuberi, stimolo fioritura ed allegagione (partenocarpia), stimolo germinazione semi ed induzione di alfa-amilasi in quelli di orzo; riduzione delle esigenze in freddo delle colture, rallentamento dei fenomeni di senescenza di fiori, foglie e frutti.
AGIBER, essendo un fitoregolatore, è influenzato nella sua azione dai fattori ambientali, dallo stato nutrizionale e sanitario della coltura, dalla varietà, motivo per cui sono opportuni saggi preliminari per valutarne la rispondenza nelle condizioni in cui si opera
Il prodotto è formulato in compresse effervescenti da 10 grammi contenenti ciascuna 1 grammo di Acido Gibberellico tecnico.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

	compresse/hl d'acqua
PERO	
Per favorire l'allegagione e la partenocarpia	
Trattare quando il 20-30% dei fiori è aperto:	1-2
Le varietà che reagiscono positivamente sono: Butirra Giffard, Coscia, Trionfo di Vienna, Conference, William, Spadona, Buona Luisa d'Avranches, Passacrassana, Kaiser	
Si sconsiglia l'impiego su Decana del Comizio e Abate	
Per ridurre i danni da gelo	
Trattare entro le 48 ore successive alla gelata	1,5-2,5
VITE	
Per aumentare la dimensione delle bacche e ridurre l'acinellatura (uve senza semi)	
Trattare subito dopo la fioritura	0,5-1
AGRUMI	
Per favorire l'allegagione (Clementine)	
Trattare in piena fioritura	1
Per ritardare la maturazione, la cascola ed i fenomeni di senescenza della buccia	
Su arancio, trattare dopo l'invaiatura, con frutti di colore "commerciabile"	0,5-1
Su limone, trattare poco prima dell'inizio invaiatura	0,5-1
CARCIOFO	
Per anticipare e concentrare lo sviluppo dei capolini	
Due trattamenti, il primo alla comparsa del capolino centrale ed il secondo 15-20 giorni dopo, oppure subito dopo la prima raccolta	1-2
Su coltivazioni non forzate è consigliabile eseguire due trattamenti, di cui il primo a 40-60 giorni dall'epoca prevista di raccolta del "cimarolo" ed il secondo trascorsi 20 giorni	1-2
Le varietà che reagiscono positivamente sono: Carciofo di Mola, Masedu, Violetto di Provenza, Castellammare, Carciofo di ogni mese, Spinoso sardo	
FRAGOLA	
Per stimolare la fioritura, anticipare e concentrare la maturazione	
Trattare 4-6 settimane prima della fioritura	2-3
Le varietà che reagiscono positivamente sono: Pocahontas, Gorella, Tioga, Cambridge Favouriten, Redgauntlet	
SPECIE FLORICOLE IN PIENO CAMPO (crisantemo, ciclamino, anemone, ortensia, fiordaliso)	
Per stimolare e uniformare la fioritura e per allungare lo stelo	
Trattamenti ripetuti, a distanza di 20-30 giorni, dalla fase di bocciolo	1-2

MODALITÀ D'USO: Le compresse sono solubili in acqua, la soluzione si prepara sciogliendole prima in poca acqua fredda e successivamente nel quantitativo totale richiesto. La soluzione va impiegata immediatamente dopo la preparazione.

AVVERTENZE: Distribuire la soluzione finemente nebulizzata ed operare nel tardo pomeriggio. Nei carciofeti trattati con **AGIBER** è opportuno irrigare prima o subito dopo l'irrorazione ed aumentare adeguatamente la concimazione, nelle zone soggette a gelate frequenti, l'impiego del fitoregolatore deve essere anticipato o posticipato rispetto al periodo di freddo. Su fragola in pieno campo, l'impiego è sconsigliato nelle zone con forti abbassamenti di temperatura. In caso di trattamenti ripetuti usare la dose inferiore di prodotto
Le compresse di **AGIBER** vanno conservate in luogo asciutto e nella confezione originale ben chiusa, ad una temperatura non superiore ai 30°C.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il prodotto deve essere impiegato da solo

FITOTOSSICITÀ: Non trattare piante malate o deperite.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di produzione SIAPA S.p.A.
Stabilimento di S. Vincenzo di Galliera (BO)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6187 —24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO gr. 100 in compresse da 10 gr.**

6188

DINOSEB RUMIANCA

Diserbante selettivo per alcune colture erbacee, orticole floricole

COMPOSIZIONE

– g. 100 di prodotto contengono:

– Dinoseb puro	g 28,5
– Emulsionanti e solventi Contiene xilolo	q.b. a g 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischi di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Evitare di respirarne i vapori.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.**
- **Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**
- **Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).**
- **In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE: Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psico motoria - tachicardia - dispnea - notevole ipertermia - colorazione gialla delle sclere - la morte consegue ad edema cerebrale o paralisi respiratoria e circolatoria.
CONSIGLI TERAPEUTICI: Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sopsettano lesioni dell'esofago, molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale. È controindicata l'atropina.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **DINOSEB RUMIANCA** è un diserbante che trova applicazione in pre e post-emergenza per il diserbo selettivo di molte colture erbacee, ortive e floricole. Agisce per contatto su infestanti dicotiledoni già presenti, purchè ai primissimi stadi di sviluppo (2-3° foglia vera) quali: stellaria, persicaria, ortica, erba morella, veronica, matricaria, farinaccio, amaranti. Alle dosi più elevate è attivo nei confronti dei germinelli delle infestanti che vengono colpite prima della loro emergenza.
Si giova, per ottenere i migliori risultati, di temperature intorno a 20-25°C; nel caso di temperature inferiori si consiglia di impiegare le dosi massime sotto consigliate.
Distribuire il prodotto con 250-300 litri di acqua per ettaro.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FAGIOLO: – pre-emergenza	**21-24 litri/ha**
– post-emergenza quando la coltura ha differenziato le prime 2 foglie vere, trattando possibilmente verso il tardo pomeriggio	**9-14 litri/ha**
PISELLO: – alla formazione del primo palco fogliare del pisello fino a quando le piantine sono alte 7-8 cm, trattando verso il tardo pomeriggio	**5-7 litri/ha**
ARACHIDE: – pre-emergenza	**15-20 litri/ha**
post-emergenza, con piantine alte 5 cm	**7-10 litri/ha**
MAIS: – pre-emergenza	**22-24 litri/ha**
PATATA: – pre-emergenza della coltura	**10-15 litri/ha**
MELO, PERO e DRUPACEE: – trattando in primavera dopo una lavorazione del terreno con infestanti in fase di plantula:	**20-25 litri/ha**
BULBOSE DA FIORE (Giacinto, Giglio, Iris) – pre-emergenza della coltura	**20-25 litri/ha**
MEDICA: – nei medicai di 1 anno trattare in primavera quando la medica ha differenziato almeno 2 foglie trilobate.	**3-5 litri/ha**
nei medicai di 2 o più anni, prima della ripresa vegetativa	**7-10 litri/ha**
CARCIOFO: – prima della ripresa vegetativa della coltura	**6-8 litri/ha**

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Non usare il **DINOSEB RUMIANCA** in miscela con altri prodotti.

FITOTOSSICITÀ: Eseguire il trattamento in giornate prive di vento onde evitare che la nube diserbante venga a contatto di colture sensibili (bietola, colza, vite, fruttiferi). Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO
Officina di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6188 **del** 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

6189

OMETOATO RUMIANCA

Fosforganico ad azione insetticida e collaterale acaricida

COMPOSIZIONE

– Ometoato puro	g 50
– Solventi, emulsionanti	q.b. a g 100

Contiene glicole etilenico monoetiletere

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
– Conservare la confezione ben chiusa.
– Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
– Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
– Evitare di respirarne i vapori.
– Non operare contro vento.
– Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
– Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
– Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
– Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva)
– In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO. In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di Ossime come Toscogonin, Protopam Chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

OMETOATO RUMIANCA è un fosforganigo sistemico attivo per contatto ed ingestione. Il prodotto si applica in frutticoltura, viticoltura, agrumicoltura, floricoltura, contro Afidi, Cemiostoma, Tripidi, Cicaline ed anche contro Carpocapsa, Ricamatrici del melo, Antonomo del melo, Cemiostoma, Tignole della vite, Maggiolino, Cocciniglie degli agrumi. È altresì efficace nei confronti di Acari rossi e gialli e di Eriofidi.
OMETOATO RUMIANCA non determina l'insorgere di rugginosità, anche in cultivar di melo notoriamente sensibili (Golden Delicious). Per la caratteristica di sistemicità e l'azione contro gli Acari, **OMETOATO RUMIANCA** trova impiego nei calendari di lotta guidata.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

	cc/hl d'acqua
Frutticoltura (melo, pero, pesco)	
Afidi, alla comparsa degli insetti	**50-70**
Cicaline, Cemiostoma, Carpocapsa, Antonomo e Ricamatrici del melo	**100-150**
Acari rossi e gialli, Eriofidi	**120-150**
Agrumicoltura (arancio, mandarino, clementine, limone)	
Cocciniglie, Acari gialli	**100-150**
Floricoltura in pieno campo (rosa, crisantemo, garofano, gladiolo, azalea)	
Tripidi, Afidi, Acari rossi e gialli	**100-150**

L'aggiunta di Tetradifon, alla dose di **150-200 cc/hl**, accentua l'azione di **OMETOATO RUMIANCA** nei confronti delle uova di Acari.
Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': OMETOATO RUMIANCA può essere miscelato con la generalità degli antiparassitari purchè non alcalini, in particolare evitare le miscele con poltiglia bordolese, polisolfuri, calce idrata.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6189 **del** 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

6190

TRITICON LIQUIDO

Diserbante selettivo per il frumento e cereali minori

COMPOSIZIONE

– Chlortoluron puro . . . . g 42
– Emulsionanti, sospensivanti . . . . q.b. a g 100
– Contiene Glicole Etilenico

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

TRITICON LIQUIDO è un erbicida di pre e post-emergenza selettivo su frumento, orzo e cereali minori. Attivo sia per via radicale che per via fogliare, il prodotto controlla infestanti annuali, graminacee ed a foglia larga quali Alopecurus, Apera, Chenopodium, Galeopsis, Lamium, Matricaria, Mercurialis, Polygonum.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

– Pre-emergenza
Si consiglia il trattamento in questo periodo per controllare soprattutto le infestanti graminacee (Alopecurus, Apera, Avena fatua, Lolium, Capsella).
Dose d'impiego: **4-5 kg/ha in circa 400-600 litri d'acqua**
L'intervento con **TRITICON LIQUIDO** si effettua dopo la semina e comunque sempre prima dell'emergenza della coltura.
Si consiglia di preparare accuratamente il terreno in modo che si presenti ben livellato e sminuzzato; dove è possibile è preferibile rullare dopo la semina e prima del trattamento.

– Post-emergenza
Intervenire a fine inverno, verso febbraio-marzo, quando il frumento si trova ad uno stadio di sviluppo compreso tra la 4ª foglia e l'inizio dell'accestimento. È necessario altresì che le infestanti non abbiano superato la 4ª-5ª foglia.
Dose d'impiego: **2,5-3 kg/ha con 600-1000 litri di acqua**

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSOCITÀ: È sconsigliabile l'impiego di **TRITICON LIQUIDO** sia sui terreni sabbiosi sia su quelli ove di norma si possono formare ristagni d'acqua, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di fitotossicità. Evitare di intervenire in post-emergenza con temperature elevate. Non trattare sulla varietà di frumento Demar 4 e su varietà di frumento duro e orzi polistici, notoriamente sensibili ai derivati ureici.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO
Officine di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6190 del 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO PESO Kg.

6191

MILDIN® LIQUIDO

Fungicida a base di Folpet

® Marchio registrato RUMIANCA S.p.A.

COMPOSIZIONE

– Folpet puro . . . . g 40

– Disperdenti, solventi, emulsionanti . . . . q.b. a g 100
Contiene glicole elitenico

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
TERAPIA: Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **MILDIN LIQUIDO** è un fungicida organico a base di Folpet indicato nella lotta contro la Peronosfora e la Muffa grigia della vite, Alternariosi, Antracnosi, Botrite, Peronospora, Septoriosi, Ticchiolatura di colture orticole e floricole. Il **MILDIN LIQUIDO** trova inoltre applicazione per combattere la Muffa grigia e la Vaiolatura della fragola.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

VITE: Contro: Peronospora della vite (Plasmopara viticola) e, parzialmente, Muffa grigia dell'uva (Botrytis cinerea) **0,25-0,35% (g 250-350 per hl di acqua)**
Contro: Peronosfora della vite (Plasmopara viticola) e, parzialmete, Muffa grigia dell'uva (Botrytis cinerea)
Il prodotto si applica normalmente a cominciare dalla fine della fioritura (con petali appena staccati), intercalando con i prodotti antiperonosporici tradizionali, contro la Peronospora e la Muffa grigia. Gli interventi vanno poi ripetuti in base alla frequenza delle piogge.
Su uve da vino interrompere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto al fine di evitare azioni negative sulla fermentazione dei mosti.
COLTURE ORTICOLE E FLOREALI: 0,2-0,3% (g 200-300 per hl di acqua)
- Fragola contro: Muffa grigia e Vaiolatura
- Pomodoro e Patata contro: Peronospora, Alternariosi
- Carota contro: Cercosporiosi e Septoriosi
- Cucurbitacee (zucchino, melone, anguria) Contro Antracnosi
- Crisantemo contro: Septoriosi
- Tulipano, Gladiolo, Giacinto contro: Marciumi da Botrytis, Penicillium
- Rosa contro: Ticchiolatura e Peronospora

Effettuare trattamenti preventivi iniziando sin dalle prime fasi vegetative delle colture e continuando secondo l'andamento e la gravità delle infezioni.
DISINFEZIONE DEI BULBI E DEI TUBERI: 1,5% (kg 1,5 per hl di acqua)
Immergere i bulbi, prima dell'impianto, in una soluzione tenendoveli per una ventina di minuti, quindi toglierli, farli asciugare e porli a dimora.

DISINFEZIONE DELLE BARBATELLE: contro marciumi da: Botrytis, Rhizoctonia, Sclerotinia, Phitopthora. Immergere le barbatelle per 20 minuti in una soluzione contenente 400 g di **MILDIN LIQUIDO** in 100 litri d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il MILDIN LIQUIDO è compatibile con la quasi totalità degli antiparassitari purchè a reazione neutra o debolmente acida. Non è miscibile con prodotti alcalini (Poltiglia bordolese, Polisolfuri), con olii e con zolfi. Nell'esecuzione dei trattamenti, occorre distanziare di almeno 20 giorni le applicazioni di **MILDIN LIQUIDO** da quelle con olii e zolfi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto e 40 giorni prima della vendemmia per le uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S.p.A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6191 del 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

ANTIDROP

Fitoregolatore per prevenire la cascola pre-raccolta delle mele e delle pere

COMPOSIZIONE

NAA puro (sotto forma di sale sodico)	g 2,5
– Diclorprop puro (sotto forma di sale trietanolaminico)	g 1,5
– Emulsionanti, solventi	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

CONSIGLI TERAPEUTICI Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatiti.

CONTROINDICAZIONI. È sconsigliata la digitale.

AVVERTENZA. Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

ANTIDROP è un fitoregolatore auxinico che, distribuito sulle piante in prossimità della maturazione dei frutti, previene ed arresta la cascola naturale pre-raccolta delle mele e delle pere. I principi attivi contenuti nel prodotto permettono di esplicare sia un effetto pronto sia un'azione prolungata nel tempo. **ANTIDROP** si impiega su tutte le varietà di melo e pero ed in particolare su quelle notoriamente soggette alla cascola pre-raccolta: Delicious rosse, Renetta del Canadà, Granny Smith, Stayman Winesap; Abate Fetel, Kaiser, Butirra Clairgeau, Passa Crassana. **ANTIDROP**, essendo un fitoregolatore, è influenzato nella sua azione dai fattori ambientali (temperatura, umidità); dallo stato della coltura (nutrizionale, sanitario); dalla varietà.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

	cc/hl d'acqua
Varietà a maturazione media e tardiva	
Trattare 20-25 giorni prima della raccolta	
– melo	80-100
– pero	80-90

Avvertenze. Operare nelle ore meno calde della giornata. Non superare le dosi indicate, quelle minori si riferiscono a trattamenti effettuati con temperature superiori a 20°C. Una pioggia che intervenga 6 ore dopo il trattamento non ne pregiudica l'efficacia. Bagnare in modo uniforme il fogliame ed i frutti. Trattare piante sane con l'apparato fogliare non danneggiato da parassiti: in questi casi l'assorbimento del fitoregolatore viene ridotto. Per la raccolta servirsi dei normali indici di maturazione, tenedo presente che il fitoregolatore accellera il fenomeno.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il prodotto deve essere impiegato da solo.

FITOTOSSOCITÀ: Non applicare il prodotto su piante malate o deperite
Il prodotto può danneggiare colture sensibile quali vite, alberi da frutta, ortaggi, ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: SARIAF S.p.A.
Stabilimento di Faenza - Ravenna
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6198 **del** 15.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

6193

FRUITONE® ANTICASCOLA

Fitoregolatore per prevenire la cascola pre-raccolta delle mele e delle pere

® Marchio registrato UNION CARDIBE, N.Y. (U.S.A.)

COMPOSIZIONE

– 2,4-DP puro (sotto forma di sale trietanolaminico)	g 3,18
– Solventi	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.*
- *Conservare la confezione ben chiusa.*
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
- *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
- *Non operare contro vento.*
- *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE: Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione striale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

CONSIGLI TERAPEUTICI: Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

CONTROINDICAZIONI: È sconsigliata la digitale.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **FRUITONE ANTICASCOLA** è un fitoregolatore auxinico che, distribuito sulle piante in prossimità della maturazione dei frutti, previene ed arresta la cascola naturale pre-raccolta delle mele e delle pere. Il **FRUITONE ANTICASCOLA** si impiega su tutte le varietà di melo e pero ed in particolare su quelle notoriamente soggette alla cascola pre-raccolta: Delicious rosse, Renetta del Canadà, Granny Smith, Stayman Winesap, Abate Fétel, Kaiser, Butirra Clairgeau, Passa Crassana. Determina un anticipo di maturazione (da 2 a 4 giorni) ed accentua la colorazione dei frutti. Trova impiego anche su pesco per ottenere una maggiore colorazione ed un anticipo di maturazione.
Il **FRUITONE ANTICASCOLA**, essendo un fitoregolatore, è influenzato nella sua azione dai fattori ambientali (temperatura, umidità): dallo stato della coltura (nutrizionale, sanitario); dalla varietà.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

Melo e pero	cc/hl d'acqua
Varietà a maturazione media e tardiva	
Trattare 20-25 giorni prima della raccolta	100-120
Su Kaiser impiegare	80-100
Su Passa Crassana per contrastare la cascola agostana	50-70
Pesco	
Trattare 20-25 giorni prima della raccolta	60-70

AVVERTENZE

Operare nelle ore meno calde della giornata. Non superare le dosi indicate: quelle minori si riferiscono a trattamenti effettuati con temperature superiori a 20°C. Una pioggia che intervenga 6 ore dopo il trattamento non ne pregiudica l'efficacia. Bagnare in modo uniforme il fogliame ed i frutti. Trattare piante sane con l'apparato fogliare non danneggiato da parassiti: in questi casi l'assorbimento del fitoregolatore viene ridotto. Per la raccolta servirsi dei normali indici di maturazione, tenendo presente che il fitoregolatore accelera il fenomeno. Nel caso in cui, per accentuare ancor più la colorazione, si impiegasse l'**ETHREL** in aggiunta al **FRUITONE ANTICASCOLA**, l'anticipo di maturazione sarebbe maggiore e tale - per garantirsi una perfetta conservabilità - da non permettere ritardi nell'inizio della raccolta dei frutti. Per l'uso dell'**ETHREL** su melo si rimanda all'etichetta specifica.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il prodotto deve essere impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ: Non trattare piante malate o deperite.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e d agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO
Officina di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6193 del 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO VOLUME LITRI

619

RUMEFOS E.C.

Insetticida liquido emulsionabile a base di Piretro e Triclorfon

COMPOSIZIONE

– Estratto di piretro puro	g 2
– Piperonil butossido puro	g 6.4
– Triclorfon puro	g 29.1
– Solventi, emulsionanti	q.b. a g 100

"CONTIENE XILOLO E ETILENGLICOL-MONOETILETERE"

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.*
- *Conservare la confezione ben chiusa.*
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
- *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
- *Non operare contro vento.*
- *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinazzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

RUMEFOS E.C. è un insetticida liquido emulsionabile a base di Piretro naturale e Triclorfon, che agisce per contatto, ingestione ed asfissia contro insetti parassiti delle colture. La presenza del Piretro garantisce un elevato potere abbattente. **RUMEFOS E.C.** si impiega contro numerosi insetti parassiti delle colture orticole, frutticole, floricole, foraggere

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

RUMEFOS E.C. si impiega in presenza dell'infestazione sulle colture, alle dosi, nelle epoche e contro i parassiti indicati.

	cc/hl d'acqua
VITE - Tignole, Eulia, Piralide, Cicaline, Nottue	200-300
MELO - Afidi, Carpocapsa, Tentredini	200-300
PERO - Psille, Afidi, Carpocapsa	200-300
PESCO - Tignole, Afidi	200-300
ORTICOLE - Cavolaia su cavolo, Afidi su patata; Nottue su cavolo, Dorifora su patata; Mosca della cipolla su cipolla, Mosca dell'aglio su aglio; Tripidi su cipolla e aglio	200-300
CEREALI (MAIS) - Afidi, Lema, Nottue, Tipule, Cimici, Barbichio	200-300
ORNAMENTALI in pieno campo - Afidi, Tripidi, Tentredini	200-300

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': RUMEFOS E.C. è compatibile con la generalità degli antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, Calce).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione SILIA S.p.A.
Stabilimento di Aprilia - Latina

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6194 **del** 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

6195

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
CONTROINDICAZIONI:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

ZOLTAN

Insetticida ad ampio spettro d'azione di utile impiego nella lotta guidata.

COMPOSIZIONE

– Fosalone puro	g 23,75
– Emulsionati, solventi	q.b. a g 100

CONTIENE XILOLO

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

Officina di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6195 del 24.1.1985

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

CARATTERISTICHE

Zoltan è un insetticida citotropico attivo per ingestione e, limitatamente al momento dell'irrorazione, per contatto. È caratterizzato da un'azione pronta e nel contempo persistente, grazie anche al suo potere translaminare che garantisce una notevole resistenza al dilavamento. **Zoltan** è efficace contro molti insetti: Afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia e Cidia del pesco, Tignole e Cicaline della vite, Altica, Cleono e Mosca della bietola, Dorifora della patata.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FRUTTIFERI

POMACEE	200-250 cc/hl
Carpocapsa, Cacoecia, Zeuzera, Antonomo, Oplocampa, Afidi - trattamenti ogni 10-15 giorni da metà maggio in poi	
DRUPACEE	200-250 cc/hl
Cidia, Anarsia del pesco dopo la caduta dei petali	
AGRUMI	200-250 cc/hl
Afidi	
VITE	200-250 cc/hl
Tignole, Cicaline trattamenti prima della fioritura, alla chiusura del grappolo, all'invaiatura	
COLTURE FLORICOLE in pieno campo	200-250 cc/hl
Afidi, Nottue, Bega del garofano, Aleurodidi, Tripidi, trattamenti delle infestazioni	
COLTURE INDUSTRIALI	
MAIS, PATATA	200-250 cc/hl
Afidi, Nottue, Piralide del mais, Dorifora della patata	
BIETICOLTURA	1,5-2 litri/ha
Altica della Bietola, alla comparsa degli insetti (iniziali erosioni delle piantine)	
Cleono	1,5-2 litri/ha
Trattamenti ad intervalli di 15 giorni dalla comparsa degli adulti. I trattamenti contro Cleono ed Altica permettono di controllare anche la Mosca.	
CEREALI	2 litri/ha
Afidi	

Trattare all'inizio della fioritura, quando sono presenti 5-10 Afidi per spiga. I trattamenti contro gli Afidi sono efficaci anche nei confronti di Cecidonidi e Lema. Le dosi sopra riportate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: ZOLTAN è compatibile con la generalità degli antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Per migliorare la compatibilità della formulazione liquida con **MICROZOLFO BAGNABILE** e **GUADENE (Dodina)**, aggiungere alla miscela **BAGIR**, bagnante-adesivo, 50 cc/hl.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

6196

F O N O F O S AnicAgricoltura

Insetticida microgranulare a base di Fonofos

COMPOSIZIONE

- Fonofos puro g 4.75
- Inerti granulari q.b. a g 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.*
- *Conservare la confezione ben chiusa.*
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
- *Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
- *Evitare di respirarne i vapori.*
- *Non operare contro vento.*
- *Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.*
- *Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*
- *Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

FONOFOS ANICAGRICOLTURA è un insetticida microgranulare, a base di Fonofos, efficace per contatto ed ingestione nei confronti di insetti terricoli parassiti delle diverse colture: Elateridi, larve di Maggiolino, Grillotalpa, Zabro gobbo, Tipule, Oziorrinco, Agrotidi.
FONOFOS ANICAGRICOLTURA è efficace anche contro miriapodi del genere Blaniulus e Scutigerella.
La formulazione granulare consente la distribuzione localizzata con microgranulatori su patata; per tutte le altre colture è conveniente procedere ad una applicazione in pieno campo.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FONOFOS ANICAGRICOLTURA si impiega a **60-80 kg/ha**
Sul terreno destinato a colture di carote
il prodotto si impiega almeno 3 mesi prima della semina a **60-80kg/ha**
Trattamenti localizzati
Patata nel solco di semina **15-20 kg/ha**
Se la distribuzione di **FONOFOS ANICAGRICOLTURA** è effettuata contemporaneamente alla distribuzione di concimi granulari, occorre conseguire una omogenea miscelazione dei componenti.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': FONOFOS ANICAGRICOLTURA è compatibile con la generalità degli antiparassitari formulati con supporti secchi o granulari. In particolare può essere miscelato con i fungicidi in polvere usati per la disinfezione del terreno. Si distribuisce inoltre unitamente ai concimi granulari in coincidenza delle concimazioni.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officine di Produzione SILIA S.p.A.
Stabilimento di Roma

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6196 **del** 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6197

ASTEN

Fitoregolatore anticascola per melo e pero

COMPOSIZIONE

– NAA puro (sotto forma di sale sodico)	g 4,2
– Solventi, emulsionanti Contiene etilcellosolve	q b a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

AVVERTENZA Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

ASTEN è un fitoregolatore auxinico che, inibisce la cascola naturale pre-raccolta delle mele e delle pere
ASTEN viene assorbito rapidamente e può esplicare l'effetto anticascola entro 1-2 giorni dalla somministrazione
L'effetto di **ASTEN** è influenzato dai fattori ambientali (temperatura, umidità) dallo stato nutrizionale, sanitario della coltura, dalla varietà

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

L'epoca di applicazione varia a seconda del periodo di maturazione dei frutti
Varietà a maturazione precoce
Trattare 8-9 giorni prima della raccolta
– melo 40-50 cc/hl
– pero 30-40 cc/hl
Varietà a maturazione medio-tardiva
Trattare 15-20 giorni prima della raccolta
– melo 80-100 cc/hl
– pero 80-90 cc/hl

Avvertenze. È consigliabile trattare nelle ore meno calde della giornata Attenersi alle dosi indicate, le minori si impiegano con temperature superiori ai 21-22°C Effettuare una seconda applicazione 8-10 giorni dalla prima se si verificasse una cascola Una pioggia 3-4 ore dopo il trattamento non ne diminuisce l'efficacia Bagnare in modo uniforme il fogliame ed i frutti Trattare piante con l'apparato fogliare in buone condizioni sanitarie tali da permettere il completo assorbimento del prodotto Per stabilire l'epoca di raccolta tenere presente che il fitoregolatore può accellerare leggermente la maturazione

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: il prodotto deve essere impiegato da solo

FITOTOSSICITÀ: Non trattare piante malate o con carenze nutrizionali

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: SARIAF S.p.A.
Stabilimento di Faenza - Ravenna

Registrazione del Ministero della Sanità n. ... del ...15.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

6198

DINOSEB ACETATO RUMIANCA

Diserbante selettivo per frumento, leguminose ed alcune colture orticole

COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:
– Dinoseb acetato puro . . . . g 37,6
– Emulsionanti e solventi . . . . q.b. a g 100
Contiene xilolo

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Evitare di respirarne i vapori.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle e gli occhi**
- **Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**
- **Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).**
- **In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.
SINTOMI D'INTOSSICAZIONE: Sudorazione - sete - nausea - spossatezza o agitazione psico motoria - tachicardia - dispnea - notevole ipertermia - colorazione gialla delle sclere - la morte consegue ad edema cerebrale o paralisi respiratoria e circolatoria.
CONSIGLI TERAPEUTICI: Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sopsettano lesioni dell'esofago, molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale. È controindicata l'atropina.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **DINOSEB-ACETATO RUMIANCA** è un diserbante selettivo che si applica in post-emergenza delle diverse colture (frumento, anche traseminato con leguminose foraggere, piselli, fragola, erba medica, cipolla) secondo le indicazioni più avanti riportate. Il prodotto è attivo contro infestanti dicotiledoni quali: Amaranto, Capsella, Fiordaliso, Farinaccio, Fumaria, Galinsoga, Persicaria, Erba morella, Stellaria, Veronica, Papavero, Camomilla, in fase di plantula al massimo fino allo stadio di 2-4 foglie vere.
I migliori effetti erbicidi si ottengono con temperature intorno a 20°C; se minori o addirittura prossime a 5°C, impiegare le dosi massime sotto consigliate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare verso il tardo pomeriggio o al massimo presto, in assenza di rugiada. Una pioggia che intervenga qualche ora dopo il trattamento non ne pregiudica l'effetto.
Distribuire il prodotto in 400-800 litri d'acqua per ettaro.

FRUMENTO: dalla 3° foglia vera sino all'inizio della levata	3,5-4 kg/ha
Se la coltura è consociata a medica o trifoglio:	
– trattare in prèsemina delle leguminose che possono essere già seminate 2 giorni dopo l'impiego del disebante	3,5-4 kg/ha
– ovvero da quando le leguminose hanno differenziato la prima foglia e fino alla terza foglia trifogliata	3,5-4 kg/ha
PISELLO: trattare quando le plantine sono alte 7-8 cm (3° palco fogliare) sino alla fioritura	3,5-4,5 kg/ha
FRAGOLA: trattare durante la stasi vegetativa prima del risveglio primaverile	3,5-5 kg/ha
ERBA MEDICA:	
– medicai di nuovo impianto: trattare quando la coltura ha differenziato almeno una foglia trifogliata	3,5-4,5 kg/ha
– medicai vecchi: trattare quando i germogli hanno un'altezza di 2-3 cm	3,5-4,5 kg/ha
CIPOLLA: trattare alla 2°-3° foglia vera	3,5-4 kg/ha
BULBOSE PRIMAVERILI DA FIORE: trattare dall'emergenza a quando le piantine sono alte 10 cm circa	4-6 kg/ha

Versare direttamente il prodotto nel serbatoio riempito di acqua purchè provvisto di agitatore; diversamente stemperarlo in poca acqua, versando la poltiglia così ottenuta nella rimanente quantità di acqua.

Da non applicarsi con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Non usare il **DINOSEB RUMIANCA** in miscela con altri prodotti

FITOTOSSICITÀ: Eseguire il trattamento in giornate prive di vento onde evitare che la nube diserbante venga a contatto di colture sensibili (bietola, colza, vite, fruttiferi). Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO
Officina di Produzione: SARIAF S.p.A.
Stabilimento di Faenza - Ravenna

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6198 — 15.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO **VOLUME LITRI**

6199

FENTER 10 M.G.

Insetticida microgranulare a base di Fenitrothion

COMPOSIZIONE

– Fenitrothion puro	g 9,5
– Inerti granulari	q b a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
– Conservare la confezione ben chiusa.
– Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
– Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
– Non operare contro vento.
– Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
– Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

FENTER 10 M.G. è un insetticida in formulazione microgranulare a base di Fenitrothion, efficace per contatto ed ingestione contro insetti terricoli parassiti delle colture Elateridi o Ferretti, larve di Maggiolino larve ed adulti di Oziorrinco, Nottue, Tipule, Bibionidi, larve di Mosche degli ortaggi in genere, Grillotalpa, Afidi radicicoli (Penfigini)
FENTER 10 M.G., grazie alla formulazione microgranulare, può essere distribuito sia a pieno campo sia localizzato sulla fila mediante microgranulatori e deve essere leggermente interrato

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

FENTER 10 M.G. si impiega sulle colture seguenti, alle dosi e nelle epoche indicate

	Trattamenti a pieno campo kg/ha	Trattamenti localizzati kg/ha
BARBABIETOLA al momento della preparazione del terreno dopo l'aratura e prima della semina	30-35	8-9
MAIS, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA al momento della preparazione del terreno dopo l'aratura	25-30	6-8
RISO al momento della preparazione delle camere, poco prima dell'immissione dell'acqua per la semina	35	8
TABACCO prima del trapianto	30-35	6-8
ORTICOLE prima della semina o del trapianto	30-35	7-8
PIOPPO a seconda dello sviluppo vegetativo delle piante	60-100	12-20
FLORICOLE prima della semina, del trapianto o della messa a dimora della talee radicate	25-30	5-7

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: FENTER 10 M.G. è compatibile con la generalità degli antiparassitari formulati con supporti secchi o granulari. In particolare può essere miscelato con fungicidi in polvere usati per la disinfezione del terreno Si distribuisce anche unitamente ai concimi granulari in coincidenza della concimazioni

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione SILIA S.p.A.
Stabilimento di Aprilia - Latina

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6199 **del** 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6200

FRUTTAL® M.G.

Insetticida microgranulare a base di Carbaryl

COMPOSIZIONE

– Carbaryl puro (esente da B-naftolo)	g 4,85
– Inerti granulari, adesivanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

– *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.*
– *Conservare la confezione ben chiusa.*
– *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
– *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
– *Non operare contro vento.*
– *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.*
– *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.

CONTROINDICAZIONI: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE

FRUTTAL M.G. è un insetticida microgranulare a base di Carbaryl, efficace per contatto ed ingestione contro insetti terricoli parassiti delle colture: Elateridi o Ferretti, larve di Maggiolino, larve ed adulti di Oziorrinco, Nottue, Tipule, Bibionidi, larve di Mosche degli ortaggi, Grillotalpa, Afidi radicicoli (Penfigini).
FRUTTAL M.G., grazie alla formulazione microgranulare, può essere distribuito sia a pieno campo, sia localizzato sulla fila mediante microgranulatori e deve essere leggermente interrato.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

FRUTTAL M.G. si impiega alle dosi, nelle epoche e sulle colture indicate:

	Trattamenti a pieno campo kg/ha	Trattamenti localizzati Kg/ha
BARBABIETOLA: al momento della preparazione del terreno dopo l'aratura e prima della semina	40-45	8-9
MAIS, ORZO, SEGALE, AVENA, FRUMENTO: al momento della preparazione del terreno dopo l'aratura	30-40	6-8
RISO: al momento della preparazione delle camere, poco prima dell'immissione dell'acqua per la semina	40	8
TABACCO: prima del trapianto	30-40	6-8
ORTICOLE: prima della semina o del trapianto	35-40	7-8
COLTURE FORESTALI: a seconda dello sviluppo vegetativo delle piante	60-100	12-20
FLORICOLE: prima della semina, del trapianto o della messa a dimora delle talee radicate	25-35	5-7

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': FRUTTAL M.G. è compatibile con la generalità degli antiparassitari formulati con supporti secchi o granulari. In particolare può essere miscelato con i fungicidi in polvere usati per la disinfezione del terreno. Si distribuisce anche unitamente ai concimi granulari in coincidenza delle concimazioni.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: FRUTTAL M.G. è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di produzione: SARIAF S.p.A.
Stabilimento di Faenza (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6200 del 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG.**

6201

Acaricida adulcicida-ovicida in polvere bagnabile del melo, pero, colture floricole ed ornamentali in pieno campo.

COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono

– Ciexatin puro	g 11,87
– Tetradifon puro	g 7,2
– Inerti, bagnanti, sospensivanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo

SINTOMATOLOGIA TOSSICA - Ingestione nausea, vomito, diarrea o stipsi
Crampi addominali localizzati alla fossa iliaca destra. Interessamento del sistema nervoso centrale cefalea occipitale continua o parossistica, vertigini, disturbi auricolari e visivi acufeni, diplopia Turbe psichiche, convulsioni, paresi vescicale, paresi dei muscoli oculo-motori, arresto respiratorio da paralisi dei muscoli respiratori Inalazione tosse, dispnea, possibile sintomatologia sistemica per inalazione prolungata Contatto cute dermatite, ustioni

CONSIGLI TERAPEUTICI Lavanda gastrica con carbone vegetale Somministrazione di protettori delle mucose a base di sali o gel di alluminio Purgante salino (25 g di solfato di sodio) Assistenza respiratoria Applicazione di catetere vescicale (per ritenzione urinaria) Controllo dei parametri cardio-circolatori e dell'equilibrio idro-elettrolitico Terapia sintomatica

CONTROINDICAZIONI I grassi per la liposolubilità del prodotto ne aumentano l'assorbimento

AVVERTENZA consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

L'**EXAKAR** è un acaricida risultato dalla miscela di due principi attivi ad azione sinergica e complementare Ciexatin e Tetradifon Il Ciexatin è infatti efficace per azione di contatto nei confronti delle forme mobili di acari (neanidi ed adulti), compresi i ceppi resistenti agli acaricidi tradizionali ed agli insetticidi fosforganici, mentre, alle dosi consigliate, è poco attivo nei confronti delle uova. Il Tetradifon esplica la sua attività per contatto contro le uova invernali di acari (purchè il trattamento venga effettuato alla schiusura delle stesse), le uova estive e le neanidi. Agisce altresì in modo indiretto sterilizzando le femmine, che depongono uova non vitali

Non condizionato nella sua efficacia da basse ed alte temperature, caratterizzato da rapida azione iniziale e lunga persistenza, l'**EXAKAR** può essere impiegato per tutta la stagione primaverile-estiva ed è attivo nei confronti di

- Ragnetto rosso del melo e del pero Panonychus (Metatetranychus) ulmi
- Ragnetto rosso comune o telario delle colture floricole e dei meli e peri Tetranychus urticae
- Acaro bruno Bryobia rubioculus
- Eriofide rugginoso del melo Aculus schlechtendali
- Eriofide rugginoso del pero Epitrimerus piri
- Eriofide galligeno del pero Eriophyes piri

L'**EXAKAR** limita, con trattamenti nel corso del mese di Giugno, le manifestazioni di brusone che compaiono, su certe varietà di pero (William, Kaiser, Decana del Comizio, Conference)

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattare alla prima comparsa degli acari 200/230 g/hl

Bagnare accuratamente le piante, eseguendo di preferenza il trattamento nelle tarde ore del pomeriggio, onde godere di un periodo più lungo di bagnatura

È opportuno aggiungere **BAGIR**, bagnante-adesivo, alla dose di 50 g/hl

Stemperare la quantità di prodotto necessario in poca acqua, mescolando con cura, sino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea. Versare quindi tale poltiglia nel quantitativo di acqua richiesto per il trattamento, mantenendo in funzione l'agitatore

Le dosi sopra consigliate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci fatta eccezione per quelli a reazione alcalina

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e pr evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6201 **del** 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg**

6202

LARVITOX M.G.

Insetticida microgranulare a base di Triclorfon

COMPOSIZIONE

– Triclorfon puro	g 9,7
– Inerti granulari	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.*
- *Conservare la confezione ben chiusa.*
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
- *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
- *Non operare contro vento.*
- *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenese di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenasa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

LARVITOX M.G. è un insetticida in formulazione microgranulare a base di Triclorfon, efficace per contatto ed ingestione contro insetti terricoli parassiti delle colture: Elateridi o Ferretti, larve di Maggiolino, larve ed adulti di Oziorrinco, Nottue, Tipule, Bibionidi, larve di Mosche degli ortaggi, Grillotalpa, Afidi radicicoli (Penfigini).
LARVITOX M.G., grazie alla formulazione microgranulare, può essere distribuito sia a pieno campo, sia localizzato sulla fila mediante microgranulatori e deve essere leggermente interrato.

EPOCRE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

LARVITOX M.G. si impiega sulle colture seguenti, alle dosi e nelle epoche indicate:

	Trattamenti a pieno campo kg/ha	Trattamenti localizzati kg/ha
BARBABIETOLA: al momento della preparazione del terreno dopo l'aratura e prima della semina	30-35	8-9
MAIS, ORZO, SEGALE, AVENA, FRUMENTO: al momento della preparazione del terreno dopo l'aratura	25-30	6-8
RISO: al momento della preparazione delle camere, poco prima dell'immissione dell'acqua per la semina	35	8
TABACCO: prima del trapianto	30-35	6-8
ORTICOLE: Cipolla, Sedano, Aglio, Cavolo, prima della semina o del trapianto	30-35	7-8
COLTURE FORESTALI: a seconda dello sviluppo vegetativo delle piante	60-100	12-20
FLORICOLE: In pieno campo o in serra prima della semina, del trapianto o della messa a dimora delle talee radicate	25-30	5-7

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: LARVITOX M.G. è compatibile con la generalità degli antiparassitari formulati con supporti secchi o granulari. In particolare può essere miscelato con fungicidi in polvere usati per la disinfezione del terreno. Si distribuisce anche unitamente ai concimi granulari in coincidenza delle concimazioni.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione SILIA S.p.A.
Stabilimento di Aprilia - Latina

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6202 del 24.1.1985

NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6203

LARVITOX 50

Insetticida efficace contro larve ed adulti di Ditteri e larve di Lepidotteri

COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:

– Triclorfon puro	g 48
– Inerti e disperdenti	q b a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

– *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.*
– *Conservare la confezione ben chiusa.*
– *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
– *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
– *Non operare contro vento.*
– *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.*
– *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per adulti 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **LARVITOX 50** è un insetticida a base di Triclorfon, efficace per contatto ed ingestione contro larve ed adulti di Ditteri e larve di Lepidotteri

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

– VITE Tignole e Tortrice, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CAVOLO, CIPOLLA, SEDANO, CAROTA, CILIEGIO mosca **150-250g/hl**
– PESCO: Cidia ed Anarsia; MELO: Eulia pulchellana, Ricamatrici, PISELLO, FRAGOLA Tortricidi, AGRUMI, OLIVO Tignola e Mosca, GAROFANO Bega, PIOPPO Criptorinco del pioppo, PINO Processionaria **250-400 g/hl**
– RISO. Coppette (Triops cancriformis), Chironomidi (Chironomus sp e Cricotopus sp), Idrocampo ed altri insetti delle risaie **1,2-1,4 kg/ha**
Dopo l'applicazione del **LARVITOX 50** si consiglia di mantenere il livello dell'acqua per 2 o 3 giorni non oltre 4-6 cm Di norma è sufficiente un solo trattamento.
– MAIS: Agrotidi, Tortricidi e la II° generazione della Piralide **3-3,3 kg/ha**
I trattamenti con **LARVITOX 50** vanno effettuati alla comparsa dei parassiti ed in caso di necessità ripetuti 2 o 3 volte alla distanza di 10-12 giorni l'uno dall'altro
Le dosi di impiego sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il **LARVITOX 50** è miscelabile con la generalità degli antiparassitari ad eccezione di quelli aventi reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione SILIA S.p.A.
Stabilimento di Aprilia - Latina
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6203 **del** 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

620

NOBILENE

FUNGICIDA POLIVALENTE A BASE DI FOLPET E CAPTAFOL

CLASSE IV

COMPOSIZIONE:

Folpet puro	g. 56
Captafol puro	g. 24
Coformulanti	q.b. a 100

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con i prodotti puri o diluiti ed anche di sollevare polveri nel maneggio dei prodotti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. - Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

TERAPIA: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE:

Il NOBILENE è un fungicida polivalente con capacità protettive, ad elevata persistenza con azione di contatto e penetrazione citotropica. In viticoltura il NOBILENE ha azione antiperonosporica e antibotritica. - Risulta inoltre efficace su melo e pero contro la Ticchiolatura, sul pesco contro Bolla e Corineo, sull'olivo contro occhio di pavone; su fragola contro Botrytis e vaiolatura e su ornamentali ed orticole (patata, melanzana, cipolla, pomodoro, lattuga e melone) contro Alternariosi, Botrite e Peronospora.

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO:

In **viticoltura**, secondo i normali calendari di intervento contro la peronospora e la botrite alla dose di 150/200 gr. in 100 litri di acqua.

In **frutticoltura** su melo e pero contro ticchiolatura gr. 150/100 litri di acqua; su pesco contro la bolla gr. 300 per 100 litri di acqua.

Olivicoltura: contro occhio di pavone gr. 200 per 100 litri di acqua.

Fragola: contro botrite e vaiolo gr. 250 per 100 litri di acqua; per coltura in serra gr. 150 per 100 litri di acqua.

In **orticoltura** (patata, melanzana, cipolla, pomodoro, lattuga, melone) contro Alternariosi, Botrite e Peronospora: 150/200 gr. per 100 litri di acqua per trattamenti fino a fine fioritura.

Piante ornamentali contro antracnosi, Alternariosi, Botrite: gr. 250 per 100 litri di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ:

Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:

E fitotossico su Pero: Butirra d'Anjou; Melo: da non usarsi dopo la fioritura perchè può manifestarsi fitotossicità.

NOCIVITÀ:

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni, sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero della Sanità n. 6204 del 24.1.1985

CHIMIBERG
BERGAMO

Prodotto nello Stabilimento DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (Bergamo)

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso kg.**

6205

A F I M O R

Insetticida selettivo ad azione specifica contro gli Afidi

COMPOSIZIONE

– Pirimicarb puro	g 23,75
– Disperdenti, bagnati, inerti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici*
- *Conservare la confezione ben chiusa.*
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
- *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
- *Non operare contro vento.*
- *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.

CONTROINDICAZIONI: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

AFIMOR è un insetticida contro tutti gli Afidi compresi quelli resistenti agli esteri fosforici
AFIMOR è particolarmente indicato nella lotta contro l'Afide verde del pesco (Myzus persicae) e l'Afide cenerognolo (Dysaphis plantaginea) e contro l'Afide nero (Aphis fabae) Il prodotto, con la sua azione prolungata e translaminare, riesce a colpire anche gli Afidi protetti dagli accartocciamenti fogliari

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il trattamento con **AFIMOR** va effettuato non appena si osservano i primi esemplari di Afidi, in modo da bloccare l'infestazione all'inizio

FRUTTICOLTURA (pesco, melo, pero, albicocco, susino, arancio, mandarino)

ORTAGGI IN SERRA ED IN PIENO CAMPO (melanzana, zucchino, pomodoro, cavolo, cocomero, fragola)

FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO (rosa, garofano, crisantemo)

COLTURE INDUSTRIALI (barbabietola da zucchero, tabacco, patata)

CEREALI (frumento, riso, mais)

La dose d'impiego è di **100-150 g/hl** d'acqua.
La lotta contro il Myzus persicae o Afide verde del pesco va preferibilmente iniziata a primavera, quando si notano le prime forme attere (senza ali) L'irrorazione con **AFIMOR** va eseguita con molta cura, in modo da bagnare bene anche la vegetazione nascosta Per ottenere migliori risultati si consiglia di distribuire non meno di 1000 litri di soluzione ad ettaro

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: AFIMOR è compatibile con la generalità degli anticrittogamici ed insetticidi È consigliabile tuttavia un saggio di miscelazione per verificare l'effettiva compatibilità dei coformulanti Non è miscibile con polisolfuri e poltiglia bordolese.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per animali domestici, pesci, bestiame ed insetti utili

Sospendere i trattamenti 14 giorni giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: SARIAF S.p.A.
Stabilimento di Faenza - Ravenna
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6205 **del** 15.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

CIDRAN 23/24

Diserbante ad azione residua per agrumi, fruttiferi ed arginelli di risaia

COMPOSIZIONE

- Clorprofam puro . . . . g 22,72
- Diuron puro . . . . g 23,28
- Inerti, bagnati, sospensivanti e disperdenti . . . . q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non magiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo(inibitore della colinesterasi)
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.
CONTROINDICAZIONI: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

CIDRAN 23/24 è un diserbante ad assorbimento radicale, contenente Clorprofam e Diuron, che agisce contro infestanti graminacee ed a foglia larga. Esplica la sua azione contro malerbe come Lolium spp., Echinochloa spp., Pea spp., Capsella bursa pastoris, Plantago spp., Polygonum aviculare, Stellaria media, Veronica persica, Sanchus arvensis che infestano impianti di agrumi, olivo, pero, melo, vite ed arginelli di risaia.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CIDRAN 23/24, per il suo particolare tipo di assorbimento, viene impiegato nei trattamenti primaverili prima dell'emergenza delle infestanti, dopo una lavorazione. Può essere altresì distribuito in autunno-inverno, durante il periodo di riposo vegetativo delle infestanti poliannuali (novembre-dicembre) allorquando piogge o precipitazioni nevose consentono un approfondimento del prodotto nel terreno e lo pongono nelle migliori condizioni di agire.
CIDRAN 23/24 si può applicare con le normali apparecchiature di distribuzione delle polveri bagnabili operando secondo le modalità usuali per questo tipo di formulazione. Il prodotto va stemperato in poca acqua rimestando in continuazione fino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea che va quindi versata nella quantità di acqua richiesta per il trattamento. Normalmente vanno applicati volumi di acqua di 600-800 litri per ettaro

Le dosi sotto riportate debbono essere proporzionalmente ridotte se il trattamento viene localizzato lungo i filari o nelle conche nel caso degli agrumi.

Agrumi, olivo, pero, melo

Trattare su impianti di almeno 4 anni a dosi di	**8-12 kg/ha**
Nei giovani impianti la dose va ridotta a	**6-8 kg/ha**

Viti

Trattare su vigneti di almeno 4 anni a dosi di	**6-10 kg/ha**
Nei giovani impianti ridurre la dose a	**4-5 kg/ha**

Arginelli di risaia

Trattare sugli argini appena costruiti quando le infestanti non sono ancora nate o sono in fase di limitato sviluppo alla dose di	**10-14 kg/ha**

Avvertenza. Nei terreni leggeri vanno sempre usate le dosi più basse. Si sconsiglia l'impiego di **CIDRAN 23/24** sia sui terreni sabbiosi sia su quelli dove si possono formare ristagni d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: CIDRAN 23/24 è compatibile con la generalità dei diserbanti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSOCITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Non contaminare mangimi ed acque pescose o destinate all'abbeveramento del bestiame. Evitare di immettere animali domestici e bestiame nelle zone trattate.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: CHEMIA S.p.A.
Stabilimento di S. Agostino - Ferrara

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6206 del 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6207

AKKRAN® CL

Acaricida

COMPOSIZIONE

– Ciexatin puro	g 11,5
– Bagnanti, disperdenti, inerti	q b a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.*
- *Conservare la confezione ben chiusa.*
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
- *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
- *Non operare contro vento.*
- *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE: Cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi.

CONSIGLI TERAPEUTICI: Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando - in relazione alla via di contaminazione - abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale. Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE

L'**AKKRAN CL** è un acaricida specifico, in polvere bagnabile, particolarmente efficace per il controllo delle forme mobili degli acari che infestano i frutteti di meli e di peri, i fiori in pieno campo o in serra rosa (non in serra) garofano, azalea, crisantemo, poinsettia L'**AKKRAN CL** agisce per contatto sia contro gli acari sensibili che contro quelli resistenti ai fosforganici ed ai cloroderivati comunemente impiegati come acaricidi specifici o come prodotti ad azione contro vari fitofagi Il prodotto, pur non possedendo una buona prontezza d'azione, ha in compenso un'ottima persistenza ed effetto residuo

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

L'**AKKRAN CL** si impiega a dosi di 160-240 g/hl, si usa la dose minore nel caso di lievi infestazioni e la dose maggiore quando la popolazione degli acari è numerosa. In ogni caso occorre aver cura di bagnare completamente le piante trattate, si consiglia inoltre, per aumentare l'efficacia dei trattamenti, di aggiungere alla miscela g 50 di BAGIR (bagnante-adesivante) Stemperare la dose di prodotto indicata in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea Versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto agitando ripetutamente Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume normale

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': L'**AKKRAN CL** è compatibile con la generalità degli antiparassitari È sconsigliabile la miscela con i polisolfuri di calcio e bario o con la poltiglia bordolese

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame Prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che accidentalmente o direttamente siano venuti a contatto con il formulato, occorre rispettare il periodo di carenza

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di produzione: SARIAF S.p.A.
Stabilimento di Faenza (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6207 **del** 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO KG.**

6208

LARVITOX 77

Insetticida efficace contro larve ed adulti di Ditteri e larve di Lepidotteri

COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:
– Triclorfon puro . . . . g 76,8
– Inerti e disperdenti . . . . q.b. a g 100

CLASSE II

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

– *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.*
– *Conservare la confezione ben chiusa.*
– *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
– *Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
– *Evitare di respirarne i vapori.*
– *Non operare contro vento.*
– *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.*
– *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*
– *Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).*
– *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI: Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **LARVITOX 77** è un insetticida a base di Triclorfon, efficace per contatto ed ingestione contro larve ed adulti di Ditteri e larve di Lepidotteri.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

– VITE: Tignole e Tortrice; BARBABIETOLA, CAVOLO, CIPOLLA, SEDANO, CILIEGIO: mosca **100-150 g/hl**

– PESCO: Cidia ed Anarsia; MELO: Eulia pulchellana, Rioamatrici
PISELLO, FRAGOLA: Tignole e Tortricidi; AGRUMI, OLIVO: Tignola e Mosca;
GAROFANO: Bega; PIOPPO: Criptorrinco; PINO: Processionana **150-250 g/hl**

– RISO: Coppette (Triops cancriformis), Chironomidi (Chironomus sp. e Cricotopus sp.), Idrocampo ed altri insetti delle risaie **0,8-0,9 kg/ha**

Dopo l'applicazione del **LARVITOX 77** si consiglia di mantenere il livello dell'acqua per 2 o 3 giorni non oltre 4-6 cm. Di norma è sufficiente un solo trattamento.

– MAIS: Agrotidi, Tortricidi e la II generazione della Piralide **2 kg/ha**

I trattamenti con **LARVITOX 77** vanno effettuati alla comparsa dei parassiti ed in caso di necessità ripetuti 2 o 3 volte alla distanza di 10-12 giorni l'uno dall'altro.
Le dosi di impiego sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il **LARVITOX 77** è miscelabile con la generalità degli antiparassitari ad eccezione di quelli aventi reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri).

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura S. p. A.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione SILIA S.p.A.
Stabilimento di Roma

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6208 **del** 24.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6209

MAZAQUAT

Erbicida liquido ad azione disseccante e residuale

COMPOSIZIONE: Simazina pura g 33,25, Paraquat puro (sotto forma di dicloruro) g 9, coformulanti quanto basta a 100.
Contiene glicole etilenico.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato, munito del patentino di cui allo art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, nr. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— evitare di respirarne i vapori;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
— durante la preparazione e l'impiego usare tute, maschere ed occhiali protettivi;
— dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro, cospargendole di calce viva);
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Attenzione: i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).
L'introduzione nell'organismo **anche di poche gocce** del prodotto può essere fatale: **non attendere la comparsa dei sintomi** per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perché sia praticata l'emodialisi.
Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.
Intossicazione per ingestione e per inalazione
I primi sintomi sono: epitassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola.
Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria.
Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato-renali.
L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria.
L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di Paraquat nel sangue.
Intossicazione per contatto
Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole.
Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta.
Terapia: sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di produzione S.I.L.I.A. S.p.A. - Roma

Registrazione n. 6209 del 31.1.85 del Ministero della Sanità

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

— **Diserbo totale o localizzato di vigneto, drupacee, pomacee, agrumeto, oliveto:** in impianti di età inferiore a 4-5 anni 3-5 kg/ha; in impianti di età superiore ai 5 anni 4-8 kg/ha. Impiegare la dose più elevata nei terreni ricchi di sostanza organica, quella minore nei terreni poveri. Il trattamento va eseguito una volta all'anno in autunno o inizio primavera.
— **Diserbo dell'asparago:** 3-5 kg/ha ad infestanti già emerse, ma prima dell'emissione dei turioni.
— **Diserbo della fragola:** trattare nell'interfila nei mesi di agosto-settembre, dopo l'impianto con irroratrici schermate per non irrorare le piantine di fragola, con 3-5 kg/ha.
— **Diserbo di viali di giardini:** 0,8-1 kg/ha in primavera.
— **Diserbo di argini, canali, aree non coltivate:** 8-10 kg/ha dopo l'emergenza delle infestanti.

Eseguire il trattamento con MAZAQUAT quando le infestanti hanno raggiunto l'altezza di 5-15 cm, possibilmente nel tardo pomeriggio o nelle ore serali poiché l'umidità notturna contribuisce alla completa diffusione del prodotto sulle diverse parti delle infestanti, migliorando l'azione disseccante. Qualche settimana dopo il trattamento, in mancanza di pioggia, è necessaria un'irrigazione per migliorare l'azione residuale.
Distribuire MAZAQUAT su tutta la superficie o localizzato sulla fila regolando la velocità in modo da distribuire, secondo il tipo di irroratrice, 300-800 l di acqua per ettaro, evitando che il prodotto venga a contatto con le parti verdi delle colture. Per questo scopo è utile impiegare appositi schermi di protezione assicurandosi che siano sufficientemente larghi e che non vengano direttamente raggiunti dal cono nebulizzato dagli ugelli.
Agitare bene la confezione di MAZAQUAT prima dell'impiego.
Diluire la dose di MAZAQUAT in poca acqua e versare poi nel serbatoio dell'irroratrice durante il riempimento.
Aggiungere sempre alla dose di MAZAQUAT del bagnante non ionico (ad esempio ADHESOL 20-40 g/hl o BAGNANTE ADESIVO EMELFA 10-20 cc/hl).

CARATTERISTICHE

MAZAQUAT è un erbicida costituito dall'associazione, nelle proporzioni ideali, di due principi attivi complementari. MAZAQUAT distrugge rapidamente le malerbe già sviluppate ed inoltre la sua azione si prolunga nel tempo impedendo per diversi mesi la levata delle infestanti.
Dato il tipo di azione la sua efficacia si estende a tutte le malerbe, anche quelle comunemente resistenti agli erbicidi residuali tradizionali. Inoltre la particolare formulazione liquida ne facilita al massimo l'impiego.
Il suo modo d'azione lo rende particolarmente adatto al diserbo di vigneti, frutteti, oliveti e agrumeti.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

Non si consigliano miscele.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non trattare su terreni sabbiosi. Evitare il contatto del liquido concentrato o diluito con altre colture ed assicurarsi che non si verifichi trasporto dell'erbicida per vento o scorrimento nei terreni contigui. I terreni trattati con l'erbicida non possono essere consociati ad altre colture (fagioli, zucche, cocomeri).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di sette mesi per il frumento e di almeno dodici mesi per le altre colture.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.684

kg

6210

CLASSE TERZA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ELIMINA ADULTI, LARVE E UOVA DEGLI ACARI CONCENTRATO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
gr. 100 di prodotto contengono:
Dicofol puro .... gr. 18
Tetradifon puro .... gr. 6
Solventi emulsionanti
quanto basta .... a 100
Contiene Xilolo

TECNICA
QUALITÀ

TECNITERRA s.r.l.

Antiparassitari - Fertilizzanti Idrosolubili

Uffici:
20129 MILANO - Via N. Bixio, 34
Sede Legale e Stabilimento:
SEGRATE (MI) Via Tiepolo, 9

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione: *vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.*

Consigli terapeutici: *intossicazione acuta, lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g. 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.*

Controindicazioni: *la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare l'adrenalina e l'efedrina.*

"AVVERTENZA" *consultare un centro antiveleni.*

Registrazione N. 6210 del Ministero della Sanità del 31.1.85

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO Kg. 1

Per la distruzione degli acari (ragnetti rossi e gialli) infestanti le colture arboree e erbacee.
Elimina adulti, larve e uova degli acari associando l'azione dei due principi attivi efficaci contro i diversi stadi biologici del parassiti.
Presenta efficacia residua. Può essere impiegato sulle seguenti colture: Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, Agrumi (arance, mandarini, limoni), Vite, Pomodoro, Colture floreali e ornamentali in pieno campo.

DOSI: gr. 250 in 100 litri di acqua.

MODALITÀ D'IMPIEGO: intervenire non appena si notano i primi adulti sulle foglie. In estate contro infestazioni già diffuse, ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni.
Sulla vite si raccomanda di eseguire il primo trattamento non appena i germogli hanno raggiunto la lunghezza di 10-15 cm.
Irrorare sempre accuratamente entrambe le pagine delle foglie.
Sciogliere la dose prescritta in poca acqua, indi agitando portare alla concentrazione voluta.

« Da non applicare con mezzi aerei ».

COMPATIBILITÀ: È compatibile con i comuni antiparassitari non alcalini e con gli integratori fogliari **IRRAL, IRRALFLOR.**

"AVVERTENZA" - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il prodotto è fitotossico per la melanzana.
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

6211

NOTAR® FLOWABLE

ANTICRITTOGAMICO MOLTO PERSISTENTE

Composizione: **IV CLASSE**

CLOROTALONIL puro . gr. 40,76

Coformulanti . . q. b. a gr. 100,00

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

CARATTERISTICHE: fungicida a largo spettro d'azione, dotato di persistenza e resistenza al dilavamento. Consente l'impiego contro più malattie.

Campi d'impiego, malattie combattute e dosi d'impiego:

— **VITE:**
cc. 200-250/hl per peronospora, escoriosi, marciume nero ed antracnosi
cc. 300-350/hl per la lotta specifica contro escoriosi, marciume nero, antracnosi, effettuare due trattamenti, rispettivamente: il primo a gemme rigonfie ed il secondo a 2-3 foglie. Per botrytis cc. 300/hl.

— **POMACEE:** per ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria, cancri rameali, marciume del colletto:
cc. 400/hl nei trattamenti invernali
cc. 200/hl nei trattamenti pre-florali
cc. 180-200/hl nei trattamenti post-florali

— **DRUPACEE:** per bolla, corineo, monilia, ruggine, cancri rameali:
cc. 350-400/hl nei trattamenti invernali
cc. 250-300/hl nei trattamenti pre-florali e post-florali

— **AGRUMI:** per allupatura, antracnosi, fumaggine:
cc. 350-400/hl nei trattamenti invernali
cc. 250-300/hl nei trattamenti primaverile-estivi

— **COLTURE ORTICOLE:**
Pomodoro, peperone e patata: peronospora, alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi non vascolari, muffa grigia e bianca, septoria, rizoctonia, cercosporiosi:
cc. 100-130/hl **nei trattamenti in semenzaio**
cc. 250-300/hl = lt 2,5-3/Ha **nei trattamenti in pieno campo ed in serra**
Cipolla: cc. 300-350/hl = lt 3-4/Ha (aggiungere adesivante), per peronospora, muffa grigia e bianca, alternaria.
Cucurbitacee: cc. 250-300/hl = lt 2,5-3/Ha per alternaria, peronospora, antracnosi, vaiolatura, cladosporiosi, rizoctonia, fusariosi non vascolari.
Sedano e carota: cc. 300-400/hl = lt 3-3,5/Ha per septoria, rizoctonia, cercospora e sclerotinia
Lattughe e radicchi: cc. 250-300/hl = 2,5-3/Ha per peronospora e sclerotinia.
Fagiolo e fagiolino: cc. 250-300/hl = lt 2,5-3/Ha per peronospora, antracnosi, ruggine
Fragola: cc. 300-350/hl = lt 3-3,5/Ha per vaiolatura, muffa grigia.
Cavoli: cc. 280-300/hl = lt. 2,5-3/Ha (aggiungere adesivante), per peronospora, alternaria, vaiolatura
Spinacio: cc. 250-350/hl = lt 2,5-3,5/Ha contro peronospora e ruggine bianca.

— **CEREALI:** cc. 300-350/hl = lt. 2,5/Ha per ruggini, septoria, elmintosporiosi, fusariosi non vascolari, nerume.

— **CONCIA DEL SEME IN SOSPENSIONE LIQUIDA:**
Cereali: per ruggine, septoria, elmintosporiosi, fusariosi non vascolari, nerume cc. 200-250/q.le di seme
Leguminose da granella: per Colletotrichum lindemuthianum, Pythium debaryanum, Pythium ultimum, Mycosphaerella pinodes cc. 150-200/q.le di seme.
Tabacco: per peronospora tabacina 200-250/hl = lt 2-2,5/Ha
Ribes nero: per peronospora, ruggine, muffa grigia cc. 250-300/hl = lt 2,5-3/Ha
Lampone: per muffa grigia cc. 250-300/hl = lt 2,5-3/Ha

— **COLTURE FLOREALI:** cc. 250-400/hl per ticchiolatura, botrytis, ruggine, antracnosi, septoriosi, fusariosi non vascolari, alternaria.

— **DISINFEZIONE DELLE FUNGAIE:** a scopo preventivo cc 3/m² per Verticillium, Fusarium, Mycogone

— **DISINFEZIONE DEI BULBI ED APPARATI RADICALI:** cc. 300-400/hl per rizoctonia, Phoma, sclerotinia, Pythium e Fusarium. Immergere l'apparato radicale nella poltiglia per circa 18-24 ore.

Epoche d'impiego: a scopo preventivo, a seconda del calendario d'incubazione delle malattie

Modalità d'impiego: bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.

Preparazione della miscela: agitare bene la confezione prima di versare la quantità consigliata di prodotto nella botte riempita a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con olii minerali. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: per le pomacee attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate: concentrazioni superiori possono provocare rugginosità sulla varietà Golden ed altre a buccia rossa. Sulle colture da fiore più delicate, eseguire saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali

Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Fitofarmaci
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 799.461/2
Telex VERKIM I 511046

Registrazione N. 6211
del 31.1.1985
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
S.B.A. CHEMIE
Rue De Renory 21
4200 OUGREE (Belgium)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

DA NON VENDERSI SFUSO

lt.

ENOCARB - FL

INSETTICIDA IN EMULSIONE FLUIDA

COMPOSIZIONE

— Carbaryl puro (esente da beta-naftolo) gr. 47,5
— Coformulanti q. b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
L'ENOCARB - FL è un insetticida in emulsione fluida che si impiega facilmente e svolge la sua attività per contatto e per ingestione. Non trasmette nè odori nè sapori sgradevoli alle colture trattate ed inoltre abbina alla prontezza d'azione una lunga persistenza.

DOSI D'IMPIEGO
Pomacee (Melo - Pero) - gr. 150 - 200/ql. acqua contro Carpocapsa e Verme delle pomacee, Cacoecia, Capua, Eulia, Pandemis e Orgya.

Noce - gr. 150 - 200/ql. acqua contro Carpocapsa e Cocciniglia.

Drupacee (Pesco - Ciliegio - Susino - Albicocco - Mandorlo) - g. 200 - 250 per q.le acqua contro Cydia molesta, Anarsia, Eulia, Capua, Cacoecia, Campa del mandorlo, Tignola e Tentredine del susino.

Vite - gr. 150 - 200 q.le acqua contro Tignola, Tignoletta, Eulia e Cicalina.

Olivo - gr. 150 - 200 q.le acqua contro Cocciniglia mezzo grano di pepe, Tignola e Fleotribo.

Agrumi (Arancio - Limone - Cedro - Mandarino - Clementino - Pompelmo) - gr. 150 - 200 q.le acqua contro Tignola, Cocciniglia mezzo grano, Cocciniglia cotonosa, Cocciniglia bianca, Cocciniglia rossa, Cocciniglia grigia.

Nocciolo - gr. 150 - 200 per q.le acqua contro il Balanino.

Pioppo - gr. 200 - 250 per q.le acqua contro Crisomela, Farfalla bianca.

Colture Forestali (Conifere: Pino, Abete, Larice, Cedro, Cipresso) gr. 200 - 250 per q.le acqua contro Limantria, Processionaria, Tortricidi e Coleotteri vari.

Patata - Melanzana - Peperone - Pomodoro - gr. 150 - 250 per q.le acqua contro Dorifora, Tignola, Nottue.

Carciofo - Cardo - gr. 150 - 250 per q.le acqua contro Nottue, Vermi grigi, Vanessa, Depressaria.

Cavolo - Cavolfiore - gr. 150 - 250 per q.le acqua contro Cavolaia e Nottua.

Asparago - Carota - Finocchio - Cipolla - Aglio - Fagiolo - Pisello - Insalata - Spinacio - Cucurbitacee gr. 150 - 250 per q.le acqua contro Agrotidi, Altiche, Tignole, Crisomelidi.

Barbabietola da zucchero - gr. 200 - 250 per q.le acqua contro Altica, Cassida e Nottue.

Foraggere (Prati, Pascoli, Leguminose, Graminacee) - gr. 200 - 250 per q.le acqua contro Fitonomo, Apion, Misurino, Crisomela, Bombice, Nottue e Piralide.

Garofano (in pieno campo) - gr. 200 - 250 per q.le acqua contro Bega verde, Nottue e Tripidi.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: il prodotto è compatibile con tutti i principali antiparassitari eccezion fatta dei prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, calce).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso"

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato"

ENOTRIA S.p.A.
Melilli (SR)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. 6212 del 31.1.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg

6213

1 CLASSE

VELENO

INSETTICIDA NEMATOCIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI PROTETTI

Registrazione Ministero Sanità N. 6213 del 31.1.85

COMPOSIZIONE: gr 100 di prodotto contengono

- Aldicarb puro gr 3,33
- Lindano puro gr 1,33
- Supporti q.b. a gr 100

> **ATTENZIONE:** data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

Contenuto netto kg. 10
Officina di produzione
La Littorale S.A.
19, quai du Port Neuf - 34505 Béziers, Francia
* Marchio registrato della
UNION CARBIDE CORPORATION, USA
84748

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano
Tel. 77 571
Telex 311 068 ucimi

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Fitofarmaco composto da un carbammato (inibitore della colinesterasi) e da un clororganico (lipofilo). Assorbimento per via cutanea, inalatoria, orale.

Intossicazione acuta ad elevate dosi per ingestione.

Sindrome neurologica con ipereccitabilità neuromuscolare tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, sindrome gastrointestinale con nausea, vomito, diarrea, scialorrea, lacrimazione. Esito in edema polmonare.

Intossicazione per vie inalatoria e cutanea.

Sindromi neurologica e gastrointestinale più lievi e sindrome cutaneo-mucosa irritativa (cute, congiuntive, vie respiratorie). Per contatto ripetuto possibilità di dermatosi a tipo eczematoso.

Consigli terapeutici: Lavanda gastrica con bicarbonato sodico. Evitare purganti oleosi, latte, sostanze grasse in genere e alcool. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specie ai bambini.
Diazepam 10-20 mg per via endovenosa da ripetere. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero in Centro di Rianimazione.
Controindicate le ossime (PAM, Contrathion), l'adrenalina e gli oppiacei.
Ossigenoterapia per la cianosi. Accurato lavaggio cutaneo se vi fu contatto.

AVVERTENZA. Consultare un Centro Antiveleno.

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano
Tel. 77 571
Telex 311 068 ucimi

NATURA DEL RISCHIO:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirarne i vapori
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva)
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE

l'Aldicarb/Lindano Union Carbide - Temik M-5G è un nematocida, insetticida sistemico microgranulare. L'associazione dei principi attivi, Aldicarb ad azione sistemica e Lindano ad azione di contatto e per ingestione, conferisce al prodotto un ampio spettro di azione contro i principali parassiti terricoli della barbabietola da zucchero. In particolare l'Aldicarb, se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna di semina in posto.

COLTURE PROTETTE

barbabietola da zucchero.

PARASSITI COMBATTUTI

Insetti del terreno: elateridi, agrotidi, maggiolino, grillotalpa, atomaria, cleono, lisso.

Fitofagi fogliari: altica, pegomya, afidi

Nottuidi: mamestra, agrotis, caradrina, cleono, lixus

Nematodi: incistati *(Heterodera)* liberi e galligeni *(Ditylenchus, Meloidogyne)*

Miriapodi: Blaniulus guttulatus

DOSI DI IMPIEGO LOCALIZZATO

Dose normale di impiego per una difesa totale 15-20 Kg/ha. In caso di forti infestazioni di nematodi (Heterodera) in abbinamento al trattamento con Aldicarb/Lindano Union Carbide - Temik M-5G si consiglia di fare un trattamento a pieno campo con 30-40 Kg/ha di Aldicarb Union Carbide - Temik 5G.

EPOCA DEL TRATTAMENTO

Alla semina della coltura. Un trattamento effettuato al momento della semina esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50-60 giorni fino allo stadio cioè di 4 foglie vere.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Alla dose normale di impiego applicare il prodotto durante la semina localizzato al livello dei glomeruli sul fondo del solchetto di semina con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare dosi superiori a 15 Kg/ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicare l'Aldicarb/Lindano Union Carbide - Temik M-5G lateralmente al seme ad una distanza di 2-3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme. Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore.

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano
Tel. 77 571
Telex: 311 068 ucimi

> **ATTENZIONE**
> Il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici. Effettuare un unico trattamento al momento della semina.

> **DA NON VENDERSI SFUSO**
> **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano
Tel. 77 571
Telex: 311 068 ucimi

COMPATIBILITÀ

Con altri principi attivi: Usare il prodotto da solo

FITOTOSSICITÀ

Per dosi superiori a 15 Kg/ha si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per l'uso consentito; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

6214

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA
DEL GRANO, ORZO, SEGALE ED AVENA

COMPOSIZIONE

— Ioxinil puro (da estere ottanoico)	. . gr. 11
— MCPP (Mecoprop) puro (da estere butossietanolico)	. . gr. 33
— Coformulanti	q. b. a gr. 100

CLASSE II

NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei (ad esempio interrando in fosse profonde un metro e cospargere con calce viva) le confezioni che contenevano il prodotto. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Intossicazione per inalazione, ingestione e contatto cutaneo.

Sintomatologia. Casi lievi: calore, sudorazione intensa, vasodilatazione, volto arrossato, astenia. **Casi gravi:** astenia, sudorazione profusa, ipersclalorrea, vomito cianosi labiale, iperpiressia, tremori, disturbi del ritmo cardiaco, ipotensione, cefalea, vertigini, irrequietezza, convulsioni, edema polmonare.

Terapia: In caso di contatto lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone. Se presente forma eczematosa applicare pomate al cortisone. In caso di ingestione: lavanda gastrica con carbone assorbente. La lavanda gastrica è controindicata se esistono convulsioni; in tale caso, se si vuole praticare la lavanda gastrica, il paziente va intubato e va iniziata la terapia a base di anticonvulsivanti. Ossigeno al bisogno. In caso di iperpiressia non somministrare antipiretici ma raffreddare il paziente senza mezzi farmacologici.
Eseguire ECG ed eventuale correzione dei disturbi del ritmo. Eseguire controllo degli elettroliti e pH ematico per una eventuale correzione. Se presenti convulsioni iniziare il trattamento con sedativi (clorazepam); qualora non si ottenessero risultati somministrare Na-thiopental 2,5% e.v. Somministrare liquidi e.v. per facilitare l'escrezione del prodotto. Nei casi gravi ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il SESAL è un erbicida sistemico che svolge anche ottima azione per contatto nei confronti di varie dicotiledoni presenti al momento dell'intervento: Correggiola, Convolvolo, Stoppione, Aparine, Veronica, Centocchio, Romice, Camomilla, Veccia, Papavero, Ranuncolo, Fiordaliso, Fumaria, Chenopodio, Borsa del Pastore.
Viene consigliato quando il grano tenero e duro, la segale, l'orzo e l'avena si trovano tra la terza e quarta foglia e la fine della levata alla dose di:

— litri 2,5/Ha - Nei trattamenti precoci con le erbe aventi due foglie (da metà febbraio a metà marzo);
— litri 3-3,5/Ha - Nei trattamenti tardivi ma prima della fase di levata della coltura (da metà marzo a metà aprile).

Le basse temperature (5-8 °C) non influenzano l'efficacia del trattamento né le eventuali piogge cadute dopo 2-3 ore dell'intervento erbicida. Dopo circa 20 giorni possono essere traseminate leguminose.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto può essere miscelato ai comuni concimi fogliari.

Fitotossicità: Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutta, ortaggi ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S.p.A.
Melilli (SR)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. 6214 del 31.1.1985 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

6215

DIAZETA 20

INSETTICIDA POLIVALENTE AD AZIONE ABBATTENTE

CLASSE III

COMPOSIZIONE

Diazinone puro	gr. 20
Solventi, emulsionanti, coadiuvanti q. b. a	gr. 100

Contiene: Xilolo

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: E MODALITA' D'IMPIEGO
Insetticida a vasta gamma di azione con effetto citropico. Agisce contro una grande serie di insetti anche se penetrati nei tessuti vegetali come frutti o foglie accartocciate, in maniera particolare contro:
Olivo: Contro la Mosca- effettuare un primo trattamento con gr. 300/hl e i trattamenti successivi con gr. 150/hl.;
Ciliegio: Contro la Mosca - gr. 150-180/hl.;
Uva: Contro la Tignola - gr. 150-180/hl.;
Pesco: Contro Cydie e Anarsia - gr. 200-300/hl.;
Agrumi: Contro Afidi e Larve di Cocciniglia: gr. 150-180/hl.;
Carote, Cavoli, Cipolle: Contro Afidi, Tignole, Bruchi - gr. 150-180/hl.;
Fiori e Colture ornamentali in pieno campo: contro Afidi, Tripidi, Ragnetti rossi, Tentredini - gr. 150-180/hl.
Versare la dose voluta nella quantità necessaria di acqua, agitare bene la miscela che apparirà come un liquido bianco in emulsione stabile. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Compatibile con tutti gli altri insetticidi e anticrittogammici, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

TOSSICITA'
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, per gli insetti utili, i pesci ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere il trattamento 15 gg. prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitar danni alle piane, alle persone ed agli animali.

AGROZOOFARMA s.r.l. - MORTEGLIANO (Ud)
Officina di Produzione: AGROZOOFARMA S.r.l. - 33050 MORTEGLIANO
Registrazione Ministero Sanità n. 6215 del 31.1.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto: litri

6216

TORVIS
INSETTICIDA IN POLVERE

COMPOSIZIONE:

Malathion puro	gr. 4
Coformulanti	q.b.a. gr. 100

NORME PRECAUZIONALI:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;

— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni buscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam Contrathion ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE:

Insetticida fosforganico per trattamenti polverulenti, che trova valido impiego per combattere gli insetti del terreno che infestano le colture floreali, mediante interramento. Può essere utilizzato per polverizzazioni sui fiori in pieno campo per il controllo di Afidi, Psillidi, Tignole e tripidi, nonchè per la disinfestazione di stagni, prati e fossi, con ottimo risultato.

CLASSE TOSSICOLOGICA: IV^a

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO:

Impolverare con cura tutta la superficie da disinfestare mediante comuni polverizzatori, 4-5 Kg. per 1.000 metri quadrati. Per il controllo degli insetti terricoli spargere uniformemente il prodotto sul terreno lungo le file dei fiori, incorporandolo mediante una leggera erpicatura, usando mediamente Kg. 30-40 per ettaro.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

Miscibilità: Il prodotto si usa da solo.

Avvertenze:

«Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso».

«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato».

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali».

Officina di Produzione: Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l. - Via T. Speri, 3/5
20028 San Vittore Olona (MI)

Registrazione Ministero della Sanità N. 6216 del 31.1.1985

«DA NON VENDERSI SFUSO»

Peso netto Kg. 1

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
VIA T. SPERI 3/5 - TEL. 0331/ 518.550
20028 SAN VITTORE OLONA (MI)

6217

TOPIBRON
esca ratticida in grani

CLASSE I

VELENO

COMPOSIZIONE (rif. a g 100):

Bromadiolone puro	g 0,005
Coformulanti	q.b. a 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del 3 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

È tossico per gli animali domestici e per l'uomo, quindi evitare di maneggiarlo con le mani nude e di disporre le esche in vicinanza di altre granaglie, nei luoghi frequentati dai bambini, nei luoghi accessibili agli animali che se ne possono volontariamente cibare: polli, conigli, suini.
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare guanti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: emorragie cutanee e delle mucose. La sintomatologia è prevalentemente emorragica.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di ingestione accidentale provocare il vomito con acqua salata calda. Nei casi gravi ricorrere al medico perché pratichi trasfusioni di sangue ed endovenose di Vitamina K contro l'azione anticoagulante del prodotto.

Controindicazioni: Anticoagulanti.

DA NON VENDERSI SFUSO

INDICAZIONI

Derattizzante e topicida. Serve contro tutte le varietà di roditori ovunque si trovino: Ratti di fogna o Surmolotti, Ratti neri o di granaio, Topolini domestici, Topi di campagna. Agisce per ingestione; la morte interviene per emorragia interna, solitamente nel giro di qualche giorno, senza agonia e quindi senza suscitare diffidenza nei consimili.
I topi, una volta intossicati, presi da un senso di soffocamento, ricercano l'aria e finiscono col morire all'aperto.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il TOPIBRON esca ratticida in grani è un esca pronta, pertanto si usa tal quale. Va posto nei luoghi frequentati dai roditori: scantinati, solai, magazzini, immondezzai, fognature, ripe di canali, fossi, campi, giardini, frutteti, ortaglie, al fine di indurre i roditori a cibarsene.
Dove si notano segni dell'esistenza di topi e di ratti, nei loro passaggi obbligati, in prossimità delle loro tane, disporre mucchietti da 25-50 g di **TOPIBRON esca ratticida in grani** o, senza aprirli, gli appositi sacchetti in politene già dosati con l'esca.
Rimpiazzare via via le esche consumate ed aumentare la quantità delle stesse od il numero dei sacchetti con l'esca dosata se necessario.
Mascherare le esche con tavolati o metterle dentro vecchi tubi o sotto vecchie tegole nei luoghi frequentati da persone o animali.
A derattizzazione avvenuta lasciare qualche mucchietto di esca come richiamo per eventuali nuovi arrivati.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il **TOPIBRON esca ratticida in grani** non deve essere miscelato ad altri prodotti.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il TOPIBRON esca ratticida in grani si è dimostrato efficace anche contro i topi comunemente detti "resistenti" agli anticoagulanti.

DOTT. Formenti S.p.A.
Industria Chimica e Farmaceutica
Via Correggio 45 - 20143 MILANO - Tel. 43.43.43
Off. di prod. DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)

Registr. Ministero Sanità n. 6217 del 31.1.1985

Contenuto g .

6218

FENASIP (R)

Fungicida organico endoterapico in polvere bagnabile per la difesa delle colture di melo, pero, vite, pesco, cucurbitacee, colture floricole, semenzai e vivai di dette colture.

COMPOSIZIONE

- Fenarimol puro	g	6
- Coadiuvanti ed Inerti:quanto basta a	g	100

(R) marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM–Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

CLASSE IV

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 6218 del 31.1.85 Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni Mediche :

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua, irrorato con pompe a volume normale.

MELO

Contro l'Oidio : impiegare una dose di g 70-80 ogni 7-10 giorni in funzione dell'intensità della malattia iniziando i trattamenti alla fase di orecchiette di topo.
Volendo combattere contemporaneamente anche la **Ticchiolatura**, aggiungere alla miscela preparata come sopra preferibilmente:

- g 120-150 di Captano 50 % (SANTHANE) o Folpet 50 % (FOLTHANE) in particolare sulla varietà di mele Golden Delicious e sulle pere, oppure:
- g 50-60 di Dodina 65% (DODENE) su Delicious rosse o varietà di melo e di pero non sensibili alla Dodina, oppure:
- g 150-180 di Mancozeb 80 % (MICENE MZ) nei frutteti misti, impiegando le dosi più alte fino all'allegagione e le più basse successivamente.

Iniziare tali trattamenti all'apertura delle gemme, ripetendoli ogni 7-8 giorni fino a che il frutto ha raggiunto la grossezza di una noce; passare quindi ad intervalli più allargati, es. 10-14 giorni, in funzione dell'andamento stagionale.

VITE

Contro l'Oidio: impiegare inizialmente il prodotto alla dose di g 20-25, effettuando i primi trattamenti quando i germogli sono lunghi 10 cm, ripetendoli ogni 7-10 giorni fino all'allegagione; aumentare successivamente la dose a g 30-60 (su uve da tavola g 50-60), mantenendo lo stesso intervallo fra i trattamenti. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi nei periodi critici.
Volendo combattere contemporaneamente anche la **Peronospora**, miscelare gli opportuni fungicidi, aumentando la dose di prodotto, man mano che si allunga l'intervallo dei trattamenti.

PESCO

Contro l'Oidio: impiegare il prodotto alla dose di g 70-80 alla scamiciatura dei frutticini, ripetendo il trattamento 7 giorni dopo. Ripetere i trattamenti alla prima comparsa della malattia a distanza di 7 giorni uno dall'altro. Nei periodi critici, durante il primo accrescimento dei frutti nelle zone e sulle varietà più sensibili, impiegare le dosi più alte.

CUCURBITACEE (Cetriolo, Cocomero, Melone, Zucca e Zucchino).
Contro l'Oidio : impiegare il prodotto alla dose di g 40-50, iniziando i trattamenti alla prima comparsa della malattia e ripetendoli ogni 8-12 giorni.

ALTRE COLTURE

Il prodotto può essere efficacemente impiegato alle dosi di g 40-60 contro Oidii che colpiscono colture floricole, semenzai e vivai di dette colture.
Usare le dosi inferiori fra quelle indicate, nel caso si facciano associazioni con altri prodotti ad azione complementare.

Preparazione della poltiglia: stemperare la quantità necessaria di prodotto, direttamente nella botte riempita a metà; completare quindi il riempimento con acqua, agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come Polisolfuri e Calce; non essendo state comunque saggiate tutte le possibili combinazioni, si consiglia di effettuare una piccola prova di compatibilità fisica, prima di effettuare la miscela nella botte.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: si raccomanda di attenersi alle dosi consigliate potendosi avere effetti sfavorevoli al verificarsi di diverse condizioni climatiche; dato l'elevato numero di varietà di colture floricole si consiglia una prova su piccola scala prima di passare a trattare superfici più ampie.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su mele; 14 giorni su uva, pero, pesco; 7 giorni su cucurbitacee.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg.**

6219

FLORGOOD

FITOREGOLATORE

COMPOSIZIONE
Acido gibberellico puro gr. 90 su gr. 100

CLASSE IV

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione; lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI:
E' un fitoregolatore solubile per impiego su:

ANEMONI, CICLAMINI, CRISANTEMI, FIORDALISI, ORTENSIE
per anticipare ed aumentare la fioritura ed ottenere fiori più grossi e steli più lunghi: gr. 1-2/hl alla comparsa dei primi boccioli. Ripetere dopo 20-30 gg.

ARANCIO:
per prevenire la cascola e ridurre la fisiopatia della buccia: gr. 0,5-1/hl dopo la invaiatura.

CARCIOFO:
Per ottenere anticipo di maturazione, capolini più numerosi e di maggior pezzatura: gr. 1-3/hl al formarsi del primo abbozzo fiorale, comunque non oltre la formazione della sesta foglia.

CILIEGIO:
Per aumentare l'allegagione gr. 1/hl a fine fioritura. Ripetendo il trattamento 2 o 3 volte di seguito si evita la cascola.

CLEMENTINE:
Per ottenere maggior produzione: gr. 1/hl in fioritura o poco dopo.

FRAGOLA:
Per ottenere precocità ed incremento di produzione: gr. 1,5-2,5/hl in 2 trattamenti 30 e 10 gg. prima della fioritura.

LIMONE:
Per ritardare la data di raccolta e migliorare la conservabilità dei frutti in magazzino: gr. 0,5-1/hl prima della invaiatura.

PERO:
Per favorire l'allegagione: gr. 1-2/hl quando il 20-30% dei fiori è aperto. Per contrastare le gelate irrorare entro 48 ore successive il fenomeno.

POMODORO:
Per ottenere maggior allegagione e precocità gr. 1/hl a fiori aperti. Ripetere il trattamento dopo ogni raccolta.

VITE:
Irrorando prima della fioritura si ottiene precocità; dopo la fioritura si previene la acinellatura e si ottiene un grappolo più spargolo e meno soggetto alla botrite: gr. 1-2/hl 10 gg. prima o dopo la fioritura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: con quasi tutti gli antiparassitari di uso comune.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: 20 gg.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGROZOOFARMA s.r.l. - MORTEGLIANO (Ud)
Via Lavariano n. 15
Officina di produzione: AGROZOOFARMA - Mortegliano

Registrazione Ministero Sanità n. 6219 del 31.1.1985

Da non vendersi sfuso

Conf. da gr.

6220

PRESAN ZOLFO

Anticrittogamico in polvere secca

Composizione:

Zolfo puro (esente da Selenio)	g. 38,6
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro di rame-calcio)	g. 6,0
Zineb puro	g. 2,55
Bagnanti e disperdenti	q.b. a g. 100

III CLASSE
ATTENZIONE:
manipolare
con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Officina di produzione:
VISPLANT-CHIMIREN S.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 6220 **del Ministero della Sanità** del 31.1.85

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRECAUZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il PRESAN ZOLFO è un fungicida per trattamenti polverulenti che svolge la sua azione anticrittogamica preventivamente ed in caso di necessità curando l'eventuale infezione già in atto.
E' particolarmente indicato nelle zone dove vi sia scarsità d'acqua nei periodi primaverili-estivi.
S'impiega alla dose di Kg. 15-30/Ha con polverizzazioni da eseguirsi nelle ore fresche della giornata. Controlla:
Vite: Peronospora, Oidio, Antracnosi.
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): Peronospora, Oidio, Antracnosi, Alternaria, Septoria e Cladosporiosi.
Melo e Pero: Ticchiolatura, Oidio, Septoria, Ruggine, Alternaria.
Garofano in pieno campo: Ruggine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Compatibilità: Il PRESAN ZOLFO non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese ecc.) con Olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl e Diclofluanide.

AVVERTENZA: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: possono essere sensibili a Rame, Zolfo e Zineb le seguenti cultivar:
Melo: Abbondanza, Bedford, Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Johnatan, Imperatore, Renetta, Roma Beauty, Rosa Mantovana, Stayman, Stayman Red, Viking Davis, Winesap.
Pero: Abate Fetel, Armella, Buona Luisa D'Avrance, Butirra precoce Morettini, Butirra Cleargeaux, Conference, Contessa di Parigi, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Dott. Jules Guyot, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Favorita di Clapp, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Spadona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, William, Zecchermann.
Vite: Sangiovese.

Tossicità: il prodotto è tossico per i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO

Kg.

6221

AGER LINURON 50

Erbicida selettivo per il diserbo del mais, delle carote, delle patate e degli ortaggi

COMPOSIZIONE:

LINURON puro . . .	gr. 50
Coadiuvanti ed inerti q.b. a .	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali: Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del preparato. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare di respirarne i vapori. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il Medico: Irritante per la cute, l'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Terapia: per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epato-protettori.
Modalità di impiego: AGER LINURON 50 è un erbicida selettivo a carica residua indicato per il diserbo in pre-emergenza o in post-emergenza di colture industriali, quali il mais, le carote, le patate, e alcune colture ortive.
Campi e dosi di impiego: L'AGER LINURON 50 combatte: Giavone, Selano, Amaranto, Digitaria, Farinello, Persicaria, Erba porcellana, Camomilla, Veronica, Senape, Mercurella, Galinsoga, Borsa Pastore, Morella, Erba paperina, Piantaggine, Falso Convolvolo, Euforbia.
MAIS: Trattamenti in pre-emergenza: terreni leggeri Kg. 1-1,5/Ha.; terreni di medio pasto Kg. 2/Ha.; terreni pesanti o argillosi Kg. 2-2,5/Ha. Il mais deve essere seminato a profondità non inferiore ai 5 cm. e deve essere ben ricoperto.
CAROTA: Trattamenti in pre-emergenza: terreni leggeri Kg. 1-1,5/Ha.; terreni di medio impasto Kg. 2/Ha.; terreni pesanti Kg. 2-2,5/Ha. **Trattamenti in post-emergenza:** Kg. 1-1,5-2/Ha.
SEDANO, FINOCCHI E PREZZEMOLO: Trattamenti in pre-emergenza: le stesse dosi consigliate per le carote.
Trattamenti in post-emergenza: Sedano e Finocchi: Kg. 1/Ha. in terreni leggeri; Kg. 2/Ha. in terreni di medio impasto o pesanti.
FAGIOLI E FAGIOLINI: Trattamenti in pre-emergenza: terreni leggeri Kg. 0,8-1/Ha.; terrenhi di medio impasto: Kg. 1,25/Ha.; terreni pesanti o argillosi Kg. 1,5/Ha.
PATATE: Trattamenti in pre-emergenza: terreni leggeri Kg. 1,5/Ha.; terreni di medio impasto Kg. 2/Ha.; terreni pesanti o argillosi Kg. 2,5-3/Ha.
ATTENZIONE: Non superare mai le dosi indicate.
Le applicazioni possono essere fatte su tutta la superficie o solo sulle file di semina: in questo caso la dose di impiego deve essere calcolata sulla effettiva superficie da trattare. Il trattamento del mais va eseguito alla semina o subito dopo usando una irroratrice che distribuisca il prodotto con uniformità impiegando 400-800 litri di acqua per ettaro.
Compatibilità: per gli usi indicati impiegare l'AGER LINURON 50 da solo.
Fitotossicità: impiegare l'AGER LINURON 50 solo per le colture specificate. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibibli; preparare la sospensione lontano da piante coltivate o dalla zona della loro estensione radicale. In caso di trattamenti effettuati sulle sole file di semina, controllare che l'attrezzatura fornisca una irrorazione uniforme su tutta la fascia da trattare per evitare accumuli di prodotto.
Osservare scrupolosamente le dosi di impiego;
Assicurarsi il perfetto funzionamento delle attrezzature.
Determinare esattamente la sospensione da distribuire per unità di superficie: effettuare una prova preliminare con solo acqua.
Mantenere costante la velocità di esecuzione del trattamento. Usare macchine dotate di agitatore. Si consiglia l'uso di AGER LINURON 50 in terreni sabbiosi per evitare possibili danni alle colture.
Il mais deve essere seminato ad una profondità superiore a 4 cm. per ottenere una buona azione erbicida in profondità senza danni alla coltura.
Evitare l'applicazione su terreni troppo umidi.
Nocività: può essere nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere i trattamenti 60 gg. prima della raccolta.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone agli animali.

AGER CHEMICAL s.r.l.
Via Nomentana, 299 - ROMA
Officina di produzione: VISPLANT CHIMIREN S.r.l. - RENAZZO DI CENTO (FE)
Reg. Min.Sanità n.6221 del 7.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG.

6222

NEXAGAN 5G

COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI
gr. 4,5 Bromofos-etile puro
Coformulanti q.b. a grammi 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Insetticida granulare per la disinfestazione del terreno. Il prodotto è adatto per le colture di mais, barbabietola da zucchero (elateridi, larve del maggiolino), cavolo (mosca del cavolo).

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: Lacrimazione,miosi,scialorrea,vomito,dolori addominali,diarrea,spasmi bronchiali,dispnea, bradicardia,ipotensione,fibrillazioni muscolari,convulsioni,edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
CONTROINDICAZIONI: Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il NEXAGAN 5 G può essere distribuito in pieno campo a spaglio con spandiconcime, avendo cura di interrare il prodotto dopo l'applicazione ad una profondità di ca. 5 cm con una leggera erpicatura.

DOSI D'IMPIEGO
Per mais, barbabietola da zucchero, cavolo
distribuzione in pieno campo: 90-120 kg/ettaro
per trattamenti localizzati con o senza la coltura in atto: 0,6 - 1,2 kg/mq.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'
Il NEXAGAN 5 G è miscibile con la gran parte dei comuni antiparassitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

"Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura sulle colture indicate, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso."

"Chi impiega il prodotto, è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato".

"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

J. & A. MARGESIN S.p.A. - Fitofarmaci - Lana d'Adige (BZ)
Sede ed officina di produzione: Lana d'Adige (BZ)
Registrazione del Ministero della Sanità N° 6222 del 31.1.1985
DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO: KG.

6223

GIBRELEX PASTIGLIE

Fitormone in compresse solubili

COMPOSIZIONE:

Acido giberellico puro . . . . gr. 10
Coformulanti q.b. a . . . . gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il GIBRELEX PASTIGLIE esplica la sua attività stimolando e accelerando il metabolismo e la riproduzione cellulare dei tessuti vegetali ed i suoi effetti si manifestano su tutti gli organi della pianta, in relazione allo stato di sviluppo della stessa, dalla germinazione dei semi alla maturazione dei frutti, ed in maniera diversa per ciascuna specie.

MODALITA' D'IMPIEGO

Pero - gr. 10-15/hl. usando 1000 litri d'acqua/ettaro.

Per stimolare l'allegagione delle varietà di difficile impollinazione.

Si deve intervenire con il 20-30% dei fiori aperti con l'aggiunta di gr. 100/hl. di Bagnante adesivo - gr. 10/hl. usando 1000 litri d'acqua/ettaro.

Per favorire l'allegagione di: William, Coscia, Buona Luisa d'Avranches, Spadona, Spadoncina, Passacrassana, Butirra Giffard, Gentilona, Kaiser, Madernassa e Trionfo di Vienna. Intervenire nel pieno della fioritura rispettando il dosaggio per non favorire la produzione di frutti deformati o la riduzione nella produzione dell'anno successivo.

Gr. 15-25/hl. usando 1500 litri d'acqua/ettaro.

Per limitare i danni da gelo in fioritura.

Intervenire entro le 48 ore dall'inizio della gelata. Aggiungere gr. 100/hl di Bagnante adesivo.

Carciofo - gr. 5-10/hl. usando circa 500 litri d'acqua/ettaro.

Per concentrare e anticipare la produzione sulle varietà: Carciofo di Mola, Carciofo di ogni mese, Violetto di Provenza, Spinoso sardo. Intervenire con un primo trattamento al momento della formazione del primo capolino quindi con un secondo, alla dose minima, dopo la prima raccolta. Per colture non forzate i due trattamenti vanno distanziati di circa 20 giorni uno dall'altro, con il primo due mesi prima della raccolta del cimarolo. Aggiungere gr. 100/hl. di Bagnante adesivo.

Fragola - gr. 5-10/hl. usando 600-800 litri d'acqua/ettaro.

Per incrementare la produzione delle varietà: Surprise des Halles, Red Gauntlet, Cambridge, Gorella, Aliso, Poca Hontas, Favourite; intervenire 30-40 giorni prima della fioritura con l'aggiunta di gr. 100/hl. di Bagnante adesivo.

Vite - gr. 10-15/hl. in 1000 litri d'acqua/ettaro.

Per favorire l'allegagione delle uve da tavola: Regina, Cardinal, Chasselas, Moscato d'Amburgo e altri, Pizzutello e Italia; intervenendo con il 20-30% di fiori aperti e con l'aggiunta di gr. 100/hl. di Bagnante adesivo.

Arancio - gr. 10-15/hl. usando 1500 litri d'acqua/ettaro.

Per migliorare la qualità e il colore della buccia intervenendo dopo l'invaiatura.

Limone - gr. 10-15/hl. usando 1500 litri d'acqua/ettaro.

Per ritardare la maturazione intervenendo prima dell'invaiatura.

Patata - gr. 5-10/hl.

Per interrompere la quiescenza e stimolare lo sviluppo dei germogli, immergere per 10 minuti i tuberi interi o sezionati in una soluzione alla dose indicata; la dose minima per i tuberi tagliati e la massima per i tuberi interi.

Colture floreali - gr. 10-20/hl. usando 300-500 litri d'acqua/ettaro.

Per aumentare e anticipare la fioritura; per la formazione dei fiori più grossi con gambi allungati. Intervenire ogni 30 giorni a partire dalla comparsa del primo bocciolo. Risultati positivi si ottengono su: Ortensie, Crisantemi, Ciclamini, Anemoni, Fiordalisi, Cactus.

CONDIZIONI GENERALI D'IMPIEGO

Il prodotto va impiegato in assenza di vento e almeno otto ore prima dell'inizio della eventuale pioggia. Affinchè le colture trattate rispondano in pieno alle sollecitazioni del prodotto sarà necessario che siano effettuate tutte le pratiche colturali, le concimazioni, gli interventi antiparassitari e che il terreno sia sufficientemente umido.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti i più comuni antiparassitari purchè la reazione della soluzione non superi il valore di pH 7.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto è fitotossico per le cultivar di pero Decana del Comizio. Per le varietà di pero, fragola, vite, carciofo, patata, e fiori non citate nel testo dell'etichetta effettuare prove preliminari su di una piccola superficie.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima dell'inizio della raccolta (limitatamente per limone, arancio, e pero).

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali ».

Biolchim

Biolchim s.r.l.
Via S. Carlo, 2130
Tel. (051) 850.150 - Medicina (BO)
Telex 510522 BIOKIM I

Prodotto formulato nello stabilimento della Ditta CEQUISA - Barcellona (Spagna) e importato in confezioni pronte all'uso.

Registrazione n. 6223 del 31.1.85 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Tubetto da n. 10 pastiglie da 10 gr. cadauna

62

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

BIETAPOST

(LIQUIDO EMULSIONABILE)
DISERBANTE SELETTIVO PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DA ORTO E DA FORAGGIO

Registrazione Ministero Sanità n. 6224 del 31.1.85
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Fenmedifam puro	g 15,9
— Coformulanti *	q.b. a g. 100
* Contiene ISOFORONE.	

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente ai bambini.
Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione.
Ossigeno-terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il BIETAPOST è un diserbante selettivo per la bietola e controlla le più comuni infestanti annuali (Anagallis arvensis, Atriplex patula, Bilderdykia convolvulus, Chenopodium album, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Lamium spp., Linaria spp., Matricaria spp., Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus spp., Stachys spp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp.).
Agisce per assorbimento fogliare, specialmente su plantule di dicotiledoni. In presenza di graminacee si consiglia la miscela con 2,3-3 kg/ha di un prodotto all'80% di Dalapon (Diserbo Canali, Antigramigna).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega quando il maggior numero di infestanti è presente e non ha superato lo stadio di 2 foglie vere, indipendentemente dallo stadio della bietola.
La dose d'impiego è di 6-8 litri/ha.
— Applicare il prodotto diluito in 300-400 litri di acqua, in giornate non ventose, bagnando bene le infestanti;
— non eseguire il trattamento se le piante sono bagnate di rugiada o nella imminenza di una pioggia;
— il prodotto fornisce i migliori risultati se applicato con temperature di 15-20° C ed infestanti in rapida crescita. Temperature superiori ai 25° C possono provocare ustioni alle foglie della bietola;
— si sconsiglia l'uso del prodotto su bietole danneggiate da insetti o comunque in cattivo stato vegetativo;
— si consiglia di effettuare un trattamento in pre-semina con Cycloate, od Chloridazon o con una miscela dei due pp.aa. a dosi ridotte, quindi intervenire con Bietapost in caso di necessità.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il prodotto nel serbatoio contenente circa metà della dose di acqua prevista, agitare e poi aggiungere l'acqua restante.

AVVERTENZE
Lavare adeguatamente le pompe impiegate con acqua e soda o carbonato attivato prima di eseguire il trattamento.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il BIETAPOST è compatibile con Torak, Fostox, Fostox metil, Sialan 35 EC e Sialan 35 PB; l'aggiunta di 3-4 litri di Concime Organico Liquido per ettaro migliora l'effetto del prodotto.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza, 172 - ROMA

CONTENUTO LT.

6225

GERMISAN

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DELL'ORZO E DEGLI ALTRI CEREALI

Composizione: Gr. 100 di prodotto contengono:

— Carbossina pura	. . .	gr. 20
— Maneb puro	. . .	gr. 40
— Bagnanti, disperdenti . . .	. q.b. a	gr. 100

« Contiene Glicole etilenico »

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirarne i vapori.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

AVVERTENZE: durante la manipolazione del prodotto si dovranno usare occhiali protettivi date le proprietà irritanti del p.a.Carbossina.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.*
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite congiuntivite, faringite, ecc.).

TERAPIA: *nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito.*
Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: il Germisan è un fungicida impiegato per la concia delle sementi dell'orzo e degli altri cereali (frumento, avena, mais, sorgo.
Il prodotto unisce, all'azione sistemica dovuta alla Carbossina che penetra nell'interno, quella per contatto dovuta al Maneb.
E' particolarmente efficace contro l'Helminthosporium gramineum, l'H. avenae dell'avena, l'H. maydis del mais, i carboni coperti dell'orzo (Ustilago nordei) e del sorgo (U. sorghi); le carie del frumento (Tilletia caries e T. foetida); il Fusarium nivale del frumento e la Septoria nodorum del frumento.
Il prodotto, inoltre, dà un controllo soddisfacente nei confronti dei carboni nudi del frumento (Ustilago tritidi), dell'orzo (U. nuda) e dell'avena (U. avena).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
Il Germisan si impiega alla dose di 200/250 gr. per 100 Kg. di seme.
Il trattamento può essere effettuato a secco mescolando direttamente la polvere con il seme da conciare nel modo più uniforme, oppure con il sistema « Slurry ». In questo secondo caso al prodotto si aggiunge la quantità di acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme.
I semi trattati o residuati della semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, ne del bestiame.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA': il Germisan è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

EUROZOLFI S.p.A. - 14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - 95030 CATANIA - Tel. (095) 592014

Officina di prod.: **EUROZOLFI S.p.A.** - 14ª Strada - Zona Ind. - 95030 CATANIA
6225 del 13.4.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg. 0,500**

6226

MICOTER

ANTICRITTOGAMICO SISTEMICO IN POLVERE BAGNABILE PER COMBATTERE ALCUNE MALATTIE FUNGINE E BATTERICHE DELLE PIANTE DA FIORE E ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA.

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

— Carbossina pura	. . . gr. 20
— Captano puro	. . . gr. 40
— Chinosol puro	. . . gr. 10
— Bagnanti e disperdenti . .	. q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - conservare la confezione chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - evitare di respirare i vapori.

AVVERTENZA: durante la manipolazione del prodotto si dovranno usare occhiali protettivi date le proprietà irritanti del p.a. Carbossina.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei di fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE: Il MICOTER è un fungicida battericida ottenuto dalla combinazione della Carbossina e del Chinosol, ad azione sistemica, con il Captan, ad azione di contatto. Il prodotto viene impiegato sia nella irrorazione delle piante che nella disinfezione del terreno. Il MICOTER risulta efficace contro le crittogame e verso alcune batteriosi a fianco indicate alle seguenti colture.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: (dosi per 100 litri d'acqua)

Garofano: gr. 200-250 contro Fusarium oxyporum, Rhizoctonia solani, Althernaria dianthi, Uromyces cariophyllinus, Fusarium roseum, Sclerotinia spp.

Poinsettia: gr. 200-300 contro Rhizoctonia solani, Sclerotinia spp, Pythium ultimum, Botrytis cinerea.
Ciclamino: gr. 200-300 contro Cleosporium cyclaminis, Fusarium spp, Pythium spp, Botrytis spp, Sclerotinia spp.

Crisantemo: gr. 200-250 contro Puccinia chrysanthemi, Fusarium spp, Septoria chrysanthemi.
Rosa: gr. 200-300 contro Antracnosi, Marsonina rosae, Peronospora spp.

Begonia, Dalia, Petunia, Azalea, Ortensia, Sanseveria, Ficus, Filodendro, Gerbera, Gladiolo, Geranio, Dieffenbachia: gr. 200-300 contro Septoria spp, Phylosticta, Ascochyta, Cercospora, Cladosporium, Collectotrichum, Gleosporium spp.

La dose più bassa è indicata per i trattamenti preventivi, la dose più alta per i trattamenti curativi (dopo l'inizio dell'infezione).

Preparazione della miscela: sospendere la dose del prodotto in poca acqua e mescolare fino ad ottenere un fluido omogeneo, versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto ed agitare ripetutamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

MISCIBILITA': Il MICOTER non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) con olii e con zolfi.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in floricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

EUROZOLFI S.p.A. - 14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - 95030 CATANIA - Tel. (095) 592014

Officina di prod.: **EUROZOLFI S.p.A.** - 14ª Strada - Zona Ind. - 95030 CATANIA

Registraz 6226 **del Ministero della Sanità** 31.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg. 0,200**

6227

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

ZERGAN

(SOLUZIONE EMULSIONABILE)
ERBICIDA CHE AGISCE PER ASSORBIMENTO FOGLIARE E RADICALE PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ERBACEE NON GRAMINACEE, ARBUSTI ED ESSENZE LEGNOSE

Registrazione Ministero Sanità n. 6227 **del** 31.1.85
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Triclopyr puro (sotto forma di estere butossiglicolico)	g 44,4
— Coformulanti	q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il ZERGAN è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e radicale per il controllo di infestanti erbacee a foglia larga, arbusti ed essenze legnose.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Riso
Impiegare alla dose di lt. 1,5 per ettaro da distribuire con 400-500 litri d'acqua per combattere: Scirpus maritimus, Scirpus Mucronatus, Heteranthera reniformis e limosa; ha pure una certa azione contro Cyperus difformis.
Per completare l'azione se ne consiglia la miscela con altri diserbanti contenenti MCPA e PROPANIL.
Il trattamento può essere effettuato dall'inizio della fase di accestimento del riso fino allo stadio di botticella. E' comunque consigliabile trattare precocemente (accestimento) al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe.
Al momento del trattamento è necessario abbassare il livello dell'acqua a 2-3 cm. per scoprire adeguatamente le infestanti da controllare. L'acqua potrà essere nuovamente immessa nella camera dopo 24-48 ore.
Aree forestali
Data la sua selettività verso le piante dei generi Picea, Pinus e Abies, Lo ZERGAN può essere impiegato per eliminare la vegetazione spontanea indesiderata prima dell'impianto delle essenze forestali suddette. Impiegare lo ZERGAN alla dose di lt. 2,5-4,5 per ettaro da distribuire con almeno 1000 litri di acqua.
E' consigliabile l'impiego di un bagnante.

Decespugliamento. Diserbo aree incolte
Impiegare lo ZERGAN alle dosi di 250-750 cc/hl di acqua avendo cura di bagnare uniformemente tutta la pianta fino a sgocciolamento. Nel caso di essenze resistenti si consiglia di irrorare anche il terreno alla base del ceppo. I migliori risultati si ottengono generalmente in primavera su vegetazione in attiva crescita (indicativamente durante il mese di Aprile). Qualora si renda necessario un secondo intervento questo potrà essere effettuato durante la ripresa vegetativa in autunno.
Lo ZERGAN controlla numerose specie quali: Acer circinatum, Acer macrophyllum, Adenostoma fasciculatum, Alnus spp., Betula pubescens, Betula verrucosa, Carya spp., Cercis canadensis, Cornus florida, Crataegus spp., Diospyros virgiliana, Fraxinus spp., Holodiscus discolor, Liquidambar styriciflora, Lonicera spp., Lyriodendron tulipifera, Morus spp., Nyssa sylvatica, Populus spp., Prunus spp., Prunus Padus, Peudotsuga menziessii, Quercus spp., Quercus coccinea, Quercus maxima, Quercus nigra, Quercus phellas, Quercus prinus, Quercus rubra, Quercus stellata, Rhamnus catharticus, Rhamnus purshiana, Robinia pseudoacacia, Rosa spp., Rubus fruticosa, Rubus idaeus, Rubus spectabilis, Salix spp., Sambucus spp., Sassafras albidum, orbus aucuparia, Tsuga heterophylla, Ulmus alata.
Lo ZERGAN può essere utilizzato anche per impieghi su ceppaia recisa. Applicare il prodotto non diluito o diluito in acqua (1:1 fino a 1:10) in autunno sulla superficie appena tagliata della ceppaia per mezzo di spennellature.
Per il diserbo aree incolte impiegare lo ZERGAN alla dose di lt. 2,5-4,5 per ettaro distribuito con 1000-4000 litri acqua.

AVVERTENZA
— Non impiantare semenzai di conifere su terreni trattati con ZERGAN prima che siano trascorsi 6 mesi dal trattamento.
— Nell'applicare il prodotto evitare che la nube irrorante venga a contatto con colture sensibili.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto, qualora sia necessario, può essere miscelato con altri diserbanti.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

CONTENUTO LT

6228

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NIVAL® OE 25

Erbicida liquido emulsionabile selettivo per il diserbo della Barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio

Composizione

Fenmedifan puro	g 25
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti (contiene trimetilbenzeni, dimetilformamide, xilolo)	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6228 del 31.1.1985

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Erbicida ad assorbimento fogliare attivo sulle plantule delle seguenti infestanti dicotiledoni: Anagallis arvensis / Atriplex patula / Capsella bursa-pastoris / Centurea cyanus / Chenopodium album / Datura stramonium / Fumaria officinalis / Galinsoga parviflora / Lamium purpureum / Linaria minor / Matricaria sp. / Myosotys arvensis / Papaver sp. / Plantago major / Polygonum aviculare / Polygonum convolvulus / Polygonum lapathifolium / Polygonum persicaria / Raphanus raphanistrum / Senecio vulgaris / Sinapis arvensis / Solanum nigrum / Sonchus oleraceus / Spergula arvensis / Stellaria media / Thlaspi arvense / Urtica urens / Veronica persica / Viola tricolor.

Si osserva un controllo parziale da parte del prodotto su: Amarantus retroflexus / Mercurialis annua.

L'applicazione si effettua in post-emergenza delle barbabietole, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, purché le malerbe non superino lo stadio delle due foglie vere;

Le dosi d'impiego variano da 4 a 5 kg/ha diluiti in 250-400 litri di acqua;

Effettuare il trattamento su piante asciutte e con temperature inferiori a 25 °C. Nelle giornate calde aver cura di eseguire l'intervento nel tardo pomeriggio;

Evitare di trattare colture di bietola danneggiate da insetti o in cattivo stato vegetativo.

I trattamenti precoci sono quelli che danno i migliori risultati, essendo evidente che le infestanti resistono al prodotto man mano che si sviluppano.

Preparazione dell'emulsione

Versare a poco a poco la dose stabilita di NIVAL OE 25 nell'acqua richiesta, agitando accuratamente.

Avvertenze

Assicurarsi che le pompe impiegate per il trattamento non contengano residui di altri erbicidi, specialmente ormonici. Lavare ripetutamente le attrezzature con acqua e soda prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci ecezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto in luogo fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione e contatto cutaneo
(inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenza

Consultare un Centro Antiveleni.

91

6229

BASOZEB BEN

Anticrittogamico misto

Composizione:

Mancozeb puro	g. 40
Benomyl puro	g. 9,5
Bagnanti e disperdenti	q.b.a g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE:
Manipolare
con prudenza

BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

20122 Milano
Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782

Officina di produzione: VISPLANT-CHIMIREN S.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 6229 del 6.3.85 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il BASOZEB BEN è un anticrittogamico attivo nei confronti di diversi funghi parassiti.

Vite: contro Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero:
gr. 350 per quintale d'acqua in trattamenti preventivi dall'inizio del germogliamento. Il prodotto esplica un'azione secondaria nei confronti dell'Oidio e della Botrytis.

Pero - Melo: contro Ticchiolatura,, Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella:
gr. 250 per quintale d'acqua. Iniziare gl'interventi dall'inizio della ripresa vegetativa ogni 7-8 giorni (in prefioritura) e ogni 10-12 circa in post-fioritura. Nel caso di piogge persistenti ridurre gl'intervalli.

Cereali in campo (frumento):
kg. 3,5 per ettaro in 500-600 litri d'acqua per il controllo di: Ruggine, Oidio, Fusariosi, Septoria, Mal del piede, Elmintosporiosi, Punta nera.
Intervenire con un primo trattamento all'inizio della levata (eventualmente allineato al diserbo post-emergenza con prodotti ammonici) ed un secondo alla fuoriuscita della spiga (in unione ad un eventuale insetticida contro Afidi e Cecidomidi).

L'IMPIEGO DEL PRODOTTO È CONSENTITO SOLO IN CAMPO E PER LE COLTURE INDICATE IN ETICHETTA.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: il BASOZEB BEN è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto è fitotossico su alcune varietà di pero quali: Abate Fetel, Armella, Butirra Morettini, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Giardina, Mora, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina e Spinacarpi.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 60 giorni per il frumento; 28 giorni per le altre colture.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO

Kg.

6230

BAYCOR 23 SK

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro ticchiolatura (con buona azione contro oidio) delle pomacee, contro monilia ed oidio delle drupacee, cercospora della barbabietola, contro ruggine ed oidio degli ortaggi, contro ticchiolatura, oidio e ruggini delle piante ornamentali e da fiore

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Baycor 23 SK contengono:
g 22,2 di bitertanolo puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Si raccomanda l'uso di maschere durante l'impiego del prodotto.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura (con buona azione contro mal bianco del melo): 0,06-0,08% (60-80 g in 100 lt d'acqua) in miscela con fungicidi tradizionali a dose ridotta, e precisamente con **Fungilon D** alla dose di 50-60 g/hl, oppure con **Pomarsol Zf** alla dose di 120-150 g/hl, oppure con **Orthocide 50** o **Captan Bayer** alla dose di 120-150 g/hl, o con **Antracol** alla dose di 120-150 g/hl, eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 gg a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 gg in dipendenza dell'andamento climatico.
Allo scopo di ottenere i migliori risultati, scegliere il fungicida tradizionale ed aggiungere al Baycor 23 SK, tenendo presente l'andamento climatico e le varietà da difendere. **Interventi curativi ed eradicativi:** 0,08-0,1% (80-100 g in 100 lt d'acqua) effettuando 1 oppure 2 interventi ravvicinati.
Drupacee (pesco, susino, albicocco, mandorlo): contro monilia: 0,1-0,12% (100-120 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti (prima, durante e dopo la fioritura), ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 gg impiegando la dose più elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici più favorevoli allo sviluppo della malattia.
Contro oidio: 0,06% (60 g in 100 lt d'acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 gg circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto elevare la dose allo 0,08% (80 g in 100 lt d'acqua).
Ortaggi (fagiolo, zucchino, porro, cetriolo): contro ruggine e mal bianco:
a) **trattamenti preventivi:** 0,06% (60 g in 100 lt d'acqua);
b) **trattamenti curativi:** 0,08-0,1% (80-100 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 giorni, effettuando il primo all'inizio dell'attacco.

Barbabietole da zucchero: contro cercospora ed oidio: 1-2 kg/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua, eseguendo 2-4 trattamenti, con inizio alla comparsa dei primi sintomi e distanziandoli con intervalli non superiori a 3-4 settimane a seconda delle condizioni climatiche più o meno favorevoli allo sviluppo della malattia.
Piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra: contro oidio (mal bianco) e ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore: 0,08-0,1% (80-100 g in 100 lt d'acqua). **Per trattamenti curativi:** 0,1-0,15% (100-150 g in 100 lt d'acqua).
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale e con una diluizione in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Baycor 23 SK può essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi, 21 giorni prima del raccolto per pomacee e drupacee, 30 giorni prima del raccolto per barbabietola da zucchero.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Filago (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 6230 del 31.1.1985

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

Kg

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6231

CAPTABAS

Anticrittogamico polivalente

Composizione:

Captan puro	g 50
Coformulanti	q.b. a g. 100

CLASSE IV

A BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Officina di produzione: VISPLANT-CHIMIREN S.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 6231 del 6.3.85 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

Compatibilità: non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Il suo impiego deve essere sospeso 15 giorni prima della raccolta ma per le uve destinate alla vinificazione tale arco di tempo dovrà rispettare i 40 giorni.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

MODALITÀ D'IMPIEGO

Anticrittogamico preventivo con vasto campo d'azione e dotato di notevole persistenza.

Pero-Melo
gr. 250/hl contro: Ticchiolatura, Marciume bruno e Occhiato o marciume lenticellare.

Pesco-Susino Albicocco-Ciliegio
gr. 250/hl contro: Bolla, Corineo, Sclerotinia e Marciume bruno.

Vite
gr. 200-250/hl contro Botrytis e Peronospora (interrompere i trattamenti 40 gg. prima della vendemmia in quanto il prodotto interferisce sulla fermentazione del mosto).

Patata-Pomodoro
gr. 250-300/hl contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi e Septoriosi.

Carota
gr. 250-300/hl contro Septoria, Cercospora, Peronospora e Antracnosi.

Fragola
gr. 250-300/hl contro Botrytis o Muffa grigia e Vaiolatura.

Aglio-Cipolla-Fagiolo-Pisello-Insalate-Asparago
gr. 250-300/hl contro Ruggine e Peronospora.

Sedano
gr. 250-300/hl contro Septoria e Peronospora.

Rosa (in pieno campo)
gr. 250-300/hl contro Peronospora, Ruggine e Ticchiolatura.

Garofano (in pieno campo)
gr. 250-300/hl contro Alternaria, Ruggine e Occhio di pavone.

Disinfezione del terreno
gr. 250-300/hl impiegare 1 litro di soluzione ogni metro quadrato di terreno per controllare i funghi dei generi Phythium, Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia.

Disinfezione dei bulbi, tuberi, rizomi, radici e talee
Kg. 1/hl immergere prima dell'impianto per il controllo dei marciumi causati dalle specie fungine sopra indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO

Kg.

6232

LEVEN ZOLFO

Fungicida di contatto

Composizione:

Zineb puro	g. 40
Zolfo puro (esente da Selenio)	g. 20
Coformulanti	q.b. a g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE:
manipolare
con prudenza

BASLINI

Industrie Chimiche Dr. Baslini S.p.A.

20122 Milano
Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN S.p.A. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 6232 **del** 13.3.85 **del Ministero della Sanità**

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio-6-fosfodeidrogenasi). In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITA' D'IMPIEGO

LEVEN ZOLFO è un anticrittogamico misto indicato per la lotta contro le crittogame parassite specifiche delle colture agricole sotto indicate.

PERO-MELO

gr. 400-500/hl contro: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella e Oidio.

VITE

gr. 500-600/hl contro: Peronospora, Oidio, Antracnosi, Marciume nero.

POMODORO (fino alla prima fioritura)

gr. 400/hl contro: Peronospora, Oidio, Antracnosi, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese ecc.) con Olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl e Diclofluanide.

AVVERTENZE: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: varietà di pero sensibili allo **Zineb:** Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona. Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Spiona, Spadona d'Estate, Spandoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Lo **Zolfo** può arrecare danno alle seguenti cultivar di **mele:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicous, Jonathan, Imperatore, Renetta. Rome Beauty, Stayman Red, Winesap e di **pere:** Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 GIORNI.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

6233

®THIODAN ds

(dispersione acquosa)
INSETTICIDA SELETTIVO

COMPOSIZIONE: Endosulfan puro g 38,5, coformulanti quanto basta a 100.
(Contiene glicole etilenico).

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
- conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- evitare di respirare i vapori;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
- durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi;
- dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro, cospargendole di calce viva);
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.
Consigli terapeutici: intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante.
Somministrazione di purganti salini (25 g di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questo insetticida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere, perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (Luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari.
Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino alla eliminazione completa del tossico.
Controindicazioni: la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di produzione S.I.L.I.A. S.p.A. - Roma

Registrazione n. 6233 **del** 27.2.85 **del Ministero della Sanità**

® Marchio registrato della Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- **Frutticoltura:**
  - pomacee: contro afidi, minatrici, tentredini, psilla, cicadelle, maggiolino, tignola, aleurodidi, antonomo 65-100 cc/hl;
  - drupacee: contro afidi e tentredine del susino 65-100 cc/hl, afide farinoso 130 cc/hl (eseguire l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi);
  - nocciolo: contro eriofide 85-100 cc/hl;
  - actinidia, lampone: contro afidi 65-100 cc/hl.
- **Vite:** contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 65-100 cc/hl.
- **Agrumi:** contro insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 65-100 cc/hl.
- **Fragola:** contro acaro 100 cc/hl, ripetendo il trattamento a distanza di circa una settimana.
- **Barbabietola da zucchero:** contro afidi, altiche e cleono 0,8-1,2 lt/ha in 400-800 litri di acqua.
- **Patata:** contro dorifora e afidi 65-100 cc/hl.
- **Ortaggi:** contro dorifora, afidi, cavolaia, altiche ed insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore 65-100 cc/hl; contro afide o pidocchio nero dei fagioli e delle fave 130 cc/hl (eseguire l'irrorazione prima che le foglie comincino ad accartocciarsi).
- **Medica:** contro afidi 65-100 cc/hl.
- **Colza:** contro meligote 65-100 cc/hl.
- **Tabacco:** contro afidi 65-100 cc/hl.
- **Cereali:** contro afidi 65-100 cc/hl.
- **Vivai, floreali ed ornamentali in pieno campo e in serra:** contro afidi 65-100 cc/hl.
- **Forestali, pioppo:** contro maggiolino 65-100 cc/hl.

CARATTERISTICHE

THIODAN ds possiede una buona velocità d'azione, una sufficiente persistonza ed è efficace per contatto ed ingestione contro numerosi parassiti. Nella lotta agli afidi si consiglia di effettuare i trattamenti prima dell'accartocciamento delle foglie. THIODAN ds svolge inoltre un'azione secondaria sugli acari. La formulazione in dispersione ottimizza l'efficacia ed agevola l'impiego del prodotto. Per preparare la miscela versare la dose stabilita di THIODAN ds nel totale quantitativo d'acqua previsto, agitando la sospensione acquosa così ottenuta.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

THIODAN ds è miscibile con AFUGAN, DEROSALIN L, ELOSAL e COMPLESAL FLUID. Prima di procedere ad altre miscele effettuare saggi preliminari. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.10.84 It

PYRACUR FL

Diserbante selettivo della barbabietola da zucchero ad ampio spettro di azione.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Chloridazon puro	g 27,3
Metolachlor puro	g 8,8
Coformulanti q.b. a	g 100

(contiene glicole etilenico)
CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen/Rhein
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N.6234 **del** 10.4.85

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza nociva per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

— *Sintomi d'intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo: nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esottalmo, trisma, spasmi muscolari.*

— *Terapia: sintomatica.*

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PYRACUR FL è un diserbante selettivo della barbabietola da zucchero, efficace sia contro infestanti graminacee (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Poa, Alopecurus Lolium) sia contro infestanti a foglia larga quali: Amarantus sp. - Anagallis arvensis - Capsella bursapastoris - Chenopodium sp. - Diplotaxis sp. - Euphorbia helioscopia - Fumaria officinalis - Galeopsis tetrahit - Galinsoga parviflora - Lamium sp. - Matricaria chamomilla - Mercurialis annua - Papaver rhoeas - Bilderdykia convolvulus - Polygonum persicaria - Poligonum avicolare - Raphanus sp. - Rapistrum rugosum - Sinapis sp. - Solanum nigrum - Stachys annua - Stellaria media - Thlaspi arvense - Veronica sp.

Il PYRACUR FL si applica in pre-semina interrato ed in pre-emergenza della barbabietola e della infestanti.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Pre-semina: l 8-10 per ettaro. Interrare il prodotto a 2-3 cm di profondità.

Pre-emergenza: l 8-10 per ettaro.
Distribuire il prodotto con 300-600 litri di acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non è prevista la miscela con altri prodotti.

FITOTOSSICITA': Il prodotto non è indicato in terreni sciolti o leggeri.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

KG. 1

6235

PYRACUR

Diserbante selettivo della barbabietola da zucchero ad ampio spettro di azione.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Chloridazon puro	g 37,2
Metolachlor puro	g 12,4
Coformulanti q.b. a	g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft

6700 Ludwigshafen/Rhein

(Germania Federale)

Reg. Min. San. N. 6235 **del** 27.2.85

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza nociva per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

— *Sintomi d'intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo: nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esottalmo, trisma, spasmi muscolari.*

— *Terapia: sintomatica.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

PYRACUR è un diserbante selettivo della barbabietola da zucchero, efficace sia contro infestanti graminacee (Echinochloa, Digitaria, Setaria, Poa, Alopecurus Lolium) sia contro infestanti a foglia larga quali: Amarantus sp. - Anagallis arvensis - Capsella bursapastoris - Chenopodium sp. - Diplotaxis sp. - Euphorbia helioscopia - Fumaria officinalis - Galeopsis tetrahit - Galinsoga parviflora - Lamium sp. - Matricaria chamomilla - Mercurialis annua - Papaver rhoeas - Bilderdykia convolvulus - Polygonum persicaria - Poligonum avicolare - Raphanus sp. - Rapistrum rugosum - Sinapis sp. - Solanum nigrum - Stachys annua - Stellaria media - Thlaspi arvense - Veronica sp.

Il PYRACUR si applica in pre-semina interrato ed in pre-emergenza della barbabietola e della infestanti.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Pre-semina: Kg 7-9 per ettaro. Interrare il prodotto a 2-3 cm di profondità.

Pre-emergenza: Kg 7-9 per ettaro.
Distribuire il prodotto con 300-600 litri di acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non è prevista la miscela con altri prodotti.

FITOTOSSICITA': Il prodotto non è indicato in terreni sciolti o leggeri.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

KG.

6235

METFOS - PB

INSETTICIDA - ACARICIDA

COMPOSIZIONE

— METIOCARB puro . .	. . gr. 30
— ISOFENFOS puro . .	. . gr. 30
— Sospensivanti ed inerti .	q. b. a gr. 100

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrandole in fosse profonde un metro, cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Intossicazione per inalazione, ingestione e contatto cutaneo.

Sintomatologia: miosi, sudorazione profusa, nausea, vomito, diarrea, tremori muscolari a tipo fascicolazione, crampi muscolari, convulsioni, cianosi, ipotensione, coma e morte.

Consigli terapeutici: lavare sempre abbondantemente la cute e gli occhi. In caso di ingestione eseguire immediatamente lavanda gastrica previa intubazione se il paziente è in stato di incoscienza. Se è presente cianosi, somministrare ossigeno prima del trattamento.

Terapia: atropinizzazione (da 1 a 4 mg. a seconda della gravità dei sintomi). Ripetere a dosi di 1 mg. ogni 10-30 minuti anche per 24-48 ore. Qualora le convulsioni siano resistenti all'atropina, somministrare Na-thiopental 2,5% e. v. o Diazepam. Non somministrare PAM e ossime, morfina, teofillina, latte, olio e grassi.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in un Centro di Rianimazione.
Consultare comunque sempre un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Pero: contro la Psilla, la Carpocapsa e Minatrici delle foglie alla dose di gr. 250-350 per q.le acqua.
Barbabietola da zucchero: Kg. 1 per ettaro in 400-600 litri di acqua contro l'Altica e il Cleono.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima dell'inizio della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. 6236 del 27.2.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

6237

ANTAK®

Per distruggere i germogli ascellari del Tabacco.

COMPOSIZIONE

– n-decanolo puro	g	79
– Coadiuvanti : quanto basta a	g	100

(R) Marchio e prodotto originale Drexel Inc. - Memphis (USA)

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano – SpA
Viale Gian Galeazzo,3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE IV

Registrazione n. 6237 del 13.3.85 Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche :

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è costituito da un principio attivo e bagnanti che, diluiti in acqua, formano un'emulsione cremosa; la poltiglia irrorata con pompe a bassissima pressione su Tabacco, subito prima o subito dopo, la cimatura, distrugge per contatto i germogli ascellari; riducendo i costi della scacchiatura, aumentando la produzione e la qualità del tabacco. Un programma completo di controllo chimico dei germogli ascellari comprende un primo intervento con ANTAK ed un secondo trattamento con prodotti a base di Idrazide Maleica.

EPOCHE D'IMPIEGO

Se si interviene prima della cimatura i germogli ascellari non debbono superare la lunghezza di 2-3 cm. e la cimatura deve essere eseguita entro due giorni. Se si interviene dopo la cimatura, questa va effettuata dopo l'emissione dello scapo fiorale (alla fase di bottone e prima dell'apertura dei fiori), curando l'eliminazione dei germogli (scacchiatura) aventi una lunghezza superiore a 2-3 cm.; il trattamento con ANTAK deve essere effettuato al più presto e comunque non oltre due giorni dalla cimatura-scacchiatura.
Il trattamento può essere effettuato durante l'intera giornata ma preferibilmente il mattino su foglie asciutte e nel pomeriggio dopo che queste si sono riprese dall'appassimento delle ore più calde.
Non operare di sera o nel tardo pomeriggio con temperature superiori a 35°C ed in giornate di pioggia; il prodotto non deve giungere a contatto con la pagina inferiore delle foglie e pertanto non si deve intervenire in presenza di vento o su piante curvate o piegate. La pioggia non diminuisce l'efficacia del prodotto se cade dopo un'ora dall'intervento.

DOSI DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di lt. 5–7 per 100 litri di miscela acquosa (lt. 5 in 95, 6 in 94, 7 in 93). La quantità di poltiglia da impiegare varia in funzione dello sviluppo delle piante e deve essere sufficiente, scorrendo lungo il fusto, a raggiungere i germogli alle ascelle delle foglie basali, evitando inutili sprechi; sono in genere sufficienti da 15 a 25 cc di poltiglia per pianta, ciò che rende necessario un quantitativo di prodotto variabile da 10-15 a 30-40 lt. per ettaro a seconda della fittezza delle varietà di tabacco (Kentucky, Maryland, Nostrano del Brenta, Beneventano, Virginia Bright).
L'effetto del trattamento si rileva nel giro di un'ora circa con l'imbrunimento dei germogli.

NUMERO DEI TRATTAMENTI

Un solo intervento è sufficiente per devitalizzare i germogli ascellari primari e secondari; se la crescita dei germogli fosse particolarmente vigorosa potrebbe essere utile anche un secondo trattamento a distanza di 5-10 giorni dal primo (che può essere fatto anche in pre-cimatura). Più frequentemente si preferisce far seguire al trattamento con ANTAK un intervento con prodotti a base di Idrazide Maleica, 5-10 giorni dopo con l'irrorazione a tutto campo in 6-8 litri di prodotto per ettaro in 500 litri di acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il trattamento antigermogliante si esegue a mano con pompe a spalla (con apparecchiature accuratamente ed appositamente predisposte) munite di lancia (curvata o piegata a gomito e con dispositivo per una rapida apertura–chiusura) e di uno o più ugelli per consentire il trattamento al centro di ogni pianta dall'alto verso il basso ad un'altezza di 20 cm. circa dalla sommità; è necessario operare a bassissima pressione, la minima necessaria per l'irrorazione della poltiglia a pioggia con grosse gocce evitando invece la nebulizzazione e la conseguente deriva.
Le pompe debbono essere preventivamente ben lavate e bonificate dai residui di eventuali precedenti trattamenti.

Preparazione della poltiglia: la poltiglia si prepara versando prima la prestabilita dose di prodotto nel contenitore della pompa o in altro recipiente ed aggiungendo poi l'acqua gradatamente nel quantitativo prescritto mescolando continuamente ed energicamente, non si deve mai versare il prodotto nell'acqua ma solo viceversa. Per evitare separazione è necessario agitare la poltiglia prima e durante l'impiego.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : il prodotto si usa da solo; gli eventuali interventi con fungicidi e insetticidi non devono essere eseguiti nello stesso giorno del trattamento con il prodotto.

Fitotossicità: non trattare con il prodotto piante ammalate, debilitate, danneggiate da insetti o da grandine, piegate e contorte.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale,per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto Lt.**

6238

FENCAP - M

INSETTICIDA - ACARICIDA

COMPOSIZIONE

— METIOCARB puro . .	. . . gr. 30
— ISOFENFOS puro . .	. . . gr. 30
— Sospensivanti e inerti .	. q. b. a gr. 100

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrandole in fosse profonde un metro, cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione e contatto cutaneo.

Sintomatologia: miosi, sudorazione profusa, nausea, vomito, diarrea, tremori muscolari a tipo fascicolazione, crampi muscolari, convulsioni, cianosi, ipotensione, coma e morte.

Consigli terapeutici: lavare sempre abbondantemente la cute e gli occhi. In caso di ingestione eseguire immediatamente lavanda gastrica previa intubazione se il paziente è in stato di incoscienza. Se è presente cianosi, somministrare ossigeno prima del trattamento.

Terapia: atropinizzazione (da 1 a 4 mg. a seconda della gravità dei sintomi). Ripetere a dosi di 1 mg. ogni 10-30 minuti anche per 24-48 ore. Qualora le convulsioni siano resistenti all'atropina, somministrare Na-thiopental 2,5% e. v. o Diazepam. Non somministrare PAM e ossime, morfina, teofillina, latte, olio e grassi.

Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in un Centro di Rianimazione.

Consultare comunque sempre un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il FENCAP-M si usa alla dose di gr. 250-350/hl. contro:

Pero: Psilla, Carpocapsa, Tignola e Minatori delle foglie del pero.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima dell'inizio della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. 6238 del 27.2.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

6239

ERBICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DELLE AVENE SELVATICHE SU GRANO E ORZO

COMPOSIZIONE

— Difenzoquat puro . . gr. 23
— Bagnanti e solventi . q. b. a gr. 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consigli di pronto soccorso. In caso di ingestione provocare il vomito meccanicamente oppure dando da bere acqua saponata ripetendo fino a che il vomito non sia fluido e chiaro. Non somministrare niente per bocca al paziente privo di sensi. In caso di contatto effettuare per almeno 15 minuti profusi lavaggi di acqua agli occhi e sulla pelle rimuovendo abiti e scarpe se contaminati, che andranno lavati prima di essere riusati. In ogni caso chiamare il medico. Terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il CODEX si impiega alla dose di Kg. 4 - 5/Ha in 400 - 600 litri d'acqua nel periodo che va dall'inizio dell'accestimento e lo stadio del primo nodo palpabile. Viene consigliato per il controllo delle Avene Selvatiche (A. fatua, A. sterilis, A. ludoviciana A. barbata) che risultano maggiormente sensibili nel periodo che va dalla seconda foglia e la fine dell'accestimento.

Il CODEX è miscibile con i diserbanti fenossiderivati nella lotta primaverile alle infestanti dicotiledoni.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con MCPA.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico su alcune varietà di grano duro e per le colture non indicate in etichetta. In caso di trattamenti tardivi può causare temporanei ingiallimenti su grano duro.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. 6239 del 27.2.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

624(

AFICIDA

COMPOSIZIONE

— Butocarboxim puro . . . gr. 23
— Coadiuvanti, solventi q. b. a gr. 100

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto cutaneo.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

— gr. 200-300/ql. acqua contro Afidi che attaccano: **Melo, Pesco, Susino, Barbabietola da zucchero, Pomodoro, Cavolo, Cavolfiore, Insalata, Fagiolo, Rosa, Garofano e Gladiolo in pieno campo, Cineraria e Cipresso.**

Il prodotto esplica anche una buona azione acaricida.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. (Polisolfuri, poltiglia bordolese, calce).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non trattare in fioritura in quanto il prodotto risulta fitotossico alle api.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (Bo)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. 6240 del 27.2.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

6241

ERBICIDA SELETTIVO
PER IL CONTROLLO DELLE AVENE SELVATICHE NEL GRANO E ORZO

COMPOSIZIONE

— Difenzoquat puro . . . gr. 23
— Bagnanti e solventi . q. b. a gr. 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consigli di pronto soccorso: In caso di ingestione provocare il vomito meccanicamente oppure dando da bere acqua saponata ripetendo fino a che il vomito non sia fluido e chiaro. Non somministrare niente per bocca al paziente privo di sensi. In caso di contatto effettuare per almeno 15 minuti profusi lavaggi di acqua agli occhi e sulla pelle rimuovendo abiti e scarpe se contaminati, che andranno lavati prima di essere riusati. In ogni caso chiamare il medico. Terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'ELOZIN - L deve essere impiegato per il controllo delle Avene selvatiche (A. fatua, A. sterilis, A. ludoviciana) alla dose di Kg. 4-5/Ha in 400-600 litri nel periodo che va dall'inizio dell'accestimento e lo stadio del primo nodo palpabile. Le infestanti sono maggiormente sensibili nello stadio che va dalla seconda foglia e la fine dell'accestimento delle stesse.

ELOZIN - L è miscibile ai fenossiderivati nella lotta contro le infestanti dicotiledoni in post-emergenza.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: il prodotto è compatibile con MCPA.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di grano duro. In caso di trattamenti tardivi può causare temporanei ingiallimenti su grano duro.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S.p.A.
Melilli (Siracusa)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. 6241 del 13.3.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

624[illegible]

RIPCORD FIORI

III CLASSE

Attenzione manipolare con prudenza

Insetticida piretroide per le colture di garofani.

Il RIPCORD FIORI, prodotto del gruppo dei piretroidi, a base di cipermetrina, è dotato di attività insetticida nei confronti di numerosi fitofagi delle colture di garofani.

Agisce per contatto ed ingestione ed è inoltre dotato di azione repellente.

Possiede una attività insetticida assai pronta e consente inoltre una lunga protezione alla coltura trattata per la specifica azione repellente nei confronti dei fitofagi.

COMPOSIZIONE

— p.a.:
cipermetrina puro . . . . g 10,0
— coadiuvanti e solventi . q.b. a g 100,0

Contiene XILOLO.

RIPCORD è un marchio Shell.

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Evitare di respirarne i vapori;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva);
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione e per contatto.

Sintomi di intossicazioni (desunti da animali di laboratorio e rapido recupero). *Sedazione, atassia, andatura irregolare, deambulazione irrequieta con tremori occasionali e convulsioni.*

Consigli terapeutici:

In caso di contaminazione cutanea: togliere immediatamente gli abiti contaminati e lavare abbondantemente la pelle contaminata con acqua e sapone. Trattamento sintomatico.

In caso di contaminazione oculare: subito lavare abbondantemente con acqua gli occhi per almeno quindici minuti.

In caso di ingestione: provocare il vomito o procedere, con debita cautela, a lavanda gastrica; se il paziente è incosciente dopo averlo intubato. Somministrare sedativi del sistema nervoso centrale e anticonvulsivanti, preferibilmente Diazepam, per via iniettiva se si manifestano convulsioni. Sostenere opportunamente la respirazione, controllando ed aiutando le funzioni cardiovascolari e renali.
Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero a un Centro di rianimazione e consultare comunque un Centro Antiveleni.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO - Telefono 02/3885

Stabilimento:

Registrazione Ministero della Sanità N. 6242 del 27.2.85

MODALITA' DI IMPIEGO

Impieghi e dosi:

Parassita	Dosi cc/hl di acqua	Epoche e modalità di impiego
Afidi	25-50	Trattare all'inizio dell'attacco (prima dell'accartocciamento delle foglie).
Aleurodidi	200	Trattare all'inizio dell'infestazione
Cocciniglie	25	Trattare quando sono presenti le forme giovanili (neanidi).
Microlepidotteri Minatori delle foglie	200	Trattamenti alla schiusura delle uova e prima della comparsa delle mine.
Beghe	200	
Tripidi	100	
Tignole	25	

Il prodotto alle dosi di impiego non macchia la vegetazione o i fiori e non ha odori sgradevoli.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Diluire la quantità precisata di RIPCORD FIORI in poca acqua e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità d'acqua.

ATTENZIONE

Bagnare abbondantemente ed accuratamente la coltura, trattare anche le pagine inferiori delle foglie, per assicurare una protezione efficace di contatto ed ingestione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il RIPCORD FIORI è compatibile con i composti insetticidi e fungicidi. Non va miscelato con prodotti fortemente alcalini.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il RIPCORD FIORI è tossico per i pesci e gli insetti utili.

«**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

«**DA NON VENDERSI SFUSO**»

Contenuto:

6243

PROPACOR

ERBICIDA SELETTIVO PER LA DIFESA DEL RISO

Composizione

100 g di prodotto contengono:
— Principio attivo: PROPANIL puro . . g **35**
— Sostanze inerti e coadiuvanti: q.b. a . g **100**
Contiene Xilolo

CLASSE III°

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione, per contatto con la pelle.

Norme precauzionali - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche - *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

Controindicanti: *Oppiacei, sedativi e comunque farmaci depressivi del sistema nervoso centrale.*

AVVERTENZA: *Consultare un Centro Antiveleni.*

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità

PROPACOR è un erbicida con azione principale di contatto, senza azione residua, da impiegarsi in post-emergenza sia del riso sia delle infestanti. Trattandosi di un diserbante a prevalente azione di contatto il trattamento deve essere fatto con risaia asciutta.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO

Intervenire quando le infestanti sottoindicate sono in attiva crescita e in accordo ai seguenti stadi vegetativi:

A - Diserbo dei giavoni con contemporaneo contenimento delle alismatacee e ciperacee originato da seme.
1. Giavone con 1-2-3 foglie (media 2 foglie) Kg/Ha 9,5
2. Giavone con 3-4 foglie Kg/Ha 12
3. Giavone in 4 foglie sino all'accestimento Kg/Ha 16-19

Con giavone invecchiato (cresciuto in periodo con temperature basse) le sopra precisate dosi vanno aumentate in ragione del 30 %.

B - Come ausiliario di prodotti anticiperacee ed antialismatacee.
1. Per il controllo di Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus e Alisma plantago Kg/Ha 1,5-3
2. Per il controllo di Butomus umbellatus Kg/Ha 10-15

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - Ad esclusione degli erbicidi sopra menzionati il prodotto non va impegato in miscela con altri agrochimici. L'applicazione va effettuata prima e dopo 5 giorni dell'uso di tali prodotti onde evitare possibili danni alla coltura.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità - Alle dosi di impiego più elevate il PROPACOR, sotto particolari condizioni, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni. Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, frutteti, vigneti e colture orticole in genere.
Il PROPACOR è fitotossico se usato con insetticidi.

Intervallo di sicurezza - 30 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO (ITALY) - VIA VITTOR PISANI, 28
TELEFONO (02) 65.97.948 - TELEX 310510

Prodotto e confezionato da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 6243 del 13.3.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

6244

MANCOR

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO

Composizione

100 g di prodotto contengono:

— Principio attivo: MANCOZEB puro .	g **80**
— Sostanze inerti e coadiuvanti: q.b. a .	g **100**

CLASSE III°

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: *Consultare un Centro Antiveleni.*

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità
MANCOR è un fungicida dotato di elevata attività biologica. Intervenire appena si verificano le condizioni favorevoli alle infezioni fungine, proseguendo i trattamenti in accordo ai calendari suggeriti in zona.

DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

Coltura	Crittogama	g/hl
Melo-Pero	Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella gleodes	150-200
Vite	Peronospora, Antracnosi, Rossore parasistario	200
	Escoriosi	350
Pomodoro	(solo fino alla prima fioritura)	
	Personospora, Alternaria, Septoria,	200-300
	Antracnosi, Cladosporio	300-350
Tabacco	Contro la Peronospora:	
	— in semenzaio	100-150
	— in pieno campo	200
Pioppo	Marssonina brunnea, Ticchiolatura	400-500
Garofano	Ruggine	200-250
Cereali in campo	Contro Ruggine e Septoria intervenire fra lo stadio di botticella e l'emissione della spiga impiegando Kg/ha 2,5	
Concia dei semi	Contro la carie mescolare accuratamente 150 g per q.le di seme.	

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA'
Il MANCOR è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari. Incompatibile con la poltiglia solfo-calcica e con i concimi fogliari contenenti boro.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispetttato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI FITOTOSSICITA'
Il prodotto è fitotossico per le varietà di Pero sensibili (quali: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO (ITALY) - VIA VITTOR PISANI, 28
TELEFONO (02) 65.97.948 - TELEX 310510

Formulato da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

Confezionato da: SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

Registrazione Ministero della Sanità N. 6244 del 15.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg.

6245

TERPAL C

Regolatore di crescita per cereali (frumento, orzo, segale).

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Clormequat puro	g.	27,2
(contiene cloruro di colina)		
Etefon puro	g.	13,8
Solvente q.b. a	g.	100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - MILANO

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft
6700 LUDWIGSHAFFEN/RHEIN
(Germania Federale)

Reg. Min. N.° 6245 **del** 7.2.85

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli e gli indumenti.
Usare guanti ed occhiali protettivi data l'azione irritante dermale ed oculare del prodotto.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomatologia
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale. L'ingestione di alte dosi, sugli animali di laboratorio, provoca crampi tonico-clonici (sintomi colinergici).

Terapia
In caso di contaminazione cutanea, togliere gli abiti e lavare abbondantemente con acqua le parti contaminate.
In caso di ingestione provocare il vomito, o meglio praticare lavanda gastrica.
Somministrazione di carbone medicinale.
Arieggiare l'ambiente ed in caso di svenimento porre il paziente in posizione stabile laterale e se necessario praticare la respirazione artificiale.
L'eventuale ulteriore terapia è sintomatica.
La somministrazione per via orale (mai per via endovenosa) di cloruro di colina come antidoto è raccomandabile con prudenza.
Comunque, in caso di intossicazione grave o presunta grave consultare un centro antiveleni e trasferire l'intossicato, quanto più rapidamente possibile, in un centro di rianimazione.

Controindicazioni
Cloruro di colina per via endovenosa. Latte, grassi ed alcool.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TERPAL C è un regolatore di crescita che, ostacolando temporaneamente la formazione delle sostanze che determinano l'allungamento delle cellule, induce un accorciamento ed un ispessimento degli internodi dei culmi e quindi una maggiore resistenza all'allettamento. Ciò rende possibile una più spinta concimazione azotata con conseguenti maggiori rese produttive.
L'impiego del TERPAL C aumenta la resistenza delle piante al gelo, alla siccità, alle concentrazioni saline e agli attacchi parassitari (animali e vegetali).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si applica per via fogliare nel periodo compreso tra lo stadio del secondo nodo (stadio vegetativo 32 secondo la scala Zadoks) e l'emissione dell'ultima foglia (stadio vegetativo 39) sul culmo principale.
Dosi d'impiego:
Frumento e Orzo: 2-2,5 l/ha.
Segale: 1,5-2 l/ha.
Per la distribuzione del prodotto si adopera un quantitativo di acqua non inferiore a 200 litri per ettaro.
Il trattamento con TERPAL C può essere associato all'intervento con fungicidi purchè venga rispettata l'epoca d'impiego sopra indicata.
Eventuali trattamenti erbicidi, invece, devono essere eseguiti prima dell'applicazione di TERPAL C.
Il prodotto può esplicare completamente la sua azione se non intervengono piogge entro 4-5 ore dalla sua applicazione.
Evitare di trattare i seminati che presentano sintomi di carenza nutrizionale o danneggiati da ristagni d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il TERPAL C è miscibile con Bavistin, Calixin e con concimi fogliari BASF. E' possibile la miscela con concimi azotati, ma data l'epoca d'impiego prevista, non oltre la dose di 10 kg/ha di azoto.
Sconsigliabile la miscela con fungicidi del gruppo dei ditiocarbammati.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

I.

6246

IV CLASSE

COSAN S

(POLVERE BAGNABILE)
ANTIOIDICO PER IRRORAZIONE CONTRO GLI AGENTI DEL MAL BIANCO, AD AZIONE COMPLEMENTARE CONTRO LA TICCHIOLATURA E RAGNO ROSSO

Registrazione Ministero Sanità n. 6246 del 7.2.85
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Zolfo ventilato puro (esente da Selenio)	gr. 80
— Coformulanti	q.b. a gr. 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Vite
Contro l'Oidio: gr. 100 per trattamenti preventivi, irrorando spesso e regolarmente, gr. 150 irrorando meno spesso; trattamenti curativi: gr. 150-200 (la dose inferiore a temperatura elevata).

Melo e Pero
Contro l'Oidio e la Ticchiolatura: gr. 300-200. Eseguire i trattamenti dall'inizio della primavera all'estate con dosi gradualmente decrescenti.

Pesco
Contro l'Oidio: gr. 80-100. Contro l'Acarinosi: gr. 200, intervenendo poco prima della schiusura delle gemme.

Cetrioli, Crisantemi, Cinerarie, Begonie, Ortensie e altre orticole e floricole
Contro l'Oidio gr. 80-100.

Nocciuolo
Contro l'Eriofide: gr. 150-200, dall'emissione delle prime foglie eseguire 3-4 trattamenti ad intervalli di circa 15 giorni.

Rosa
Contro l'Oidio: gr. 100-200 nei trattamenti estivi e gr. 300 nei trattamenti invernali.

Quercia
Contro l'Oidio: gr. 100-200 nei trattamenti estivi e gr. 300 nei trattamenti invernali.

Tabacco:
Contro l'Oidio: gr. 125-150, intervenire, al primo manifestarsi dei sintomi, con 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni.

Pomodoro
Contro l'Acaro rugginoso: gr. 150-250.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo di distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.
Per aumentare l'efficacia del trattamento aggiungere alla miscela 50 grammi per ettolitro di bagnante-adesivo Irol.
Stemperare il prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua o della miscela antiparassitaria continuando ad agitare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari ad eccezione di quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), olii minerali, Captano, DDVP, Binapacril, Diclofluanide.

Avvertenza:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

— **Fitotossicità:** il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser - Alexander - Olivier De Serres - William - Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese

CUCURBITACEE — può essere fitotossico.

Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Non effettuare i trattamenti in estate, nelle ore più calde del giorno.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

contenuto Kg.

6247

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIAMID 15 G

(GRANULARE)

ERBICIDA GRANULARE A LUNGA PERSISTENZA PER LA LOTTA LOCALIZZATA CONTRO I ROMICI CHE INFESTANO I PRATI STABILI E DA VICENDA E PER LA LOTTA CONTRO LE MALERBE ANNUALI E PERENNI CHE INFESTANO LE AREE NON AGRICOLE

Registrazione Ministero Sanità n. 6247 **del** 7.2.85
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Clortiamid puro	g 15
— Coformulanti	q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto esplica la sua azione per assorbimento radicale, indifferentemente su terreno lavorato o sodo, e devitalizza i semi in germinazione, i rizomi, gli stoloni, i bulbi, nonché le malerbe già in vegetazione. La durata dell'azione diserbante è, in media, di 4-6 mesi, per quanto, in alcuni casi, essa possa risultare anche superiore.
Il prodotto non è infiammabile nè esplosivo, non è corrosivo per legno, metalli e rivestiture di cavi. E' cattivo conduttore della elettricità.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Lotta contro i Romici che infestano i prati stabili e da vicenda:
Localizzare il prodotto in quantità pari alla punta abbondante di un cucchiaino da caffè (0,2-0,3 grammi di prodotto) sulla rosetta formata dalle foglie basali dei Romici, preferibilmente all'inizio della vegetazione. Questo quantitativo è sufficiente a devitalizzare completamente una pianta.
L'applicazione può essere fatta a mano o con apposita attrezzatura meccanica.
Evitare la distribuzione di dosi superiori a quella prescritta, al fine di non provocare vuoti troppo ampi alla cotica erbosa.

Diserbo industriale:
Spargere uniformemente sul suolo il prodotto con macchine spargigranuli a tramoggia, mototrainate o spalleggiate, anche su terreno previamente non lavorato. L'applicazione deve aver luogo preferibilmente a fine inverno od inizio della primavera (nelle regioni del Sud anche in autunno) quando le erbe infestanti sono negli stati iniziali di sviluppo.

Diserbo di aree industriali, linee ferro-tramviarie, sentieri in terra battuta, argini di canali, dighe, zone archeologiche, piazzali di fabbriche, cimiteri, cortili, selciati, campi da tennis e altre aree sportive, piste di aeroporti, fasce tagliafuoco e luoghi incolti in genere:
Kg. 10-15 di prodotto ogni 1000 metri quadrati.

Diserbo preventivo di opere idrauliche e stradali (canali, strade, piste, dighe):
Kg. 20 di prodotto ogni 1000 metri quadrati dopo il termine dei movimenti di terreno (profilature) e poco prima della posa in opera del rivestimento. Ciò al fine di prevenire l'azione disgregatrice operata dalla vegetazione infestante sui rivestimenti in bitume, calcestruzzo e simili posti a contatto con il terreno ed anche se spessi e monolitici.

Diserbo delle banchine di strade e autostrade:
Kg. 5-8 di prodotto per fasce della larghezza di cm. 50 e della lunghezza di 1 Km.

Diserbo del fondo dei canali dalle infestanti sommerse e natanti:
Kg. 10-15 di prodotto secondo il grado di infestazione, ogni 1000 metri lineari e per ciascun metro di larghezza del fondo. Distribuire il prodotto sul fondo del canale in asciutta, dopo l'annuale operazione di spurgo.
Al termine dell'applicazione i canali devono rimanere in asciutta per circa 20 giorni: trascorso tale periodo non vi è alcun rischio di dilavamento o di asportazione del prodotto, ormai già fissato nel letto del canale.
Nei canali a riempimento periodico si consiglia di effettuare l'operazione di diserbo dopo il turno di irrigazione, sul fondo ancora umido, sempreché siano nelle normali condizioni di manutenzione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A. **CONTENUTO KG.**

prodotto nello stabilimento di

SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza, 172 - ROMA

6248

INSETTICIDA NEMATOCIDA SISTEMICO IN MICROGRANULI PROTETTI

1 CLASSE

VELENO

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

- Aldicarb puro .... gr. 4
- Lindano puro .... gr. 1
- Supporti .... q.b.a gr. 100

Registrazione Ministero Sanità N. 6248 del 7.2.85

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Fitofarmaco composto da un carbammato (inibitore della colinesterasi) e da un clororganico (lipofilo). Assorbimento per via cutanea, inalatoria, orale.

Intossicazione acuta ed elevate dosi per ingestione.

Sindrome neurologica con ipereccitabilità neuromuscolare tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, sindrome gastrointestinale con nausea, vomito, diarrea, scialorrea, lacrimazione. Esito in edema polmonare.

Intossicazione per vie inalatorie e cutanea.

Sindromi neurologica e gastrointestinale più lievi e sindrome cutaneo-mucosa irritativa (cute, congiuntive, vie respiratorie). Per contatto ripetuto possibilità di dermatosi a tipo eczematoso.

Consigli terapeutici: Lavanda gastrica con bicarbonato sodico. Evitare purganti oleosi, latte, sostanze grasse in genere e alcool. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specie ai bambini.
Diazepam 10-20 mg per via endovenosa da ripetere. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero in Centro di Rianimazione.
Controindicate le ossime (PAM, Contrathion), l'adrenalina e gli oppiacei.
Ossigenoterapia per la cianosi. Accurato lavaggio cutaneo se vi fu contatto.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleno.

NATURA DEL RISCHIO:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Contenuto netto kg.
Officina di produzione:
La Littorale S.A.
19, quai du Port Neuf - 34505 Béziers, Francia

* Marchio registrato della:
UNION CARBIDE CORPORATION, USA
84720

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.

Via Durini 28
20122 Milano
Tel. 77 571
Telex: 311 068 ucimi

Distribuito da :

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO

MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE

l'Aldicarb/Lindano Union Carbide - TRANID 5G è un nematocida, insetticida sistemico microgranulare. L'associazione dei principi attivi, Aldicarb ad azione sistemica e Lindano ad azione di contatto e per ingestione, conferisce al prodotto un ampio spettro di azione contro i principali parassiti terricoli della barbabietola da zucchero. In particolare l'Aldicarb, se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna di semina in posto.

COLTURE PROTETTE
barbabietola da zucchero.

PARASSITI COMBATTUTI
Insetti del terreno: elateridi, agrotidi, maggiolino, grillotalpa, atomaria
Fitofagi fogliari: altica, pegomya, afidi, cleono, lisso
Nottuidi: mamestra, agrotis, caradrina.
Nematodi: incistati *(Heterodera)* liberi e galligeni *(Ditylenchus, Meloidogyne)*.
Miriapodi: Blaniulus guttulatus.

DOSI DI IMPIEGO LOCALIZZATO

Dose normale di impiego per una difesa totale 15-20 Kg/ha. In caso di forti infestazioni di nematodi (Heterodera) in abbinamento al trattamento con Aldicarb/Lindano Union Carbide - TRANID 5G si consiglia di fare un trattamento a pieno campo con 30-40 Kg/ha di Aldicarb Union Carbide - TEMIK 5G.

EPOCA DEL TRATTAMENTO

Alla semina della coltura. Un trattamento effettuato al momento della semina esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50-60 giorni fino allo stadio cioè di 4 foglie vere.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Alla dose normale di impiego applicare il prodotto durante la semina localizzato al livello dei glomeruli sul fondo del solchetto di semina con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare dosi superiori a 15 Kg/ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicare l'Aldicarb/Lindano Union Carbide - TRANID 5G lateralmente al seme ed una distanza di 2-3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme. Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore.

ATTENZIONE

Il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici. Effettuare un unico trattamento al momento della semina.

Distribuito da :

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO

DA NON VENDERSI SFUSO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Distribuito da :

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO

COMPATIBILITÀ

Con altri principi attivi: Usare il prodotto da solo.

FITOTOSSICITÀ
Per dosi superiori a 15 Kg/ha si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per l'uso consentito: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

6249

IV CLASSE

ACRITAN

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE A LUNGA PERSISTENZA

Registrazione Ministero Sanità n. 6249 **del** 7.2.85

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Captafol puro	g. 80
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con i prodotti puri o diluiti, ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua) e digitale.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

L'ACRITAN è un fugicida di sintesi di alta efficacia e persistenza superiore a quella dei sali di rame, in grado di controllare numerose malattie delle piante. La sua efficacia, unitamente alla sua buona selettività sulla vegetazione, rende particolarmente interessante il suo impiego nella difesa delle colture dalle crittogame parassite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Pesco e Mandorlo: Contro la Bolla, la Gommosi e il Cancro dei rami: 250 g/hl per i trattamenti al « bruno » e 150 g/hl per i trattamenti su piante in piena vegetazione. Date le caratteristiche del prodotto, il normale calendario di trattamento al « bruno », che prevede un 1° intervento alla caduta delle foglie, un 2° in primavera nella fase di ingrossamento delle gemme a fiore, ed eventualmente un 3° da effettuarsi in pieno inverno, può essere sostituito da un unico trattamento alla dose di 800 g/hl da effettuare alla caduta delle foglie.
Pesco: Contro la Ruggine: 150 g/hl.
Mandorlo: Contro il Marciume Bruno: 250 g/hl nei trattamenti al « bruno » e 100-150 g/hl nei trattamenti al « verde ».
Olivo: Contro l'Occhio di Pavone: 250-300 g/hl. Effettuare 2 trattamenti, di cui il 1° in pre-fioritura ed il 2° ai primi di Settembre. Con andamento stagionale piovoso, il 2° trattamento dovrà essere anticipato di 2-3 settimane.
Melo e Pero: Contro i Cancri del legno: 200 g/hl, da applicarsi nella fase di « orecchiette di topo » per il melo e di « mazzetti affioranti » per il pero. A questo primo trattamento dovranno seguirne altri due, di cui il primo all'inizio della caduta delle foglie ed il secondo a defogliazione completa.
Contro la Ticchiolatura: 75-150 g/hl.
Pero: Contro l'Alternariosi: 150 g/hl.
Albicocco e Ciliegio: Contro il Marciume Bruno: 250 g/hl nei trattamenti al « bruno » e 100-150 g/hl nei trattamenti al « verde ».
Ciliegio: Contro la Cilindrosporiosi: 100 g/hl.
Susino: Contro la Ruggine: 150 g/hl.
Agrumi: Contro l'Allupatura e la Melanosi: 150 g/hl.
Contro la Gommosi del Colletto, mediante pennellature del tronco: 150 g/hl.
Vite: Contro la Muffa Grigia e la Peronospora: 120-150 g/hl, sospendendo i trattamenti sei settimane prima del raccolto per le uve da vino (sulle uve bianche il prodotto può dar luogo, in alcuni casi, a fenomeni fitotossici sugli acini se impiegato nel periodo che segue immediatamente la fioritura).
Fragola: Contro la Muffa Grigia: 200 g/hl.
Pomodoro: Contro la Peronospora, l'Alternariosi e la Septoriosi: 150-200 g/hl.
Patata: Contro la Peronospora e l'Alternariosi: 200 g/hl.
Lattuga, Sedano, Cucurbitacee, Solanacee, Fagiolino, Fagiolo e Cipolla: Contro l'Antracnosi, la Cladosporiosi, la Septoriosi, l'Alternariosi, la Fusariosi, le Peronospore e le Cercospore: 150-200 g/hl.
Riso, Grano, Orzo, Avena, Segale e Mais: Contro l'Elmintosporiosi, il Mal del Piede, il Brusone, trattare il seme con 200 g/q.le.
Bietola: Contro la Cercosporiosi e il Mal del Piede, trattare il seme con 600 g/q.le.
Garofano: Contro la Fusariosi: 100 g/hl, immergere le talee nella sospensione ottenuta, prima di trapiantarle. Qualora lo si desideri il prodotto potrà essere applicato, alla stessa dose, per irrorazione sulle piantine già trapiantate, avendo cura di bagnare bene il terreno intorno alle stesse.
Contro la Ruggine: 150 g/hl.
Rosa: Contro la Peronospora e la Ticchiolatura: 100 g/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

L'ACRITAN è compatibile con la generalità dei fungicidi, insetticidi ed acaricidi in commercio. Da escludere le miscele con prodotti a reazione alcalina e con gli olii.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto per tutte le colture esclusa la vite (uva da vino) sulla quale i trattamenti dovranno essere sospesi 40 giorni prima della raccolta.

- **Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per l'uso consentito; ogni altro uso è pericoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A. contenuto Kg.

prodotto nello stabilimento di -

SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza, 172 - ROMA

6250

GLIFOSOL

DISERBANTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA AD AZIONE TOTALE SU MALERBE ANNUALI E PERENNANTI

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

— GLIFOSATE puro (come sale isopropilamminico) gr. 36

— Coformulanti q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non usare o conservare il **GLIFOSOL** in contenitori zincati o di acciaio non protetti da apposite vernici perché potrebbe reagire coi metalli sviluppando un gas molto infiammabile che potrebbe essere pericoloso in presenza di fiamme (es. una sigaretta accesa). Non lasciare nelle irroratrici per lungo periodo la miscela pronta per l'uso. Dopo l'applicazione pulire accuratamente le pompe e i recipienti impiegati.
Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

IMPIEGO: Diserbo di ripe, di fossi, bordi stradali, sedi ferroviarie, piazzali di depositi e impianti industriali, stoppie di cereali, impianti adulti di Meli, Peri, Viti ed Agrumi.
Dosi e modalità di impiego: Il prodotto va usato nelle infestanti ben sviluppate bagnando bene le erbe senza provocare sgocciolamenti alle seguenti dosi:

— 3-5 Kg. per ettaro in 400-500 litri di acqua contro la maggior parte delle erbe annuali.

— 4-5 Kg. per ettaro contro: Sorghum, Agropyrum, Ranunculus.

— 5-7 Kg. per ettaro contro: Cyperus, Cirsium, Artemisia, Potemtilla, Tarexacum, Rumex.

— 8-10 Kg. per ettaro contro: Convolvolus, Urtica, Cannuccia.

Non irrorare il prodotto in giornate ventose ed evitare in ogni caso il contatto con le foglie delle colture e con i tronchi non ben lignificati.
AVVERTENZA: La caduta di pioggia entro 6 ore dal trattamento ne riduce l'efficacia. Dopo il trattamento su erbe perennanti aspettare 2-3 settimane prima di lavorare il terreno per consentire al prodotto di esplicare l'azione erbicida in modo completo.
PREPARAZIONE: Agitare la confezione prima dell'uso, diluire la dose prestabilita in poca acqua e versarla poi nel totale quantitativo d'acqua da irrorare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto si usa da solo.
FITOTOSSICITA': Evitare che il prodotto vada a contatto con l'apparato fogliare e i rami non lignificati delle colture agricole. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

TERRANALISI s.n.c.
VIA DONIZZETTI N. 2/A - **CENTO** (Ferrara) - Tel. 90.62.07

Stabilimento di produzione:TERRANALISI - RENAZZO (FE) - Via IV Novembre

Registrazione n. 6250 del 10.4.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO Kg. 1**

6251

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

BANVEL 21 S

(SOLUZIONE)
ERBICIDA SELETTIVO PER IL CONTROLLO DELLE MALERBE NEI CEREALI (MAIS, GRANO, ORZO, AVENA) E NELLE ASPARAGIAIE

Registrazione Ministero Sanità n. 6251 **del** 7.2.85
marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Dicamba puro	g. 21,2
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe con cui giunge a contatto. Il prodotto viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. Date queste sue caratteristiche il prodotto è in grado di controllare anche le malerbe dicotiledoni perennanti quali Convolvulus arvensis e Cirsium arvense. La sua azione si estende poi alla generalità delle malerbe annuali, quali:

— Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Ajuga spp., Atriplex patula, Capsella bursa pastoris, Centauréa cyanus, Chenopodium album, Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum persicaria, Polygonum convolvulus, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Senecio vulgaris, Solanum nigrum, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica spp., Vicia spp., Abutilon theophrasti.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Grano e cereali minori (orzo, avena, segale): il trattamento può essere effettuato dallo stadio di 5-6 foglie della coltura e fino allo stadio di botticella. E' comunque consigliabile trattare quanto più precocemente possibile al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe. Dose applicativa: 0,6-1,5 Kg/Ha.
Mais: Applicare il prodotto in post-emergenza, con erbe già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm. Il prodotto, distribuito in questa fase, è in grado di controllare, oltre alle dicotiledoni annuali, anche piante perenni, fra le quali, di preminente importanza per il mais, il Convolvulus sepium e Convolvulus arvensis. Dose applicativa: 0,8-1,2 Kg/Ha.
Asparago: Il prodotto si impiega in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido. Dose applicativa: 0,200-0,600 Kg/Ha. Il prodotto, per una razionale distribuzione, va diluito in 5-6 quintali di acqua per Ha.

AVVERTENZE

— Non applicare il prodotto su colture di mais, impiantate su terreni sabbiosi o con basso contenuto di materia organica (meno del 2%), in quanto in questi terreni, il prodotto, oltre ad essere facilmente dilavato dalle piogge, potrebbe essere fitotossico per la coltura.
— Non trattare mais di altezza superiore ai 60-70 cm.
— Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Qualora le condizioni operative lo richiedano, il prodotto può essere impiegato in miscela con MCPA e MECOPROP, a dosi dimezzate.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di
San Vincenzo di Galliera (Bologna)

contenuto Kg.

6252

CROPOTEX

ACARICIDA

inibitore dello sviluppo degli acari (ragnetti rossi, ragnetti gialli) che infestano le colture ornamentali in pieno campo e in serra

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Cropotex contengono:
g 50 di flubenzimin puro;
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi e modo d'impiego: 0,1% (100 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-4 interventi a seconda dell'andamento climatico più o meno favorevole all'infestazione ad intervalli di 30 giorni.
Essendo il prodotto un inibitore di sviluppo è necessario, per ottenere buoni risultati, che l'inizio dei trattamenti sia anticipato rispetto ai normali interventi acaricidi e cioè alla comparsa dei primi sintomi di infestazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto può essere miscelato con antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non impiegare il Cropotex in vicinanza di un intervento con zolfo in polvere.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura, con esclusione di colture destinate all'alimentazione; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco
Registrazione Ministero Sanità n.6252 **del** 7.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6253

CAPTAN LIQUIDO RUMIANCA

Fungicida liquido a base di Captan

COMPOSIZIONE

- Captan puro . . . . g 39
- Disperdenti, emulsionanti, solventi . . . . q.b. a g 100
  Contiene glicole elitenico

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Conservare la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
TERAPIA: Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **CAPTAN LIQUIDO RUMIANCA** è un fungicida organico in formulazione liquida indicato per la lotta contro crittogame parassite delle piante coltivate (Peronospore, Ticchiolature, Alternariosi, Ruggini, Antracnosi) con azione contro i marciumi come la Muffa grigia dell'uva, la Muffa grigia della fragola (Botrytis), la marcescenza dei frutti pendenti ed immagazzinati (Monilia, Gloeosporium)

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

Melo - Pero: 0,3-0,35% (g 300-350 per hl di acqua)
Può usarsi regolarmente per l'intero programma antiticchiolatura, tuttavia è utile applicare il prodotto negli ultimi trattamenti
- per prevenire le forme di marcescenza (Moniliosi) dei frutti pendenti;
- per accrescere la difesa dagli attacchi di Botrytis, Gloeosporium dei frutti immagazzinati

Evitare trattamenti associati di Captan e Zolfo.

Vite: 0,3-0,35% (g 300-350 per hl di acqua)
Contro la Muffa grigia dell'uva (Botrytis cinerea) iniziare i trattamenti subito dopo l'allegagione continuandoli ad intervalli di 10-15 giorni e sulle uve da vino sospendendoli 40 giorni prima della vendemmia al fine di evitare azioni negative sulla fermentazione dei mosti

Fragola: 0,3-0,35% (g 300-350 per hl di acqua)
Contro marciume o Muffa grigia (Botrytis cinerea), Maiolatura (Sphaerella fragariae) applicare i trattamenti dal periodo prefioritura, proseguendoli settimanalmente per 3-4 volte

Colture orticole e floreali: 0,25-0,35% (g 250-350 per hl di acqua)
Contro Botrytis, Fusarium, Septoria, Antracnosi (asparago, fagiolo, pisello, cocomero, melone, carota, sedano, melanzana, cipolla, peperone, pomodoro)
Contro le varie forme di marciume da Botrytis (gladiolo, giacinto, tulipano, violaciocca, rosa)
Per la protezione delle talee delle colture floricole ed ornamentali, immergere le talee in una soluzione formata da g 60 di **CAPTAN LIQUIDO RUMIANCA** in 10 litri di acqua, addizzionandovi eventualmente un radicante
Per la protezione dei bulbi, immergere i bulbi, prima dell'impianto, in una soluzione formata da g 120 di **CAPTAN LIQUIDO RUMIANCA** in 10 litri di acqua, addizzionandovi g 10 di CHINOSAN.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il CAPTAN LIQUIDO RUMIANCA è compatibile con la quasi totalità degli antiparassitari purchè a reazione neutra o debolmente acida. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri), con olii e con zolfi. Nell'esecuzione dei trattamenti, occorre distanziare di almeno tre settimane le applicazioni di **CAPTAN LIQUIDO RUMIANCA** da quelle con olii e zolfi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: CAPTAN LIQUIDO RUMIANCA può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto
e 40 giorni per le uve destinate alla vinificazione

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA
AnicAgricoltura s. p.
VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: SARIAF S.p.A
Stabilimento di Faenza - Ravenna

Registrazione del Ministero della Sanità n. ..

DA NON VENDERSI SFUSO

625

TRITICON

Diserbante selettivo per il frumento e cereali minori

COMPOSIZIONE

– Chlortoluron puro . . . . g 76
– Bagnanti, disperdenti, inerti . . . . q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
– Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
– Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

TRITICON è un erbicida di pre e post-emergenza selettivo su frumento, orzo e cereali minori. Attivo sia per via radicale che per via fogliare, il prodotto controlla infestanti annuali, graminacee ed a foglia larga quali Alopecurus, Apera, Chenopodium, Galeopsis, Lamium, Matricaria, Mercurialis, Polygonum.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

– Pre-emergenza
Si consiglia il trattamento in questo periodo per controllare soprattutto le infestanti graminacee (Alopecurus, Apera, Avena fatua, Lolium, Capsella).
Dose d'impiego: **2,5-3 kg/ha in circa 400-600 litri d'acqua**
L'intervento con **TRITICON** si effettua dopo la semina e comunque sempre prima dell'emergenza della coltura. Si consiglia di preparare accuratamente il terreno in modo che si presenti ben livellato e sminuzzato; dove è possibile è preferibile rullare dopo la semina e prima del trattamento.
– Post-emergenza
Intervenire a fine inverno, verso febbraio-marzo, quando il frumento si trova ad uno stadio di sviluppo compreso tra la 4ª foglia e l'inizio dell'accestimento. È necessario altresì che le infestanti non abbiano superato la 4ª-5ª foglia.
Dose d'impiego: **1,5-2 kg/ha con 600-1000 litri di acqua**

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con la generalità degli antiparassitari.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSOCITÀ: È sconsigliabile l'impiego di **TRITICON** sia sui terreni sabbiosi sia su quelli ove di norma si possono formare ristagni d'acqua, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di fitotossicità. Evitare di intervenire in post-emergenza con temperature elevate. Non trattare sulla varietà di frumento Demar 4 e su varietà di frumento duro e orzi polistici, notoriamente sensibili si derivati ureici.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Prodotto negli stabilimenti della Società ANICAGRICOLTURA
Unità di Carrara-Avenza (MS)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6254 del 7.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6255

CLASSE II

X

NOCIVO

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

Dimetoato puro	gr.	8
Endosulfan puro	gr.	4
Solventi emulsionanti q.b.	a	100

Contiene Xilolo

TECNICA QUALITÀ

TECNITERRA s.r.l.

Antiparassitari - Fertilizzanti Idrosolubili

Uffici:
20129 MILANO - Via N. Bixio, 34
Sede Legale e Stabilimento:
SEGRATE (MI) Via Tiepolo, 9

NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intossicazione mortale per inalazione per ingestione o per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessbile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso o con mezzi più idonei (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva) le confezioni che contenevano il prodotto. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: L'ENDOGOR è composto da un estere fosforico associato con un clororganico, sostanze chimiche aventi meccanismi tossicologici diversi.

Si presume che l'intossicazione sia clinicamente dominata dall'estere fosforico, però, nel caso di ingestione in un secondo tempo potrebbe manifestarsi anche una sintomatologia da clororganici.

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione, contatto, cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *Scialorrea - vomito - dolori addominali - spasmi bronchiali - dispnea - lacrimazione - miosi - bradicardia - ipotensione - fibrillazione muscolare - convulsioni - edema polmonare*

Consigli terapeutici: Salvo i casi di cianosi iniziale da combattere con respirazione artificiale ed ossigenoterapia. Iniezioni endovenose di solfato di atropina 1-2 mg. per adulti e 0,2-1 mg. per bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (contrathion) per iniezione endovenosa lenta. Se vi è stato contatto cutaneo, detersioni con profusi lavaggi della cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico

Alcune controindicazioni: *La morfina, e per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina, l'alcool, sostanze grasse e latte*

Registrazione N. 6255
del Ministero della Sanità del
..2.85

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE: Agisce per contatto, ingestione e penetra nei tessuti vegetali distruggendo gli insetti protetti. Ha azione contro gli insetti ad apparato boccale, succhiatore e masticatore

FRUTTICOLTURA: (melo, pero, pesco, susino), afidi, tentredini, antonomo, mosca della frutta, psilla del pero, cidia e anarsia del pesco

VITICOLTURA. cicaline, tignola, sigaraio della vite

COLTURE INDUSTRIALI: (barbabietola colza, pioppi) cleono, altica, afidi, nottue, mamestra della barbabietola, meligete del colza, crisomela, afidi, limantria del pioppo

ORTICOLTURA: (asparago, cavolo, fagiolo, fava, sedano) afidi, aleurodi, tripidi, mosca del sedano, criocera degli asparagi, cavolaie

OVICOLTURA: palumella bianca, mosca dell'olivo

FLORICOLTURA: in pieno campo o in serra: tortrici (bega) e tripidi del garofano afidi e tripidi della rosa

CEREALI: nottue e mamestra del mais, afidi del riso

DOSI D'IMPIEGO: gr. 350-700 per 100 litri di acqua.

«Da non applicare con mezzi aerei».

COMPATIBILITÀ: È compatibile con i comuni antiparassitari non alcalini e con integratori fogliari

«AVVERTENZA»: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHIO DI NOCIVITÀ: È tossico agli insetti utili agli animali domestici, pesci e bestiame

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.

«Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso»

«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato»

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg

6256

CLASSE IV

Maladust 10

Insetticida

Composizione

100 gr. di prodotto contengono:
gr. 10 di MALATHION puro
q. b. a 100 di supporti

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni

Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

Il MALADUST 10 trova utile impiego nelle operazioni di disinfestazione specificamente agricole, per il vasto campo d'azione del principio attivo in esso contenuto, che si esplica per contatto e per ingestione contro numerosi insetti dannosi alle principali colture agrarie:

— **FRUTTIFERI (agrumi, drupacee, pomacee), VITE, OLIVO:** Afidi, Antonomi, Carpocapsa, Tentredini, Tignole, Tingidi, Tripidi;
— **ORTAGGI (bietola, pisello) e COLTURE FLOREALI:** Afidi, Bega, Tentredini, Tripidi;
— **FORAGGERE:** Apion, Fitonomo, Misurino.

Dosi e modalità d'impiego

Eseguire il trattamento con polverizzatrici, spargendo il prodotto in ragione di 12-15 Kg. per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Può essere miscelato con qualsiasi altro insetticida od antricrittogamico, purchè ad azione neutra.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non trattare le piante durante la fioritura.

Nocività

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S.p.A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Officina di produzione e sede amministrativa:
FAENZA - Via S. Silvestro, 1

Registrazione Ministero della Sanità N. 6256 **del** 7.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

6257

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIAMID 7,5 G

(GRANULARE)
ERBICIDA GRANULARE A LUNGA PERSISTENZA PER IL DISERBO DELLA VITE, DELL'OLIVO, DEL PIOPPO, DEL NOCCIOLO E DELLE AREE NON AGRICOLE DALLE MALERBE ANNUALI E PERENNI NONCHE' PER LA LOTTA LOCALIZZATA CONTRO I ROMICI CHE INFESTANO I PRATI STABILI E DA VICENDA

Registrazione Ministero Sanità n. 6257 **del** 7.2.85
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Clortiamid puro	g 7,5
— Coformulanti	q.b. a g100,0

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il prodotto esplica la sua azione per assorbimento radicale, indifferentemente su terreno lavorato o sodo, devitalizzando i semi in germinazione, i rizomi, gli stoloni, i bulbi, nonché le malerbe già in vegetazione.
La durata dell'azione diserbante è in media di 4-6 mesi, per quanto in alcuni casi essa possa risultare anche superiore.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Spargere uniformemente il prodotto con macchine a tramoggia mototrainate o spalleggiate, anche su terreno previamente non lavorato. L'applicazione deve aver luogo a fine inverno o all'inizio della primavera (nelle regioni del Sud anche in autunno), quando le infestanti sono negli stadi iniziali di sviluppo. Sulla vite in particolare occorre impiegare il prodotto sempre prima della ripresa vegetativa, in modo da beneficiare delle piogge di inizio primavera che aumentano notevolmente l'efficacia del prodotto.
Dopo l'intervento, qualora non si preveda la caduta di una pioggia entro un breve periodo di tempo, è sempre buona norma effettuare una irrigazione.

Diserbo della vite, dell'olivo, del pioppo e del nocciolo ad iniziare dal 5º anno della messa a dimora:

a) al primo anno di applicazione del prodotto:

VITE E OLIVO:	100-130 kg/ha
PIOPPO:	80-100 kg/ha
NOCCIOLO:	80-100 kg/ha

b) al secondo anno di applicazione del prodotto, e per quelli successivi, ridurre le dosi del 20% ad ettaro.

Evitare di trattare i vivai di piante madri di viti americane con tralci allevati rasenti al suolo. L'intervento dovrà comunque essere evitato su piante di vite i cui nuovi getti siano a meno di 30 cm. dal terreno.

L'intervento con il prodotto può essere effettuato sull'intera superficie della piantagione oppure venire localizzato lungo le file delle piante. In questo caso le dosi dovranno riferirsi alla superficie effettivamente da trattare, per ottenere la quale occorre eseguire il seguente calcolo: si moltiplichi la dose d'impiego ad ettaro per la larghezza della striscia da diserbare e si divida il prodotto per la distanza tra le file (es.: la larghezza della striscia da trattare è di m. 0,8, la dose prescelta per il diserbo dell'intera superficie risulta di kg 100 ad ettaro e la distanza fra le file m. 2; il quantitativo di prodotto realmente da distribuire è dato da 0,8 x 100 = 80; 80 : 2 = 40 kg/ha).

Lotta contro i romici che infestano i prati stabili e da vicenda:
Localizzare il prodotto in quantità pari alla punta abbondante di un cucchiaino da caffè (0,4 grammi di prodotto) sulla rosetta formata dalle foglie basali dei Romici, preferibilmente all'inizio della vegetazione. Questo quantitativo è sufficiente a devitalizzare completamente una pianta.
L'applicazione può essere fatta a mano o mediante apposite attrezzature meccaniche.

Diserbo di aree industriali, linee ferro-tranviarie, sentieri in terra battuta, argini di canali, dighe, zone archeologiche, piazzali di fabbriche, cimiteri, cortili, selciati, campi da tennis ed altre aree sportive, piste di aeroporti, fasce tagliafuoco e luoghi incolti in genere:
kg. 40 di prodotto ogni 1000 metri quadrati.

Diserbo preventivo di opere idrauliche e stradali (canali, strade, piste, dighe):
kg 40 di prodotto ogni 1000 metri quadri dopo il termine dei movimenti di terreno (profilature) e poco prima della posa in opera del rivestimento. Ciò al fine di prevenire l'azione disgregatrice operata dalla vegetazione infestante sui rivestimenti in bitume, calcestruzzo e simili posti a contatto con il terreno ed anche se spessi e monolitici.

Diserbo delle banchine di strade e autostrade:
kg 20 di prodotto per fasce della larghezza di cm. 50 e della lunghezza di 1 km.

Diserbo del fondo dei canali dalle infestanti sommerse e natanti:
kg 40 di prodotto, secondo il grado di infestazione, ogni 1000 metri lineari e per ciascun metro di larghezza del fondo. Distribuire il prodotto sul fondo del canale in asciutta, dopo l'annuale operazione di spurgo.
Al termine dell'operazione i canali devono rimanere in asciutta per circa 20 giorni: trascorso tale periodo non vi è alcun rischio di dilavamento o di asportazione del prodotto, ormai già fissato nel letto del canale.
Nei canali a riempimento periodico si consiglia di effettuare l'operazione di diserbo dopo il turno di irrigazione, sul fondo ancora umido, sempreché siano nelle normali condizioni di manutenzione.
Il prodotto non è infiammabile né esplosivo, non è corrosivo per legno, metalli e rivestiture di cavi. E' cattivo conduttore dell'elettricità.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per l'uso consentito; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.
prodotto nello stabilimento di
San Vincenzo di Galliera (Bologna)

CONTENUTO KG.

6258

TEPETA 5 DUST

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI POLVERULENTI

CLASSE IV

COMPOSIZIONE:

Folpet puro	g. 5
Coformulanti	q.b. a 100

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. - Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
TERAPIA: Lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE:
Il Tepeta 5 Dust è un fungicida organico polivalente indicato per trattamenti polverulenti contro peronospora e Botritis della vite con inizio da fine fioritura, particolarmente adatto per una azione di penetrazione all'interno del grappolo dove più difficile è la difesa delle crittogame. È efficace anche per la difesa della peronospora e alternaria di patata e pomodoro.
EPOCA DI APPLICAZIONE: In viticoltura si consiglia l'applicazione di TEPETA 5 DUST iniziando i trattamenti alla fine fioritura rispettando i calendari di incubazione. - Sulle colture ortive iniziare i trattamenti al primo manifestarsi degli attacchi delle crittogame.

DOSI DI IMPIEGO:

Su vite contro peronospora e botrite	kg. 18/20 per ettaro
Su patata e su pomodoro contro alternaria e peronospora; su sedano contro la ruggine	kg. 15/18 per ettaro

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ:
Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e olio bianco.
AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo. - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 10 giorni; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero della Sanità n. 6258 del 27.2.85

CHIMIBERG
BERGAMO

Prodotto nello Stabilimento DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (Bergamo)

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6259

FLORNET

**DISERBANTE, DISSECCANTE IN LIQUIDO EMULSIONABILE
PER COLTURE ORNAMENTALI ERBACEE ED ARBOREE**

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

— Paraquat Dicloruro puro . .	. . .	gr. 17,80
— Coformulanti	. q.b. a	gr. 100

I CLASSE

VELENO

NATURA DEL RISCHIO:

rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto, n. 1255.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (trattare le stesse con soda caustica, interrarle in fosse profondepiù di mt. 1, cospargendole con calce viva): in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Attenzione: i sintomi di intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).
L'introduzione nell'organismo anche di **poche gocce del prodotto** può essere fatale: non attendere la comparsa dei sintomi per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perché sia praticata l'emodialisi. Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocate il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrate una sostanza assorbante con il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follope, la terra di Fuller, ecc.

Intossicazione per ingestione e per inalazione

I primi sintomi sono: epitassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutazione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato-renali. L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria. L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza del Paraquat nel sangue.

Intossicazione per contatto

Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole.
Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta.

Terapia: sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.
In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del Paraquat e sulla terapia possono essere richieste alla società produttrice di questo presidio sanitario.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO (riferite a 1 Ha): Il Flornet è un erbicida ad azione causticante per contatto. Viene impiegato per il diserbo interfilare delle colture ornamentali, da fiore e nei vivai, contro l'Alopecurus, Cynedon dactilon, Bromus, Festuca, Phragmites, Agrostis, Lolium e Phloeum, Stellaria, Amarantus, Portulaca e molte altre infestanti annuali e perennanti, alla dose di 2-4 Kg/Ha in 400-500 lt. di acqua. Per il diserbo di canali-sponde di fossati, viali, aie, bordi stradali si impiega alla dose di Kg. 5-10/Ha in 400-500 lt. di acqua. Le dosi più alte si useranno in presenza di forti infestazioni e nelle prime applicazioni. L'acqua necessaria alla distribuzione varia secondo lo sviluppo delle malerbe, da 300 a 800 litri per Ha.

E' VIETATO L'IMPIEGO DIRETTO SUI FORAGGI

MODOLITA' DI DISTRIBUZIONE: può essere usato con tutti i tipi di attrezzature **eccetto** gli automizzatori, che per la loro dispersione, potrebbero causare danni alle colture utili e all'utilizzatore. E' obbligatorio l'uso di maschere protettive durante la distribuzione per evitare l'inalazione del formulato.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

FITOTOSSICITA: trattare solo le colture consigliate, evitare che il Flornet colpisca le colture vicine sensibili.

COMPATIBILITA': è consigliabile l'uso in miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con molti erbicidi. Per l'uso appropriato seguire i consigli dei tecnici di fiducia.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norma precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. La lepre è particolarmente sensibile al formulato. In considerazione delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia di eseguire il trattamento al mattino presto, durante le prime ore di attività aziendale.

INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in floricoltura e su colture non destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali, nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

EUROZOLFI S.p.A. - 14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - 95030 CATANIA - Tel. (095) 592014

Officina di produzione: **SARIAF S.p.A.** - Via S. Silvestro, 1 - FAENZA (RA)
Registrazione 13.3.85 n. 6259 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg.**

62

BAYFIDAN Polvere

FUNGICIDA ORGANICO

per trattamenti in polvere su vite, ortaggi (peperone, cetriolo, melone, pomodoro pesco e nettarine

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Bayfidan polvere contengono:
g 0,5 di triadimenol puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non caratteristici, malessere, contrazioni, effetto sedativo.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: terapia sintomatica previo controllo delle funzioni epatiche e renali.
In caso d'ingestione: lavanda gastrica precauzionale, tenendo presente che l'azione irritativa non esclude il pericolo di perforazione.

Controindicazioni: latte, olii, alcool, carbonati e bicarbonati.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: distribuire uniformemente sulla vegetazione da proteggere ripetendo il trattamento a seconda della necessità: 15-25 kg/ha.
Campo d'azione
Drupacee (pesco e nettarine): contro l'oidio.
Vite: contro l'oidio.
Ortaggi (pomodoro, melone, cetriolo, peperone): contro l'oidio.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto non deve essere miscelato con altri formulati.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi e vite, 10 giorni prima del raccolto per drupacee

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Filago (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 6260 **del** 15.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6261

BAYFIDAN EW

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro l'oidio (mal bianco) di pesco e nettarine e della vite, e contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano, orzo), ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone)

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Bayfidan EW contengono:
g 5 di triadimenol puro;
coformulanti quanto basta a 100.
(contiene cicloesanone)

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non caratteristici, malessere, contrazioni, effetto sedativo.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: terapia sintomatica previo controllo delle funzioni epatiche e renali.
In caso d'ingestione: lavanda gastrica precauzionale, tenendo presente che l'azione irritativa non esclude il pericolo di perforazione.

Controindicazioni: latte, olii, alcool, carbonati e bicarbonati.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Drupacee (pesco e nettarine): contro l'oidio: 0,05-0,1% (50-100 cc in 100 lt d'acqua).
Vite: contro l'oidio: 0,04-0,08% (40-80 cc in 100 lt d'acqua). **Per trattamenti curativi:** 0,08-0,01% (80-100 cc in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni, di cui il primo all'inizio dell'attacco.
Ortaggi (melone, cetriolo, peperone e pomodoro): contro mal bianco 0,05-0,1% (50-100 cc in 100 lt d'acqua).
N.B. - Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo d'acqua sufficiente da assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10-15 hl/ha per vite). Usare la dose più elevata nei casi di maggiore sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.
Cereali (grano, orzo): contro mal bianco e ruggini: 2-2,5 lt/ha diluiti in 600-800 litri d'acqua intervenendo alla comparsa dei primi sintomi.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Bayfidan EW può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi e vite, 10 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, 30 giorni prima del raccolto per cereali

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: DIACHEM - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 6261 **del** 15. 2.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare al riparo dal gelo

lt

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

BAYFIDAN CF

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro oidio, malattie del piede, ruggini del grano e dell'orzo, septoria (con buona azione collaterale contro nerume) del grano, rincosporiosi dell'orzo

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Bayfidan CF contengono:
g 5,2 di triadimenol puro;
g 32,5 di captafol puro;
coformulanti quanto basta a 100.
(contiene glicoletilenico)

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con i prodotti puri o diluiti ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Consigli terapeutici di massima condizionati al caso: sintomatici, lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale. Controllare la funzione del fegato e dei reni ed eseguire la relativa terapia.

Controindicazioni: latte, olii, alcool, carbonati e bicarbonati.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dose d'impiego: 2 lt/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua.

Campi ed epoche di impiego

Grano: a) **Inizio-levata** per combattere le « malattie del piede » (Fusarium sp, Cercosporella) e Septoria tritici, con azione contemporanea contro oidio ed attacchi precoci di ruggini.

b) **In spigatura:** contro oidio, ruggini e Septoria nodorum con buona azione contemporanea contro nerume.

Orzo: a) **Inizio-levata** per combattere le « malattie del piede » (Fusarium sp, Cercosporella) e rincosporiosi, con azione contemporanea contro oidio ed attacchi precoci di ruggini.

b) **In spigatura:** contro oidio, ruggini e Fusarium sp.
Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Bayfidan CF può essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra e, in caso di intervento all'inizio levata, anche con prodotti ormonici. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)
Reg.Min.Sanità n.6262 del 15.2.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

lt

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6263

BAYFIDAN COMBI P. B.

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro l'oidio (mal bianco) di vite, ortaggi (melone, peperone, cetriolo, pomodoro), cereali (grano e orzo)

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Bayfidan combi P.B. contengono:
g 50 di zolfo puro (esente da selenio);
g 2,5 di triadimenol puro;
inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non caratteristici, malessere, contrazioni, effetto sedativo.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: terapia sintomatica previo controllo delle funzioni epatiche e renali.
In caso d'ingestione: lavanda gastrica precauzionale, tenendo presente che l'azione irritativa non esclude il pericolo di perforazione.
Controindicazioni: latte, olii, alcool, carbonati e bicarbonati.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,1-0,2% (100-200 g in 100 lt d'acqua).
Ortaggi: contro mal bianco e ruggini del melone, cetriolo, peperone e pomodoro: 0,1-0,2% (100-200 g in 100 lt d'acqua).
N.B.: per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo d'acqua sufficiente da assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10-15 hl/ha per vite). Usare la dose più elevata nei casi di maggiore sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.
Cereali (grano ed orzo): contro mal bianco e ruggini, rincosporiosi (dell'orzo), septoria e Typhula incarnata: 6 kg/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua, intervenendo alla comparsa dei primi sintomi.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Bayfidan combi P.B. è miscibile con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra, fatta eccezione per i prodotti a base di oli minerali, nel caso si debba effettuare un trattamento con questi prodotti, deve essere impiegato con un intervallo di almeno 2 settimane. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico su vite Sangiovese e Cucurbitacee.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi e vite, 30 giorni prima del raccolto per cereali

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 6263 **del** 15.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

FITOREGOLATORE PER LA PREVENZIONE DELL'ALLETTAMENTO DEI CEREALI

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

100 gr. di prodotto contengono:

- Etefon puro .... gr. 39.6
- Solventi .... q.b.a. gr. 100

Contiene butossietanolo

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A
Via Durini 28
20122 Milano
Tel.: 77571
Telex: 311 068 ucimi

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Usare guanti ed occhiali protettivi data l'attività irritante dermale ed oculare del prodotto.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Caratteristiche: Il CERONE è un fitoregolatore che nei tessuti vegetali libera etilene. Tale ormone, già presente in natura, provoca nei cereali in accrescimento una riduzione dello sviluppo in lunghezza degli internodi ed un ispessimento delle pareti del culmo. Tali effetti del CERONE consentono di prevenire il fenomeno dell'allettamento della coltura e le conseguenti perdite di produzione e difficoltà di raccolta. Il CERONE essendo un fitoregolatore è influenzato nell'azione da fattori ambientali, dallo stato di attiva vegetazione e sanitario della coltura, dalla varietà; sono quindi opportuni saggi preliminari per valutarne la rispondenza nelle condizioni in cui si opera.

Colture da proteggere, dosi ed epoche di impiego

1) **Cereali tipo frumento.**

Frumento tenero e duro:	0.5 -0.75 l/ha
Orzo primaverile:	0.5 -0.75 l/ha
Orzo invernale:	0.75-1.25 l/ha
Segale:	1 -1.5 l/ha
Farro:	0.5 -1 l/ha

Sulle colture sopraelencate il trattamento va fatto nel periodo compreso tra l'apparizione dell'ultima foglia sul culmo principale e l'emergenza di non più della metà della spiga, ovvero negli stadi K-L-M-N della scala Keller-Baggiolini.

2) **Granoturco:** 1-1.5 l/ha, quando sono presenti da 7 a 10 foglie.

In tutti i casi le dosi più elevate di CERONE sono consigliabili quando vengono trattate varietà suscettibili all'allettamento e quando i fattori colturali e climatici sono più favorevoli all'insorgenza del fenomeno.

Il CERONE può essere distribuito con le normali barre irroratrici diluito in 200-400 l/ha di acqua. La preparazione della diluizione di CERONE in acqua deve essere fatta subito prima del trattamento ed evitare la permanenza per più di quattro ore della stessa entro il serbatoio.
Il trattamento con CERONE va fatto su vegetazione completamente asciutta e quando non si prevedono piogge immediatamente successive.
L'impiego del CERONE è consigliabile in colture in attiva e vigorosa crescita ed in assenza di gravi attacchi parassitari, da crittogame in modo particolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il CERONE può essere distribuito anche in miscela con fungicidi fogliari, tuttavia data la vasta gamma di prodotti commerciali disponibili è consigliabile effettuare preventivamente una prova di compatibilità. Sono da evitare le miscele di CERONE con il maneb o con miscele contenenti maneb.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare colture malate o deperite.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Officina di produzione:

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Ozzano Emilia (Bologna)

Registrazione Ministero Sanità N° 6264 del 15.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto lt 5

Distribuito da CIBA-GEIGY S.p.A. - ORIGGIO (VARESE)

CERONE ® è un marchio registrato della Union Carbide Agricultural Products Company Inc., USA.
847719

6265

USTILAN 35 P.B.

DISERBANTE TOTALE

per la lotta contro le infestanti su aree incolte, come piazze, viali, impianti sportivi e industriali, strade ferrate, bordi autostradali (escluse piazzole o aree di sosta praticabili)

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Ustilan 35 P.B. contengono:
g 35 di etidimuron puro;
sospensivanti, bagnanti ed inerti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Campo d'azione: l'Ustilan 35 P.B. è efficace contro le seguenti infestanti a foglia larga: Achillea millefolium, Aegopodium podagraria, Amaranthus, Anthemis arvensis, Anthriscus silvestris, Artemisia vulgaris, Atriplex patula, Bidens, Brassica, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, Cenchrus longispinus, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Chrysanthemum, Cirsium arvense, Commelina longicaulis, Daucus carota, Eclipta alba, Equisetum sp, Fumaria, Galium, Glechoma hederaceum, Heracleum spondylium, Hypericum perforatum, Ipomoea sp, Lamium, Lantana camara, Linaria, Matricaria chamomilla, Mercurialis, Mollugo stricta, Mollugo verticillata, Myosotis arvensis, Oxalis, Papaver rhoeas, Plantago, Polygonum, Portulaca, Potentilla sp, Pteridium aquilinum, Ranunculus, Richardia scabra, Rubus idaeus, Rumex, Sida, Sinapis, Stellaria, Taraxacum, Thlaspi arvense, Tussilago, Urtica, Veronica, Vicia, Viola tricolor, Xanthium; e contro le seguenti infestanti graminacee: Agropyron repens, Agrostis, Alopecurus, Andropogon, Apera, Avena, Chloris virgata, Cynodon dactylon, Dactylis, Digitaria, Echinochloa, Eleusine indica, Eragrostis sp, Festuca sp, Lolium, Panicum, Paspalum, Phleum, Poa, Setaria, Sorghum halepense, Trachypogon spicatus, Urochloa panicoides.

Dose ed epoca di impiego: 15-20 kg/ha (diluiti in 1000-2000 lt d'acqua), a seconda del tipo delle infestanti e del grado di infestazione, intervenendo alla nascita o alla ripresa vegetativa delle infestanti, prima che abbiano superato l'altezza di 10 cm.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto può essere miscelato con Dalapon e con diserbanti ormonici. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare che la soluzione raggiunga alberi, cespugli e colture utili o la zona del terreno interessata dalle loro radici. Eseguire possibilmente il trattamento in giornate senza vento.

N.B. - In genere è consigliabile non usare per il diserbo pompe e recipienti impiegati per trattamenti alla vegetazione con insetticidi e fungicidi.

Qualora ciò non sia possibile è necessario, dopo il trattamento con il diserbante, lavare a fondo con carbone attivo (1 kg in 1000 lt d'acqua) le pompe che devono essere lasciate almeno una notte con la soluzione e quindi sciacquate con acqua.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 6265 **del** 15.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

626

USTILAN® GRANULARE

DISERBANTE TOTALE

per la lotta contro le infestanti su aree incolte, come piazze, viali, impianti sportivi e industriali, strade ferrate, bordi autostradali (escluse piazzole o aree di sosta praticabili)

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Ustilan® Granulare contengono:
g 5 di etidimuron puro;
inerti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Campo d'azione: l'Ustilan® granulare è efficace contro le seguenti infestanti a foglia larga: Achillea millefolium, Aegopodium podagraria, Amaranthus, Anthemis arvensis, Anthriscus silvestris, Artemisia vulgaris, Atriplex patula, Bidens, Brassica, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, Cenchrus longispinus, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Chrysanthemum, Cirsium arvense, Commelina longicaulis, Daucus carota, Eclipta alba, Equisetum sp, Fumaria, Galium, Glechoma hederaceum, Heracleum spondylium, Hypericum perforatum, Ipomoea sp, Lamium, Lantana camara, Linaria, Matricaria chamomilla, Mercurialis, Mollugo stricta, Mollugo verticillata, Myosotis arvensis, Oxalis, Papaver rhoeas, Plantago, Polygonum, Portulaca, Potentilla sp, Pteridium aquilinum, Ranunculus, Richardia scabra, Rubus idaeus, Rumex, Sida, Sinapis, Stellaria, Taraxacum, Thlaspi arvense, Tussilago, Urtica, Veronica, Vicia, Viola tricolor, Xanthium; e contro le seguenti infestanti graminacee: Agropyron repens, Agrostis, Alopecurus, Andropogon, Apera, Avena, Chloris virgata, Cynodon dactylon, Dactylis, Digitaria, Echinochloa, Eleusine indica, Eragrostis sp, Festuca sp, Lolium, Panicum, Paspalum, Phleum, Poa, Setaria, Sorghum halepense, Trachypogon spicatus, Urochloa panicoides.

Dose ed epoca di impiego: 100-150 kg/ha (1-1,5 kg per 100 m²), a seconda del tipo delle infestanti e del grado di infestazione, intervenendo alla nascita o alla ripresa vegetativa delle infestanti, prima che abbiano superato l'altezza di 10 cm.
Distribuire il prodotto a spaglio.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità: evitare che la soluzione raggiunga alberi, cespugli e colture utili o la zona di terreno interessata dalle loro radici.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

BAYER

Reg. Min.Sanità n.6266 del 6.3.85

6267

USTILAN

DISERBANTE TOTALE

per la lotta contro le infestanti su aree incolte, come piazze, viali, impianti sportivi e industriali, strade ferrate, bordi autostradali (escluse piazzole o aree di sosta praticabili)

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Ustilan contengono:
g 70 di etidimuron puro;
sospensivanti, bagnanti ed inerti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Campo d'azione: l'Ustilan è efficace contro le seguenti infestanti a foglia larga: Achillea millefolium, Aegopodium podagraria, Amaranthus, Anthemis arvensis, Anthriscus silvestris, Artemisia vulgaris, Atriplex patula, Bidens, Brassica, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, Cenchrus longispinus, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Chrysanthemum, Cirsium arvense, Commelina longicaulis, Daucus carota, Eclipta alba, Equisetum sp. Fumaria, Galium, Glechoma hederaceum, Heracleum spondylium, Hypericum perforatum, Ipomoea sp. Lamium, Lantana camara, Linaria, Matricaria chamomilla, Mercurialis, Mollugo stricta, Mollugo verticillata, Myosotis arvensis, Oxalis, Papaver rhoeas, Plantago, Polygonum, Portulaca, Potentilla sp, Pteridium aquilinum, Ranunculus, Richardia scabra, Rubus idaeus, Rumex, Sida, Sinapis, Stellaria, Taraxacum, Thlaspi arvense, Tussilago, Urtica, Veronica, Vicia, Viola tricolor, Xanthium; e contro le seguenti infestanti graminacee: Agropyron repens, Agrostis, Alopecurus, Andropogon, Apera, Avena, Chloris virgata, Cynodon dactylon, Dactylis, Digitaria, Echinochloa, Eleusine indica, Eragrostis sp, Festuca sp, Lolium, Panicum, Paspalum, Phleum, Poa, Setaria, Sorghum halepense, Trachypogon spicatus, Urochloa panicoides.

Dose ed epoca di impiego: 7-10 kg/ha (diluiti in 1000-2000 lt d'acqua), seconda del tipo delle infestanti e del grado di infestazione, intervenendo alla nascita o alla ripresa vegetativa delle infestanti, prima che abbiano superato l'altezza di 10 cm.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto può essere miscelato con Dalapon e con diserbanti ormonici. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare che la soluzione raggiunga alberi, cespugli e colture utili o la zona del terreno interessata dalle loro radici. Eseguire possibilmente il trattamento in giornate senza vento.

N.B. - In genere è consigliabile non usare per il diserbo pompe e recipienti impiegati per trattamenti alla vegetazione con insetticidi e fungicidi.
Qualora ciò non sia possibile è necessario, dopo il trattamento con il diserbante, lavare a fondo con carbone attivo (1 kg in 1000 lt d'acqua) le pompe che devono essere lasciate almeno una notte con la soluzione e quindi sciacquate con acqua.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A - MILANO
Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco
Registrazione Ministero Sanità n. 6267 **del** 15.2.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Officina di Produzione
CIFO S.p.A.
Via Oradour, 6
S. Giorgio di Piano (BO)

BAGNANTE DEMETRA

Bagnante - Adesivante non - ionico con antischiuma

COMPOSIZIONE
gr. 100 di prodotto contengono :

— NONILFENOLO poliglicoletere ossietilato con 9 moli di Ossido di Etilene puro	gr.	15
— Coformulanti ed antischiuma	q. b. a gr.	100

CLASSE IV

BAGNANTE DEMETRA

demetra ITALIA srl
Via Cavallotti, 39
Tel. (051) 86.19.01 - (0542) 76.223
40059 MEDICINA (Bologna)

CHIMICA PER L'AGRICOLTURA

Reg. N. 6268 del 3.4.85 del Ministero della Sanità

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il **BAGNANTE DEMETRA** riduce la tensione superficiale dell'acqua e consente alle particelle liquide di distribuirsi uniformemente sulle superfici delle piante. Inoltre, rendendo più adesivi gli antiparassitari ne aumenta sia l'efficacia e la persistenza che la resistenza all'azione dilavante della pioggia.

Il **BAGNANTE DEMETRA** è indicato in aggiunta alla generalità delle miscele antiparassitarie (trattamenti antioidici, insetticidi, acaricidi, e con diserbanti) nei trattamenti alle piante difficilmente bagnabili a causa della consistenza cerosa o pelosa delle foglie.

Il **BAGNANTE DEMETRA** infine è molto utile quando si debbono combattere infestazioni di Cocciniglie, Afidi ed altri fitofagi che sono protetti dalle loro secrezioni.

Il **BAGNANTE DEMETRA** si impegna alle seguenti dosi:
— per la generalità dei trattamenti: gr. 50 in 100 litri di acqua.
— in caso di superfici vegetali o parassiti difficilmente bagnabili: gr. 100 in 100 litri di acqua.
— come coodiuvante per i trattamenti Erbicidi gr. 400/500 per 100 l. di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBIITÀ

Il **BAGNANTE DEMETRA** è compatibile con tutti gli antiparassitari ad eccezione di quelli per i quali non è consigliabile l'aggiunta di un bagnante. - AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. - Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

L'invernto che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta è quello del principio attivo al quale viene aggiunto.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Netto Kg. 20**

6269

NATURA DEL RISCHIO
Sostánza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA ICI

'VIGIL'

Antioidico sistemico liquido specifico per la vite a base di diclobutrazolo

COMPOSIZIONE

Diclobutrazolo puro	g 11,8
Coadiuvanti e inerti (contiene glicole etilenico)	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CARATTERISTICHE
'VIGIL' è un antioidico specifico per la vite a base di diclobutrazolo.
Si tratta di un principio attivo in formulazione liquida, dotato di proprietà sistemica e rapida penetrazione.
Alle dosi indicate la persistenza d'azione del 'VIGIL' è tale da permettere l'esecuzione di trattamenti a cadenze fisse.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Italia Settentrionale (Piemonte - Lombardia - Tre Venezie - Liguria - Emilia Romagna):
'VIGIL' = 50 - 60 cc/hl
Italia Centrale/Meridionale/Insulare:
'VIGIL' = 60 - 80 cc/hl
Iniziare i trattamenti in prefioritura e ripeterli ogni 14 giorni. L'ultimo trattamento, particolarmente importante per il contenimento della malattia, deve essere effettuato all'invaiatura.

Avvertenze: non trattare la cultivar Primus. Per la cultivar Cabernet Sauvignon iniziare i trattamenti a partire dall'allegagione.
Impiegare una quantità di acqua sufficiente ad ottenere una bagnatura completa dell'apparato fogliare e dei grappoli.
'VIGIL' può anche essere distribuito con apparecchiature a basso volume.
In tal caso le corrispondenti dosi per ettaro sono rispettivamente di 750-900 cc/ha nell'Italia Settentrionale e 900-1200 cc/ha nell'Italia meridionale.
Nei periodi più favorevoli all'infezione è bene miscelare il 'VIGIL', alle dosi indicate, con uno zolfo bagnabile micronizzato ('ZOLFO WP' 2) alla dose di 100-150 g/hl per garantire una duplice azione (sistemica e di contatto) nei riguardi dell'oidio e sfruttare gli effetti benefici dello zolfo.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
'VIGIL' è compatibile con i più comuni fungicidi e insetticidi presenti sul mercato. Nel caso di miscele con poltiglie bordolesi si consiglia un saggio preventivo di fitotossicità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOSSICITA'
'VIGIL' non deve essere impiegato sulla cultivar Primus.
Per la cultivar Cabernet Sauvignon si consiglia l'impiego del 'VIGIL' a dosi non superiori ai 50 cc/hl, iniziando i trattamenti ad allegagione completa.

Attenzione: 'VIGIL' va distribuito esclusivamente sulla vite in coltura specializzata. Non usare in vigneti consociati ad altre colture.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

p. p. ... s.p.a.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 6269 **del** 27.2.85
'VIGIL' marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

DA NON VENDERSI SFUSO **cc 50**

627(

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

p. p. ... s.p.a.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'VIGIL' COMBI

Antioidico liquido a base di diclobutrazolo e zolfo specifico per la vite

COMPOSIZIONE

Diclobutrazolo puro	g 3
Zolfo puro (esente da selenio)	g 50
Disperdenti, coadiuvanti, inerti . . q.b.a	g 100

CLASSE IV

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n 6270 del 27.2.85
'VIGIL' marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

CARATTERISTICHE

'VIGIL' COMBI è un antioidico liquido a base di diclobutrazolo e zolfo specifico per la vite. Il diclobutrazolo ha proprietà sistemiche e viene rapidamente assorbito dalla pianta.
Lo zolfo è invece il ben noto principio attivo ad azione preventiva ed in parte curativa che completa l'efficacia del diclobutrazolo apportando alle piante i vantaggi della sua prontezza di azione che si manifesta quando le temperature raggiungono i 20°C.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Italia Settentrionale (Piemonte - Lombardia - Tre Venezie - Liguria - Emilia Romagna):
'VIGIL' COMBI = 150 - 200 cc/hl

Italia Centrale/Meridionale/Insulare, data la maggiore gravità che può assumere la malattia in queste zone:
'VIGIL' COMBI = 200 - 300 cc/hl

Avvertenze: non trattare la cv. Primus. Per la cultivar Cabernet Sauvignon iniziare i trattamenti a partire dall'allegagione.
Impiegare una quantità di acqua sufficiente ad ottenere una bagnatura completa dell'apparato fogliare e dei grappoli.
'VIGIL' COMBI può anche essere distribuito con apparecchiature a basso volume.
In tal caso le corrispondenti dosi per ettaro sono rispettivamente di 2250-3000 cc/ha nell'Italia Settentrionale e 3000-4500 cc/ha nell'Italia Meridionale.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

'VIGIL' COMBI è compatibile con i più comuni fungicidi e insetticidi presenti sul mercato. Nel caso di miscele con poltiglie bordolesi si consiglia un saggio preventivo di fitotossicità: non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, captano, DDVP, binapacril, diclofluanide.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOSSICITA'

Con temperature particolarmente elevate, evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate.
'VIGIL' COMBI non deve essere impiegato sulla cultivar Primus.
Per la cultivar Cabernet Sauvignon si consiglia l'impiego del 'VIGIL' COMBI a dosi non superiori ai 150 cc/hl iniziando i trattamenti ad allegagione completa.
E' fitotossico per vite Sangiovese.

Attenzione: 'VIGIL' COMBI va distribuito esclusivamente sulla vite in coltura specializzata. Non usare in vigneti consociati ad altre colture.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione - ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO **cc 50**

6271

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

p. [ ] ...p.a.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

SELEVIN

Antioidico in polvere bagnabile a base di diclobutrazolo e zolfo specifico per la vite

COMPOSIZIONE

Diclobutrazolo puro	g 2
Zolfo puro (esente da selenio)	g 50
Disperdenti, coadiuvanti, inerti . . . . q.b.a	g 100

CLASSE IV

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 6271 **del** 27.2.85

CARATTERISTICHE
SELEVIN è un antioidico in polvere bagnabile a base di diclobutrazolo e zolfo specifico per la vite. Il diclobutrazolo ha proprietà sistemiche e viene rapidamente assorbito dalla pianta.
Lo zolfo è invece il ben noto principio attivo ad azione preventiva ed in parte curativa che completa l'efficacia del diclobutrazolo apportando alle piante i vantaggi della sua prontezza di azione che si manifesta quando le temperature raggiungono i 20°C.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Italia Settentrionale (Piemonte - Lombardia - Tre Venezie - Liguria - Emilia Romagna):
SELEVIN = 200 - 300 g/hl
Italia Centrale/Meridionale/Insulare, data la maggiore gravità che può assumere la malattia in queste zone:
SELEVIN = 300 - 400 g/hl

Avvertenze: non trattare la cv. Primus. Per la cultivar Cabernet Sauvignon iniziare i trattamenti a partire dall'allegagione.
Impiegare una quantità di acqua sufficiente ad ottenere una bagnatura completa dell'apparato fogliare e dei grappoli.
SELEVIN può anche essere distribuito con apparecchiature a basso volume.
In tal caso le corrispondenti dosi per ettaro sono rispettivamente di 3000-4500 g/ha nell'Italia Settentrionale e 4500-6000 g/ha nell'Italia Meridionale.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
SELEVIN è compatibile con i più comuni fungicidi e insetticidi presenti sul mercato. Nel caso di miscele con poltiglie bordolesi si consiglia un saggio preventivo di fitotossicità: non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, captano, DDVP, binapacril, diclofluanide.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOSSICITA'
Con temperature particolarmente elevate, evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate.
SELEVIN non deve essere impiegato sulla cultivar Primus.
Per la cultivar Cabernet Sauvignon si consiglia l'impiego del SELEVIN a dosi non superiori al 200-250 g/hl iniziando i trattamenti ad allegagione completa.
E' fitotossico per vite Sangiovese.

Attenzione: SELEVIN va distribuito esclusivamente sulla vite in coltura specializzata. Non usare in vigr ..i consociati ad altre colture.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO **g 50**

6272

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'VIGIL' COMBI PB

Antioidico in polvere bagnabile a base di diclobutrazolo e zolfo specifico per la vite

COMPOSIZIONE

Diclobutrazolo puro	g 3
Zolfo puro (esente da selenio)	g 50
Disperdenti, coadiuvanti, inerti q.b.a	g 100

CLASSE IV

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
FARMOPLANT S.p.A. - MARINA DI MASSA (MS)
Registrazione Ministero della Sanità n° 6272 **del** 27.2.85
'VIGIL' marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

CARATTERISTICHE
'VIGIL' COMBI PB è un antioidico in polvere bagnabile a base di diclobutrazolo e zolfo specifico per la vite. Il diclobutrazolo ha proprietà sistemiche e viene rapidamente assorbito dalla pianta.
Lo zolfo è invece il ben noto principio attivo ad azione preventiva ed in parte curativa che completa l'efficacia del diclobutrazolo apportando alle piante i vantaggi della sua prontezza di azione che si manifesta quando le temperature raggiungono i 20°C.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Italia Settentrionale (Piemonte - Lombardia - Tre Venezie - Liguria - Emilia Romagna):
'VIGIL' COMBI PB = 150 - 200 g/hl

Italia Centrale/Meridionale/Insulare, data la maggiore gravità che può assumere la malattia in queste zone:
'VIGIL' COMBI PB = 200 - 300 g/hl

Avvertenze: non trattare la cv. Primus. Per la cultivar Cabernet Sauvignon iniziare i trattamenti a partire dall'allegagione.
Impiegare una quantità di acqua sufficiente ad ottenere una bagnatura completa dell'apparato fogliare e dei grappoli.
'VIGIL' COMBI PB può anche essere distribuito con apparecchiature a basso volume.
In tal caso le corrispondenti dosi per ettaro sono rispettivamente di 2250-3000 g/ha nell'Italia Settentrionale e 3000-4500 g/ha nell'Italia Meridionale.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
'VIGIL' COMBI PB è compatibile con i più comuni fungicidi e insetticidi presenti sul mercato. Nel caso di miscele con poltiglie bordolesi si consiglia un saggio preventivo di fitotossicità: non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, captano, DDVP, binapacril, diclofluanide.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOSSICITA'
Con temperature particolarmente elevate, evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate.
'VIGIL' COMBI PB non deve essere impiegato sulla cultivar Primus.
Per la cultivar Cabernet Sauvignon si consiglia l'impiego del 'VIGIL' COMBI PB a dosi non superiori ai 150 g/hl iniziando i trattamenti ad allegagione completa.
E' fitotossico per vite Sangiovese.

Attenzione: 'VIGIL' COMBI PB va distribuito esclusivamente sulla vite in coltura specializzata. Non usare in vigneti consociati ad altre colture.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO **g 50**

6273

SALUT®

Insetticida fosforganico a largo spettro d'azione.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Clorpirifos puro	g. 24,8
Dimetoato puro	g. 19,8
Coformulanti q.b. a.	g. 100

Contiene: Cicloesanone

CLASSE II

NOCIVO

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - MILANO

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft
6700 LUDWIGSHAFEN/RHEIN
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N.° 6273 **del** 27.2.85

® = Marchio registrato BASF.

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso, e con mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti, 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-28 ore.
Associare a base di Ossime come Toxogonin, Protopan chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E' un prodotto di combinazione tra il Clorpirifos (principio attivo del Dursban) ed il Dimetoato. Ha un larghissimo spettro d'azione ed agisce per contatto, per inalazione e per ingestione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Agrumi: Cocciniglie, Dialeurodidi (es. Dialeurodes Citri), Mosca della frutta, Afidi, Tignola.
g. 125-150 per hl. di acqua.
Formiche (formica argentina).
g. 250-300 per hl. di acqua, irrorando il terreno in ragione di 10 hl. di miscela per ettaro.

Melo e pero: Carpocapsa, Psilla, Tortricidi, Cocciniglie, Afidi, Tendredini, Tingidi, Maggiolino, Zeuzera.
g. 125-150 per hl. di acqua.

Barbabietola e tabacco: Altica, Nottua (es. Mamestra spp.).
Kg. 1,25-1,5 di prodotto in 600-800 litri per ettaro.
Per la lotta contro le nottue il prodotto può essere utilizzato anche come esca con crusca e melasso al 2,5-3% di formulato, distribuendo 50 kg/ha dell'esca preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il Salut è compatibile con la generalità degli antiparassitari, eccezion fatta per i polisolfuri di calcio e di bario.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 12 mesi.

Rischi di nocività: Il Salut è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per le colture di melo e pero; 60 giorni nel caso di agrumi, barbabietole e tabacco.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

I. 1

6274

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

GALBEN® R 3,6-30 BLU

Sospensione Concentrata (Flowable)

Fungicida liquido dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro la peronospora della vite, della patata, del pomodoro e della cipolla.

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro		g 3,6
Rame puro sotto forma di Ossicloruro di Rame		g 30
Bagnanti, disperdenti coloranti e diluenti	q.b. a	g 100

(Contiene glicol-etilenico)

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6274 **del** 27.2.85

® Marchio registrato.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN R 3,6-30 BLU è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Rame attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola) g 450 - 500.
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria. I successivi si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
In assenza di piogge infettanti un trattamento andrà, comunque, effettuato non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7-8 foglie).
Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO

Peronospora (Phytophthora infestans): g 600-700.
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione; nei trattamenti di chiusura usare fungicidi di copertura.

PATATA

Peronospora (Phytophthora infestans): g 600-700.
Effettuare non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e gli altri distanziati di 14 giorni.
Nei trattamenti successivi usare fungicidi di copertura, i quali possono essere impiegati sin dall'inizio, nei casi di minori pericoli d'infezione.
Non impiegare il sistemico come eradicante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il pericolo dell'insorgenza della resistenza.

CIPOLLA

Peronospora (Peronospora desructor): g 500-600.
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione. Per favorire l'attività del prodotto è consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante, es. FITOFIL 50 cc/hl.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il GALBEN R 3,6-30 BLU può essere miscelato con i più comuni fitomarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti e fertilizzanti fogliari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.

Rischi di nocività
È tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corso d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

FARMOPLANT S.p.A.

6275

CLASSE IV

FALCON® 25

Repellente per uccelli, in polvere, particolarmente attivo nella concia a secco delle sementi, di ortaggi e cereali

Composizione

Antrachinone puro	g 25
Supporti inerti, coadiuvanti e coloranti q.b. a	g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6275 **del** 27.2.85

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Il FALCON 25, mediante la concia del seme protegge efficacemente dagli attacchi dei passeracei (passeri, verdoni, fringuelli, fanelli, corvi, cornacchie) le sementi dei cereali (grano, orzo, avena, segale, mais), dei legumi (fagiolo, pisello) e di altre colture orticole (broccoli, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa, colza, ravizzone), dalla semina sino alla fase di emergenza.

Il trattamento deve essere effettuato prima della semina, mescolando a secco la semente con FALCON 25 in ragione di 250 g di prodotto per ogni quintale di seme, usufruendo delle apposite attrezzature. I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'allimentazione umana, ne del bestiame.

Avvertenze

Il FALCON 25 non deve essere applicato in prossimità di una pioggia.

Ripetere il trattamento qualora sopravenga una pioggia prolungata.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il FALCON 25 può essere miscelato con antiparassitari nella concia a secco. In caso di miscela con prodotti da impiegarsi nella concia ad umido (Ergostim), effettuare dapprima detta concia ad umido e soltanto dopo l'essiccamento, procedere al trattamento con FALCON 25.

Avvertenza

In caso di miscela con altri furmulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NIVAL® OE 40

Erbicida liquido emulsionabile selettivo per il diserbo della Barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio

Composizione

Fenmedifan puro	g 40
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti (contiene trimetilbenzeni, dimetilformamide, xilolo)	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6276 **del** 27.2.85

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Erbicida ad assorbimento fogliare attivo sulle plantule delle seguenti infestanti dicotiledoni: Anagallis arvensis / Atriplex patula / Capsella bursa-pastoris / Centurea cyanus / Chenopodium album / Datura stramonium / Fumaria officinalis / Galinsoga parviflora / Lamium purpureum / Linaria minor / Matricaria sp. / Myosotys arvensis / Papaver sp. / Plantago major / Polygonum aviculare / Polygonum convolvulus / Polygonum lapathifolium / Polygonum persicaria / Raphanus raphanistrum / Senecio vulgaris / Sinapis arvensis / Solanum nigrum / Sonchus oleraceus / Spergula arvensis / Stellaria media / Thlaspi arvense / Urtica urens / Veronica persica / Viola tricolor.

Si osserva un controllo parziale da parte del prodotto su: Amarantus retroflexus / Mercurialis annua.

L'applicazione si effettua in post-emergenza delle barbabietole, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, purché le malerbe non superino lo stadio delle due foglie vere;

Le dosi d'impiego variano da 2,5 a 3 kg/ha diluiti in 250-400 litri di acqua;

Effettuare il trattamento su piante asciutte e con temperature inferiori a 25 °C. Nelle giornate calde aver cura di eseguire l'intervento nel tardo pomeriggio;

Evitare di trattare colture di bietola danneggiate da insetti o in cattivo stato vegetativo.

I trattamenti precoci sono quelli che danno i migliori risultati, essendo evidente che le infestanti resistono al prodotto man mano che si sviluppano.

Preparazione dell'emulsione

Versare a poco a poco la dose stabilita di NIVAL OE 40 nell'acqua richiesta, agitando accuratamente.

Avvertenze

Assicurarsi che le pompe impiegate per il trattamento non contengano residui di altri erbicidi, specialmente ormonici. Lavare ripetutamente le attrezzature con acqua e soda prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci ecezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto in luogo fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione e contatto cutaneo
(inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenza

Consultare un Centro Antiveleni.

93

6177

OXAMYL DU PONT DE NEMOURS

VYDATE®

CLASSE I

VELENO

NEMATOCIDA - INSETTICIDA

® Marchio registrato E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

COMPOSIZIONE:

Oxamyl puro g 4,925
Coformulanti quanto basta a g 100.
Contiene dimetilformamide.

ATTENZIONE. Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968, no. 1255

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirare i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.
- Nel caso che il prodotto raggiunga incidentalmente gli occhi, lavarli per 15 minuti con acqua abbondante. Recarsi dal medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione. *L'Oxamyl produce effetti associati con attività anticolinesterasiche che possono includere spossatezza, annebbiamento, cefalea, nausea, crampi addominali, diarrea, oppressione toracica, costrizione delle pupille, sudorazione, polso lento, tremori muscolari.*

Trattamento

- *Nel caso di inalazione, trasportare il paziente in ambiente non contaminato.*
- *Nel caso di contatto, togliere gli abiti contaminati e lavare prontamente la pelle e gli occhi contaminati, con acqua abbandante.*
- *Nel caso di ingestione, applicare una lavanda gastrica.*
- *Alla comparsa di segni locali o sistemici o di sintomi di avvelenamento colinesterasico, somministrare atropina: 1,2 - 2 mg per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento ad intervalli di 10-30 minuti fino alla comparsa di fenomeni di atropinizzazione.*
- *Non somministrare 2-PAM; controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione*

Prontosoccorso. *Se ingerito provocare il vomito con acqua calda (1 cucchiaio da tavola di sale in un bicchiere d'acqua), ripetendo fino a che il vomito non sia chiaro.*
Se inalato allontanare il paziente dell'ambiente contaminato, far coricare e riposare calmo.
In caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare la pelle e gli occhi contaminati con abbondante quantità di acqua.
Se il paziente mostra difficoltà respiratorie praticare immediatamente la respirazione artificiale.
Somministrare 2 tavolette di atropina da 0,6 mg, per via orale o facendole sciogliere sotto la lingua, se sono disponibili. In seguito ogni 10-15 minuti somministrare una tavoletta di atropina fino a che la gola e la pelle sono asciutte.
Se necessario somministrare altre tavolette per mantenere asciutte la gola e la pelle.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleno.

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche
L'OXAMYL DU PONT DE NEMOURS è un nematocida / insetticida in formulazione granulare al 5% di principio attivo Oxamyl, dotato di azione sistemica con traslocazione dal basso verso l'alto.
L'OXAMYL DU PONT DE NEMOURS applicato al suolo controlla i nematodi presenti nel terreno ed inoltre è traslocato dalla radice alla parte aerea della pianta controllando nematodi fogliari, nonché insetti ad apparato boccale pungente / succhiante.
L'OXAMYL DU PONT DE NEMOURS deve essere distribuito alla semina, con le comuni macchine usate per lo spargimento dei granulari.
I trattamenti in pre-semina o durante la semina possono essere effettuati con diverse modalità:
- con incorporazione su tutta la superficie,
- alla semina in localizzazione con il seme.

Dosi d'impiego
L'OXAMYL DU PONT DE NEMOURS si applica su Barbabietola da zucchero contro nematodi radicali del tipo Heterodera Schachtii:
- in presemina 140 - 160 kg/ha di OXAMYL DU PONT DE NEMOURS distribuito su tutta la superficie, avendo cura di interrare il prodotto a qualche centimetro di profondità,
- durante la semina 30 - 40 kg/ha di OXAMYL DU PONT DE NEMOURS distribuito sulla fila in localizzazione con il seme.

Prima di iniziare lo spargimento avere cura di tarare l'apparecchio di distribuzione in modo da distribuire esattamente la dose indicata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'OXAMYL DU PONT DE NEMOURS è miscibile con i più comuni antiparassitari in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, animali domestici, bestiame ed insetti utili. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni.
Durante il trattamento tenere lontano persone non protette, animali e bestiame.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante.

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
20093 Cologno Monzese (MI) - Via A. Volta, 16

Officina di produzione
E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.) Wilmington,
Delaware U.S.A.

Registrazione n.6277 del Ministero della Sanità del 6.3.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso kg

62

RIDOMIL® COMBI LIQUIDO

Fungicida specifico per la lotta contro le peronosporacee della vite, delle colture orticole, del tabacco e della rosa in pieno campo

Composizione
100 g di prodotto contengono:
6,0 g metalaxyl puro
34,2 g folpet puro
q.b. a 100 g coformulanti
(contiene glicole etilenico)

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (Va)

Officina di produzione: SIPCAM, Salerano s/Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6278 **del** 27.2.85
® marchio registrato

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi di intossicazione
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia:
lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

Avvertenza
Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche
RIDOMIL COMBI Liquido è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture sottoindicate.

Dosi e modalità d'impiego
Vite: contro la peronospora (= Plasmopara viticola)
250 cc/100 lt di acqua.
Eseguire il primo trattamento dopo il verificarsi della prima pioggia infettante e, successivamente, intervenire ad intervalli cadenzati di 15 giorni, anche in condizioni climatiche tali da favorire il persistere di un'elevata e continua pressione di infezione.
Infatti, l'attività sistemica e la persistenza d'azione del RIDOMIL COMBI Liquido sono tali da assicurare comunque la protezione della coltura, inclusa la nuova vegetazione, che si sviluppa tra un trattamento e l'altro.
In tal modo sono sufficienti solo quattro trattamenti per proteggere la vite ed in particolar modo il grappolo, nella fase più delicata e di maggior pericolo per la coltura.

Spinacio: contro la peronospora (= Peronospora spinaciae)
cc 250/100 lt di acqua.
Trattare con RIDOMIL COMBI Liquido ad intervalli fissi di 14-16 giorni.

Pomodoro: contro la peronospora (= Phytophthora infestans)
250-300 cc per 100 lt di acqua alla cadenza di 14-16 giorni.
Per gli ultimi trattamenti con piante a rallentato sviluppo vegetativo si consiglia di applicare in luogo del RIDOMIL COMBI Liquido prodotti a base di rame o di chlortalonil o loro miscele.

Cipolla: contro la peronospora (= Peronospora destructor)
lt 2,5-3,5/ha ad intervalli di 12 giorni fra i singoli trattamenti.
Onde favorire l'assorbimento del prodotto è indispensabile l'aggiunta di un bagnante (es. Etravon alla dose di 50 cc per ettolitro di acqua).
RIDOMIL COMBI Liquido esercita una buona attività di prevenzione nei confronti della Botrytis cinerea.

Tabacco: contro la peronospora (= Peronospora tabacina)
300-400 cc/100 lt di acqua.
Iniziare i trattamenti non appena la coltura abbia superato la crisi del trapianto con cadenza di 10 giorni. Ciò consentirà la protezione totale della coltura anche nei periodi di elevata pressione di infezioni. Onde evitare la comparsa di infezioni durante la fase della crisi di trapianto eseguire un trattamento in semenzaio 1-2 giorni prima della messa a dimora delle piantine in campo alla dose di 250-300 cc per ettolitro d'acqua.

Peronospora della rosa (= Peronospora sparsa) **in pieno campo**
250-300 cc per 100 lt di acqua.
Iniziare i trattamenti sui nuovi ricacci dopo la potatura, distanziando le irrorazioni di 14-16 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici di più comune impiego fatta eccezione per la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco.
Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili e i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto per la vite e tabacco.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto delle altre colture.

Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg

6279

USTINEX TS

granulare

DISERBANTE TOTALE
per la distruzione delle erbe infestanti nei vialetti di parchi e giardini

CLASSE III
ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Ustinex TS contengono:
g 0,8 di metabenzthiazuron puro
g 1,6 di simazina pura
coadiuvanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Impiegare in vialetti, anche se in vicinanza vi sono arbusti purchè con apparato radicale abbastanza profondo (rose ad es.). I migliori risultati si ottengono intervenendo all'inizio della ripresa vegetativa e cioè quando le erbe infestanti sono nei primi stadi di sviluppo. Per non diminuire l'effetto erbicida, non lavorare il terreno dopo il trattamento. Un solo trattamento è normalmente sufficiente per un'intera stagione.
Dose d'impiego: 200-230 kg/ha (2-2,3 kg/100 m^2) distribuendo il prodotto sul terreno in modo più uniforme possibile. In caso di andamento climatico molto asciutto, può essere consigliabile bagnare il terreno dopo la distribuzione del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il prodotto può essere miscelato con diserbanti ormonici.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 6279 **del** 13.3.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6280

CLASSE I

DATIOCID P. B.

CLASSE I

VELENO

INSETTICIDA AGRICOLO IN POLVERE BAGNABILE PER FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI (PATATE E BIETOLE)

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono
— METIDATHION puro gr 19
— Coformuanti q.b. a gr 100

« ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente a personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255. »

Natura del rischio: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Evitare di respirare i vapori. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi piu idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di 1 metro e cospargendo con calce viva). - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopamchloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO: Il **DATIOCID P.B.** si impiega alle dosi di gr 200-300 per 100 litri di acqua contro i seguenti parassiti: MELO E PERO: contro Cacoecia rosana, Carpocapsa, Aspidiotus, Afidi, Cecidomia, Cemiostoma, Nepticula, Psilla del pero; PESCO: contro Diaspis Pentagona, Aspidiotus, Cidia Molesta; CILIEGIO: contro Ragoletis Cerasi; VITE: contro Tignola e Tignoletta; PATATA: contro la Dorifora; BIETOLE: contro il Cleono.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il **DATIOCID P.B.** è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio esclusi quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, calce).
« AVVERTENZA: In caso di miscela con altri f· mulati, deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono essere ino' . osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. »

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

« **Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
44042 CENTO (Ferrara) Via Donizetti, 2-a - ☎ 90 62 07
Stabilimento di produzione: **SARIAF S.p.A.** - FAENZA (Ravenna)

Reg. N. 6280 del 14.3.85 Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO Kg**

6281

ACESAN

INSETTICIDA AFICIDA IN POLVERE SOLUBILE

COMPOSIZIONE: 100 gr di prodotto contengono:
— ACEFATE puro . . . . . gr 42,5
— Coadiuvanti e inerti q.b. a . . gr 100
CLASSE III **ATTENZIONE: Manipolare con prudenza.**

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa: non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Controthion, ecc. somministrato per iniezione endovenisa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni!

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO:
POMACEE - contro: Afidi e Orgia antiqua alla dose di gr 80-120; contro: Carpocapsa, Capua reticulana, Cacoecia, Pandemis alla dose di gr 120-150 in 100 litri di acqua.
DRUPACEE - contro: Afidi alla dose di gr 80-120; contro: Anarsia alla dose di gr. 120-150.
VITE - contro: Tignole e Cicaline alla dose di gr 80-120; contro: Nottua alla dose di gr 120-150 per 100 litri di acqua.
AGRUMI - contro: Cocciniglie alla dose di gr 100-150; contro: Afidi alla dose di gr 80-120.
OLIVO - contro: Cocciniglie alla dose di gr 100-150.
FRAGOLA, PATATA, POMODORO, COCURBITACEE, FAGIOLI, BIETOLA, TABACCO
MAIS - contro: Afide verde alla dose di gr 100-120.
SEDANO - contro: la Mosca alla base di gr 120-150.
GAROFANO - contro: la Bega alla dose di gr 120-150.
MAIS - contro: Piralide alla dose di gr 120-150.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con tutti gli antiparassitari di comune impiego esclusi quelli a reazione alcalina come poltiglia bordolese e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo — devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili per i prodotti più tossici — qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non eseguire trattamenti con intervalli inferiori ai 15 giorni. Sui peschi interrompere i trattamenti nei mesi estivi.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 GIORNI.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

TERRANALISI s.n.c.
44042 — CENTO (Ferrara)
Via Donizetti, 2/a - Telef. 90.62.07

Officina di produzione
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - RAVENNA
Stabilimento di TORRENIERI - SIENA

Registrazione Ministero della Sanità N.6281 del 14.3.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

CAPTOLATE* L.

Fungicida Liquido a base di Captano per la concia delle sementi.

Composizione:

Captano puro	gr. 43,13
Emulsionanti e solventi	q.b. a gr. 100

CLASSE IV

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:

Sintomi di intossicazione: Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche — Il **Captolate L** è un fungicida organico efficace contro numerosi parassiti fungini delle sementi: mais, frumento, barbabietola da zucchero, colza, lino e ortaggi.
Phoma, Botritis, Alternaria della barbabietola;
Phoma, e Alternaria della colza;
Septoriosi del frumento;
Pytium e contaminazioni esterne da Fusarium del mais;
Pytium, Botritis delle sementi orticole.

Dosi di impiego per kg. 100 di sementi:

Grano e Mais lt. 0,300 in lt. 0,200 di acqua.
Colza e fagioli lt. 0,350 in lt. 0,400 di acqua.
Barbabietole lt. 0,800/0,900 in lt. 0,400 di acqua.
Sementi orticole lt. 0,100/0,150 in lt. 0,150 di acqua.

Modalità di impiego:

Il **Captolate L** è stato messo a punto per poter essere utilizzato con macchine per il trattamento delle sementi a ciclo continuo.

I coformulanti contenuti favoriscono la sospensibilità del prodotto nell'acqua evitando la formazione di schiuma e facilitando l'omogeneo impolveramento della superficie dei semi.

Versare la quantità di **Captolate L** necessaria per trattare kg 100 di sementi nell'acqua occorrente. Mescolare accuratamente ed attaccare la pompa di alimentazione dell'apparecchiatura per i trattamenti.

Il **Captolate L** si può usare anche in un comune tamburo di disinfezione.

Avvertenza: Le sementi trattate e residuate dalla semina non possono essere destinate alla alimentazione umana né del bestiame.

Compatibilità:
Il **Captolate L** non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia tipo bordolese, polisolfuri ecc.) con olii e con zolfi.

« **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta ».

Attenzione: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

* Marchio della The Dow Chemical Company.
Prodotto Fabbricato in Francia dalla PROCHIM S.A.
Stabilimento di Courchelettes - DOUAI -

DA NON VENDERSI SFUSO

Dow Chemical S.p.A.
- Via R. Lepetit, 8 - Milano
Registrazione del Ministero della Sanità
N.6282 del 13.3.85
Confezione da lt.

6283

BUTANET (R) COMBI L

Erbicida selettivo di pre-semina, in pasta liquida, a base di Butilate e Atrazina, efficace contro le infestanti della coltura di mais.

Il prodotto agisce sui semi in via di sviluppo con azione antigerminello; è efficace su tutte le più comuni infestanti del mais, sia graminacee che a foglia larga, compresa Sorghetta da seme, Giavone americano, Digitarie e Setarie resistenti alle Triazine.

COMPOSIZIONE

- Butilate puro .... g 45
- Atrazina pura .... g 15
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a .... g 100

Contiene Xilolo, Cloruro di metilene, e tetracloroetilene

(r) marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM–Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 6283 del 14.3.85 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchiti, effetto Antabuse (in caso di assunzione di alcool), irritazione della cute e delle mucose in caso di contatto (dermatiti, congiuntiviti, faringiti, ecc.) nonchè manifestazioni allergiche cutanee e bronchiali.

Terapia: nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centri di rianimazione.
Molti dei sintomi tossici possono essere provocati dai solventi organici presenti nel formulato; pertanto la terapia deve tener conto anche dei danni causati da questi.
I solventi possono provocare gravi lesioni epatiche, renali e a carico del sistema nervoso centrale e periferico (particolarmente i distillati del petrolio possono causare polmoniti chimiche); tutte queste forme richiedono idonee terapie sintomatiche.
Il vomito non va provocato. Somministrare grandi quantità di acqua. Se il paziente vomita spontaneamente, somministrare ancora liquidi, dopo averlo intubato.
Se il paziente è incosciente non somministrare nulla per bocca. Ricoverare il paziente in un Centro di rianimazione.
La lavanda gastrica, a paziente intubato, va praticata con una soluzione di 200-300 ml di acqua in cui siano stati sciolti 30-60 g di carbone attivo.
Purganti salini. Terapie sintomatiche mirate.
Per le manifestazioni cutanee e mucose rimuovere gli abiti contaminati, lavaggio con abbondante acqua della pelle e degli occhi per almeno quindici minuti, pomate oftalmiche e dermatologiche.

Controindicazioni: Alcool, olii, grassi.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

La particolare associazione dei due principi attivi, Butilate e Atrazina, assicura il controllo di un ampio spettro di infestanti, nonchè evita l'eccessivo accumulo di residui dannosi di Atrazina nel terreno.
Impiegare il prodotto prima della semina del mais su terreno ben sminuzzato ed uniforme, incorporandolo al terreno subito dopo il trattamento, mediante attrezzi adatti a fargli raggiungere 5-8 cm. di profondità (es.apposite attrezzature, frese e organi rotanti, erpici a dischi, ecc.). Se possibile incorporare il prodotto al terreno immediatamente dopo la distribuzione.
La semina del mais può essere fatta da subito dopo il trattamento fino a qualche giorno dopo.
Il prodotto si impiega alla dose di 6-9 Kg/ha di superficie diluito in 400-500 litri di acqua, attenendosi alla dose inferiore su terreni leggeri ed in presenza di una limitata infestazione di graminacee e a quella superiore in terreni pesanti o argillosi o con limitato contenuto di sostanza organica, ovvero in presenza di infestanti particolarmente resistenti come la Sorghetta da seme.
Si sconsiglia il trattamento su terreni contenenti più del 10% di sostanza organica poichè il prodotto perde di efficacia.

Preparazione della poltiglia: diluire il prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a contatto di colture sensibili vicine.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

6284

DISERBANTE DEL RISO

COMPOSIZIONE

— Propanil puro . . . . gr. 14
— Benthiocarb puro . . . . gr. 14
— Mecoprop puro (da estere isobutilico) . . gr. 14
— Emulsionanti e solventi . . . . . q. b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, lacrimazione, miosi, fenomeni di fotosensibilizzazione, manifestazioni cutanee allergiche di tipo eritematoso, ipotensione arteriosa, bradicardia, astenia profonda, cefalea intensa e pulsante, vertigini ed aritmie, fibrillazione, tremori e convulsioni tonico - cloniche, edema polmonare acuto e stato comatoso.

Terapia: praticare lavanda gastrica con soluzione di bicarbonato di sodio. Somministrare per via venosa solfato di atropina ogni 15 minuti, mg. 1 in rapporto alla gravità del caso, sospendendo ai primi segni di atropinizzazione. Ossigenare in caso di cianosi con ossigeno al 100% ed umidificatore, in caso di edema polmonare acuto applicare tutte le misure terapeutiche richieste dal caso ed ospedalizzare.
Se necessario somministrare cortisonici. Monitoraggio cardiaco. In caso di intossicazione è sempre bene chiedere indicazioni al centro antiveleni. **Sono controindicati:** PAM, Contrathion e digitalici.
Nei casi gravi o sospetti ricovero in centri di rianimazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il BEST è un diserbante che agisce per contatto e assorbimento fogliare, indicato per il controllo di: Cucchiaio (Alisma plantago), Quadrello (Scirpus mucronatus), Cipollino (Scirpus maritimus), Biodo o Fiorone (Butomus umbellatus), Erba saetta (Sagittaria sagittifoglia), Cyperus spp., Sparganium spp., Heleocharis spp., Potamogeton spp.
Si applica in asciutta alla dose di Kg. 7/Ha circa 35 - 50 giorni dopo la semina. Intervenire quando le infestanti sono nella fase di attivo sviluppo togliendo l'acqua dalle camere uno o due giorni prima del trattamento. Sommergere di nuovo la risaia 50 - 70 ore circa dopo il trattamento. Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima o dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3 - 5 ore.

"Da non applicare con mezzi aerei"

Compatibilità: il prodotto va impiegato da solo.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto, anche sotto forma di vapori, portati dal vento, con le colture sensibili quali: vite, colture arboree, ortaggi, fiori e pioppi. Trattare in assenza di vento.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

"Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (Bo)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. 6284 del 14.3.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg. -

6285

ERBICIDA DEL RISO PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI MONO E DICOTILEDONI, ESCLUSE LE GRAMINACEE

COMPOSIZIONE

— Propanil puro	gr. 20
— MCPA (da estere isobutilico puro) .	gr. 8
— Mecoprop (da estere isobutilico) puro .	. . gr. 13
— Emulsionanti e solventi .	q. b. a gr. 100

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici: Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chimidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: E' sconsigliata la digitale.

Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il DERVIL si impiega alla dose di Kg. 4 - 5/Ha in 500 litri d'acqua 35 - 50 giorni dopo la semina del riso per il controllo di: Alisma plantago, Heleocharis spp., Sparganium spp., Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Cyperus spp., Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifoglia.
Il prodotto si impiega in asciutta con le infestanti completamente scoperte e dopo 24 - 48 ore si rimette l'acqua nelle camere al livello normale.

"Da non applicare con mezzi aerei"

Compatibilità: Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima e dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature. Non eseguire il trattamento nel caso si preveda una pioggia a distanza di 3 - 5 ore.

Fitotossicità: Durante il trattamento la nube non deve colpire le colture vicine sensibili ai fenossiderivati quali: fruttiferi, viti, pioppi, colture floricole e orticole in generale, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima dell'inizio della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. 6285 del 14.3.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

6286

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargere con calce viva).

Informazioni per il medico:
Consultare un centro antiveleno
Carbammati: Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).
Sintomi d'intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, sciolorrea, disponea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

«Da non vendersi sfuso»
PESO PREDETERMINATO
MECCANICAMENTE
AL CONFEZIONAMENTO
Gr. NETTI

CARBOTIN 5G

ESCA INSETTICIDA GRANULARE DEL TERRENO

COMPOSIZIONE:
CARBARYL (esente da B naftolo)
puro gr. 4,9 Supporti assorbenti q.b. a gr. 100

CLASSE III

COMBATTE:

GRILLOTALPA
MAGGIOLINI
AGRIOTES e altri
ELATERIDI AGROTIS
e altri NOTTUIDI

Caratteristiche del prodotto
La forma granulare agevola l'uniformità della distribuzione. È miscelabile con i fertilizzanti polverulenti e granulari al momento dell'impiego. Non trasmette odori o sapori sgradevoli. Il CARBOTIN viene impiegato per il controllo degli insetti del terreno quali: GRILLOTALPA MAGGIOLINI, AGRIOTES ed altri ELATERIDI AGROTIS e altri NOTTUIDI.
Modalità d'impiego: Il CARBOTIN si applica nei terreni destinati alle seguenti colture (barbabietole, mais, patate, tabacco, fiori e piante ornamentali in pieno campo), prima della semina o del trapianto alla dose di 300/400 grammi ogni 100 metri quadrati incorporandolo nel terreno con leggera zappatura.
«Da non applicare con mezzi aerei»
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci, esclusi il solfato di rame ed i polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri granulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionarie prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame e gli insetti utili.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Officina di produzione propria sede
Via Lion, 9 - Maserà Padova

Registrazione Ministero della Sanità n. del 13.3.85

industrialchimica
DI CASTELLO BRUNO
Stabilimenti e Uffici: VIA LION, 9
MASERA' (PD)
Tel. 049 - 645295

6287

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargere con calce viva).
Informazioni per il medico:
Consultare un centro antiveleno
Carbammati: Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).
Sintomi d'intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, sciolorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

«Da non vendersi sfuso»
PESO PREDETERMINATO MECCANICAMENTE AL CONFEZIONAMENTO
Gr. 5.000 NETTI

CARBOTIN 4G

ESCA INSETTICIDA GRANULARE DEL TERRENO

COMPOSIZIONE:
CARBARYL (esente da B naftolo) puro gr. 3,9 Supporti assorbenti q.b. a gr. 100

CLASSE III

COMBATTE:

GRILLOTALPA
MAGGIOLINI
AGRIOTES e altri
ELATERIDI AGROTIS
e altri NOTTUIDI

Caratteristiche del prodotto
La forma granulare agevola l'uniformità della distribuzione. È miscelabile con i fertilizzanti polverulenti e granulari al momento dell'impiego. Non trasmette odori o sapori sgradevoli. Il CARBOTIN viene impiegato per il controllo degli insetti del terreno quali: GRILLOTALPA MAGGIOLINI, AGRIOTES ed altri ELATERIDI AGROTIS e altri NOTTUIDI.
Modalità d'impiego: Il CARBOTIN si applica nei terreni destinati alle seguenti colture (barbabietole, mais, patate, tabacco, fiori e piante ornamentali in pieno campo), prima della semina o del trapianto alla dose di 300/400 grammi ogni 100 metri quadrati incorporandolo nel terreno con leggera zappatura.
«Da non applicare con mezzi aerei»
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci, esclusi il solfato di rame ed i polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri granulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionarie prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame e gli insetti utili.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Officina di produzione propria sede
Via Lion, 9 - Maserà Padova

Registrazione Ministero della Sanità n. del 13.3.'75

industrialchimica
DI CASTELLO BRUNO
Stabilimenti e Uffici: VIA LION, 9
MASERA' (PD)
Tel. 049 - 645295

6288

GRAMINEX L

DISERBANTE SELETTIVO PER FRUMENTO E ORZO IN FORMULAZIONE LIQUIDA AUTOSOSPENSIBILE

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
— CHLORTOLURON puro gr. 43,6
— Coformulanti q.b. a gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI:
— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
— Non contaminare altre colture, bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: Il prodotto agisce contro le seguenti infestanti del frumento e dell'orzo: Apara, Avena, Lolium, Poa, fra le graminacee; Capsella, Centaurea, Cerastium, Gellopsis, Lamium, Matricaria, Mercurialis, Polygonum, Rafhanus, Sinapis, Stellaria, fra le dicotiledoni.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO: Il **GRAMINEX L** va usato alle seguenti dosi prima della emergenza della coltura e delle infestanti: Kg. 4-5 per ettaro in 400-600 litri di acqua. Il trattamento va eseguito subito dopo la semina o comunque prima della emergenza della coltura. Il terreno deve essere ben lavorato e sminuzzato e accuratamente livellato. Nel caso si debba intervenire in post-emergenza il trattamento va effettuato dalla 3ª - 4ª foglia all'inizio dell'accestimento della coltura (grano o orzo) alla dose di 3-3,5 Kg.
AVVERTENZA: Evitare super dosaggi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscelabile con altri erbicidi derivati dall'aurea, triazine e fenossiderivati.
« AVVERTENZA »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il trattamento con **GRAMINEX L** non è consigliabile nei terreni molto sabbiosi e in quelli soggetti a ristagni d'acqua. Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni transitori di sofferenza della cutura. Non deve essere impiegato sul frumento tenero DEMAR 4 o sul frumento duro KID sensibili al Chlortoluree e sugli orzi polistici.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprі del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TERRANALISI s.n.c.
VIA DONIZETTI N. 2/A - 44042 CENTO (FE) - TEL. 90.62.07

Officina di produzione: TERRANALISI - RENAZZO (FE) Via IV Novembre.

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6283 **del** 14.3.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6289

ANTIOIDICO PER LA DIFESA DI VITE, FRUTTIFERI, CEREALI, COLTURE INDUSTRIALI ED ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

— Principio attivo: ZOLFO COLLOIDALE puro (esente da selenio)	g **80**
— Sostanze inerti e coadiuvanti q. b. a	g **100**

CLASSE IV°

NORME PRECAUZIONALI - Conservarse questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche - *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità

ZOLFOCOR è un antioidico in polvere bagnabile dotato prevalentemente di azione curativa. Essa esercita un certo contenimento della ticchiolatura, del corineo, degli acari e degli eriofidi.

Dosi di impiego per 100 litri d'acqua:

Vite	In pre-fioritura	g 80-160
	In post-fioritura	g 100-120
	In caso di trattamenti curativi aumentare le dosi a	g 150-200
	Con temperature elevate impiegare la dose inferiore	
Fruttiferi	Melo, Pero, Pesco, Nocciolo	g 100-180
Cereali	Frumento, Orzo, Avena	Kg/Ha 1,5-2
Colture industriali	Pomodoro, Cetriolo, Melone, Cocomero, Zucchino, Insalata	g 100-150
Colture ornamentali	Rosa, Zinnia, Crisantemo, Begonia, Quercia	g 100-200

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

ZOLFOCOR non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

FITOTOSSICITA'

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELO: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luisa D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

Non intervenire in estate durante le ore più calde del giorno. Intervallare i trattamenti con Zolfocor dal trattamento con olii di almeno tre settimane.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO (ITALY) - VIA VITTOR PISANI, 28
TELEFONO (02) 65.87.848 - TELEX 310510

Formulato da
DIACHEM S.p.A.
Stabilimento di ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
Confezionato da: SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 6289 del 13.3.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Peso Netto Kg. 1

62

FUNGICIDA ORGANICO
PER FRUTTI-VITICOLTURA, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

— Principio attivo: CAPTAN puro . .	g **50**
— Sostanze inerti e coadiuvanti q. b. a .	g **100**

CLASSE IV°

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale.

AVVERTENZA: *Consultare un Centro Antiveleni.*

MODALITA' D'IMPIEGO

Frutticoltura: Melo, Pero, Pesco, Susino, Fragola	Contro Ticchiolatura, Marciume bruno, Botrytis, Vaiolatura	g/hl 200-300
Viticoltura	Contro Peronospora, Botrytis	g/hl 250-300
Orticoltura: Pomodoro, Patata, Fagiolo, Bietola, Cucurbitacee, Insalata, Carota	Contro Peronospora, Alternaria, Ticchiolatura, Antracnosi, Vaiolatura	g/hl 250-300

Disinfezione del terreno

Contro marciume e gli avvizzimenti delle piantine in semenzaio e vivaio impiegare 5 g/mq. di CAPTACOR.

Floricoltura in campo: Rosa, Garofano, Zinnia, Azalea	Contro Peronospora, Alternaria, Ticchiolatura	g/hl 200-300
Per il trattamento delle talee di Garofano, Crisantemo, Azalea	Contro i marciumi da Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora, immergere le talee per 3-4 minuti prima della messa a dimora in una sospensione di	g/hl 400
Bulbi e tuberi	Contro i marciumi da Botrytis, Sclerotinia, Stromatinia, Fusarium immergerli per circa 1 ora in una sospensione di	g/hl 1000

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - CAPTACOR è compatibile con i principali antiparassitari. In caso di dubbio, prima effettuare piccole prove di saggio in uso. Non è compatibile con le poltiglie solfocalciche e comunque con le poltiglie a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di Pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

INTERVALLO DI SICUREZZA. Il suo impiego deve essere sospeso 15 giorni prima della raccolta ma per le uve destinata alla vinificazione tale arco di tempo dovrà rispettare i 40 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO (ITALY) - VIA VITTOR PISANI, 28
TELEFONO (02) 65.97.948 - TELEX 310510

Formulato da:
DIACHEM S.p.A.
Stabilimento di ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
Confezionato da: SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 6290 del 3.4.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Peso Netto Kg. 0,250

6291

MANCORAME

FUNGICIDA CUPROORGANICO

Composizione

100 g di prodotto contengono:

— Principi attivi:	
MANCOZEB puro	g 16
RAME metallo (sotto forma di ossicloruro) .	g 30
— Sostanze inerti e coadiuvanti: q.b. a . . .	g 100

CLASSE III^a

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: *Consultare un Centro Antiveleni.*

MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità

MANCORAME è un fungicida particolarmente indicato per la difesa delle colture contro malattie fungine che colpiscono la vite, il melo, il pero, il pomodoro e il garofano. Mancozeb e rame sono combinati in modo da fornire la migliore efficacia e persistenza di azione.

DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

Coltura	Crittogama	g/hl
Vite	Contro Peronospora, Antracnosi, Marciume nero, Escoriosi	300-400
Melo-Pero	Contro Ticchiolatura, Alternaria	300-400
Pomodoro	Contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi (Solo sino alla prima fioritura)	300-400
Garofano	Contro Ruggine	350-450

Epoca d'impiego

Iniziare i trattamenti appena si verificano le condizioni favorevoli alla infezione e proseguire secondo i calendari di difesa zonali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari. In caso di dubbio, effettuare prima piccole prove di saggio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spenacarpi, Zecchermanna.
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su varietà di melo: Abbondanza Belford, Black Styman, Golden Delicious, Gravenstein Jonatham, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana; e di pero: Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO (ITALY) - VIA VITTOR PISANI, 26
TELEFONO (02) 65.97.948 - TELEX 310510

Formulato da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Confezionato da: SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 6291 del 13.3.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

6292

LENTAGRAN® EC

COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI
gr. 59,2 Pyridate puro
Coformulanti q.b. a 100.

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Diserbante selettivo di postemergenza contro infestanti dicotiledoni atrazinoresistenti del mais, nonché contro numerose erbe infestanti di riso. L'azione del prodotto si esplica inibendo il processo di fotosintesi dell'infestante.

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con le pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Su mais: La coltura di mais tollera ottimamente in ogni suo stadio di sviluppo i trattamenti con LENTAGRAN EC (pre- e postemergenza della coltura). LENTAGRAN EC appare come l'erbicida da impiegare specialmente ove si verificano casi di sviluppo di infestanti dicotiledoni resistenti all'Atrazina quali: Solanum nigrum, Chenopodium spp., Amaranthus spp. LENTAGRAN EC combatte inoltre: l'Abutilon theophrasti, Galium aparine, Anthemis arvensis, Bidens tripartitus, Erigeron canadensis, Lamium spp., Stachys annua, Lithospermium arvense, Galinsoga spp., Matricaria camomilla, Capsella bursa pastoris, Fumaria officinalis, Galeopsis spp., Vicia spp., Polygonum convolvulus, Anagallis arvensis, Datura stramonium; LENTAGRAN EC controlla, applicato allo stadio di 3 foglie vere: Echinochloa crus-galli, Digitaria spp., nonché Setaria.
Impiego e dosaggio su mais: Applicare il prodotto alla dose di 1,5 - 2 lt/ettaro di formulato LENTAGRAN EC in postemergenza del mais quando le infestanti resistenti sono totalmente emerse fino al raggiungimento delle 10 foglie. Prima del trattamento con LENTAGRAN EC, l'agricoltore potrà aver usato qualsiasi erbicida di presemina, pre- o postemergenza, riservando l'impiego del LENTAGRAN EC ove si verifica l'insorgenza di Chenopodio, Solano o Amaranto atrazino-resistenti. Non sufficientemente controllate ed in parte resistenti sono: Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cruciferae (Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis), Equisetum arvense, Viola arvensis, Alopecurus myosuroides, Apera spica venti, Avena fatua, Poa trivialis.
Su riso: L'applicazione va eseguita preferibilmente in aggiunta a Propanil (35 % p.a.) 2 - 5 lt/ettaro, quando il riso ha raggiunto la 4ª foglia fino all'accestimento. Occorrerà cioè che la maggior parte delle erbe infestanti siano già emerse e siano in fase di attiva crescita. Il trattamento dev'essere eseguito in presenza di un leggero strato d'acqua (2-4 cm) Distribuire il prodotto in 400 - 600 litri d'acqua per ettaro. Associato a Propanil, LENTAGRAN EC controlla: Alisma plantago, Butomus umbellatus, Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Eleocharis spp., Lindernia apasmoides. Associato a Propanil, LENTAGRAN EC è inoltre attivo allo stadio di 3 foglie vere contro giavoni (Echinochloa spp.).
DOSE D'IMPIEGO: 1,5 - 2 lt/ettaro; in abbinamento con Propanil (35 % p.a.) 3 - 5 lt/ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il LENTAGRAN EC è miscibile con concimi fogliari, Aniten M, Propanil, Bentazon, Atrazina, Cyanazina, Methalachlor, Alachlor, Chlortoluron, Isoproturon, fenossiderivati, Chlormequat.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante, deve essere usato solo per le colture indicate. Non applicare il LENTAGRAN EC a temperature inferiori a 5°C e se si prevedono gelate notturne, con tempo freddo e umido, con foglie delle infestanti bagnate e con minaccia di piogge entro 2 ore dal trattamento. Non applicare il LENTAGRAN EC su mais in abbinamento con diserbanti ormonici; mantenere su mais un intervallo di almeno una settimana tra l'applicazione di LENTAGRAN EC e successive applicazioni di ormonici; non aggiungere oli minerali o bagnanti. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili; è fitotossico per il sorgo e diverse varietà di mais dolce (Zea mais, var. Saccherato), la vite, per i fruttiferi e per le colture arboree in genere e per le colture ortofloreali.

"Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso"
"Chi impiega il prodotto, è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

CHEMIE LINZ ITALIA s.r.l. - Milano
Officina di produzione:

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA N°...6292... DEL ...6.3.85.......
DA NON VENDERSI SFUSO

Lentagran(R) - marchio registrato della Chemie Linz AG (Austria)

Pyridate - un principio attivo della Chemie Linz AG, Linz (Austria)

CONTENUTO NETTO:

6293

LENTAGRAN® WP

COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI
gr 45 Pyridate puro
Coformulanti q.b. a 100.

CLASSE III
"Attenzione: manipolare con prudenza"

Diserbante selettivo di postemergenza contro infestanti dicotiledoni atrazinoresistenti del mais, nonché contro numerose erbe infestanti di riso. L'azione del prodotto si esplica inibendo il processo di fotosintesi dell'infestante

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con le pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Su mais: La coltura di mais tollera ottimamente in ogni suo stadio di sviluppo i trattamenti con LENTAGRAN WP (pre- e postemergenza della coltura). LENTAGRAN WP appare come l'erbicida da impiegare specialmente ove si verificano casi di sviluppo di infestanti dicotiledoni resistenti all'Atrazina quali: Solanum nigrum, Chenopodium spp., Amaranthus spp.; LENTAGRAN WP combatte inoltre: l'Abutilon theophrasti, Galium aparine, Anthemis arvensis, Bidens tripartitus, Erigeron canadensis, Lamium spp., Stachys annua, Lithospermium arvense, Galinsoga spp., Matricaria camomilla, Capsella bursa pastoris, Fumaria officinalis, Galeopsis spp., Vicia spp., Polygonum convolvulus, Anagallis arvensis, Datura stramonium.
LENTAGRAN WP controlla, applicato allo stadio di 3 foglie vere: Echinochloa crus-galli, Digitaria spp., nonché Setaria.
Impiego e dosaggio su mais: Applicare il prodotto alla dose di 2-2,5 kg/ettaro di formulato LENTAGRAN WP in postemergenza del mais quando le infestanti resistenti sono totalmente emerse fino al raggiungimento delle 10 foglie. Prima del trattamento con LENTAGRAN WP, l'agricoltore potrà aver usato qualsiasi erbicida di presemina, pre- o postemergenza, riservando l'impiego del LENTAGRAN WP ove si verifica l'insorgenza di Chenopodio, Solano o amaranto atrazino-resistenti. Non sufficientemente controllate ed in parte resistenti sono: Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cruciferae (Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis), Equisetum arvense, Viola arvensis, Alopecurus myosuroides, Apera spica venti, Avena fatua, Poa trivialis.
Su riso: L'applicazione va eseguita preferibilmente in aggiunta con Propanil (35 % p.a.) 2 - 5 lt/ettaro, quando il riso ha raggiunto la 4ª foglia fino all'accestimento. Occorrerà cioè che la maggior parte delle erbe infestanti siano già emerse e siano in fase di attiva crescita. Il trattamento dev'essere eseguito in presenza di un leggero strato d'acqua (2-3 cm). Distribuire il prodotto in 400 - 600 litri d'acqua per ettaro. LENTAGRAN WP controlla: Alisma plantago, Butomus umbellatus, Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Eleocharis spp., Lindernia [illegible]. Associato a Propanil, LENTAGRAN WP è inoltre attivo allo stadio di 3 foglie vere contro giavoni (Echinochloa spp).
DOSI D'IMPIEGO: 2,5 kg/ettaro; in abbinamento con Propanil (35 % p.a.) 3 - 5 kg/ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il LENTAGRAN WP è miscibile con concimi fogliari, Aniten M, Propanil, Bentazon, Atrazina, Cianazina, Methalachlor, Alachlor (Chlortoluron), Isoproturon, fenossiderivati, Chlormequat.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante, deve essere usato solo per le colture indicate. Non applicare il LENTAGRAN WP a temperature inferiori a 5°C e se si prevedono gelate notturne, con tempo freddo ed umido, con foglie delle infestanti bagnate e con minaccia di piogge entro 2 ore dal trattamento. Non applicare il LENTAGRAN WP su mais in abbinamento con diserbanti ormonici; mantenere su mais un intervallo d. almeno una settimana tra l'applicazione di LENTAGRAN WP e successive applicazioni di ormonici; non aggiungere oli minerali o bagnanti. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili. E' fitotossico per il sorgo e diverse varietà di mais dolce (Zea mais, var. Saccherato), la vite, per i fruttiferi e per le colture arboree in genere e per le colture ortofloreali.

"Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso"
"Chi impiega il prodotto, è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

CHEMIE LINZ ITALIA s.r.l. - Milano
Officina di produzione:

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' N° 6293...DEL....6.2.85....
DA NON VENDERSI SFUSO

LENTAGRAN(R) - marchio registrato della CHEMIE LINZ AG, Austria.

Pyridate - un principio attivo della Chemie Linz AG, Linz (Austria).

CONTENUTO NETTO:

6294

ANITEN MIX

COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI
gr. 35,4 Pyridate* puro
gr. 8,7 MCPA Isoottilestere puro (corrispondente a gr. 5,6 di acido puro)
gr. 2,2 Flurenol N-butilestere puro (corrispondente a gr. 1,76 di acido puro)
Coformulanti q.b. a 100.

CLASSE III
"Attenzione: manipolare con prudenza"
ERBICIDA SELETTIVO DI CONTATTO A LARGO SPETTRO D'AZIONE, EFFICACE CONTRO VARIE ERBE INFESTANTI DEL RISO.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inaluzione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con le pelle.
Sintomi d'intossicazione: Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.
Consigli terapeutici:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi. Controindicazioni: E' sconsigliata la digitale.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
In risaia l'ANITEN MIX è un erbicida selettivo che agisce per contatto e lo s'impiega quindi esclusivamente in post-emergenza della coltura e delle infestanti. Il trattamento deve essere eseguito con risaia leggermente sommersa (2-3 cm). Distribuire il prodotto in 400 - 600 litri d'acqua per ettaro. E' importante rispettare la dose consigliata per ettaro e di operare con pompe attrezzate di ugelli a ventaglio, in grado di assicurare un'uniforme bagnatura delle infestanti, evitando pressioni troppo elevate (massimo 2-3 bar).

EPOCA D'APPLICAZIONE
Il prodotto dev'essere applicato su riso dalla 4. foglia all'accrescimento.
DOSE E CAMPO D'IMPIEGO PER ETTARO: 3 - 4 lt.
Infestanti controllate: Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Butomus umbellatus, Alisma plantago sp., Cyperus flavescens, Lindernia spasmoides, Heleocharis spp. L'aggiunta ad Aniten Mix di Propanil completa l'azione contro il giavone (Echinochloa crus-galli).
ATTENZIONE: Non applicare a temperature inferiori a 5°C, se si prevedono gelate notturne, con tempo freddo ed umido, con foglie delle infestanti bagnate e con minaccia di pioggia entro 2 ore dal trattamento. Il tempo che deve intercorrere per verificare l'esito del trattamento, è in funzione della temperatura e dell'umidità. Tempo caldo-umido favorisce l'effetto erbicida. Non tenere il prodotto a temperature inferiori a 0° C.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'Aniten Mix è miscibile con Folagron, Plant Complex, Propanil e Bentazon.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante, deve essere usato solo per le colture indicate. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili. E' fitotossico per la vite, per i fruttiferi e per le colture arboree in genere e per le colture ortofloreali, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
RISCHIO DI NOCIVITA'
L'Aniten Mix è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

"Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento ed per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali."

J. & A. MARGESIN SPA - FITOFARMACI - LANA D'ADIGE (BZ)
Officina di produzione: Celamerck GMBH & CO KG, Ingelheim (Germania)
REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' N° .6294... DEL ....6.3.85..
DA NON VENDERSI SFUSO

Aniten(R) - marchio registrato della Celamerck GMBH & CO KG, Ingelheim/Rhein (Germania)
*Pyridate - principio attivo della Chemie Linz AG (Austria)

CONTENUTO NETTO: LT.

6295

TREAMIN®

® = TREAMIN è marchio registrato dalla Rohm and Haas Co. Filadelfia, U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO PER LE INSALATE
E PER LA LOTTA SPECIFICA CONTRO LE CUSCUTE

COMPOSIZIONE - 100 gr. di prodotto contengono:

Principi attivi
— PROPYZAMIDE pura . . . . gr. 22,50
— CHLORPROPHAM puro . . . . . gr. 6,25
Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

CLASSE IV°

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamate il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità: il TREAMIN è un erbicida costituito da due principi attivi ad attività complementare ed il suo modo di azione è, in via principale, per assorbimento radicale e, in via secondaria, per assorbimento fogliare. TREAMIN controlla le infestanti sino ai primissimi stadi di sviluppo.

CAMPO - EPOCA E DOSI DI IMPIEGO

Insalate (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria): subito dopo la semina impiegare 5-7 Kg/ha di TREAMIN in 400-600 litri per Ha di acqua. Il trattamento va eseguito su terreno finemente preparato e privo di infestanti. Durante il periodo estivo effettuare frequenti e non pesanti irrigazioni.
Impiegare la dose più alta durante il periodo estivo ed in presenza di infestanti già nate.
Colture per le quali è consigliato l'impiego per la lotta alla CUSCUTA
Barbabietola da zucchero: intervenire dopo lo stadio di sviluppo della coltura corrispondente alle 6 foglie vere quando si intravede l'inizio dell'infestazione. Non intervenire oltre lo stadio di 10-12 foglie vere. Trattare durante le ore più calde della giornata impiegando 6-8 Kg/Ha di TREAMIN in 600-800 litri per Ha di acqua avendo cura di bagnare uniformemente la Cuscuta. Impiegare la dose più alta in presenza di Cuscuta che già ha attaccato le piante di bietola.
Erba medica: intervenire solo su medicai di età superiore all'anno durante i mesi di Novembre e Dicembre. Impiegare 8 Kg/Ha TREAMIN in 300-500 litri di acqua per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non si consiglia l'impiego di TREAMIN in miscela con altri erbicidi o antiparassitari.

FITOTOSSICITA'

Rispettare i seguenti intervalli fra l'applicazione di TREAMIN **e la successiva semina** di colture sensibili:
Due mesi: Colture moderatamente tolleranti (mais, fragola, sorgo, batata, crucifere).
Quattro mesi: Colture mediamente sensibili (melanzana, lino, menta, aglio, cipolla, peperone, patata, spinacio, bietola da zucchero, pomodoro).
Sei mesi: Colture molto sensibili (cereali da granella in genere: orzo, avena, frumento, segale e graminacee foraggere).

Intervallo fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 60 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti — ogni altro uso è pericoloso —. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VIA VITTOR PISANI, 28 - TEL. 62.56
20124 MILANO (ITALY)

Formulato da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Confezionato da:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 6295 **del** 3.4.85
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG. 1

6296

6296

TALONIL

Fungicida in polvere bagnabile a base di Clortalonil efficace per la lotta contro diverse malattie fungine della vite, fruttiferi, ortaggi, colture floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE:
gr. 100 di prodotto contengono:

— CLORTALONIL puro	gr. 75
— COFORMULANTI	q.b. a gr. 100

CLASSE TOSSICOLOGICA IV

NORME PRECAUZIONALI:

— conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;

— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;

— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

S.C.A.M. s.r.l. MODENA
Officina di Produzione: SCAM/Modena.
Reg. Min. Sanità n. 6296 del 13.3.85

MODALITA' DI IMPIEGO:
Il TALONIL è un fungicida dotato di un ampio spettro d'azione, elevata resistenza al dilavamento e notevole attività residua.

Il TALONIL viene impiegato alle seguenti dosi:

Vite - Contro Peronospora, Botrite, Antracnosi ed Escoriosi: gr. 150-200 per ettolitro.

Pomacee - Contro Ticchiolatura, Septoria: gr. 300 per ettolitro nei trattamenti invernali - gr. 120-150 per ettolitro nei trattamenti primaverili-estivi.

Drupacee - Contro Bolla, Corineo, Cancri rameali, Monilia, Nerume e Ruggine: gr. 300 per ettolitro nei trattamenti invernali - gr. 150 per ettolitro nei trattamenti primaverili-estivi.

Agrumi - Contro Antracnosi, Allupatura, Fumaggine: gr. 300 per ettolitro nei trattamenti invernali - gr. 150-200 per ettolitro nei trattamenti primaverili-estivi.

Barbabietola - Contro Cercospora e Vaiolatura: gr. 200-250 per ettolitro distribuendone Kg. 2-2,5 per ettaro.

Fragola - Contro Botrite e Vaiolatura: gr. 150-200 per ettolitro distribuendone Kg. 1,5 per ettaro.

Tabacco - Contro Peronospora: Kg. 1,5-2 per ettaro.

Frumento - Contro Septoriosi, Ruggini, Fusariosi, Elmintosporiosi, Nerume: Kg. 2 per ettaro.

Mais - Orzo - Contro Elmintosporiosi: Kg. 1,5-2 per ettaro.

Cucurbitacee - Contro Antracnosi, Peronospora, Vaiolatura, Alternariosi, Cladosporiosi, Rizoctonia: gr. 150-200 per ettolitro distribuendone Kg. 1,5 per ettaro.

Pomodoro - Patata - Peperone - Melanzana - Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Botrite, Septoriosi, Rizoctonia, Sclerotinia: gr. 150-200 per ettolitro distribuendone Kg. 1,5-2 per ettaro.

Lattuga - Indivia - Radicchio - Contro Peronospora: gr. 150-200 per ettolitro distribuendone Kg. 1,5 per ettaro.

Colture floreali ed ornamentali - Contro Ticchiolatura, Botrite, Ruggini, Antracnosi, Septoriosi, Alternariosi: gr. 150-200 per ettolitro.

Intervenire preventivamente secondo i normali calendari dei trattamenti. Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume normale.

Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose prescelta in poca acqua a parte e versare poi la miscela ottenuta nel totale quantitativo di acqua, agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile, ad eccezione di quelli a reazione alcalina quali Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, Calce.
La miscela con liquidi emulsionabili è sconsigliata nei casi in cui la compatibilità sia accertata preventivamente.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono, inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può provocare rugginosità su alcune varietà di melo a buccia gialla e rossa (Golden).

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Netto Kg.**

CONCIMI BIOCHIMICI
CONCIMI FOGLIARI
ANTIPARASSITARI

Stabilimento e uffici: S. MARIA DI MUGNANO - Tel. 30.91.31

6297

DANITOL

NOCIVO

Insetticida acaricida piretroide, a base di fenpropatrin, formulato come concentrato emulsionabile. Agisce rapidamente per ingestione e per contatto — a dosi contenute — nei confronti di numerosi insetti ed acari fitofagi, associando all'azione diretta un effetto repellente sui parassiti.

Indicato per la lotta contro insetti ed acari di colture arboree, industriali, orticole e floricole in pieno campo e in serra. L'attività acaricida, che si esplica su larve e adulti, permette di evitare il pericolo dell'acaro insorgenza, comune ai trattamenti con altri fitofarmaci.

COMPOSIZIONE

Fenpropatrin, puro	g	10.0
Coadiuvanti e solventi	q.b. a g	100.0

Contiene XILOLO.

DANITOL è un marchio Sumitomo Chemical Co. Ltd., Osaka - Japan.

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es.: interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Togliere immediatamente gli abiti contaminati e lavare abbondantemente la pelle con acqua e sapone.
In caso di contaminazioni oculari lavare subito gli occhi con acqua per non meno di 15 minuti.
In caso di ingestione procedere a lavanda gastrica con precauzione per evitare rigurgito.
Trattare sintomatologicamente.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità, Nr 6297 in data 13.3.85

MODALITA' DI IMPIEGO

DANITOL può essere impiegato per la difesa contro insetti e acari parassiti di colture eduli (melo, pero, pesco, vite, cetriolo, zucchino, pomodoro, patata, aranci e limoni) e non eduli (rosa, crisantemo, garofano, gerbera) a dosi da 25 a 250 cc/hl). Per il dettaglio delle colture ammesse e delle dosi raccomandate contro i diversi parassiti attenersi al foglio illustrativo accluso alla confezione.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Diluire la quantità precisata di DANITOL in poca acqua e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità di acqua.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'

DANITOL è compatibile con i normali antiparassitari usati per impieghi contro altri parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

DANITOL è nocivo per i pesci, gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti:

— melo, pero, pesco, vite, cetriolo, zucchino, pomodoro = 7 giorni
— patata = 21 giorni
— aranci e limoni = 30 giorni

prima della raccolta.

«**Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso».

«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

«DA NON VENDERSI SFUSO»

Contenuto netto

MODALITA' DI IMPIEGO

Colture arboree	Parassiti combattuti	Dosi cc/hl d'acqua
Arancio - Limone	Cocciniglia mezzograno di pepe *(Saissetia oleae)*	25 cc
	Ceroplaste *(Ceroplastes rusci)*	25 cc
	Aonidiella *(Aonidiella aurantii)*	25 cc
	Acari (P. citri, T. urticae)	150-200 cc
Melo - Pero	Fillominatori *(Lithocolletis blancardella, Leucoptera scitella)*	volo adulti 100 cc prime mine 200 cc
	Carpocapsa *(Carpocapsa pomonella)*	50 cc
	Ricamatrici *(Pandemis, Capua, Eulia)*	schiusura uova 50 cc inizio infestazione 100 cc
	Afidi *(Aphis pomi, Disaphis plantaginea)*	100-150 cc
	Psilla del pero *(Psylla piri)*	200 cc
	Acari *(P. ulmi, T. urticae)*	200-250 cc
Pesco	Afidi *(Myzus persicae)*	applicazioni a bottoni rosa 25 cc
	Tignole *(Cydia molesta)*	50 cc
	Tripidi	50 cc
	Mosca della frutta *(Ceratitis capitata)*	50 cc
	Acari *(P. ulmi)*	200 cc
Vite	Tignole *(Polychrosis botrana, Clysia ambiguella)*	25 cc
	Cicaline *(Empoasca flavescens)*	25 cc
	Acari *(P. ulmi, T. urticae, E. carpini)*	200 cc
Patata	Dorifora *(Leptinotarsa decemlineata)*	100 cc
Pomodoro	Dorifora *(L. decemlineata)*	100 cc
	Aleurode *(Trialeurodes vaporariorum)*	100 cc
	Acari *(T. urticae)*	150-200 cc
Cetriolo Zucchina	Aleurode *(T. vaporariorum)*	100 cc
	Acari *(T. urticae)*	150-200 cc

Colture floricole in pieno campo e in serra	Parassiti combattuti	Dosi cc/hl d'acqua
Rosa	Tortricidi delle rose *(Cacoecimorpha pronubana, Argyrotoxa bergmanniana, ecc.)*	80 cc
	Acari *(T. urticae)*	150 cc
Crisantemo	Aleurode *(T. vaporariorum)*	100 cc
	Minatori fogliari *(Liriomyza trifolii)*	150 cc
	Acari *(T. urticae)*	150 cc
Garofano	Bega *(Epichoristodes acerbella)*	150 cc
	Acari *(T. urticae)*	150-200 cc
Gerbera	Aleurode *(T. vaporariorum)*	100 cc
	Minatori fogliari *(L. trifolii)*	150 cc
	Acari *(T. urticae)*	150 cc

Nei trattamenti alle colture floricole e orticole specie per quelle in serra eseguire saggi preliminari poiché alcune varietà potrebbero risultare sensibili.

Quanto sopra in particolare su rose in serra con vegetazione tenera e su nuove varietà particolarmente delicate.

6298

MODALITA' DI IMPIEGO

Il modo specifico di azione per contatto e ingestione prevede che le irrorazioni siano effettuate con cura per bagnare bene le parti vegetative della coltura infestata.
Applicare l'insetticida all'inizio delle infestazioni per sfruttarne anche l'azione repellente.

Dosi d'impiego di Fastac

Coltura	Parassiti combattuti	Dosi (in 100 litri di acqua)	Note
Pesco	Afide verde *(Myzus persicae)*	cc 30	eventualmente con kg 2 di olio bianco (FOLIOL) in trattamenti di fine inverno allo stadio dei bottoni rosa;
		cc 50	in trattamenti primaverili/estivi (non applicare quando le foglie sono accartocciate).
	Mosca della frutta *(Ceratitis capitata)*	cc 40	
	Tignole *(Anarsia lineatella, Grapholita molesta)*	cc 30-40	
	Tripidi *(Thrips, spp.)*	cc 70 cc 50	stadio bottoni rosa post fioritura
	Tortrici Ricamatrici *(Pandemis heperana, Eulia pulchellana)*	cc 40-60	
Pero	Psilla *(Psylla piri)*	cc 100 cc 150-200	trattamento fine inverno inizio attacco primaverile/estivo
	Afidi *(Aphis pomi)*	cc 100	inizio attacco
Melo	Verme delle mele *(Carpocapsa pomonella)*	cc 50-100	
	Microlepidotteri minatori *(Lithocolletis blancardella, Leucoptera scitella)*	cc 100	trattamenti all'epoca del massimo volo, prima della schiusura delle uova.
	Tortrici ricamatrici *(Eulia pulchellana, Pandemis ribeana, Capua reticulana, Cacoecia rosana et podana)*	cc 50	
	Afidi *(Aphis pomi, Disaphis plantaginea)*	cc 100	inizio attacco
Vite	Tignole *(Lobesia botrana, Clysia ambiguella)*	cc 30	inizio attacco
	Cicaline *(Empoasca flavescens)*	cc 30-50	
Agrumi	Afidi brunastro *(Toxoptera aurantii)* verde chiaro *(Aphis spiraecola)* verde scuro *(Aphis gossypii)*	cc 50	
	Verme della zagara *(Prays citri)*	cc 80-100	
	Coccinigile *(Saissetia oleae, Ceroplastes rusci, Aonidiella aurantii)*	cc 30	eventualmente con kg 1 di olio bianco (FOLIOL)
Patata	Dorifora *(Leptinotarsa decemlineata)*	cc 50	
	Afide verde *(Myzus persicae)*	cc 50	trattare con foglie non accartocciate
	Nottue *(Agrotis spp.)*	cc 70-100	

Coltura	Parassiti combattuti	Dosi	Note
Pomodoro	Aleurodidi *(Trialeurodes vaporariorum)*	cc 200	
		cc 50-100	trattamento ogni 7-10 giorni
	Fillominatori *(Liriomyza trifolii)*	cc 100	
	Nottue *(Agrotis spp.)*	cc 70-100	
	Afidi *(Aphis fabae, Myzus persicae)*	cc 50-100	trattare con foglie non accartocciate
Cavolo cappuccio Cavolfiore	Cavolaia *(Pieris brassicae)*	cc 50	
Fagiolo Lattuga	Afidi *(Aphis fabae, Myzus persicae)*	cc 70-100	
Carciofo	Nottue *(Gortyna xanthenes)*	cc 70-100	
	Mosca minatrice delle foglie *(Agromyza andalusiaca)*	cc 100	
Cetriolo	Aleurodidi *(Trialeurodes vaporiarorum)*	cc 200	
		cc 50-100	trattamento ogni 7-10 giorni
	Afidi *(Aphis gossypii)*	cc 70-100	
Cipolla	Tripidi *(Thrips spp.)*	cc 70-100	
Mais	Piralide *(Ostrinia nubilalis)*	1,6-2 l/ha	
	Afidi	1-1,6 l/ha	
	Nottue *(Agrotis spp.)*	cc 70-100	
Frumento Orzo	Afidi	0,4-0,6 l/ha	
Riso	Afidi	cc 70-100	
Soia	Afidi	cc 100	
Barbabietola da zucchero	Altica *(Chaetocnema tibialis)*	0,7-1 l/ha	
	Lisso *(Lyxus spp.)*		
	Cleono *(Cleonus spp.)*		
	Cassida *(Cassida nobilis, Cassida vittata)*		
	Afidi *(Myzus persicae, Aphis fabae)*		
Tabacco	Afidi	cc 70	
Colture floricole	Tripidi *(Thrips spp.)*	cc 100	
	Aleurodidi *(Trialeurodes vaporariorum)*	cc 200	
	Tortricidi: Bega *(Epichoristodes acerbella)*	cc 70-100	
	Afidi	cc 70	
Pioppo	Saperda *(Saperda charcarias)*	cc 200	
	Criptorrinco *(Cryptorrhynchus lapati)*	cc 100	

Le dosi inferiori sono sufficienti all'inizio delle infestazioni o in caso di attacchi meno gravi.

III CLASSE

Attenzione manipolare con prudenza

FASTAC

Insetticida concentrato emulsionabile, efficace contro: Lepidotteri, Emitteri e Coleotteri parassiti di colture frutticole, orticole, floreali in campo, pioppo. Unisce alla rapida azione per contatto e ingestione un effetto prolungato. Fastac associa all'azione diretta un certo effetto repellente verso forme resistenti ai comuni insetticidi fosforganici e carbammati.

COMPOSIZIONE

Alfametrina, puro . . . . g 4,75
Coadiuvanti e solventi . . q.b. a g 100,0

FASTAC è un marchio Shell.

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi di acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es.: interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

(desunti da animali di laboratorio a rapido recupero). Sedazione, atassia, andatura irregolare, deambulazione irrequieta con tremori occasionali e convulsioni.

Consigli terapeutici:

In caso di contaminazione cutanea: togliere immediatamente gli abiti contaminati e lavare abbondantemente la pelle contaminata con acqua e sapone Trattamento sintomatico.
In caso di contaminazione oculare: subito lavare abbondantemente con acqua gli occhi per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione: provocare il vomito o procedere, con debita cautela, a lavanda gastrica; se il paziente è incosciente dopo averlo intubato. Somministrare sedativi del sistema nervoso centrale e anticonvulsivanti, preferibilmente Diazepam, per via iniettiva se si manifestano convulsioni. Sostenere opportunamente la respirazione, controllando ed aiutando le funzioni cardiovascolari e renali. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero a un Centro di rianimazione e consultare comunque un Centro Antiveleni.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità. Nr. ....6298........... in data . 13.3.85............

MODALITA' DI IMPIEGO

FASTAC può essere impiegato per la difesa contro insetti parassiti di colture eduli (pomodoro, lattuga, cetriolo, fagiolo, mais, carciofo, cavoli, patata, vite, melo, pero, pesco, soia, cipolla, barbabietola da zucchero, agrumi, frumento, riso, orzo, tabacco) e non eduli (floreali, pioppo) a dosi da 30 a 200 cc/hl di acqua. Per il dettaglio delle colture ammesse e delle dosi raccomandate contro i diversi parassiti attenersi al foglio illustrativo accluso alla confezione.

Modalità di applicazione

Diluire la quantità precisata di FASTAC in poca acqua e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità d'acqua.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

FITOTOSSICITA'

FASTAC non è in generale fitotossico per le colture floricole. Sarà opportuno comunque, con varietà delicate, eseguire saggi preliminari specialmente per rose e poinsettie.

COMPATIBILITA'

FASTAC è compatibile con i normali antiparassitari usati per impieghi contro altri parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

FASTAC è nocivo per i pesci e le api, in laboratorio.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

— pomodoro, lattuga, cetriolo, fagiolo, mais = 3 giorni
— carciofo, vite, melo, pero, pesco, soia, patata, cavoli = 7 giorni
— cipolla = 14 giorni
— barbabietola da zucchero = 24 giorni
— agrumi = 30 giorni
— frumento, riso, orzo = 42 giorni
— tabacco = 60 giorni

«Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso».
«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

«DA NON VENDERSI SFUSO»

Contenuto netto:

6299

METRIPAN[(R)]

Erbicida in polvere bagnabile, per il diserbo delle colture seminate e trapiantate (patata, pomodoro), Soia, Medica.

COMPOSIZIONE

— Metribuzin puro	g	35
— Coadiuvanti ed Inerti;quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM–MILANO

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 6299 del 14.3.85 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Possibilità di intossicazione solo per ingestione di forti quantitativi.

Sintomi di intossicazione:

Nausea, vomito, difficoltà di respirazione, depressione del sistema nervoso centrale.

Consigli terapeutici : lavanda gastrica.

Alcune controindicazioni :

Bevande alcooliche, grassi e olii.

Antidoti : sostanze ad azione stimolante sui centri vasmotori e circolatori.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto agisce per assorbimento fogliare e radicale e presenta una buona azione contro le infestanti graminacee e dicotiledoni annuali.

E' particolarmente indicato per la lotta contro le graminacee annuali comprese Setaria, Digitaria, Echinochloa, e inoltre contro molte infestanti Dicotiledoni come Amaranto, Chenopodio, Portulaca, Poligono, Papavero e Veronica. Non è efficace contro le specie perennanti.

Qualora si voglia impiegare il prodotto in pre-emergenza è consigliabile far seguire al trattamento una leggera bagnatura del terreno.
Distribuire il prodotto alle dosi per ettaro di superficie di seguito indicate, diluite in 500-700 litri di acqua, impiegando la dose minima su terreni leggeri e con temperature elevate e la dose massima in caso contrario..

PATATA

- **pre-emergenza:** intervenire alla dose di **Kg. 1,5-3**, poco prima dell'emergenza della coltura, dopo l'ultima rincalzatura.
- **post-emergenza:** impiegare **Kg. 1-1,5** di prodotto nell'epoca fra l'inizio dell'emergenza fino a che la coltura ha raggiunto i 5 cm. di altezza.

POMODORO (da trapianto)

- Intervenire alla dose di **Kg. 1,5** qualche giorno prima del trapianto, ovvero alla dose di **Kg. 1** appena superata la crisi da trapianto, su piantine ben sviluppate.

SOIA

- Intervenire in pre-emergenza alla dose di **Kg. 1-1,5** evitando di trattare i terreni leggeri.

POMODORO (da semina diretta)

Effettuare trattamenti in post-emergenza con coltura alta almeno 10-15 cm. usando una dose di **0.75-1 Kg/ha.**

MEDICA

Impiegare una dose di **Kg. 2** durante il riposo vegetativo.

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte e aggiungere quindi al totale quantitativo di acqua agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : il prodotto è in genere miscibile con altri antiparassitari, si consiglia tuttavia una prova preliminare onde controllarne la compatibilità fisica.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità; su patata e pomodoro (da seme) in post-emergenza, si raccomanda una prova su piccola scala onde, controllarne la sensibilità varietale. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg.**

6300

AKTUAN

COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI
gr. 25 DITHIANON puro
gr. 10 CIMOXANIL puro
Coformulanti q.b. a grammi 100.

Fungicida in polvere bagnabile ad azione preventiva e curativa contro la Peronospora della vite; svolge anche un'azione complementare contro l'Escoriosi, Marciume nero dell'acino "Black rot" (Guignardia bidwellii), Rossore (Pseudopeziza tracheiphila) della vite.

CLASSE II NOCIVO

NATURA DEL RISCHIO
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirarne i vapori
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE
Possibilità d'intossicazione per ingestione e contatto cutaneo.
Sintomologia: Irritazioni cutanee, vomito, diarrea. Terapia: sintomatica. Trattamento topico delle manifestazioni cutanee con pomate antistaminiche o cortisoniche.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua rimanente.

CAMPI E DOSE D'IMPIEGO

Vite:	contro Peronospora e azione complementare contro Marciume nero dell'acino ,"Black rot", Rossore ed Escoriosi della vite	0,1 - 0,15 %
Patata:	contro Phytophtora	2 - 2,5 kg/ hl
Pomodoro:	contro Phytophtora	3 - 4 kg/ hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
AKTUAN è miscibile con la maggior parte dei fungicidi in uso, esclusi i prodotti alcalini.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo verso pesci, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

"Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".
"Chi impiega il prodotto, è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

J. & A. MARGESIN SPA - Fitofarmaci - LANA D'ADIGE (BZ)
Sede ed officina di produzione: Lana d'Adige (BZ)
REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' N° 6300... del 14.3.85
DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO: KG.

06 81 AD 2

6301

Antigermoglio Tabacco

Fitoregolatore antigermogliante specifico ad azione per contatto

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

N-decanolo puro		g 79
Coformulanti	q.b. a	g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 6301 del Ministero della Sanità del 14.3.85

CARATTERISTICHE

L'ANTIGERMOGLIO TABACCO è un prodotto ad attività antigermoglio da usare sulle coltivazioni di tabacco, costituito da un solo componente, tale da garantirne la non fitotossicità.

Per l'eliminazione ed il controllo dei germogli ascellari è necessario che l'ANTIGERMOGLIO TABACCO, opportunamente diluito in acqua, venga a contatto diretto con i germogli e che questi non abbiano ancora raggiunto la lunghezza di 2-3 cm. Poichè l'ANTIGERMOGLIO TABACCO agisce per contatto è necessario che le piante siano perfettamente allineate e diritte e che lo stelo venga bagnato in modo uniforme (fino alla base) distribuendo l'emulsione dall'alto e facendola scorrere lungo lo stesso fusto.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

L'ANTIGERMOGLIO TABACCO si impiega a cavallo della cimatura, nella fase vegetativa compresa tra lo stadio di "bottone florale" e quello di "inizio della schiusura dei fiori". Durante la cimatura è consigliabile asportare manualmente anche i germogli già troppo sviluppati. L'effetto del trattamento sui germogli è visibile già 1-2 ore dopo il trattamento. L'ANTIGERMOGLIO TABACCO può essere applicato in qualsiasi ora del giorno fino alle 18.30 circa; è preferibile comunque eseguire il trattamento nella prima mattina (al diradamento della rugiada) o nel pomeriggio dopo che le piante si sono riprese dall'avvizzimento.

Non effettuare il trattamento se c'è vento o se le foglie sono bagnate o se minaccia di piovere entro 1-2 ore o se la temperatura è superiore ai 30°C.

Evitare sempre di bagnare la pagina inferiore delle foglie di tabacco.

L'ANTIGERMOGLIO TABACCO si impiega alla dose di 5-7 litri/hl d'acqua, distribuendo 15-25 cc di poltiglia per pianta; adottare le dosi più basse quando si opera su tabacchi leggeri (o chiari da sigaretta) del tipo Maryland, le dosi più alte su tabacchi "neri" e vigorosi.

Il trattamento si esegue con pompa a spalla munita di lancia a 1 o più ugelli che consenta di trattare al centro ogni pianta, dall'alto verso il basso, ad un'altezza di 15-20 cm dall'apice.

Operare a bassissima pressione con getto a goccia grossa, evitando la nebulizzazione e la conseguente deriva.

Preparazione della poltiglia: agitare il prodotto prima dell'uso; versare quindi la dose prestabilita di ANTIGERMOGLIO TABACCO nel contenitore ed aggiungere poi gradatamente l'acqua (non viceversa); mescolando con cura portare infine al volume desiderato.

Se l'emulsione preparata rimane ferma per qualche tempo, è necessario riagitare accuratamente il tutto prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'ANTIGERMOGLIO TABACCO va impiegato da solo e mai in miscela con antiparassitari

FITOTOSSICITA'

L'ANTIGERMOGLIO TABACCO può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Pulire accuratamente le attrezzature prima e dopo l'uso.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO Litri

6302

MATAVEN

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

Diserbante specifico contro le avene selvatiche **(Avena ludoviciana, A. sterilis, A. fatua, A. barbata)** che infestano le colture di grano tenero e di grano duro, con azione anche contro **Alopecurus myosuroides.**

COMPOSIZIONE IN PESO

— flamprop-metile puro	g	15,6
— solventi, coadiuvanti, emulsionanti	qb a g	100,0

contiene xilolo e cicloesanone

MATAVEN è un marchio Shell.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- Conservare la confezione ben chiusa;
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- Non operare contro vento;
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- Sciacquare abbondantemente e a lungo la pelle e gli occhi, se incidentalmente contaminati;
- Distruggere le confezioni completamente vuote;

Informazioni mediche

In caso di malessere ricorrere al medico, mostrandogli l'etichetta.

Consigli di pronto soccorso nel caso di contaminazione:

- **degli occhi** - lavare abbondantemente con acqua per 15 minuti;
- **della pelle** - risciacquare con acqua e sapone, togliere gli abiti contaminati e le scarpe;
- **per inalazione** - portare il paziente all'aria pura;
- **per ingestione** - somministrare pastiglie di carbone attivato in latte o olio.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO - Telefono 02/3885

Stabilimento: SHELL PERNIS (Olanda)

Registrazione Ministero della Sanità N. 6302 del 3.4.85

MODALITA' DI IMPIEGO

L'emulsione si impiega — in post-emergenza del grano e dell'avena — nel periodo compreso gli stadi di inizio levata (H) ed il 1°-2° nodo (I-J).-

Stadi vegetativi del grano
G = fine accestimento
H = fase raddrizzamento (inizio levata)
I = levata, con 1° nodo palpabile
J = levata con 2° nodo palpabile
K = fase di botticelle

Si consiglia di intervenire nell'epoca precisata impiegando kg 3,5 di formulato per ettaro. Nei in cui si abbia una debole infestazione la dose potrà essere ridotta a kg 3/ettaro, nei casi in in cui l'infestazione di Avena selvatica sia piuttosto abbondante sarà opportuno ricorrere 4/ettaro. In ogni caso la quantità di formulato dovrà essere erogata con normali pompe a vo normale in una quantità di soluzione pari a 500-600 litri per ettaro.

AVVERTENZE: Agitare la confezione prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

MATAVEN non è miscibile con i comuni ormonici (lasciare un intervallo di 10 gg.).

Avvertenza: «In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di ca più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodott tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiu

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

«Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti altro uso è pericoloso».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso impropri preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

«Avvertenza: Immagazzinare al riparo, meglio se in locali riscaldati».

Contenuto: Kg 10

6303

NEBURON 60 AMONN

CLASSE IV

POLVERE BAGNABILE - Erbicida di pre-emergenza per frumento tenero e cereali minori

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Neburon p.a. puro g 60
Bagnanti, disperdenti, stabilizzanti ed inerti quanto basta a 100 grammi

NORME PRECAUZIONALI
-Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; -Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua; -Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il NEBURON 60 AMONN è un erbicida di pre-emergenza per frumento e cereali minori che controlla le seguenti specie di infestanti graminacee e dicotiledoni annuali : Alopecurus myosuroides, Amaranthus spp, Atriplex spp, Ambrosia spp, Capsella bursa pastoris, Chenopodium spp, Digitaria sanguinalis, Oxalis spp, Papaver spp, Poa spp, Polygonum spp, Portulaca spp, Sonchus spp, Stellaria spp.

MODALITA' DI IMPIEGO
Cereali (frumento, orzo, avena, segale) autunnali - dose media kg 3-6 distribuiti in 200-500 lt/ha.
Usare la dose più bassa nei terreni sciolti e la più alta per i terreni pesanti.
Il trattamento con NEBURON 60 AMONN va effettuato dopo la semina dei cereali e comunque prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti. Non ripetere il trattamento prima di 6 mesi.
L'efficacia erbicida è migliore su terreno ben lavorato, privo di zolle, con elevato grado di umidità del suolo al momento del trattamento o dopo la sua esecuzione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il NEBURON 60 AMONN è miscibile con i più comuni fitofarmaci.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Su grano duro usare con precauzione.
Non trattare su terreni sabbiosi.
Non traseminare leguminose.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Bolzano, via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Stabilimento di Bolzano, via Siemens, 12

Registrazione N. 6303 del 10.4.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 1

AMONN FITOCHIMICA SPA

BOLZANO, VIA PIAVE 2

6304

MALERTOX RISO FLUID®

DISERBANTE SELETTIVO DEL RISO CONTRO I GIAVONI

MOLINATE PURO g 72,6 - COFORMULANTI QUANTO BASTA A g 100 - (CONTIENE XILOLO)

CLASSE III

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici — Conservare la confezione ben chiusa — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua — Non operare contro vento — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti — Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchiti, effetto Antabuse (in casi di assunzione di alcool), irritazione della cute e delle mucose in caso di contatto (dermatiti, congiuntiviti, faringiti, ecc.) nonché manifestazioni allergiche cutanee e bronchiali.*

Terapia: *nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centri di rianimazione.*
Molti dei sintomi tossici possono essere provocati dai solventi organici presenti nel formulato, pertanto la terapia deve tener conto anche dei danni causati da questi.
I solventi possono provocare gravi lesioni epatiche, renali e a carico del sistema nervoso centrale e periferico (particolarmente i distillati del petrolio possono causare polmoniti chimiche); tutte queste forme richiedono idonee terapie sintomatiche.
Il vomito **non** *va provocato. Somministrare grandi quantità di acqua.*
Se il paziente vomita spontaneamente, somministrare ancora liquidi, dopo averlo intubato.
Se il paziente è incosciente **non** *somministrare nulla per bocca. Ricoverare il paziente in un centro di rianimazione.*
La lavanda gastrica, a paziente intubato, va praticata con una soluzione di 200-300 ml di acqua in cui siano stati sciolti 30-60 g di carbone attivo.
Purganti salini. Terapie sintomatiche mirate.
Per le manifestazioni cutanee e mucose rimuovere gli abiti contaminati, lavaggio con abbondante acqua della pelle e degli occhi per almeno quindici minuti, pomate oftalmiche e dermatologiche.

Controindicazioni: *Alcool, olii, grassi.*
Avvertenza: *consultare un Centro antiveleni.*

MODALITA' DI IMPIEGO

Il MALERTOX RISO FLUID® è un diserbante liquido del riso dotato di azione contro i giavoni.
Il MALERTOX RISO FLUID® si applica in presemina con la risaia asciutta, interrando subito dopo e sommergendo, oppure con la risaia già sommersa.
Il MALERTOX RISO FLUID® si applica anche in post-emergenza del riso, prima della fase di accestimento dei giavoni. Il trattamento si effettua in presenza dell'acqua, che deve essere mantenuta ferma per almeno 5 giorni.
Dosi di impiego:
— in terreni leggeri: 5 Kg/Ha
— in terreni di medio impasto: 5,5 Kg/Ha
— in terreni pesanti, argillosi, organici: 6 Kg/Ha
— in terreni torbosi: 6,5-7 Kg/Ha
da distribuirsi in 4-5 ql/Ha di acqua con le normali barre irroratrici.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto va impiegato da solo.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIVAM FITOCHIMICA

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO - S.p.A.
VIA SCARLATTI 30 • 20124 MILANO • TEL.(02) 270.451 • Telex 320379 SIVAM I
Officina di produzione: DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (Bergamo)

Registrazione n. 6304 del Ministero della Sanità del 3.4.85

PESO: Kg

6305

DICLORSAN 50 P.B.

ANTICRITTOGAMICO ORGANICO PER LA DIFESA PREVENTIVA DI COLTURE ORTICOLE E FLOREALI

DICLORAN PURO g 50 - DISPERDENTI, BAGNANTI, INERTI QUANTO BASTA A g 100

Classe III

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;**
- **conservare la confezione ben chiusa;**
- **non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;**
- **non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua;**
- **non operare contro vento;**
- **evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti**
- **dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il DICLORSAN 50 P.B. è un anticrittogamico indicato in prevalenza per la difesa dai marciumi, dovuti principalmente a Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia, che colpiscono il colletto e l'apparato radicale dalle seguenti colture:

- colture ortive: pomodoro, peperone, melanzana, insalata, cetriolo, zucchino, fragola, melone, cocomero;
- colture floreali: geranio, ciclamino, poinsettia, bromoceliaceae, anthurium, sansevieria, pothos, peonia, begonia, garofano, rosa, gladiolo, crisantemo, lilium.

Il DICLORSAN 50 P.B. si applica alle seguenti dosi, valide per trattamenti a volume normale:

- trattamenti al terreno: 150-250 g per 100 mq di superficie, da incorporare leggermente, sia in semenzai che in pieno campo;
- trattamenti su colture in atto: 150-200 g per 100 litri di acqua, in due-tre trattamenti, a seconda dell'andamento stagionale, distanziati 3-4 settimane, indirizzando il getto verso il colletto delle piante;
- concia bulbi: g 600 per ogni 100 kg di bulbi, che devono essere leggermente inumiditi in precedenza;
- disinfezione terricciati: 600 g per ogni metro cubo di composto.

Il DICLORSAN 50 P.B. nella dose necessaria, deve essere stemperato prima in poca acqua a parte e poi versato nel serbatoio dell'irroratore, aggiungendo acqua ed agitando.
Il DICLORSAN 50 P.B. nelle sue applicazioni su colture in atto, è impiegato in miscela con il BAGNANTE ADESIVO S e con l'integratore fogliare CF-1.

Da non applicare con mezzi aerei

Miscibile con la maggior parte degli anticrittogamici in commercio e con tutti quelli di nostra produzione, ad eccezione di quelli contenenti calcio, o comunque a reazione alcalina. E' sconsigliabile la miscela con prodotti in formulazione oleosa. Avvertenza: in caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non deve essere impiegato su plantine troppo giovani, quando la temperatura è alta: è bene che abbiano almeno quattro foglie. Inoltre le piantine devono aver superato la crisi dopo il trapianto (10-15 giorni dopo il trapianto). In caso di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di effettuare preventivamente delle piccole prove.

Rischi di nocività: è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO - S.p.A.

VIA SCARLATTI 30 • 20124 MILANO • TEL.(02) 270.451 • Telex 320379 SIVAM I

Officina di produzione: DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (Bergamo)

Registrazione n. 6305 del Ministero della Sanità del 3.4.85 PESO: Kg

6306

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Erbicida liquido emulsionabile selettivo per il diserbo della Barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio

Composizione

Fenmedifan puro	g 30
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti (contiene trimetilbenzeni, dimetilformamide, xilolo)	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6306/1/1 **del** 3.4.85

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Erbicida ad assorbimento fogliare attivo sulle plantule delle seguenti infestanti dicotiledoni: Anagallis arvensis / Atriplex patula / Capsella bursa-pastoris / Centurea cyanus / Chenopodium album / Datura stramonium / Fumaria officinalis / Galinsoga parviflora / Lamium purpureum / Linaria minor / Matricaria sp. / Myosotys arvensis / Papaver sp. / Plantago major / Polygonum aviculare / Polygonum convolvulus / Polygonum lapathifolium / Polygonum persicaria / Raphanus raphanistrum / Senecio vulgaris / Sinapis arvensis / Solanum nigrum / Sonchus oleraceus / Spergula arvensis / Stellaria media / Thlaspi arvense / Urtica urens / Veronica persica / Viola tricolor.

Si osserva un controllo parziale da parte del prodotto su: Amarantus retroflexus / Mercurialis annua.

L'applicazione si effettua in post-emergenza delle barbabietole, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, purché le malerbe non superino lo stadio delle due foglie vere;

Le dosi d'impiego variano da 3 a 4 kg/ha diluiti in 250-400 litri di acqua;

Effettuare il trattamento su piante asciutte e con temperature inferiori a 25 °C. Nelle giornate calde aver cura di eseguire l'intervento nel tardo pomeriggio;

Evitare di trattare colture di bietola danneggiate da insetti o in cattivo stato vegetativo.

I trattamenti precoci sono quelli che danno i migliori risultati, essendo evidente che le infestanti resistono al prodotto man mano che si sviluppano.

Preparazione dell'emulsione

Versare a poco a poco la dose stabilita di NIVAL OE 30 nell'acqua richiesta, agitando accuratamente.

Avvertenze

Assicurarsi che le pompe impiegate per il trattamento non contengano residui di altri erbicidi, specialmente ormonici. Lavare ripetutamente le attrezzature con acqua e soda prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto in luogo fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione e contatto cutaneo
(inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenza

Consultare un Centro Antiveleni.

92

6307

GESAPRIM® WDG Autodispersibile

Granuli autodispersibili in acqua
Erbicida selettivo per il mais

Composizione
100 g di prodotto contengono:
85 g atrazina pura
q.b. a 100 coformulanti

CLASSE III
ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: CIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6307 **del** 3.4.85

® marchio registrato

Modalità d'impiego
GESAPRIM WDG combatte efficacemente le più dannose infestanti graminacee e dicotiledoni provenienti da seme a germinazione primaverile-estiva, agendo per assorbimento fogliare e soprattutto per assorbimento radicale sulle infestanti in via di germinazione. Le malerbe ad apparato radicale profondo, rizomatose ed in genere perenni non risentono in misura determinante dell'azione del prodotto; in particolare risultano resistenti il Panicum dichotomiflorum, la Gramigna, il Convolvolo, il Sorgo selvatico, l'Artemisia.

Dosi e tempi di applicazione
Kg 2-2,5/ha in 400-600 litri di acqua
Adottare il dosaggio più basso nei terreni sciolti e di medio impasto, il più alto nei terreni compatti ed in quelli ricchi di sostanza organica. Eseguire i trattamenti subito dopo la semina del mais od al massimo quando le malerbe hanno raggiunto uno sviluppo vegetativo di 4-6 cm. Applicazioni più ritardate possono risultare meno efficaci.

Preparazione della miscela
Versare direttamente il prodotto nella botte della macchina distributrice.

Avvertenze
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Applicare il prodotto su terreni ben preparati, sminuzzati e possibilmente rullati dopo la semina. Curare l'uniformità della distribuzione evitando di soffermarsi con gli ugelli aperti sulle capezzagne o in qualsiasi altro posto del campo. Evitare anche sovrapposizioni nelle strisciate della macchina distributrice. Se dopo 4-5 giorni dal trattamento non piove a sufficienza è necessario intervenire con irrigazioni (possibilmente a pioggia).
Evitare l'impiego di acque luride, sia per l'irrigazione che per la preparazione della miscela.
Il trattamento è sconsigliato in terreni torbosi o comunque molto ricchi di humus.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari. « Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

6308

PARAZIN CLASSE I

DISERBANTE DISSECCANTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA SOTTO FORMA DI SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE: gr 100 di prodotto contengono
— PARAQUAT puro (sotto forma di dicloruro) gr 8,6
— SIMAZINA pura gr 25
— COFORMULANTI q.b. a gr 100
— Contiene glicole etilenico.

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.
NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corso d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabile dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrando in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva). In caso di intossicazione ricorrere al medico mostrandogli la seguente etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
ATTENZIONE: I sintomi dell'intossicazione qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi dopo alcuni giorni (latenza prolungata). L'introduzione nell'organismo anche di poche gocce del prodotto può essere fatale: non attendere la comparsa dei sintomi per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perché sia praticata l'emodialisi. Nel frattempo nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza assorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.
INTOSSICAZIONE PER INGESTIONE E PER INALAZIONE: I primi sintomi sono: epistassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con seguito di lesioni epato-renali.
L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare, grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria. L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat nel sangue.
INTOSSICAZIONE PER CONTATTO - Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore). Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole. Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta. Terapia sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.
In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicità del paraquat e sulla terapia possono essere richieste direttamente alla società produttrice di questo presidio sanitario.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO: Il **PARAZIN** è un diserbante-disseccante, dato dalla unione di due noti principi attivi, che viene impiegato in post-emergenza delle infestanti. Il **PARAZIN** agisce, con azione rapida ed immediata, sulle parti epigee delle infestanti, provocandone il totale disseccamento e poi per via radicale portando in breve tempo la pianta infestante a completa distruzione.
Il **PARAZIN** è efficace in quanto è dotato di buona persistenza d'azione e controlla un notevole numero di erbe infestanti quali le graminacee in genere ed in particolare: Aleopecurus, Cynodon dactylon, Bromus Festuca, Phragmites, Agrotis, Lolium, Veronica, Borsa del Pastore, Persicaria, Ortica, Erba porcellana e Papavero. Il **PARAZIN** è consigliato per il diserbo sulle seguenti colture:
COLTURE ARBOREE (melo - vite - agrumi - olivo): impiegare il **PARAZIN** alla dose di kg 10-12 per ettaro, trattando preferibilmente in febbraio-marzo. Può essere impiegato anche per il diserbo del pero, non però se innestato su cotogno, in quanto può provocare una certa fitotossicità.
LUOGHI INCOLTI (canali, fossi, aree industriali): il **PARAZIN** viene impiegato in dosi di kg 12-20 per ettaro impiegando la dose massima dove vi è la massima infestazione. E' buona regola aggiungere gr 400-600 di olio bianco per ettaro per una migliore riuscita dell'effetto erbicida.
La quantità di acqua varia da 500 a 1000 litri per ettaro.
ARGINI DELLE RISAIE: Contro il Giavone, nonché tutte le infestanti prima citate, impiegare il **PARAZIN** alla dose di kg 10-12 per ettaro.

DIVIETO DI IMPIEGO SUI FORAGGI

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il **PARAZIN** è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': usare il prodotto in giornate senza vento in quanto può provocare danni alle colture adiacenti, evitando che il liquido diserbante venga a contatto con le foglie delle piante coltivate, in quanto provocherebbe il disseccamento di tali foglie.
Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
NOCIVITA': Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

« **ATTENZIONE** da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2-a - ☎ 90 62 07 44042 CENTO (Ferrara)

officina di produzione: TERRANALISI s.n.c.
RENAZZO DI CENTO (FE)

Registrazione Ministero della Sanità N. 6308 del 3.4.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO Kg**

6309

SEVITOX 50

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO VERMI E TIGNOLE ED ALTRI INSETTI IN FRUTTICULTURA, VITICOLTURA E ORTICULTURA

CONMPOSIZIONE: **100 grammi di prodotto contengono**
— CARBARYL puro (esente da B-naftolo) . . . . . gr 47,5
— Coformulanti q.b. a . . . . gr 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Informazione per il medico: Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).
Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO: Il **SEVITOX 50** si usa alla dose di gr 200 in 100 litri di acqua sulle seguenti culture:
POMACEE: Contro Carpocapsa e larve Ricamatrici;
DRUPACEE: Contro Anarsia e Cidia Molesta;
VITE: Contro Tignola della vite;
PATATE: Contro Dorifora;
POMODORO: Contro Dorifora;
SEDANO: Contro la Nottua;
FRAGOLE: Contro larve di Lepidotteri;
FAGIOLI: Contro larve di Lepidotteri.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.
Nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il pesce e il bestiame.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

« **Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
44042 — CENTO (Ferrara)
Via Donizetti, 2/a - Telef. 90.62.07

OFFICINA DI PRODUZIONE: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - RENAZZO (FE)

Registrazione n. 6309 del 3.4.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto kg**

6310

TOXIBAS

Diserbante della barbabietola da zucchero

Composizione:

Cloridazon puro	g. 68,8
Coformulanti	q.b. a g. 100

CLASSE IV

A BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

20122 Milano
Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782

Officina di produzione:
VISPLANT-CHIMIREN S.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 6310 **del** 3.4.85
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il TOXIBAS è un erbicida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale ed in parte anche per via fogliare. Controlla le malerbe che si propagano per seme e le infestanti a foglia larga quali:
Veronica, Ortica piccola, Erba storna, Centocchio, Spergola, Erba morella, Senape, Rafanistro, Erba porcellana, Persicaria, Convolvolo nero, Papavero, Camomilla, Erba ruota, Galinsoga, Canapa selvatica, Rucola selvatica, Carota selvatica, Farinaccio, Capsella, Atriplice e Amaranto.
Non controlla le malerbe perenni e quelle che germinano in profondità. Il TOXIBAS s'impiega in:

Pre-semina: con interramento a 3-4 cm. di profondità con il terreno finemente lavorato.

Pre-emergenza: cioè subito dopo la semina fino a poco prima della fuoriuscita delle piantine. Questa variante necessità di terreno umido; in caso contrario sarà indispensabile intervenire con una irrigazione.

Post-emergenza: si deve effettuare non oltre le due foglie vere delle infestanti e con le barbabietole aventi le foglie della grandezza di un pisello. Di norma si preferisce, in questo periodo, abbinare il **TOXIBAS** ad un altro erbicida specifico in relazione al tipo di flora avventizia presente al momento dell'intervento.

Dosi consigliate negli interventi di pre-semina e pre-emergenza nei diversi terreni.

Terreno leggero-sabbioso: Kg./Ha 2,5-3,5 - Terreno di medio impasto: Kg/Ha 4-4,5 - Terreno argilloso: Kg/Ha 4,5-5.
Il prodotto si distribuisce con le normali attrezzature per il diserbo impiegando circa 500-600 litri d'acqua/Ha.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con gli antiparassitari in polvere bagnabile e generalmente non è compatibile con le formulazioni emulsionabili.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare che la soluzione erbicida giunga a contatto con colture vicine sensibili al prodotto. Dopo il diserbo lavare ripetutamente tutte le attrezzature impiegate. Il prodotto è tollerato dalla barbabietola, tuttavia non impiegarlo:
— nel periodo che va dalla fuoriuscita delle piantine fino alla formazione delle due prime foglie vere;
— su piantine indebolite da diverse cause.
L'azione residua del prodotto si prolunga fino ad un massimo di 3 mesi. Nel caso che la nascita delle barbabietole non sia soddisfacente è possibile riseminare, previa aratura, mais, patata e barbabietola. Sono sconsigliate le semine o il trapianto di crucifere e pomodoro.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO

Kg.

6311

DATIOCID L

INSETTICIDA AGRICOLO IN FORMULAZIONE LIQUIDA
PER FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

Metidathion puro . . . . . . gr. 19

Coformulanti . . . . . q.b. a gr. 100

Contiene: XILOLO

CLASSE I VELENO

« **ATTENZIONE:** Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente a personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 N. 1255 ».
NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego del prodotto usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO: il DATIOCID L si impiega alla dose di gr. 200-300 per 100 litri di acqua contro i seguenti parassiti:
Frutticoltura: PERI E MELI: contro Carpocapsa, Afidi, Cecidomia, Aspidiotus, Cacoecia rosana, Cemiostoma, Nepticula, Psilla del pero.
PESCO: Cydia, Diaspis pentagona, Aspidiotus.
CILIEGIO: Ragoletis.
VITE: Tignola.
PATATA: Dorifora.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
COMPATIBILITÀ: Il DATIOCID L è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio esclusi quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, calce).
« **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta ».
RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali ».

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti n. 2/A - **CENTO** (Fe) - Tel. 90.62.07
Stabilimento di produzione: RENAZZO (Ferrara) Via IV Novembre

DA NON VENDERSI SFUSO Peso Netto Kg.

Registrazione Ministero della Sanità N. 6311 del 3.4.85

6312

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

Erbicida liquido emulsionabile selettivo per il diserbo della Barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio

Composizione

Fenmedifan puro	g 16
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti (contiene trimetilbenzeni, dimetilformamide, cicloesanone)	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6312 **del** 3.4.85

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Erbicida ad assorbimento fogliare attivo sulle plantule delle seguenti infestanti dicotiledoni: Anagallis arvensis / Atriplex patula / Capsella bursa-pastoris / Centurea cyanus / Chenopodium album / Datura stramonium / Fumaria officinalis / Galinsoga parviflora / Lamium purpureum / Linaria minor / Matricaria sp. / Myosotys arvensis / Papaver sp. / Plantago major / Polygonum aviculare / Polygonum convolvulus / Polygonum lapathifolium / Polygonum persicaria / Raphanus raphanistrum / Senecio vulgaris / Sinapis arvensis / Solanum nigrum / Sonchus oleraceus / Spergula arvensis / Stellaria media / Thlaspi arvense / Urtica urens / Veronica persica / Viola tricolor.

Si osserva un controllo parziale da parte del prodotto su: Amarantus retroflexus / Mercurialis annua.

L'applicazione si effettua in post-emergenza delle barbabietole, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, purché le malerbe non superino lo stadio delle due foglie vere;

Le dosi d'impiego variano da 6 a 8 kg/ha diluiti in 250-400 litri di acqua;

Effettuare il trattamento su piante asciutte e con temperature inferiori a 25 °C. Nelle giornate calde aver cura di eseguire l'intervento nel tardo pomeriggio;

Evitare di trattare colture di bietola danneggiate da insetti o in cattivo stato vegetativo.

I trattamenti precoci sono quelli che danno i migliori risultati, essendo evidente che le infestanti resistono al prodotto man mano che si sviluppano.

Preparazione dell'emulsione

Versare a poco a poco la dose stabilita di NIVAL OE 16 nell'acqua richiesta, agitando accuratamente.

Avvertenze

Assicurarsi che le pompe impiegate per il trattamento non contengano residui di altri erbicidi, specialmente ormonici. Lavare ripetutamente le attrezzature con acqua e soda prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci ecezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto in luogo fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione e contatto cutaneo
(inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenza

Consultare un Centro Antiveleni.

89

6313

III CLASSE

Attenzione manipolare con prudenza

PREFIX SG

Erbicida selettivo, granulare, particolarmente efficace su:

Monocotiledoni:

Agropyrum repens, Alopecurus myosuroides, Avena fatua, Digitaria sanguinalis, Echinocloa crus-galli, Equisetum spp., Lolium spp., Poa annua, Setaria viridis, Sorghum halepense (da seme).

Dicotiledoni:

Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Anthemis cotula, Artemisia vulgaris, Atriplex patulum, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Euphorbia spp., Galeopsis angustifolia, Galium aparine, Galinsoga parviflora, Fumaria officinalis, Lamium purpureum, Matricaria chamomilla, Oxalis cernua, Papaver rhoeas, Polygonum spp., Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Rumex spp., Senecio vulgaris, Sinapis alba, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Taraxacum officinalis.

COMPOSIZIONE IN PESO

dichlobenil, puro . . .	. . g	6,75
coadiuvanti e solventi .	q.b. a g	100,00

PREFIX è un marchio Shell.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es.: interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento: SHELL NEDERLAND CHEMIE B.V. - Rotterdam (Olanda)

Registrazione del Ministero della Sanità N 6313 in data 14.3.85

MODALITA' DI IMPIEGO

1) DISERBO SELETTIVO:

VITE e OLIVO: 80-100 kg/ha.
La dose di impiego deve essere aume
ricoperto da infestanti, in particolare s
vulus arvensis (vilucchio).
L'uso di PREFIX SG è sconsigliato in
il trattamento va effettuato nel periodo
ripresa vegetativa. Nel caso che il diser
sullo stesso terreno e il primo interv
secondo anno si dovrà ridurre il dosa
Il trattamento è sconsigliato su terreni
impiegare il prodotto su terreni in pendi
onde evitare che la pioggia possa trasp
mull in zone più basse.
Non impiegare il prodotto in caso di co

2) Interventi localizzati su Romici:
Per distruggere piante isolate di Romic
porre 2-3 grammi circa di prodotto atto
Si consiglia di non impiegare il prodott
non provocare danni alla giovane veget
evitare che i residui dell'erbicida possan

3) Lotta contro i romici che infestano campi
punta abbondante di un cucchiaino da caf
basali dei romici, preferibilmente all'inizi
devitalizzare completamente una pianta.

4) Diserbo di aree industriali, linee ferro-t
zone archeologiche, piazzali di fabbriche,
sportive, piste di aeroporti, fasce taglia
1000 metri quadrati.

5) Diserbo preventivo di opere idrauliche e
dotto ogni 1000 metri quadrati dopo il t
prima della posa in opera del rivestiment
dalla vegetazione infestante sul rivestime
il terreno ed anche se spessi e monoliti

6) Diserbo delle banchine di strade ed autos
20 kg di prodotto per fasce della larghe

7) Diserbo del fondo dei canali dalle infes
il grado di infestazione, ogni 1000 metri i
buire PREFIX SG sul fondo del canale in as
Al termine dell'applicazione i canali devo
tale periodo non vi è alcun rischio di dil
nel letto del canale.
Nei canali a riempimento periodico si con
di irrigazione sul fondo ancora umido, se

FITOTOSSICITA'

PREFIX SG non agisce per via fogliare, pert.
con gli organi verdi delle piante.

MODO D'IMPIEGO

La formulazione granulare del prodotto ne fa
meccanici.
PREFIX SG può essere impiegato tutto l'anno
L'epoca di impiego consigliabile va dall'inizio
In caso sia necessario impiegare il prodotto i
gimento. Agendo in post-emergenza l'efficacia
l'applicazione. Il trattamento dovrà comunque
umido. Piogge o irrorazione per aspersione f
migliorandone l'efficacia.
L'incorporazione del prodotto ad una profond
o con zappature aumenta l'efficacia e la durat
Dato che i risultati dell'applicazione sono st
granuli, bisogna aver cura di distribuire unifo
Non ripetere il trattamento prima che siano t

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI».

COMPATIBILITA'

Il prodotto deve essere impiegato da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del r
«**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in a
altro uso è pericoloso.
Chi usa il prodotto è responsabile degli event
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione
e per evitare danni alle piante, alle persone ed

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: kg 25

6314

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NIVAL® OE 20

Erbicida liquido emulsionabile selettivo per il diserbo della Barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio

Composizione

Fenmedifan puro	g 20
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti (contiene trimetilbenzeni, dimetilformamide, cicloesanone)	q.b. a g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6314 **del** 3.4.85

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Erbicida ad assorbimento fogliare attivo sulle plantule delle seguenti infestanti dicotiledoni: Anagallis arvensis / Atriplex patula / Capsella bursa-pastoris / Centurea cyanus / Chenopodium album / Datura stramonium / Fumaria officinalis / Galinsoga parviflora / Lamium purpureum / Linaria minor / Matricaria sp. / Myosotys arvensis / Papaver sp. / Plantago major / Polygonum aviculare / Polygonum convolvulus / Polygonum lapathifolium / Polygonum persicaria / Raphanus raphanistrum / Senecio vulgaris / Sinapis arvensis / Solanum nigrum / Sonchus oleraceus / Spergula arvensis / Stellaria media / Thlaspi arvense / Urtica urens / Veronica persica / Viola tricolor.

Si osserva un controllo parziale da parte del prodotto su: Amarantus retroflexus / Mercurialis annua.

L'applicazione si effettua in post-emergenza delle barbabietole, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, purché le malerbe non superino lo stadio delle due foglie vere;

le dosi d'impiego variano da kg 5-6/ha diluiti in 250-400 litri di acqua;

Effettuare il trattamento su piante asciutte e con temperature inferiori a 25 °C. Nelle giornate calde aver cura di eseguire l'intervento nel tardo pomeriggio;

Evitare di trattare colture di bietola danneggiate da insetti o in cattivo stato vegetativo.

I trattamenti precoci sono quelli che danno i migliori risultati, essendo evidente che le infestanti resistono al prodotto man mano che si sviluppano.

Preparazione dell'emulsione

Versare a poco a poco la dose stabilita di NIVAL OE 20 nell'acqua richiesta, agitando accuratamente.

Avvertenze

Assicurarsi che le pompe impiegate per il trattamento non contengano residui di altri erbicidi, specialmente ormonici. Lavare ripetutamente le attrezzature con acqua e soda prima dell'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci ecezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto in luogo fresco.

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione e contatto cutaneo
(inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Avvertenza

Consultare un Centro Antiveleni.

90

6315

DISERBAS

Erbicida liquido emulsionabile

Composizione:

Trifluralin puro	g. 42,27
Coformulanti	q.b. a g. 100

CONTIENE XILOLO E CICLOESANONE

III CLASSE

ATTENZIONE:
manipolare
con prudenza

A BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Officina di produzione:
VISPLANT-CHIMIREN S.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 6315 del 10.4.85
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il DISERBAS è un diserbante selettivo che s'impiega in pre-emergenza delle infestanti. Agisce principalmente sui semi delle malerbe bloccandone la germinazione. Deve essere incorporato nel terreno entro quattro ore dall'impiego escluso quando viene applicato al grano, orzo e segale. Controlla diverse Monocotiledoni e Dicotiledoni annuali quali.
Erba codina, Spica Venti, Forasacco, Sanguinella, Giavone, Gramigna, Loglio, Gramigna delle vie, Setaria, Sorghetta da seme, Amaranto, Atriplice, Farinaccio, Gallinaccia, Aparine, Lamio, Papavero, Correggiola, Falso convolvolo, Erba porcellana, Centocchio, Tribolo, Ortica piccola e Veronica.

Grano, Orzo e Segale (a semina autunnale): lt. 1,2-2/Ha senza incorporamento subito dopo la semina ma prima dell'emergenza delle infestanti. Inoltre le Dicotiledoni annuali non devono avere raggiunto lo stadio delle quattro foglie vere. I semi devono essere totalmente ricoperti dal terreno.

Orticole trapiantate (Pomodoro, Peperone, Indivia, Lattuga, Scarola, Radicchio, Carota, Finocchio, Sedano, Cavolo, Cavolfiore, Cipolla) lt. 1/Ha terreni leggeri; lt. 1,5/Ha medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti applicando ed interrando il DISERBAS da 3-4 settimane a 1 giorno prima del trapianto.

Orticole seminate (Radicchio, Fagiolo, Fagiolino, Carota, Finocchio, Sedano, Prezzemolo, Aglio, Arachide, Cavolo, Cavolfiore) lt. 1/Ha terreni leggeri; lt. 1,5/Ha medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti applicando ed interrando il DISERBAS da 3-4 settimane ad 1 giorno prima della semina.

Pisello: lt. 1-2/Ha per tutti i terreni da sei settimane ad 1 giorno prima della semina (non incorporando). Nel caso si voglia trattare durante l'autunno inverno che precede la semina trattare ed incorporare alla dose di: lt. 1,5/Ha.

Pomodoro da semina: lt. 1/Ha terreni leggeri; lt. 1,5/Ha medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti interrato alla base delle piantine nel periodo del diradamento.

Gladiolo: lt. 1/Ha terreni leggeri; lt. 1,5/Ha medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti interrato da 6 settimane ad 1 giorno dalla piantagione dei bulbi.

Barbabietola da zucchero (post-emergenza della coltura): lt. 1,2/Ha terreni leggeri e medio impasto; lt. 1,5/Ha nei terreni pesanti interrato nelle interfile subito dopo il trattamento. Si applica su tu' a la superficie con la bietola allo stadio delle 4-6 foglie vere: nel caso si effettui il diradamento una settimana dopo.

Carciofo: lt. 1/Ha terreni leggeri; lt. 1,5/Ha medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti. S'impiega prima dell'impianto dei carducci o subito dopo la messa a dimora degl'ovuli ed immediatamente interrato. Per gli impianti in produzione trattare lungo le interfile, all'inizio del ricaccio, subito incorporare.

Patata: lt. 1/Ha terreni leggeri; lt. 1,5/Ha medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti. Subito dopo l'applicazione interrare senza danneggiare i tuberi.

Melone, Anguria e Cetriolo: lt. 1/Ha terreni leggeri; lt. 1,5/Ha terreni medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti. Eseguire il trattamento al momento del diradamento, con le piante alla differenzazione della 3-4 foglia seguito da un incorporamento immediato.

Asparago: lt. 1/Ha terreni leggeri; lt. 1,5/Ha medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti, applicando in primavera, con interramento, prima della fuoriuscita dei turioni.

Fragola: lt. 1/Ha terreni leggeri; lt. 1,5/Ha medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti. Trattare ed interrare lungo le file in primavera.

Menta: lt. 1/Ha terreni leggeri; lt 1,5/Ha medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti. S'impiega subito prima dell'impianto o del ricaccio con incorporamento.

Erba medica (dopo l'ultimo sfalcio del primo anno): lt. 1,5/Ha terreni leggeri e lt. 2//Ha nei terreni di medio impasto e pesanti. Si impiega durante il riposo vegetativo del medicaio. Impiegare attrezzi per l'incorporamento che danneggino il meno possibile l'impianto.

Arancio, Limone, Melanzane, Bergamotto, Cedro, Pero, Melo, Pesco, Susino, Ciliegio, Albicocco, Mandorlo, Vite. All'impianto: lt. 1/Ha terreni leggeri; lt. 1,5/Ha medio impasto e lt. 2/Ha nei terreni pesanti. Dopo l'applicazione interrare immediatamente. **Impianti già radicati:** lt. 2-4/Ha applicare e interrare con il terreno privo di infestanti.

Campi da Golf: lt. 3-5/Ha in primavera quando le Monocotiledoni annuali iniziano a germinare.
Non interrare ma irrigare abbondantemente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità. Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ISTRUZIONI SPECIALI

Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio. Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all'applicazione del prodotto. Non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica in quanto perde di efficacia.

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO

Kg.

6316

FENADIN (R) S

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa del Melo e del Pero.

Si impiega in trattamenti liquidi contro la Ticchiolatura e Oidio del Melo e contro la Ticchiolatura del Pero.

COMPOSIZIONE		
– Fenarimol puro	g	2
– Dodina pura	g	50
– Coadiuvanti ed Inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM–Milano

SIPCAM–Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 6316 del 10.4.85 Ministero della Sanità

Natura del rischio : sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali : conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarree. Eczemi resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro) e digitale.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega contro le crittogame e alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale.

MELO

– **contro Ticchiolatura e Oidio** : usare una dose di **200-250 g** in trattamenti distanziati ad opportuni intervalli pre-fiorali e post-fiorali.

PERO

– **contro Ticchiolatura** : usare una dose di **150-200 g**.

Preparazione della poltiglia : stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità : il prodotto non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina, non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività, evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità : per la Golden Delicious può essere fitotossico a dose superiore allo 0,05 %.

Rischi di nocività : il prodotto è tossico per le api, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Avvertenze: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su Melo e 14 giorni su Pero.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

6317

6317

SANDOFAN® F12-60

Anticrittogamico che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite, del pomodoro e della patata.

Composizione

gr. 12,5 di oxadixil puro
gr. 60 di Folpet puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

- Sintomatologia
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale:
  flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
  Il Folpet ha la seguente sintomatologia:
  azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
  Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
  Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.

In caso di ingestione

Far vomitare il paziente, ma mai se è in stato di incoscienza; quando non si verifica il vomito ed il paziente non è in stato di incoscienza è raccomandata la lavanda gastrica con magnesia usta (gr.30 per litro d'acqua); digitale.

In caso di contaminazione degli occhi

Lavare gli occhi con acqua corrente per circa 15 minuti.
Se necessario somministrare pomata oftalmica anestetica o collirio.

In caso di inalazione

Stendere il paziente all'aria aperta e coprirlo bene tenendolo al caldo.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	0,2% = gr. 200
Pomodoro	Peronospora	0,2% = gr. 200
Patata	Peronospora	0,2% = gr. 200

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza, permettono al SANDOFAN F 12-60 di controllare la Peronospora intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.

In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm. e la pre-chiusura del grappolo.
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.

Su pomodoro e patata intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. SANDOFAN F 12-60 per la presenza del folpet è attivo anche contro le malattie secondarie come Alternaria, Septoria e Botrytis.
Nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2 kg. per ettaro.

Da non impiegare sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari Sandoz a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamento con questi ultimi, distanziare l'intervento con SANDOFAN F 12-60 di 2–3 settimane. Il formulato non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività

E' tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta per la vite.
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta per pomodori e patate.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.p.A. - MILANO

Dipartimento Agro

Officina di produzione:
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6317 del 3.4.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO — Contenuto netto kg.

6318

SANDOFAN® M

Anticrittogamico che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro

Composizione

gr. 10 di oxadixil puro
gr. 56 di mancozeb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- **Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;**
- **conservare la confezione ben chiusa;**
- **non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;**
- **non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;**
- **non operare contro vento;**
- **evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;**
- **è obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto;**
- **dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;**
- **una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;**
- **conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;**
- **in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;**
- **durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).**

Informazioni per il medico

- **Sintomatologia**
  L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
  La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.

  Il mancozeb ha la seguente sintomatologia:
  l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite.
  Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

- **Terapia**
  Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
  Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini.
  Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

- **Controindicazioni**: alcool, olii e grassi.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	0,2 – 0,25% - gr. 200-250
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	0,2 – 0,25% - gr. 200-250

La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza, permettono al SANDOFAN M di controllare la Peronospora, della vite e del pomodoro, intervenendo ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento delle piogge.

In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo. Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame.

Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2–2,5 kg. per ettaro.

Non impiegare sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non impiegare in serra.

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità

SANDOFAN M è compatibile con tutti gli antiparassitari Sandoz a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.

Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio SANDOFAN M + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di SANDOFAN M da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del SANDOFAN M con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di SANDOFAN M, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Su pomodoro è bene evitare trattamenti con SANDOFAN M miscelato a concimi fogliari contenenti boro.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.;

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.P.A. - MILANO

Dipartimento Agro
Officina di produzione
PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 6318 del 3.4.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg.**

6319

VITIRIL

Fungicida organico sistemico e di contatto per trattamenti liquidi contro peronospora della vite e del pomodoro

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Vitiril contengono:
g 10 di oxadixil puro
g 56 di propineb puro
disperdenti e coadiuvanti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomatologia: l'unica sintomatologia nota per l'oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori. La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
Il Propineb ha la seguente sintomatologia:
l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite ecc.).
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii e grassi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite: 0,20-0,25% (200-250 g per 100 lt d'acqua).
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): 0,20% (200 g per 100 lt d'acqua).
Su **vite e pomodoro** i trattamenti si effettuano ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento stagionale. Sulla **vite** si consigliano non più di quattro trattamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo; successivamente proseguire intervenendo con prodotti tradizionali cuproorganici o cuprici.
N.B. - Usare la dose più elevata quando le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura sono particolarmente favorevoli. Usare sempre un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione impiegando 2-2,5 kg di formulato per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

— Non impiegare su vivai di vite
— Non impiegare in serra
— Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: il Vitiril è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; sconsigliabile l'uso in miscela con antiparassitari a reazione alcalina. Per la miscela con altro formulato, stemperare prima il Vitiril in poca acqua e in altro recipiente l'altro formulato; poi versare l'altro formulato così preparato nel recipiente contenente Vitiril, sempre agitando e portare a volume con acqua. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 6319 del 3.4.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6320

ISTRUZIONI PER L'USO DEL PRODOTTO:
Campi d'impiego, malattie combattute e dosi d'impiego:

Vite (peronospora)	gr. 200-250/hl
Pomodoro (peronospora)	gr. 200-250/hl
Patata (peronospora)	gr. 200-250/hl

Epoche d'impiego:
La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza, permettono all'OXIFOL di controllare la peronospora intervenendo ogni 14 giorni indipendentemente dall'andamento delle piogge.
In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo
Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame. **Da non impiegare sui vivai di vite.**
Su pomodoro e patate intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. L'OXIFOL per la presenza del folpet è attivo anche contro le malattie secondarie come Alternaria e Septoria. Nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.
Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali siano particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia.
Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati e un consumo di formulato di 2-2,5 kg. per ettaro.
Preparazione della poltiglia:
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: il formulato è compatibile con tutti gli antiparassitari Verchim Asterias a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con prodotti oleosi; in caso di trattamenti con questi ultimi, distanziare l'intervento con OXIFOL di 2-3 settimane.
L'OXIFOL non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e con polisolfuri.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: è tossico per i pesci e gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta per la vite. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti. Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta per pomodori e patate.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

OXIFOL®

ANTICRITTOGAMICO CHE AGISCE PER CONTATTO E PER VIA SISTEMICA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA

Composizione:

OXADIXIL puro	gr. 10
FOLPET puro	gr. 35
Disperdenti e coadiuvanti q.b. a	gr. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA (Bologna)
Tel. 79.94.61/2
Telex 511046

Registrazione N. 6320 del 3.4.85 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone • E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomatologia: *l'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori. La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.*
Il Folpet ha la seguente sintomatologia: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.
In caso di ingestione: *far vomitare il paziente, ma mai se è in stato di incoscienza; quando non si verifica il vomito ed il paziente non è in stato d'incoscienza è raccomandata la lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua); digitale.*
In caso di contaminazione degli occhi: *lavare gli occhi con acqua corrente per circa 15 minuti. Se necessario somministrare pomata oftalmica anestetica o collirio.*
In caso di inalazione: *Stendere il paziente all'aria aperta e coprirlo bene tenendolo al caldo.*

VERCHIM ASTERIAS

DA NON VENDERSI SFUSO
Kg.

6321

STIMOLANTE 66f®
Stimolante di germinazione o di accrescimento
l. gobbi s.r.l.
Genova - Via B. Bosco, 57/3
COMPOSIZIONE
NAA puro . . . gr. 0,01
Soluzione equilibrata di microelementi gr. 0,11
Solvente stabilizzante e coformulanti . q.b a gr. 100
CLASSE III ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA
— Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle
Norme precauzionali
Informazioni mediche
— In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
MODALITA' DI IMPIEGO
Lo stimolante 66f® può avere i seguenti diversi impieghi
SEMENZAI
Per anticipare la germinazione dei semi ed ottenere una germinazione completa immergere i semi per 12-24 ore in una soluzione dello stimolante 66f® alla dose di 1 : 5000 (1 cc. di stimolante 66f® in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria)
Continuare il trattamento per stimolare la crescita irrorando le prime foglie della piantina con la stessa soluzione per 3-4 volte ad intervalli settimanali
®Prodotto e Marchio Registrato della Eduard Gerlach GmbH - Germania Occ.
STIMOLANTE 66f
Stimolante di germinazione e di accrescimento
66f ®
l. gobbi s.r.l.
Genova - Via B. Bosco, 57/3
TRAPIANTO DI
TALEE ERBACEE, TALEE LEGNOSE, ARBUSTIVE E DI VITE
Immergere l'apparato radicale della piantina da trapiantare e irrorare subito dopo la messa a dimora le foglie con una soluzione dello stimolante 66f® (1 cc. in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria). Ripetere il trattamento per 4-5 volte ad intervalli settimanali. Si evita in questo modo la crisi tipica del trapianto.
PER ANTICIPARE LA CRESCITA DI
PIANTE FRUTTIFERE (POMACEE), VITI, PIANTE FORESTALI, PIANTE IN VIVAIO
Irrorare abbondantemente le foglie con la soluzione ottenuta miscelando lo stimolante 66f® nella dose di 1 : 5000 (20 cc. in 100 litri di acqua o soluzione antiparassitaria). I trattamenti vanno effettuati durante il primo periodo di vegetazione e ripetuti almeno 4-5 volte a distanza di 10-15 giorni
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Diluire lo stimolante 66f® nella dose di 1 : 5000 (1 cc. in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria) ed irrorare una o due volte alla settimana per tutto il periodo della crescita
Da non applicare con mezzi aerei.
Lo stimolante 66f® è compatibile con gli antiparassitari.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Officina di produzione
Eduard Gerlach - GmbH - Lübbecke - Germania Occ
Officina di confezionamento
L. Gobbi S.r.l. - Via Murtola, 53 r. - Genova
Registrazione Ministero Sanità N.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto netto all'origine: cc.

6322

COMPOSIZIONE

NAA puro	**gr. 7,50**
Agente bagnante	**gr. 3,50**
Diluente stabilizzante . . .	**q.b. a gr. 100**

CLASSE III ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il dosaggio delle concentrazioni va regolato in base alla temperatura della stagione, usando una concentrazione più debole per le qualità che vengono irrorate in una stagione con temperatura più mite ed una concentrazione più forte per qualità che vengono irrorate in una stagione con temperatura più fredda.

CON TEMPERATURE INFERIORI AI 10° C.
OBSTHORMON 24 a® NON PUO' AGIRE

Le dosi sotto indicate si riferiscono ad una temperatura ambientale di circa 20° C. Per ogni aumento di 5° C. occorre ridurre la dose dello 0,01%.

MELE precocissime: irrorare 5 giorni prima del raccolto alla dose dello 0,015%, cioè **15 cc.** in 100 litri di acqua.

MELE precoci: irrorare 10-18 giorni prima del raccolto alla dose da 0,025 a 0,030%, cioè da **25** a **30 cc.** per 100 litri di acqua.

® Marchio Registrato
dalla Eduard Gerlach GmbH - Germania Occ.

Obsthormon 24a®

Impedisce la caduta prematura delle mele e delle pere

***l. gobbi** s.r.l.*

Genova - Via B. Bosco, 57/3

MELE normali: irrorare 10-20 giorni prima del raccolto alla dose da 0,030 a 0,050%, cioè da **30** a **50 cc.** per 100 litri di acqua.

MELE tardive: 12-20 giorni prima del raccolto alla dose da 0,050 a 0,075%, cioè da **50** a **75 cc.** per 100 litri di acqua.

PERE: 10-14 giorni prima del raccolto alla dose dello 0,050%, cioè **50 cc.** per 100 litri di acqua.

— Per certe qualità di mele e pere, come quelle con buccia liscia, grassa, spessa, sarà opportuno ripetere l'irrorazione, nel caso che si verifichi ancora la caduta dei frutti, rispettando la carenza di 5 giorni.

— Irrorare con apparecchi ad imboccatura sottile, procurando di bagnare entrambe le pagine delle foglie, ma in modo di non farle gocciolare.

— Tra il momento dell'applicazione ed un'eventuale precipitazione atmosferica, devono intercorrere almeno cinque ore perché si mantenga l'efficacia del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non miscelare con antiparassitari.

Sospendere i trattamenti almeno 5 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Officina di produzione:
Eduard Gerlach GmbH - Germania Occ. Lübbecke

Officina di confezionamento:
L. Gobbi S.r.l. - Via Murtola, 55 r. - Genova

Registrazione Ministero Sanità N. 6322 del 3.4.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: cc.

6323

Caratteristiche del prodotto

Il DI-TRAPEX® è un liquido giallastro i cui componenti si diffondono nel terreno sotto forma di gas, operando una efficace eliminazione di tutti quei fattori biotici che possono danneggiare le produzioni agricole.

Il trattamento è raccomandabile in tutti i casi e soprattutto in quelle zone ad agricoltura intensiva ove si registra una maggiore incidenza delle malattie, favorita dalla stretta successione colturale e dalle tecniche di coltivazione.

L'applicazione va fatta su terreno nudo, successivamente destinato alla coltivazione, e nei reimpianti di vite, pesco e agrumi.

DOSI DI IMPIEGO

Per la disinfezione di superfici destinate a coltura:

— Contro Nematodi liberi e galligeni, insetti del terreno	:	20-30 cc/m².
— Contro Nematodi formanti cisti (Heterodera)	:	40 cc/m².
— Contro Funghi parassiti ed erbe infestanti	:	30-40 cc/m².

Per la disinfezione dei terricciati:

— Impiegare 150-180 cc/m³ di terreno.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il DI-TRAPEX® si impiega senza diluizione per mezzo di appositi iniettori (pali iniettori e fumigatori a traino) o per spargimento entro solchi.

Per una corretta utilizzazione del prodotto leggere attentamente le istruzioni riportate nel volantino unito alla confezione.

AVVERTENZA: chi utilizza il prodotto deve provvedere in modo idoneo a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

Da non impiegare con mezzi aerei.

E' vietato impiegare il prodotto in serra e in ambienti chiusi.

Compatibilità: il prodotto non richiede associazioni con altri antiparassitari e, quindi, va usato da solo.

Fitotossicità

Poiché il gas prodotto dal DI-TRAPEX® è fitotossico per le piante coltivate, il trattamento deve essere effettuato su terreno privo di vegetazione, evitando che nelle vicinanze ci siano piante sensibili come pesco, vite, pioppo in vegetazione.

Rischi di nocività

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Tempo di attesa prima della semina o del trapianto: 40 giorni.

Una settimana prima della semina o del trapianto è consigliabile arieggiare il terreno operando una leggera lavorazione.

« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO l. 10

DI-TRAPEX®

Fumigante del terreno ad azione nematocida, fungicida, insetticida ed erbicida.

Composizione su 100 g.:

— Metilisotiocianato puro	g. 20,0
— 1,3 Dicloropropene puro	g. 72,9
— Derivati del ciclo di lavorazione	q.b. a 100

CLASSE II

NOCIVO

LIQUIDO INFIAMMABILE

SCHERING SpA
Divisione Agricoltura
20131 MILANO - VIA MANCINELLI, 7/11

Officina di Nova Milanese

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6323 del 3.4.85

Natura del rischio

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;*
- *Conservare la confezione ben chiusa;*
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;*
- *Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;*
- *Evitare di respirarne i vapori;*
- *Non operare contro vento;*
- *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;*
- *Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (v. avvertenze specifiche);*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*

Avvertenze specifiche

- *Il DI-TRAPEX® è infiammabile: i recipienti vanno tenuti ben chiusi, lontani dalle fonti di accensione (fuoco, scintille, sigarette accese);*
- *Conservare inoltre i recipienti in luogo fresco ed asciutto, protetti dal calore solare diretto;*
- *Non utilizzare recipienti di alluminio per il travaso;*
- *Dopo l'impiego lavare abbondantemente i recipienti usati, con nafta o petrolio o appositi solventi e successivamente con acqua;*
- *I contenitori vuoti non devono essere sigillati e vanno posti all'aperto senza tappo, con l'apertura rivolta verso terra per eliminare totalmente i residui di prodotto;*
- *I contenitori vuoti non devono essere tagliati o saldati, prima che siano stati adeguatamente lavati, in quanto possono contenere ancora piccole quantità o tracce di prodotto;*
- *Durante le applicazioni e i travasi portare maschera ed occhiali protettivi (ad es. tipo AUER 3 S con filtro 2730 A). Nel caso di utilizzo in ambienti scarsamente ventilati caricare l'irroratrice all'aperto;*
- *In caso di contatto fortuito con la pelle asciugarsi subito con uno straccio asciutto; solo successivamente lavarsi abbondantemente con acqua e sapone;*
- *I fusti vuoti possono essere usati, previo riempimento con terra, come vasi di fiori per ornamento di aie, giardini, cortili di campagna o per usi diversi. Se non si prevede un utilizzo pratico, depositarli presso una discarica autorizzata soltanto dopo averli profondamente deformati per evitare un loro eventuale ricupero.*

Informazioni per il medico

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca paralisi - tempo di latenza: anche parecchie ore.

Sintomi di intossicazione: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione e della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.

Dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero da epatite tossica.

Dispnea, tosse, congestione e edema polmonare.

Congiuntivite, irritazione cutanea, eritemi ed edemi localizzati.

Possibili lesioni renali, coma uremico.

Consigli terapeutici

Terapia sintomatica: asciugare e lavare abbondantemente - lavaggio degli occhi con bicarbonato di sodio al 5% e trattamento con idrocortisone - combattere l'acidosi con fleboclisi saline e glucosate - dieta a base di carboidrati - impiego di vasocostrittori.

In caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua - somministrazione eventuale di idrossido di alluminio - somministrazione di carbone medicinale - purganti salini - vitamina K.

In caso di inalazione: aminofillina 250 mg per via rettale o endovena - eventuali inalazioni di adrenalina o isoprenalina in soluzione all'1% - ossigenoterapia.

Controindicazioni: *non somministrare bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, diuretici e sostanze lipidiche come latte e olio. Nei casi gravi o sospetti ricovero in centro di rianimazione.*

Avvertenza

Consultare un centro antiveleni.

6324

Caratteristiche generali

Il PROMALIN ® è un fitoregolatore che trova interessanti campi di applicazione su alcune cultivar di melo. Infatti in determinate situazioni ambientali i frutti delle mele appartenenti al gruppo delle Delicious rosse e delle Golden Delicious, sia normali che Spur, tendono ad assumere una forma tendenzialmente schiacciata: il PROMALIN ®, somministrato con la tecnica sottoindicata, provoca una modificazione della forma (allungamento) nel senso previsto dagli standard varietali delle zone più vocate (collina-montagna) per la produzione di queste cultivar.

Epoca di applicazione

Il momento ottimale per l'applicazione è compreso fra la piena fioritura (80% di fiori aperti) e la caduta dei petali.
Nell'ambito di questo periodo è da preferire il trattamento precoce.

Dosi e tecnica di impiego

— La dose di PROMALIN ® è di 70-100 cc per 100 litri di acqua.
Le dosi maggiori sono indicate in modo particolare per i trattamenti sulla Golden D.
Aggiungere sempre 100 cc/hl di un bagnante non ionico, come il Tensol, avendo cura di metterlo prima del PROMALIN ®.
— Mettere la dose stabilita di PROMALIN ® in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume richiesto.
— Tenere la soluzione così preparata in costante agitazione anche durante la fase di distribuzione (impiegare tale soluzione entro 24 ore dalla sua preparazione).
— Per irrorazione impiegare un getto finemente nebulizzato e bagnare uniformemente la massa fiorale, senza però eccedere in modo da non arrivare allo « sgocciolamento ».
— La quantità totale di soluzione per ettaro dipenderà dallo sviluppo delle piante e dal tipo di allevamento (per es. 14/17 hl per ettaro).
— Trattare solo quando è prevedibile che non debba piovere per un periodo di almeno 4-6 ore dopo l'applicazione.
— Dovendo applicare il PROMALIN ® dopo una pioggia, attendere che la vegetazione si sia asciugata.
— Trattare preferibilmente nelle ore del tardo pomeriggio.

Avvertenze e note

— Su piante con notevole scalarità di fioritura è preferibile impiegare il PROMALIN ® con la tecnica degli interventi frazionati consistenti nel trattare con una dose ridotta di PROMALIN ®, ad es. 50-60 cc/hl, e ripetendo il trattamento 7-10 giorni dopo.
— Non trattare se si prevedono temperature inferiori a 7 °C o superiori a 32 °C.
— Il PROMALIN ® può essere applicato anche su impianti giovani non ancora in produzione, comprese le piante di melo in vivaio, per stimolare l'apertura delle gemme e l'emissione di rami anticipati, migliorare l'angolatura dei rami e per accelerare l'entrata in produzione delle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il PROMALIN ® è compatibile con i comuni bagnati, concimi fogliari, ALAR, zolfo bagnabile ed altri fungicidi comunemente usati in frutticoltura. Durante la preparazione delle miscele è opportuno aggiungere il PROMALIN ® alla dose richiesta, per ultimo. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto l 1

Promalin®

Regolatore di crescita

Composizione su g 100:

— Gibberelline (isomeri A_4 - A_7) pure	g 1,8
— 6-Benziladenina pura	g 1,8
Sostanze Solventi	q.b. a 100

« Contiene alcool tetraidrofurfurilico »

CLASSE III

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SCHERING SpA
Divisione Agricoltura

20131 MILANO - Via Mancinelli, 7/11

® Marchio registrato della Abbott Lab.
North Chicago, Illinois, U.S.A.

Officina di Nova Milanese

Registrazione N. 6324 del 3.4.85
del Ministero della Sanità

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Il contatto con gli occhi può causare irritazione.

Norme precauzionali

— *Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.*
— *Conservare la confezione ben chiusa.*
— *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
— *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
— *Non operare contro vento.*
— *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.*
— *Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*
— *In caso di contatto accidentale con gli occhi lavarsi immediatamente con abbondante acqua.*
— *Per maggior sicurezza mettere occhiali protettivi durante la preparazione e l'impiego del prodotto.*

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

6325

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

LEFFEL

Erbicida - Arbusticida
Emulsione

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 44,4 di Triclopyr puro (come estere butossiglicolico)
Coformulanti quanto basta a 100

Reg. n. 6325 del 18.4.85 del Ministero della sanità

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

E' un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e radicale per il controllo di infestanti erbacee a foglia larga, arbusti ed essenze legnose

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Riso

Impiegare alla dose di lt. 1,5 per ettaro da distribuire con 400-500 litri di acqua per combattere: Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Heteranthera reniformis e limosa. Ha pure una certa azione contro Cyperus difformis.

Per completare l'azione se ne consiglia la miscela con altri diserbanti contenenti MCPA e Propanile.

Il trattamento può essere effettuato dall'inizio della fase di accestimento del riso fino allo stadio di botticella. E' comunque consigliabile trattare precocemente (accestimento) al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe.

Al momento del trattamento è necessario abbassare il livello dell'acqua a 2-3 cm. per scoprire adeguatamente le infestanti da controllare. L'acqua potrà essere nuovamente immessa nella camera dopo 24-48 ore.

Aree forestali

Data la sua selettività verso le piante dei generi Picea, Pinus e Abies, il prodotto può essere impiegato per eliminare la vegetazione spontanea indesiderata prima dell'impianto delle essenze forestali suddette.

Impiegare il prodotto alla dose di lit 2,5-4,5 per ettaro da distribuire con almeno 1000 litri di acqua

E' consigliabile l'impiego di un bagnante

Decespugliamento, diserbo aree incolte

Impiegare il prodotto alle dosi di 250-750 cc/hl di acqua avendo cura di bagnare uniformemente tutta la pianta fino a sgocciolamento. Nel caso di essenze resistenti si consiglia di irrorare anche il terreno alla base del ceppo. I migliori risultati si ottengono generalmente in primavera su vegetazione in attiva crescita. Qualora si renda necessario un secondo intervento questo potrà essere effettuato durante la ripresa vegetativa in autunno

Il prodotto controlla numerose specie quali: Acer circinatum, Acer Macrophyllum, Adenostoma fasciculatum, Alnus spp., Betulla pubescens, Betulla verrucosa, Carya spp., Cercis canadensis, Cornus florida, Crataegus spp., Diospyros virgiliana, Fraxinus spp., Holodiscus discolor, Liquidambar styriciflora, Lonicera spp., Lyriodendron tulipifera, Morus spp., Nyssa sylvatica, Populus spp., Prunus spp., Prunus padus, Pseudotsuga menziessii, Quercus spp., Quercus coccinea, Quercus maxima, Quercus nigra, Quercus phellas, Quercus prinus, Quercus rubra, Quercus stellata, Rhamnus catharticus, Rhamnus purshiana, Robinia pseudoacacia, Rosa spp., Rubus fructicosa, Rubus idaeus, Rubus parviflorus, Rubus spectabilis, Salix spp., Sambucus spp., Sassafras albidum, Sorbus aucuparia, Tsuga heterophylla, Ulmus alata

Il prodotto può essere utilizzato anche per impieghi su ceppaia recisa

Applicare il prodotto non diluito o diluito in acqua (1:1 fino a 1:10) in autunno sulla superficie appena tagliata della ceppaia per mezzo di spennellature

Per il diserbo aree incolte impiegare il prodotto alla dose di lt 2,5-4,5 per ettaro distribuito con 1000-4000 litri di acqua

Contro Equisetum e Ortica si consiglia di effettuare trattamenti localizzati alla dose di litri 0,5 per ettolitro

AVVERTENZA

Non impiantare semenzai di conifere su terreni trattati con il prodotto prima che siano trascorsi 6 mesi dal trattamento

Nell'applicare il prodotto evitare che la nube irrorante venga a contatto con colture sensibili

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto, qualora sia necessario, può essere miscelato con altri diserbanti

Avvertenza:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stab. di Produzione: Dow Chemical Co. KING'S LINN-INGHILTERRA
Stab. di Confez.to: RAVIT S.p.A. - Paganica (Aq)

6326

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

EVADE

Erbicida - Arbusticida
Emulsione

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 44,4 di Triclopyr puro (come estere butossiglicolico)
Coformulanti quanto basta a 100

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

E' un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e radicale per il controllo di infestanti erbacee a foglia larga, arbusti ed essenze legnose.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Riso

Impiegare alla dose di lt. 1,5 per ettaro da distribuire con 400-500 litri di acqua per combattere: Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Heteranthera reniformis e limosa. Ha pure una certa azione contro Cyperus diffomis. Per completare l'azione se ne consiglia la miscela con altri diserbanti contenenti MCPA e Propanile.

Il trattamento può essere effettuato dall'inizio della fase di accestimento del riso fino allo stadio di botticella. E' comunque consigliabile trattare precocemente (accestimento) al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe.

Al momento del trattamento è necessario abbassare il livello dell'acqua a 2-3 cm. per scoprire adeguatamente le infestanti da controllare. L'acqua potrà essere nuovamente immessa nella camera dopo 24-48 ore.

Aree forestali

Data la sua selettività verso le piante dei generi Picea, Pinus e Abies, il prodotto può essere impiegato per eliminare la vegetazione spontanea indesiderata prima dell'impianto delle essenze forestali suddette.

Impiegare il prodotto alla dose di lt. 2,5-4,5 per ettaro da distribuire con almeno 1000 litri di acqua.

E' consigliabile l'impiego di un bagnante.

Decespugliamento, diserbo aree incolte

Impiegare il prodotto alle dosi di 250-750 cc/hl di acqua avendo cura di bagnare uniformemente tutta la pianta fino a sgocciolamento. Nel caso di essenze resistenti si consiglia di irrorare anche il terreno alla base del ceppo. I migliori risultati si ottengono generalmente in primavera su vegetazione in attiva crescita. Qualora si renda necessario un secondo intervento questo potrà essere effettuato durante la ripresa vegetativa in autunno.

Il prodotto controlla numerose specie quali: Acer circinatum, Acer Macrophyllum, Adenostoma fasciculatum, Alnus spp., Betulla pubescens, Betulla verrucosa, Carya spp., Cercis canadensis, Cornus florida, Crataegus spp., Diospyros virgiliana, Fraxinus spp., Holodiscus discolor, Liquidambar styriciflora, Lonicera spp., Lyriodendron tulipifera, Morus spp., Nyssa sylvatica, Populus spp., Prunus spp., Prunus padus, Pseudotsuga menziesaii, Quercus spp., Quercus coccinea, Quercus maxima, Quercus nigra, Quercus phellas, Quercus prinus, Quercus rubra, Quercus stellata, Rhamnus catharticus, Rhamnus purshiana, Robinia pseudoacacia, Rosa spp., Rubus fructicosa, Rubus idaeus, Rubus parviflorus, Rubus spectabilis, Salix spp., Sambucus spp., Sassafras albidum, Sorbus aucuparia, Tsuga heterophylla, Ulmus alata.

Il prodotto può essere utilizzato anche per impieghi su ceppaia recisa.

Applicare il prodotto non diluito o diluito in acqua (1:1 fino a 1:10) in autunno sulla superficie appena tagliata della ceppaia per mezzo di spennellature.

Per il diserbo aree incolte impiegare il prodotto alla dose di lt. 2,5-4,5 per ettaro distribuito con 1000-4000 litri di acqua.

Contro Equisetum e Ortica si consiglia di effettuare trattamenti localizzati alla dose di litri 0,5 per ettolitro.

AVVERTENZA

Non impiantare semenzai di conifere su terreni trattati con il prodotto prima che siano trascorsi 6 mesi dal trattamento.

Nell'applicare il prodotto evitare che la nube irrorante venga a contatto con colture sensibili.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto, qualora sia necessario, può essere miscelato con altri diserbanti.

Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Lt.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stab. di Produzione: Dow Chemical Co.
KING'S LINN-INGHILTERRA
Stab. di Confez.to: RAVIT S.p.A. - Paganica (Aq)

Ravit

Reg. n. 6326 **del Ministero della Sanità del** 18.4.85
2/84

6327

SOLARAM F

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro la Peronospora della Vite, del Pomodoro e della Patata.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Oxadixil puro	g. 10
Folpet puro	g. 35
Coformulanti q.b. a	g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - MILANO

Officina di produzione:

SANDOZ S.p.A. - MILANO
Stabilimento di Palazzolo Milanese

Reg. Ministero Sanità N.° 6327 **del** 13.4.85

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomatologia

L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
Il Folpet ha la seguente sintomatologia:
azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

In caso di ingestione

Far vomitare il paziente, ma mai se è in stato di incoscienza; quando non si verifica il vomito ed il paziente non è in stato d'incoscienza è raccomandata la lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua); digitale.

In caso di contaminazione degli occhi

Lavare gli occhi con acqua corrente per circa 15 minuti. Se necessario somministrare pomate oftalmica anestetica o collirio.

In caso di inalazione

Stendere il paziente all'aria aperta e coprirlo bene tenendolo al caldo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLARAM F è un antiperonosporico che deriva dell'associazione di due sostanze attive ad azione combinata; l'una, l'oxadixil che agisce per via sistemica ed ha azione specifica preventiva e curativa, di lunga durata; l'altra, il folpet che agisce per contatto ed ha azione polivalente.

SOLARAM F consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporici indipendenti dall'andamento delle piogge e dello sviluppo della superficie fogliare.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora della vite: 200-250 g. per 100 litri d'acqua (2-2,5 kg. per ettaro).

Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino al pre-chiusura del grappolo.

Si consiglia di non effettuare più di quattro trattamenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.

Non impiegare su vivai di vite.

Peronospora del pomodoro e della patata: 200-250 g/100 litri d'acqua.

Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Per i trattamenti successivi adottare un intervallo di 14 giorni.

SOLARAM F è attivo anche contro Alternaria e Septoria.

Nei trattameni di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: E' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Non è miscibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

Avvertenza: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: E' tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta per le uve da tavola. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Per pomodoro e patata sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

SOLARAM CF

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro la Peronospora della Vite, del Pomodoro e della Patata.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Oxadixil puro	g. 10
Folpet puro	g. 40
Rame metallo (da ossicloruro tetraramico)	g. 15
Coformulanti q.b. a	g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - MILANO

Officina di produzione:

SANDOZ S.p.A. - MILANO
Stabilimento di Palazzolo Milanese

Reg. Ministero Sanità N.° 6328 **del** 18.4.85

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
E' obbligatorio l'uso di occhiali e **maschera** durante la manipolazione e l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomatologia
L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
Il Folpet ha la seguente sintomatologia:
azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

In caso di ingestione
Far vomitare il paziente, ma mai se è in stato di incoscienza; quando non si verifica il vomito ed il paziente non è in stato d'incoscienza è raccomandata la lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua); digitale.

In caso di contaminazione degli occhi
Lavare gli occhi con acqua corrente per circa 15 minuti. Se necessario somministrare pomata oftalmica anestetica o collirio.

In caso di inalazione
Stendere il paziente all'aria aperta e coprirlo bene tenendolo al caldo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SOLARAM CF è un un antiperonosporico che deriva dall'associazione di tre sostanze attive ad azione combinata: l'una, l'oxadixil che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata; le altre, il folpet ed il rame che agiscono per contatto ed hanno azione polivalente.
SOLARAM CF consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporici indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Peronospora della vite: 200-250 g. per 100 litri d'acqua (2-2,5 kg. per ettaro).
Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino al pre-chiusura del grappolo.
Si consiglia di non effettuare più di quattro trattamenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.
Non impiegare su vivai di vite.
Peronospora del pomodoro e della patata: 200-250 g/100 litri d'acqua.
Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Per i trattamenti successivi adottare un intervallo di 14 giorni.
Nei trattamenti di chiusura intervenire con prodotti tradizionali di copertura.
SOLARAM CF è attivo anche contro Alternaria e Septoria ed ha anche un'azione collaterale verso disseccamenti e maculature batteriche.
Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: E' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Non è miscibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Avvertenza: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e prodotti a base di polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Da non impiegare durante la fioritura.
Rischi di nocività: E' tossico per i pesci e gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

6329

SOLARAM MS 10-56

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro la Peronospora della Vite e del Pomodoro.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Oxadixil puro	g. 10
Metiram puro	g. 56
Coformulanti q.b. a	g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - MILANO

Officina di produzione:

SANDOZ S.p.A. - MILANO
Stabilimento di Palazzolo Milanese

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il prodotto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomatologia

L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flaccidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
La sostanza attiva ha inoltre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
Il Metiram ha la seguente sintomatologia: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: *Nei casi gravi ricovero urgente in Centro di rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*
Controindicazioni: *alcool, olii e grassi.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLARAM MS 10-56 è un antiperonosporico che deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione combinata: l'una, l'oxadixil, che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata; l'altra, il metiram, che agisce per contatto, ad azione polivalente.
SOLARAM MS 10-56 consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporici indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora della vite: 200-250 g. per 100 litri d'acqua (2-2,5 kg. per ettaro).
Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino al pre-chiusura del grappolo.
Si consiglia di non effettuare più di quattro trattamenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.
Non impiegare su vivai di vite.
Peronospora del pomodoro: 200 g. per 100 litri d'acqua (solo fino alla prima fioritura).
Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.
Divieto d'impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: E' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione fortemente alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

Reg. Ministero Sanità N.° 6329 **del** 18.4.85

SOLARAM MS 8-56

Fungicida ad azione sistemica e di contatto per la lotta contro la Peronospora della Vite e del Pomodoro.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Oxadixil puro	g. 8
Metiram puro	g. 56
Coformulanti q.b. a	g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - MILANO

Officina di produzione:

SANDOZ S.p.A. - MILANO
Stabilimento di Palazzolo Milanese

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il prodotto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomatologia

L'unica sintomatologia nota per l'Oxadixil è quella sperimentale: flacidità, astenia, posizione prona, decubito laterale, tremori.
La sostanza attiva ha inolre la capacità di indurre i sistemi enzimatici del fegato.
Il Metiram ha la seguente sintomatologia: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose e bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: *Nei casi gravi ricovero urgente in Centro di rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda grastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*

Controindicazioni: *alcool, olii e grassi.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLARAM MS 8-56 è un antiperonosporico che deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione combinata; l'una, l'oxadixil, che agisce per via sistemica ed ha azione specifica, preventiva e curativa, di lunga durata; l'altra, il metiram, che agisce per contatto, ed ha azione polivalente.
SOLARAM MS 8-56 consente l'adozione di programmi di lotta antiperonosporici indipendenti dall'andamento delle piogge e dallo sviluppo della superficie fogliare.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora della vite: 250-300 g. per 100 litri d'acqua (2,5-3 kg. per ettaro).
Il primo trattamento si effettua quando si verificano le condizioni idonee per l'infezione primaria; i trattamenti successivi ad intervalli di 14 giorni fino al pre-chiusura del grappolo.
Si consiglia di non effettuare più di quattro trattamenti. Per eventuali trattamenti supplementari utilizzare invece prodotti tradizionali.
Non impiegare su vivai di vite.
Peronospora del pomodoro: 250 g. per 100 litri d'arqua (solo fino alla prima fioritura).
Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.
Divieto d'impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: E' miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione fortemente alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Evitare le miscele con concimi fogliari contenenti boro.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

Reg. Ministero Sanità N.° 6330 **del** 18.4.85

6331

Metabloc

Lumachicida - limaccida

CLASSE TOSSICOLOGICA III

Metabloc

Lumachicida - limaccida

CLASSE TOSSICOLOGICA III

Composizione: Metaldeide pura gr 5, attrattivi-coformulanti q.b. a g 100.
Preparato in granuli per combattere tutte le specie di molluschi gasteropodi (lumache, limacee, chiocciole) che attaccano le colture orticole, floreali e ornamentali. Agisce per ingestione e per contatto. Il prodotto non viene asportato dal vento, nè dilavato o reso inefficace dalla pioggia. La sua natura granulare lo rende pronto all'uso e di facile impiego.

Attenzione: manipolare con prudenza.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali:
Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare, non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Evitare di respirare i vapori.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Informazioni per il medico: avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.
Sintomi d'intossicazione: violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato), shock, midriasi, ipotermia, convulsioni, obnubilazione del sensorio.
Consigli terapeutici di massima e condizioni al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (g 5 per litro di acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina -
diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e derivati in caso di torpore.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
Dosi e modalità d'impiego: Colture in pieno campo: (bietole, carciofi, insalate, spinaci, cucurbitacee, rose, crisantemi): 6-10 kg per ettaro su tutta la superficie.
METABLOC va somministrato preferibilmente dopo una pioggia abbondante o una irrigazione, distribuendo una maggiore quantità su una striscia larga circa 2 metri lungo il perimetro del campo. È opportuno effettuare una seconda somministrazione quando i granuli sono stati divorati.
Colture in serra (ortaggi e fiori): distribuire 10-15 granuli/mq.
"Da non applicare con mezzi aerei".
Avvertenze: Non mescolare il formulato con altri prodotti. Rischi di nocività: il prodotto è pericoloso per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Tempo di sicurezza: 20 giorni
Prodotto da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

CIFO S.p.A. - Via Oradour, 6
40016 S. Giorgio di Piano (Bologna)
Stabilimento produttore
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (Bologna)
Registrazione n. [illegible] del [illegible] Min. Sanità
Da non vendersi sfuso.

Peso netto:

6332

® DECIS mg

Insetticida in formulazione microgranulare

COMPOSIZIONE: Deltametrina pura g 0,05, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— conservare il prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: in caso di ingestione accidentale, segni di nervosismo, ansietà, tremori, convulsioni e danni respiratori.
Consigli terapeutici:
— cure di pronto soccorso:
- evitare il raffreddamento del paziente;
- trattare le irritazioni con creme lenitive-rinfrescanti o a base di Chinisocaina cloridrato o antistaminiche;
- in caso di contatto cutaneo, lavare abbondantemente con acqua;
- evitare l'esposizione alla luce viva;
- in caso di ingestione accidentale, provocare il vomito, a meno che sia incosciente.

— Cure sotto controllo medico (in caso di intossicazione grave):
- in caso di inalazione somministrare per aerosol per 15 minuti un derivato della cisteina;
- in caso di ingestione praticare una lavanda gastrica. Somministrare poi carbone attivo o in mancanza Attapulgite;
- in caso di intossicazione grave o di sintomi neurologici trattare il soggetto con Amobarbital per iniezione intramuscolare;
- nei casi più gravi, ospedalizzazione in un centro di rianimazione.

AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di produzione S.I.L.I.A. S.p.A. - Roma
Lavorazioni Industriali Aprilia S.p.A. - Aprilia (Latina)

Registrazione n. 6332 **del** 18.4.85 **del Ministero della Sanità**

® Marchio registrato della Roussel Uclaf S.A. - Parigi

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della
Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Contro la piralide del mais kg 20-25/ha.

CARATTERISTICHE

DECIS mg è un insetticida in formulazione microgranulare, appositamente studiata per i trattamenti contro la piralide del mais.
DECIS mg è caratterizzato da una buona persistenza d'azione, che svolge per contatto ed ingestione, in modo rapido e irreversibile, sulle larve di piralide.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

DECIS mg si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.10.84 kg 1

6333

Il **METILAZ 25 PB** è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione, caratterizzato da una lunga persistenza ed una buona azione citotropica.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
Impiegare da 150 a 250 g. di prodotto per 100 litri di acqua.
FRUTTICOLTURA: (Melo - Pero - Pesco) Psilla del pero, afidi, cimici, minatori, Capua reticolana, Carpocapsa, Antonomo, Fillobio.
VITICOLTURA: Tignola, Acari, ragno rosso e giallo, Tortrice, Cicaline.
AGRUMICOLTURA: Tignola, cocciniglie, fetola, Archips Podana.
FLORICOLTURA: in pieno campo Tantredini, Tripidi, Minatori.
ORTICOLTURA: Cavolaia (Cavoli - Broccoli - Rape).
PATATA: Dorifora.
BIETOLA: Altica e cleono.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
ATTENZIONE: Impiegare su varietà Golden Delicious solo 2 mesi dopo la fioritura.
MISCIBILITÀ: È miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra. Non impiegàrlo in miscela con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
METILAZ 25 PB è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg. 1

METILAZ 25 PB

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:

Azinfos Metile puro	g. 25
Bagnati, diluenti	q.b.a g. 100

I CLASSE VELENO

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito dal Patentino di cui all'Art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968, n. 1255.

Officina di produzione: CHEMIA S.p.a.
Via Statale
SAN AGOSTINO (FE)

Registrazione Ministero Sanità n 6333 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazioe mortale per inalazione, per ingetione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirare i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA Consultare un Centro Antiveleni

6334

GEOCID è un geodisinfestante completo in quanto agisce, oltre che per contatto, ingestione ed asfissia, anche per azione sistemica, potendo in tal modo, non solo controllare gli insetti presenti o che si sviluppano nel terreno, ma anche le infestazioni precoci dei parassiti delle foglie e degli steli per le colture sottoindicate.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
Và distribuito all'epoca della semina o del trapianto alle dosi consigliate, sia su tutto il terreno sia localizzato lungo la fila e solo con speciali macchine munite di microgranulatori.
È in grado di controllare attacchi di Agrotidi, Atomarie, Elateridi, Grillotalpe, Maggiolini, Mosche e punteruoli delle radici, Tipole nonché Nematodi del tipo Meloidogine e Pratylenchus. Inoltre controlla gli attacchi precoci di Afidi, Altiche, Casside, Ragno rosso.
Dose generale di impiego per ettaro: kg. 40-60 su tutta la superficie, su Barbabietola da zucchero, Mais, Patata, Pomodoro, Tabacco, piante ornamentali e gli ortaggi: Carote, Cavoli, Sedano, Pisello, Peperone, Melanzana, Fagioli, Zucchini.
In caso di trattamento localizzato sia nel solco da semina che ai lati delle file, si consigliano le seguenti dosi:
- kg. 10-12 per Barbabietola da zucchero per ettaro;
- kg. 18-22 per Mais, Pomodoro, Patata, Tabacco per ettaro;
- kg. 20-24 su colture floreali ed orticole per ettaro

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Il prodotto va impiegato da solo.
Rischi di nocività: È tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.
Sospendere i trattamenti almeno 60 giorni prima del raccolto.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg. 5

FORATE PAVONI

(GEOCID)
GEODISINFESTANTE MICRO-GRANULARE AD AZIONE DI CONTATTO E SISTEMICA

Composizione:

Forate	g.	4,5
Coformulanti	q.b.a g.	100

I CLASSE VELENO

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del Patentino di cui all'Art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968, n. 1255.

Officina di produzione: CHEMIA S.p.A.
Via Statale
SAN AGOSTINO (Ferrara)

Registrazione Ministero Sanità n. 6334 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prododtto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - ESTERI FOSFORICI
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massina e condizionati al caso. In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

6335

PIRICAR è un aficida molto specifico ad effetto molto rapido che agisce anche sulla parte inferiore della foglia per la sua proprietà traslaminare. Ha anche un'azione fumigante ma è privo di odori sgradevoli. È attivo anche contro gli afidi resistenti agli esteri fosforici.

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO
Impiegare 150 grammi di PIRICAR per ettolitro contro:
Melo: Afide verde e grigio
Pero: Afide verde e grigio
Pesco: Afide verde e bruno e nero delle radici
Susino: Afide verde e nero
Mandorlo: Afide verde e farinoso
Agrumi: Afide verde chiaro (spiraecola), verde scuro (gossipii) e Afide brunastro
Bietola da zucchero: Afide verde e nero
Ciliegio: Afide nero
Frumento: Afidi del grano (Sitobium avenae e granarium)
Patata: Afidi (myzus, macrosiphum, aulacorthum, aphis)
Pomodoro: Afide verde
Fragola: Afide verde e giallastro
Pisello: Afide verde
Si consiglia di impiegare non meno di 1000 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di ben bagnare tutta la vegetazione anche quella più nascosta.
Usando gli atomizzatori, è consigliabile proteggersi il volto con una mascherina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: **PIRICAR** può essere miscelato con la massima parte degli antiparassitari in commercio salvo Poltiglia Bordolese e Polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: Il prodotto può essere nocivo per gli animali, domestici, per i pesci e per il bestiame; è nocivo per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 1

PIRICAR

AFICIDA SPECIFICO SOTTO FORMA DI POLVERE BAGNABILE A BASE DI PIRIMICARB

Composizione:

Pirimicarb puro	g. 23,5
Bagnanti e diluenti q.b.a	g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Officina di produzione: CHEMIA S.p.A.
Via Statale
SAN AGOSTINO (Ferrara)

Registrazione Ministero Sanita n. 6335 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).
Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA
Sentire un centro antiveleni
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni dalle piante, alle persone ed agli animali.

6336

FUNGICIDA ZR è un fungicida cuprorganico derivato dall'associazione di zinco con ossicloruro di rame.

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO

Viticoltura: Contro Peronospora impiegare 250-400 gr. per ettolitro
Pomacee: Contro la ticchiolatura impiegare 200-300 gr. per ettolitro
Cereali in campo: Ruggine, Septoriosi impiegare gr. 300-350 per ettolitro.
Pomodoro: Usare FUNGICIDA solo fino alla prima fioritura contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, alla dose di 300-400 gr. per ettolitro.
Tabacco: Perospora tabacina impiegare gr. 250-300 per ettolitro.
Garofano: Contro la Ruggine impiegare gr. 250-300 per ettolitro.

NON IMPIEGARE IN SERRA

L'IMPIEGO DEL PRODOTTO È CONSENTITO SOLO SULLE COLTURE ED I PARASSITI INDICATI IN ETICHETTA

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: FUNGICIDA è compatibile con la massima parte dei fungicidi ed insetticidi inn commercio. Non è compatibile con la Poltiglia Bordolese.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non trattare durante la fioritura.
Il prodotto può essere fitotossico su alcune varietà di melo e pero, qui i: Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonaathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Imperatore, Abate Fetel, Buona Luisa d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Butirra d'Estate, Gentil Bianca, Spinacarpi, Spadone d'Estate, Giardina, Scipiona.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg. 5

FUNGICIDA ZR

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
A BASE DI RAME E ZINEB

Composizione:

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g. 30
Zineb puro	g. 13
Diluenti, bagnanti, disperdenti	q.b.a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Officina di produzione: Laboratori Chimici CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n 6336 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazone della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio - 6 - fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusione di sangue.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

6337

VITAPET PB è particolarmente indicato per la lotta contro Peronospora e Botrite della vite. Viene vantaggiosamente anche impiegato contro vari altri parassiti fungini di diverse colture in quanto dotato di lunga persistenza e di largo spettro di attività.

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO
Viticoltura: Peronospora, Botrite (muffa grigia), Escoriosi, Mrciume nero, Rossore parassitario - da g. 120 a 250 per ettolitro.
ATTENZIONE: sospendere i trattamenti 40 gg. prima della vendemmia delle uve da vino.
Frutticoltura (pomacee-pesco): gr. 100-150 contro Ticchiolatura delle Pomacee (trattamenti prefiorali); gr. 200 contro Bolla del Pesco.
Olivicoltura: gr. 300 contro Occhio di Pavone ed Antracnosi.
Fragola: muffa grigia e vaiolatura - g. 120-150 per ettolitro.
Pomodoro: Peronospora, Alternaria, Septoria, Ticchiolatura - g. 150
Patata: Peronospora ed Alternaria - g. 150
Cipolla: Peronospora, Alternaria - g. 200
Cocomero e melone: Peronospora e Antracnosi - g. 150
Crisantemo: Septoria e botrite - g. 150-200
Sedano: Septoria e Cercospora - g. 150-200
Fagiolo: Antracnosi - g. 150-200

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: con quasi tutti gli antiparassitari salvo quelli oleosi, alcalini, TEEP e Dinocap. Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Avvertenza: debbono trascorrere venti giorni da una applicazione con olli minerali o polisolfuri.
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
È tossico per le seguenti cultivar: pere (Butirra d'anjou), mele (Red delicious - Winesap).
Fitotossicità: **Pere**: Butirra D'Anyou, **Meli**: da non usarsi dopo la fioritura perché può manifestare fitotossicità.
Nocività: Il prodotto può essere nocivo per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. È nocivo per gli insetti utili.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 20 gg. prima della raccolta; in caso di UVA da VINO, i trattamenti devono essere sospesi 40 gg. prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg. 5

VITAPET PB

FUNGICIDA SOTTO FORMA DI POLVERE BAGNABILE A BASE DI CAPTAFOL E FOLPET PRINCIPALMENTE CONSIGLIATO PER LA LOTTA CONTRO PERONOSPORA E BOTRITE

Composizione:

Captafol puro	g. 16
Folpet puro	g. 54
Diluenti e disperdenti	q.b.a g. 100

IV CLASSE

Officina di produzione: Laboratori Chimici CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n. 6337 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con i prodotti puri o diluiti ed anche di sollevare polvere nel maneggio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acque e digitale.
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizioni essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ADIN è un bagnante antischiuma liquido ad azione anche adesivante particolarmente indicato come aggiunta a tutti i trattamenti antiparassitari in quanto in grado di esaltare l'azione degli antiparassitari diminuendone la dispersione nell'ambiente.
Essendo inoltre non ionico è consigliato in miscela con ERBASTOP e SENZERBE per migliorarne l'attività erbicida.

DOSI DI IMPIEGO

In diluzione nelle miscele antiparassitarie: g. 50-100 per ettolitro.
In miscela con ERBASTOP e SENZERBE: g. 250-500 per ettolitro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg. 5

ADIN

BAGNATE ANTISCHIUMA SPECIFICO PER I TRATTAMENTI AGRICOLI

Composizione:
Nonilfenolo condensato con 9 moli di ossido di etilene g. 12
acqua q.b.a g. 100

IV CLASSE

Officina di produzione: LABORATORI CHIMICI CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n. 6338 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

6339

FOSFORT è un insetticida polivalente che agisce per contatto, asfissia ed ingestione.

DOSI E CAMPO DI IMPIEGO

Melo, Pero: Afidi, Antonomo, Carpocapsa, Cocciniglie (stadio larvale), Cecidomia, Larve minatrici, Tentredini, g. 120-150/hl
Pesco: Afidi, Cocciniglie (stadio larvale) g. 120-150 /hl Tignola del pesco g. 170-250/hl
Vite: Tignola, Sigaraio, g. 120-200/hl
Fiori: Afidi, Tentredini g. 120-170/hl
Pomodori, Peperoni, Melanzane: Afidi, Agrotidi, Mosche g. 120-150/hl
Cavolo, cavolfiore: Cavolaia, Punteruolo g. 120-170/hl
Olivo: Tignola, Mosca, Fleotripide, Cocciniglia g. 120-250/hl
Agrumi: Ceroplaste, Cocciniglie a virgola, bianca, nera, mezzo grano di pepe, biancarossa; Iceria, Tripidi g. 200-250/hl
Pioppo: Saperda, Punteruolo, Tarli, g. 500-1300/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari in commercio salvo quelli a reazione alcalina. Non usare ocn Poltiglia Bordolese, Polisolfuri di bario e calcio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: È tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.
Attenzione: Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 5

FOSFORT

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE A BASE DI PARATHION

Composizione:

Parathion puro	g. 19,2
Solventi, emulsionanti (contiene xilolo) q.b.a	g. 100

I CLASSE VELENO

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255.

Officina di produzione: Laboratori Chimici CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n 6339 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiale protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chlorida, Pam Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

6340

LINURON 50 è un erbicida selettivo adatto per il diserbo di diverse colture sia in pre che in post emergenza della coltura stessa.

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO

Mais: pre-emergenza: terreni leggeri Kg. 1,5 per ettaro, terreni medio impasto Kg. 2 per ettaro, terreni pesanti Kg. 2,5 per ettaro.

Carote: pre-emergenza: terreni leggeri Kg. 1-1,5 per ettaro, terreni medio impasto Kg. 2 per ettaro, terreni pesanti Kg. 2-2,5 per ettaro; post-emergenza: Kg. 1,5-2 per ettaro.

Patate: pre-emergenza: terreni leggeri Kg. 1,5 per ettaro, terreni medio impasto Kg. 2 per ettaro, terreni pesanti Kg. 2,5 per ettaro.

Sedano e finocchio: pre-emergenza: terreni leggeri Kg. 1-1,5 per ettaro, terreni medio impasto: Kg. 2 per ettaro, terreni pesanti Kg. 2-2,5 per ettaro.
post-emergenza: (per finocchio intervenire dopo la sesta foglia) terreni leggeri Kg. 1 per ettaro, terreni medi e pesanti Kg. 2 per ettaro.

Prezzemolo: pre-emergenza: terreni leggeri Kg. 1-1,5 per ettaro, terreni medio impasto Kg. 2 per ettaro, terreni pesanti Kg. 2-2,5 per ettaro.

Fagioli e fagiolini: pre-emergenza: terreni leggeri Kg. 0,5-1 per ettaro, terreni medio impasto Kg. 1,25 per ettaro, terreni pesanti Kg. 1,5 per ettaro.

Fragola: trattare solo nel 2° anno di impianto e prima del risveglio vegetativo con Kg. 1,5-2,5 per ettaro.

Carciofo: trattare prima della ripresa vegetativa con Kg. 1,5-2,5 per ettaro.

Argini risaie: usare Kg. 4 per ettaro.

Osservare scrupolosamente le dosi di impiego consigliate accertandosi che la distribuzione sia omogenea. Evitare l'impiego in terreni o troppo sciolti o torbosi. Il Mais deve essere seminato ad oltre 4 cm. di profondità Le infestanti sensibili sono generalmente le annuali come Amaranto, Capsella, Camomilla, Farinaccio, falso Convolvolo, Giavone, Papavero, Piantaggine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: È compatibile con altri erbicidi purché il loro impiego sia consigliabile: a tale proposito consultare il tecnico di fiducia. Non miscelarlo con insetticidi ed anticrittogamici.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Trattandosi di un erbicida, impiegarlo solo sulle colture e con le tecniche consigliate. Evitare di colpire le colture limitrofe o comunque sensibili. Preparare le diluizioni lontano da piante coltivate o dalLe zone della loro espansione radicale. Assicurarsi del perfetto funzionamento delle attrezzature per una uniforme e regolare distribuzione.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.) 1

LINURON 50

ERBICIDA SELETTIVO A CARICA RESIDUA PER IL DISERBO DI COLTURE INDUSTRIALI

Composizione:

Linuron puro	g. 50
Diluenti, bagnanti	q.b.a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Officina di produzione: Laboratori Chimici CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n. 6340 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessbile ai bambini ed agli aninali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Irritante per la cute.
L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Terapia

Per le dermatosi: pomate cortisoniche od antistaminiche.
Non è consigliabile la lavanda gastrica.
Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epato-protettori.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZA Consultare un Centro Antiveleni.

6341

ZINEB 80 è un anticrittogamico non sistemico ad applicazione fogliare.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
Vite: contro peronospora - g. 150-250 per ettolitro.
Melo e Pero: contro ticchiolatura - g. 150-250 per ettolitro.
Pomodoro solo sino alla prima fioritura: contro peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi - g. 250-350 per ettolitro.
Pioppo: contro marsonnina e ticchiolatura - g. 200-300 per ettolitro.
Cereali in campo: contro ruggine e septoriosi g. 200-400 per ettolitro.
Tabacco: contro peronospora tabacina - g. 200-300 per ettolitro
Garofano in pieno campo: cotro ruggine - g. 250 per ettolitro.

DIVIETI DI IMPIEGO: non impiegare in serra.
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

NON IMPIEGARE CON I MEZZI AEREI.
Compatibilità: è instabile in condizioni di forte alcalinità ed acidità
In miscela con Malathion e Diazinone è consigliabile l'uso immediato della miscela.
È compatibile con Esteri Fosfori purchè non in miscela oleosa.
Attenzione: In caso di miscela con altri antiparassitari deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: su pomacee non impiegare su varietà sensibili ai ditiocarbammati quali: Armella, Butirra d'estate, Coscia, Gentile Bianca, Giardina, Mora, Scipiona, S. Giovanni, S. Marco, Spadoccina, Spadona d'estate, Spinacarpi.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg. 1

ZINEB 80
FUNGICIDA POLVERE BAGNABILE

Composizione:

Zineb puro	g. 80
Bagnanti e disperdenti	q.b.a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Officina di produzione: Laboratori Chimici CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n. 6341 **del** 24.4.85

pavoni&c S.P.A.
Divisione antiparassitari
Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità ed il calore;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
- durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Perl'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.
In caso d'ingestione, la presenza dello Zineb può provocare solfoemoglobinenia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico del glucosio - 6 - fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare sempre il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

ZOLFO FLOWABLE è una formulazione di zolfo finemente disperso in un ambiente liquido ed addizionato con speciali addensanti e bagnanti.
La formulazione FLOWABLE è in grado pertanto di assicurare:
- azione fungicida pronta
- uniforme copertura della pianta da proteggere
- prolungata azione fungicida per minori dilavamenti e dispersioni.

DOSE MEDIA DI IMPIEGO

Da cc. 180 a 350 per ettolitro di acqua.

Campi di impiego

Contro tutte le forme di oidio su vite, Pomacee, Drupacee, Orticoltura, Floricoltura.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Attenzione: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione avvenuta.

Fitotossicità: può arrecare danno alle seguenti cultivar di
Mele: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renette - Tome Beauty - Stayman Red - Winesap.
Pere: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese
CUCURBITACE - può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 5

ZOLFO FLOWABLE

ZOLFO IN FORMULAZIONE FINEMENTE DISPERSA IN AMBIENTE LIQUIDO

Composizione:

zolfo puro (esente da Selenio) g. 57
Disperdenti, addensanti, diluenti q.b.a g. 100

"Contiene Etilen Glicole"

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Officina di produzione: LABORATORI CHIMICI CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n. 6342 **del** 24.4.85

pavoni&c S.P.A.
Divisione antiparassitari

Via Francesco Crispi, 219
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione, per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non mangiare e non fumare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

"Attenzione ad impiegare il prodotto esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro è pericoloso".
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

6343

OSSI-FLOWABLE è una formulazone idro-sospesa di ossicloruro di rame che unisce ad una estrema finezza delle particelle, una sospensività ed una dispersibilità elevata. Queste caratteristiche rendono OSSI-FLOWABLE un fungicida di pronta e prolungata azione.

DOSE MEDIA DI IMPIEGO

Da cc. 280 e 550 per ettolitro di acqua.
OSSI-FLOWABLE è prontamente dispersibile nell'acqua con blanda agitazione rimanendo a lungo sospeso nel mezzo liquido.

Campi di impiego

Vite: Peronospora
Pomacee: Ticchiolatura, Corineo, Moniliosi
Drupacee: Bolla, Cancro dei rametti, Monilia, Corineo
Agrumi: Mal Secco, Allupatura, Fumaggine, Batteriosi
Patata: Peronospora, Alternaria
Pomodoro: Peronospora, Alternaria
Orticoltura: Peronospora
Olivo: Occhio di Pavone, Fumaggine, Lebbra, Batteriosi
Barbabietola da zucchero: Impiegare da 4 a 5 litri per ettaro contro Cercospora.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: È compatibile con la massima parte degli antiparassitari in commercio.

Attenzione: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione avvenuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) = Abbandanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonatham, Rome Beauty, Morgentuft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.
(**) = Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Buttirra Glargeau, Passacrassana, B.C. William, dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 5

OSSI - FLOWABLE

OSSICLORURO DI RAME IN FORMULAZIONE !DROSOSPESA

Composizione:

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro g. 30
Disperdenti, sospensivanti, diluenti q.b.a g. 100

"Contiene Glicole Etilenico"

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza.

Officina di produzione: LABORATORI CHIMICI CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n. 6343 **del** 24.4.85

pavoni&c S.P.A.
Divisione antiparassitari

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazioe o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Sospendere i trattamenti almeno 20 giorni prima del raccolto

"Attenzione ad impiegare il prodotto esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

6344

GEOVAP è un prodotto per la disinfezione dei terreni destinati alle colture ortive, floricole, sia in serra che in pieno campo, asparagiaie.
Agisce contro Fusarium, Sclerotina. Pythium Rhizoctonia, Verticillium, nonché le forme libere di nematodi. Controlla le infestanti in fase di germinazione nonchè gli insetti terricoli.

DOSI MODALITA D'IMPIEGO

Può essere distribuito sia puro con pali iniettori sia in acqua di irrigazione, annaffiatura o irrorazione (diluizione da 1 a 10).
Dopo l'applicazione è consigliabile una irrigazione abbondante per favorire la distribuzione del prodotto in profondità.
L'applicazione deve essere fatta almeno 3 settimane prima della messa a coltura, avendo cura di farla preceder da una erpicatura anche leggera, onde arieggiare il terreno.
Dose: da litri 800 a 1500 per ettaro a seconda del tipo di terreno e del grado di infestazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: non è compatibile con altri antiparassitari e la tecnica di applicazione non ne consiglia la miscelazione.
Fitotossicità: è fitotossico per tutte le colture. Il prodotto è tossico per i pesci; è nocivo per animali domestici e bestiame.
Impiegare almeno 20-30 giorni prima della semina o trapianto.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VERDERSI SFUSO

Contenuto kg. 130

GEOVAP

FUMIGANTE LIQUIDO AD AZIONE EMATOCIDA, FUNGICIDA E DISERBANTE DIRETTAMENTE NEL TERRENO

Composizione:

Metamsodium puro	g. 32
Diluenti e disperdente	q.b.a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Officina di produzione: Laboratori Chimici CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n. 6344 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc).
Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

6345

DISEGRAN è un erbicida ormonico selettivo per la lotta contro le infestanti nei cereali, quali: grano, orzo, avena, segale, riso.

EPOCA DI TRATTAMENTO
Grano, orzo, segale, avena: trattare nel periodo compreso fra fine accestimento ed inizio botticella.
Riso: trattare dopo l'accestimento e prima dell'ingrossamento della spiga nel culmo.
Le infestanti debbono essere in attivo accrescimento. Non trattare in giornate di pioggia e di vento

DOSE DI IMPIEGO
Per grano, orzo, avena, segala: impiegare 0,4-0,5 kil per ettaro in 300/500 lt. acqua.
Per riso: impiegare 0,4-1 kilo per ettaro in 300/500 lt. acqua.
Impiegare dosi alte in condizioni meno favorevoli quali infestanti abbondanti, temperature basse, condizioni ambietali instabili: in tutti gli altri casi le dosi più basse sono consigliabili: l'esperienza locale sarà particolarmente utile.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: si sconsiglia qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi; con erbicidi usare molta prudenza e seguire i consigli del tecnico di fiducia.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fititossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutta, ortaggi, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Evitare di colpire le colture limitrofe o comunque sensibili.
Preparare le diluizioni lontano da piante coltivate o dalle zone della loro espansione radicale. Assicurarsi del perfetto funzionamento delle attrezzature per una uniforme e regolare distribuzione.
Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, per gli insetti utili, per i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg. 5

DISEGRAN

DISERBANTE SELETTIVO LIQUIDO A BASE DI "2,4 - D"

Composizione

2,4 - D Acido puro g. 24,8
Solventi, emulsionanti (contiene xilolo) q.b.a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza.

Officina di produzione: Laboratori Chimici CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n 6345 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalázione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

CONSIGLI TERAPEUTICI
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per la dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

6346

DIUR 80 è un diserbante a carica residua caratterizzato da una lunga persistenza. Oltre che per trattamenti totali è particolarmente adatto per alcuni diserbi su colture agrarie.

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO

Olivi, Meli, Peri, Vigneti, Agrumeti: impiegare kg. 3-4/ha in primavera oppure due trattamenti annuali in primavera ed autunno a 2,5 kg/ha.
Asparagi: usare 0,5-2 kg/ha in 6-8 ettolitri di acqua.
Erba medica: usare 2 kg/ha nel pieno riposo vegetativo
Menta piperita: usare 2 kg/ha prima della ripresa vegetativa
Gladiolo: usare 1-1,5 kg/ha in pre-emergenza
DIUR 80 controlla: Echinochloa, Poa, Setaria, sorgum da seme, Anagallis, Anthemis, Atriplex, Capsella, Cerastium Chenopodium, Chrysantemum, Galinsoga, Papaver, Portulaca, Raphanus, Sinapis, Solanum, Spergula, Stellaria, Thiaspi.
Sono mediamente sensibili Digitaria, Amaranthus, Sonchus.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: non miscelare con fungicidi e insetticidi. Le miscele conn altri erbicidi vanno fatte se indispensabili e se consigliate dal tecnico di fiducia.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattandosi di un erbicida, impiegarlo solo sulle colture e con le tecniche consigliate. Evitare di colpire le colture limitrofe o comunque sensibili. Preparare le diluizioni lontano da piante coltivate o dalle zone della loro espansione radicale. Assicurarsi del perfetto funzionamento delle attrezzature per una uniforme e regolare distribuzione.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg. 1

DIUR 80

ERBICIDA A CARICA RESIDUA A BASE DI DIURON

Composizione:

Diuron puro	g. 77,6
Diluenti, bagnanti	q.b.a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza.

Officina di produzione: Laboratori Chimici CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n. 6346 **del** 24.4.85

pavoni&c S.P.A. Divisione antiparassitari
Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Attenzione: sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

6347

CARB 50 è un insetticida che unisce ad una vasta attività su quasi tutti gli insetti, una lunga persistenza ed una tossicità bassa e che ne fanno il prodotto più versatile e duttile.

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO

Melo, Pero: Anarsia, Carpocapsa, Ricamatrici: g. 200-250/hl
Pesco: Cydia g. 200-250/hl
Vite: Tignola e Tignoletta g. 150-200/hl
Agrumi: Mezzo grano di pepe, Saissetia g. 200-250 /hl, Tignola g. 150-200/hl
Cavolo, Broccoli: Cavolaia g. 150/hl
Patate, Melanzane: Dorifora g. 150/hl
Carciofo: Depressaria g. 200/hl
Garofano in pieno campo: Bega g. 200/hl
Olivo: Tignola g. 150-200/hl, Saissetia g. 200-250/hl
Nocciolo: g. 100-150/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Può essere miscelato con la massima parte degli antiparassitari sul mercato salvo la Poltiglia Bordolese. Usare precauzione nelle miscele con olii bianchi, ossicloruri di rame.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VERDERSI SFUSO

Peso netto kg. 1

CARB 50

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE A LARGO SPETTRO DI AZIONE A BASE DI CARBARYL

Composizione:

Carbaryl puro (esente da Beta-naftolo)	g. 49
Diluenti e bagnati q.b.a	g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Officina di produzione: Laboratori chimici CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n 6347 **del** 24.4.85

pavoni&c S.P.A.
Divisione antiparassitari
Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione, per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione e contatto cutaneo (inibitore della colinestrasi).
Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsione, miosi, bradicardia, edema-polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrahtion, ecc.) che potrebbero essere nocive.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

6348

AKARSTOP è un acaricida specifico contro tutti gli stadi degli acari (neanidi, uova, adulti). Si impiega nei trattamenti primavera/estate.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

Melo, Pero, Vite, Pesco: Contro gli acari in tutti gli-stadi g. 200-250/hl
Agrumi: Contro acari in tutti gli stadi g. 200-250/hl
Fiori in pieno campo: Contro acari in tutti gli stadi g. 200-250/hl
In infestazioni in atto di particolare gravità, eseguire 2 applicazioni a distanza di 3-6 giorni.

NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Può essere miscelato con la massima parte degli antiparassitari in commercio salvo Poltiglia Bordolese, Polisolfuri di Bario e calcio ed in genere con i prodotti a reazione alcalina.
L'unione con prodotti rameici và fatta con precauzione.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve esser rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg. 5

AKARSTOP

OVO-ACARICIDA LIQUIDO A BASE DI "TETRADIFON" E "DICOFOL"

Composizione:

Tetradifon puro	g. 5,9
Dicofol puro	g. 13,6
Diluenti, emulsionanti q.b.a	g. 100
Contiene xilolo	

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Officina di produzione: Laboratori Chimici CIFA
S.S. Padana Superiore
CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero Sanità n 6348 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente e con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questo etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Intossicazione acuta: lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g. 25 solfato di sodio). Per la liposubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0 1-02 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari, fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia.
Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
Controindicazioni: la morfina e l'alcool, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni

6349

ESCALDEIDE è una esca pronto all'uso che attira ed elimina le limacce e le chiocciole.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

In caso di infestazioni leggere e medie distribuire sul terreno una media di 10 kilogrammi per ettaro, mentre per infestazioni forti, quando si hanno più di 30 individui per metro quadrato, si consiglia di spargere almeno 15 kili per ettaro.
Si consiglia di creare una barrieraa esterna attorno alla coltura da proteggere larga almeno 2 metri e con una dose leggermente superiore, potendo in tal modo ridurre la dose nella parte centrale.
Si impiega sia in Ortive che Floricoltura, Colture di fragole e di patate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si deve impiegare da solo.

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Intervallo di sicurezza: Non spargere prodotto negli ultimi 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg. 5

ESCALDEIDE

ESCA PRONTA ALL'USO IN GRANULI PROTEICI A BASE DI METALDEIDE PER LA LOTTA CONTRO LE LUMACHE

Composizione:

Metaldeide pura	g. 4,9
Supporti proteici ed organici q.b.a	g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Officina di produzione: CHEMIA S.p.A.
Via Statale
SAN AGOSTINO (Ferrara)

Registrazione Ministero Sanità n. 6349 **del** 24.4.85

Via Francesco Crispi, 129
CATANIA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questo etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE

Violenti dolori addominali - diarrea - vomito biancastro (aspetto del latte cagliato) - shock - midriasi - ipotermia - convulsioni - obnubilazione del sensorio.

CONSIGLI TERAPEUTICI:

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (g. 5 per litro d'acqua) - riscaldare il paziente - cardiotonici - fleboclisi clorurate o glucosate, con noradrenalina - diuretici - barbiturici - neuroplegici - anfetamina e derivata in caso di torpore.

6350

GRAMINEX PB

DISERBANTE SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE PER FRUMENTO E ORZO

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
— CLORTOLURON puro gr. 77,6
— Coformulanti q.b. a gr. 100

CLASSE IV

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO: Il **GRAMINEX PB** si usa contro le seguenti infestanti del Frumento e dell'Orzo: Alopecurus - Apera - Lolium - Poa (fra le graminacee) Capsella - Centaurea - Galeopsis - Lamium - Matriacaria - Mercurialis - Polygonum - Raphanus - Sinapsis - Stellaria (fra le dicotliledoni) alle seguenti dosi:
— Kg. 2,5 - 3/ha in 6-10 hl. di acqua in preemergenza della coltura;
— Kg. 2 - 2,5/ha in 6-10 hl. di acqua in post emergenza, quando la coltura è nello stadio delle 2-3 foglie.
AVVERTENZA: evitare super dosaggi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è miscibile con altri erbicidi derivati dall'urea, triazine e fenossiderivati.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati derivati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Il trattamento con **GRAMINEX PB** non è consigliabile nei terreni molto sabbiosi e in quelli soggetti a ristagni di acqua. Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni transitori di sofferenza delle colture. Non deve essere impiegato sul frumento tenero DEMAR e sul frumento duro KID sensibili al Clortoluron e sugli orzi polistici. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere il trattamento 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

TERRANALISI s.n.c.
VIA DONIZETTI N. 2/A - CENTO (FE) - TEL. 90.62.07

Stabilimento di produzione:
SARIAF S.p.A. - FAENZA (Ravenna)
Registrazione n. 6350 del 16.5.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6351

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchiti, effetto Antabuse (in casi di assunzione di alcool), irritazione della cute e delle mucose in caso di contatto (dermatiti, congiuntiviti, faringiti, ecc.) nonchè manifestazioni allergiche cutanee e bronchiali.

Terapia: nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centri di Rianimazione. Molti dei sintomi tossici possono essere provocati dai solventi organici presenti nel formulato; pertanto la terapia deve tener conto anche dei danni causati da questi. I solventi possono provocare gravi lesioni epatiche, renali e a carico del sistema nervoso centrale e periferico (particolarmente i distillati del petrolio possono causare polmoniti chimiche); tutte queste forme richiedono idonee terapie sintomatiche. Il vomito **non** va provocato. Somministrare grandi quantità di acqua. Se il paziente vomita spontaneamente, somministrare ancora liquidi, dopo averlo intubato. Se il paziente è incosciente **non** somministrare nulla per bocca. Ricoverare il paziente in un centro di rianimazione.
La lavanda gastrica, a paziente intubato, va praticata con una soluzione di 200-300 ml di acqua in cui siano stati sciolti 30-60 g di carbone attivo.
Purganti salini. Terapie sintomatiche mirate.
Per le manifestazioni cutanee e mucose rimuovere gli abiti contaminati, lavaggio con abbondante acqua della pelle e degli occhi per almeno quindici minuti, pomate oftalmiche e dermatologiche.

Controindicazioni: Alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'ERBIVORAX'

Diserbante liquido emulsionabile selettivo per il mais, per le colture industriali, per le colture ortive e per i fruttiferi

COMPOSIZIONE

EPTC (Eptam) puro	g 75.2
Solventi, coadiuvanti (contiene Xilolo)	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione: ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 6350 del 16.5.85
'ERBIVORAX' - marchio depositato ICI Solplant S.p.A.

CARATTERISTICHE

'ERBIVORAX' agisce sui germinelli delle infestanti. È selettivo per il mais, fagiolo, arachide, barbabietola da zucchero, carota, cece, fava, lupino, patata, pomodoro, tabacco, vite, agrumi, pomacee, drupacee.
La sua azione è specifica contro infestanti graminacee come Setaria spp, Digitaria sanguinalis, Lolium perenne, Echinochloa spp, Panicum dichotomiflorum, Sorghum halepense (nato da seme) e con una buona efficacia su quello nato da rizoma. Inoltre esso è attivo contro Cyperus spp, Chenopodium album, Amarantus retroflexus, Portulaca oleracea, Lamnium amplexicaule.
'ERBIVORAX' può anche essere impiegato nel diserbo dei vigneti, dei frutteti (agrumi, pomacee, drupacee), allorchè tra le infestanti predominino cyperus spp e gramigna.

MODALITA' DI IMPIEGO

Epoca	Nel diserbo delle colture erbacee 'ERBIVORAX' si applica in pre-semina.
Dosi	litri 6-8/ha
Mezzi	Irroratrici
Metodo	Irrorazione uniforme della dose/ettaro diluita in 400/600 litri di acqua e quindi immediato incorporamento nel terreno (entro un'ora dall'applicazione, alla profondità di 6-8 cm). L'operazione può essere condotta con fresa, erpici a dischi o a denti (in tal caso indispensabile eseguire due passaggi incrociati).
Avvertenza	**La semina del mais, del fagiolo, del cece, della fava può essere eseguita subito dopo il trattamento o qualche giorno più tardi. Per la semina o trapianto di arachide, barbabietola, carote, patata, pomodoro e tabacco si dovrà attendere 20 giorni dal trattamento. Per la semina dei semenzai di lupino attendere 2 settimane.**

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

'ERBIVORAX' si impiega da solo oppure in miscela con altri diserbanti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZE

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

6352

Idroram Pasta

Anticrittogamico in pasta fluida colloidale direttamente sospensibile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

– Rame metallico (sotto forma di ossicloruro)	g 20
– Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

caffaro S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 6352 del 16.5.85 Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE

L'IDRORAM PASTA è un formulato in pasta direttamente sospensibile costituito da particelle di natura colloidale. Questa particolare formulazione permette una maggiore adesività del prodotto sulle parti trattate; si ottiene un aumento della resistenza al dilavamento e una persistenza di azione più prolungata.

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI

Diluire l'IDRORAM PASTA in poca acqua e versare quindi nella rimanente quantità di acqua necessaria per il trattamento, secondo le seguenti dosi:

— **Vite** contro: Peronospora, Black-rot, Antracnosi	g	500/hl
— **Olivo** contro: Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine	g	600/hl
— **Agrumi** (arancio, limone, mandarino) contro: Mal secco, Allupatura, Gommosi del colletto, Batteriosi, Fumaggine	g	600/hl
— **Drupacee** (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo) contro: Bolla, Gommosi, Cancro dei rametti, nei trattamenti autunno invernali	g	1000/hl
— **Pomacee** (melo, pero) contro: Ticchiolatura e Cancro		
nei trattamenti autunno-invernali	g	1000/hl
nei trattamenti primaverili-estivi	g	500/hl
— **Orticole** (cavoli, cipolla, fagiolo, melanzana, patata, peperone, pomodoro, pisello, sedano, spinacio, carciofo, cardo, carota, cicoria, cucurbitacee, insalate, prezzemolo, rapa) e colture floreali in campo contro: Peronospora, Septoria, Alternaria, Antracnosi, Cercospora	g	500/hl
— **Barbabietola da zucchero** contro: Cercospora	kg	5-6/ha

Operando con pompe a volume ridotto le dosi vanno proporzionalmente aumentate.

Attenzione: prima dell'uso agitare il contenitore in modo da fluidificare il contenuto. Dopo lo svuotamento risciacquare con acqua fino a totale pulizia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'IDRORAM PASTA è miscibile con i più comuni antiparassitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cupro sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) Meli cuprosensibili: Abbondanza "Belfort", Black Stayman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgendufí, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

(**) Peri cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranche, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg

6353

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dpo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione.
Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii, grassi

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

FERNASAN (Tipo 50)

Anticrittogamico in polvere per la concia a secco delle sementi

COMPOSIZIONE

Thiram puro	g 49
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione
ICI Solplant S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 6359 16.5.85
'FERNASAN' Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

CARATTERISTICHE

Si tratta di triram formulato come polvere secca adatta alla concia delle sementi.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campi di impiego e dosi

PARASSITA COMBATTUTO	COLTURA	DOSE
Marciume dei semi e delle piantine procurati da: **Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Alternaria, Phytophotora, Septoria.**	Mais, Pisello, Sorgo, Fagiolo, Soia, Arachidi.	200 g/q.le
	Cavolo, Spinacio, Lattuga, Cucurbitacee.	500 g/q.le
	Bietola, Lino.	670 g/q.le

Metodo: concia delle sementi.

Mezzi: qualunque purchè realizzi completa ed uniforme ricopertura del seme trattato.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con i più comuni insetticidi e fungicidi in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

I semi trattati eventualmente residuati dalla semina non possono essere destinati all'alimentazione dell'uomo e degli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **g**

6354

LUMACARYL

CLASSE II

Esca limacida - insetticida, in granuli, per combattere le lumache, chiocciole, limacce, grillotalpe, nottue, grilli, che infestano campi, serre, orti e giardini

II CLASSE

Composizione

100 gr. di prodotto contengono:

Metaldeide pura	gr.	4,9
Carbaryl puro esente da beta-naftolo	gr.	9,8
Sostanze attrattive e disperdenti q.b. a	gr.	100

Natura del rischio:

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei (per esempio, interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva) le confezioni che contenevano il prodotto. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

Il LUMACARYL è un preparato a base di metaldeide acetica (Tetramero della acetaldeide) e di un carbammato, sostanze chimiche, che, pur avendo meccanismi tossicologici diversi, presentano tossicità acute, orale e dermale, dello stesso ordine di grandezza.
Si presume che l'effetto narcotizzante dell'aldeide si sommi all'azione anticolinesterasica del carbammato. Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

Miosi - lacrimazione - scialorrea - vomito - diarrea - dolori addominali (stato di male convulsivo) - dispnea - spasmi bronchiali - tremori diffusi (fascicolazioni muscolari) - bradicardia - edema polmonare.

Consigli terapeutici:

Lavanda gastrica con acqua e bicarbonato di sodio (5 gr./lt.) se ingerito. Lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato 1-2 mg. per via intramuscolare ogni 15 minuti fino a comparsa di segni di atropinizzazione (midriasi - tachicardia), usando particolare prudenza nei bambini. Diazepam fiale da 10 mg, endovena 1 oppure più. Barbiturici (Luminal 1 fiala per i.m.) se predomina lo stato convulsivo. Fleboclisi (soluzioni glucosaline) con eventuale aggiunta di cortisonici (Flebocortid 500 mg.) se vi è stato collasso o shock. Ossigeno -terapia in caso di cianosi o dispnea. Le Ossime (Contrathion - PAM) sono controindicate.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero in Centro di Rianimazione.

Caratteristiche

Il LUMACARYL è un'esca già pronta all'uso, costituita da una miscela di prodotti ad azione complementare e a lunga persistenza: la METALDEIDE, che agisce per ingestione e per contatto ed è efficacissima nei confronti di tutte le specie di Lumache e Limacce; il CARBARYL, insetticida carbammico attivo per ingestione e contatto verso le larve delle Nottue, i Grilli e i Grillotalpa.
Il LUMACARYL è formulato in granuli che in presenza di acqua ed elevata umidità si rigonfiano e si ammorbidiscono rendendosi completamente appetibili.

Dosi e modalità d'impiego

Negli orti come pure nelle serre e nei semenzai sono sufficienti 1. grammi per mq. di superficie oppure distribuire il prodotto a piccoli mucchietti tra le file.
In pieno campo bastano kg. 10-15 per ettaro, uniformemente distribuiti, a seconda del grado di infestazione. Ad evitare invece infestazioni dall'esterno è consigliabile distribuire il LUMACARYL alla dose di 15-20 kg./ha lungo i bordi del campo per una lunghezza di mt. 1-2.
La distribuzione del LUMACARYL deve essere effettuata preferibilmente verso sera dopo una pioggia abbondante o una sufficiente irrigazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Non è previsto abbinamento con altri prodotti.
Il prodotto è nocivo per i pesci, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Officina di produzione e sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1

Registrazione N. 6354 del 6.5.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO**

6355

ISOFOS

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO LA PSILLA DEL PERO

Composizione: 100grammi di **ISOFOS** contengono:

Isofenfos puro	gr. 50
Emulsionanti e solventi q.b. a	gr. 100
(contiene: xilolo)	

CLASSE I^A^

CLASSE I

VELENO

ATTENZIONE: **Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.**

NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettori. Durante la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabile dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contengono il prodotto schiacciandole e poi interrandole in fosse profonde circa 1 metro. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti, 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni!

MODALITA' DI IMPIEGO: l'**ISOFOS** si impiega alla dose di gr. 100-150 per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': l'**ISOFOS** è miscelabile con prodotti a reazione neutra.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il pesce, il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

TERRANALISI s.n.c. di MALAGUTI Dr. ENZO & C. - Via Donizzetti, 2/A - CENTO (FE).
Officina di produzione: TERRANALISI - RENAZZO (FE) Via IV Novembre.
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6355 **del** 16.5.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO Kg.**

(Conservare al riparo dal gelo)

6356

DAZAGRO

FUMIGANTE DISINFESTANTE DEL SUOLO CONTRO I FUNGHI TERRICOLI

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE

Dazomet puro	g. 83,3
Coadiuvanti ed inerti	q. b. a 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il DAZAGRO è efficace contro i nematodi parassiti delle piante (anguillule), i funghi parassiti, le infestanti mono e dicotiledoni e gli insetti che vivono nel terreno.

Il DAZAGRO agisce come disinfestante completo del terreno sostituendo vantaggiosamente il metodo della disinfezione con vapore.

MODALITA' DI IMPIEGO

Si incorpora il prodotto nella massa chiudendola con tela di plastica. Dopo 8 giorni togliere la copertura ed arieggiare con cura; il terricciato è pronto all'impiego dopo due-tre settimane da questa operazione.

DOSI DI IMPIEGO

In terreno aperto ed in serra Kg. 250/400 ettaro.
Per disinfezione terricciati g. 200 mc.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il DAZAGRO è miscibile a fertilizzanti granulari semplici e complessi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero della Sanità N. 6356 del 16.5.1985

BOLOGNA - S.p.A.

Prodotto fabbricato nello Stabilimento «DIACHEM S.p.A.» - di Albano S. Alessandro (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO **Sacchi plastica da Kg.**

6357

IV CLASSE

SILBORD COMBI

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA, CON EFFETTO COLLATERALE CONTRO LA MUFFA GRIGIA, L'ESCORIOSI, L'ALTERNARIA E LA SEPTORIA

Registrazione Ministero Sanità n. 6357 **del** 16.5.85

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Captafol puro	g 24
Rame metallico (sotto forma di solfato)	g 9
Cymoxanil	g 5
Coformulanti	q.b. a g 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con i prodotti puri o diluiti, ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie, possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua) e digitale.
AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il SILBORD COMBI è un formulato in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite, del pomodoro, del tabacco, e della patata con effetto collaterale verso altre malattie fungine di dette colture, caratterizzato dalla associazione di tre principi attivi.
Il Cymoxanil manifesta una pronta azione anticrittogamica ed un ottimo effetto bloccante in quanto penetra rapidamente all'interno dei tessuti vegetali, mentre il rame ed il Captafol possiedono una lunga persistenza d'azione.

Attività del Cymoxanil
— **Azione di contatto:** il Cymoxanil, prima di essere assorbito all'interno delle foglie, **impedisce** la germinazione delle spore come i tradizionali antiperonosporici di contatto.
— **Azione preventiva:** il Cymoxanil viene rapidamente assorbito dai tessuti vegetali e **blocca** le infezioni sul nascere, sfuggendo nel contempo al pericolo di dilavamento.
— **Azione bloccante post-infezione:** il Cymoxanil **arresta** lo sviluppo del fungo anche quando il micelio è già diffuso all'interno dei tessuti vegetali durante i primi 3-4 giorni del periodo di incubazione.
— **Azione eradicante:** il Cymoxanil, distribuito quando sono già presenti macchie di peronospora, **limita** la sporulazione del fungo riducendo il potenziale di infezione presente sulle colture.
Il SILBORD COMBI, oltre a combattere le peronosporacee ha una efficacia collaterale contro la muffa grigia, l'escoriosi, il marciume nero degli acini, il rossore parassitario delle foglie di vite e verso l'alternaria e la septoria della patata, del pomodoro, e del tabacco.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Contro la peronospora della vite il SILBORD COMBI si impiega alla dose di 200-250 g/Hl.
Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle infezioni peronosporiche e proseguirli secondo il calendario tradizionale.
Con andamento climatico normale trattare ogni 8-10 giorni. In caso di forte attacco o di rapido accrescimento della vegetazione l'intervallo può essere ridotto a 6-8 giorni.
Contro la peronospora del pomodoro, della patata e del tabacco, si impiega alla dose di 250-300 g/Hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il SILBORD COMBI si può impiegare in miscela con altri formulati ad eccezione dei prodotti a reazione alcalina ed olio bianco.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

Via di Tor Sapienza 172 - ROMA

Contenuto Kg.

6358

IV CLASSE

AVENCARB

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
PRODOTTO INDICATO PER IL DISERBO SELETTIVO
IN POST-EMERGENZA CONTRO AVENA SELVATICA
IN GRANO TENERO, ORZO E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Registrazione Ministero Sanità n. 6358 del 16.5.85

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Barban puro	g. 12
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

AVVERTENZA

Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto controlla le Avene selvatiche che nascono in colture di grano tenero, orzo e barbabietola da zucchero, quando queste hanno uno sviluppo compreso fra 1 e 2 foglie e mezzo. Oltre questo stadio il controllo diminuisce fino ad ottenere risultati non soddisfacenti.

Comunque il trattamento va effettuato entro lo stadio di 4 foglie per le colture di grano tenero ed orzo e non oltre i 30 giorni dall'emergenza per la barbabietola da zucchero. Irrorare la coltura quando essa è in pieno sviluppo vegetativo.

Il prodotto agisce per assorbimento e traslocazione per via fogliare.

Il prodotto possiede anche un'azione collaterale su Alopecurus e su Falaris quando la maggior parte di queste infestanti si trova nello stadio di 2 foglie.

Il prodotto non è influenzato dalla temperatura: si devono tuttavia evitare trattamenti su colture gelate o bagnate.

Dopo il trattamento eventuali leggeri sintomi di fitopatia scompaiono nel giro di 3-4 settimane.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

La giusta dose di prodotto va diluita in 2 hl/ha di acqua, avendo cura di bagnare uniformemente la coltura.

Dosi per trattamento unico:

— GRANO tenero:	2-2,5 lt/ha
— ORZO:	2,5-3 lt/ha
— BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	4-6 lt/ha

Dosi per trattamento doppio:

Qualora si volessero effettuare 2 trattamenti distanziati, le dosi indicate potranno essere dimezzate ed il secondo trattamento potrà essere effettuato con altro avenicida (Difenzoquat - Benzoylprop-ethyl - Diclofop-methyl) a dose ridotta.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Qualora si effettuassero trattamenti con pompe a volume ridotto il prodotto va diluito in 40-45 lt/ha di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con diserbanti a base di Difenzoquat, Benzoylprop-ethyl ed altri comunemente impiegati sulle stesse colture.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico su grano duro e su alcune varietà di orzo (Domen, Mari e Amsel).

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza 172 - ROMA

Contenuto Lt.

6359

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIAZINA PASTA

ERBICIDA IN PASTA LIQUIDA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DEL MAIS

Registrazione Ministero Sanità n. 6359 **del** 16.5.85

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Alachlor puro	g 27,0
Atrazina pura	g 11,6
Coformulanti (contiene cicloesanone)	q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

SIAZINA PASTA è una formulazione, appositamente studiata per il controllo delle malerbe del mais. Il prodotto agisce sulle infestanti, provenienti da seme, siano esse dicotiledoni o monocotiledoni, per assorbimento radicale sui semi in via di germinazione. Anche le malerbe resistenti ai derivati triazinici, quali Setaria spp., Digitaria spp., Echinochloa spp. sono perfettamente controllate dal prodotto.
Oltre alle malerbe predette, l'azione fitocida di SIAZINA PASTA si esplica anche su:

— Amaranthus spp., Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Echinochloa spp., Geranium spp., Matricaria spp., Mercurialis annua, Panicum dichotomiflorum, Plantago spp., Poa annua, Poligonum aviculare, Poligonum persicaria, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Sorghum halepense da seme, Stellaria media, Urtica spp., Veronica spp.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Per permettere alla SIAZINA PASTA di esprimere tutta la sua capacità di controllo sulle erbe infestanti, è di fondamentale importanza la perfetta preparazione del terreno su cui non devono rimanere zolle eccessivamente grosse che possono portare alla luce semi non raggiunti dal prodotto.
SIAZINA PASTA si applica in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, alla dose di 5 - 7 Kg/Ha impiegando la dose più alta quando si prevede una forte presenza di malerbe resistenti alle triazine o su terreno ad alto contenuto di sostanza organica.
Qualora lo si desideri il prodotto può essere localizzato solo sulla fila. In tal caso le dosi vanno proporzionalmente ridotte alla superficie trattata.

Preparazione della poltiglia:
Stemperare la SIAZINA PASTA in poca acqua e versare la poltiglia ottenuta nel quantitativo di acqua necessaria per distribuirlo.
E' consigliabile, per una sua perfetta distribuzione, non usare meno di 4 ql/Ha di acqua.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

AVVERTENZE

— Le colture di mais trattate con SIAZINA PASTA non possono essere consociate con altre coltivazioni.
— Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi o eccessivamente ricchi di sostanza organica, che annullerebbe l'efficacia del prodotto. Il letame, eventualmente distribuito, va perfettamente interrato prima del trattamento. L'efficacia del prodotto viene ridotta anche da spargimenti di liquame.
— Perchè il prodotto possa esercitare a pieno la sua azione, è necessario che entro due settimane dalla sua applicazione, cada una leggera pioggia, altrimenti provvedere con una irrigazione.
— Dal trattamento alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).
— Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto si usa da solo.

FITOTOSSICITA'

Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture vicine.
Si consigliano prove parcellari per varietà poco note o di recente acclimatazione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di
San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Contenuto Lt.

6360

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONE PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi, se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito.
Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'FERNIDE'

Fungicida acuprico in polvere bagnabile a base di Thiram, ad azione preventiva e curativa.

COMPOSIZIONE

Thiram puro . . . . g 49
Adesivanti, coadiuvanti, bagnanti, disperdenti q.b.a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 6360 **del** 23.5.85
'FERNIDE' marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

'FERNIDE' fungicida acuprico a base di thiram ad azione preventiva e curativa.

MODALITA' DI IMPIEGO
Campi di impiego e dosi (Riferite a 100 l di acqua)

COLTURA	PARASSITA	EPOCA	DOSE (g)
POMACEE	Moniliosi	Fine inverno	600-700
	Ticchiolatura	Pre-fioritura Fioritura Post-fioritura	25[illegible]00
		Dalla allegagione	200-300
	Maculatura fogliare del pero e del cotogno	Al primo manifestarsi della infezione	450-650
DRUPACEE	Ticchiolatura	In pieno riposo	500-700
	Bolla e Corineo	Caduta delle foglie	500-700
		Gennaio	
	Cancro dei rametti e Moniliosi	Fine inverno Pieno riposo	600-700
		Inizio ingrossamento gemme	
		Bottoni rosa	500
		Post-fioritura	200-300
VITE	Botrytis (muffa grigia)	Secondo i calendari o al primo manifestarsi della infezione.	400-500
POMODORO	Ticchiolatura Alternariosi		250-300
CETRIOLO	Peronospora		
FRAGOLA	Vaiolatura Botrytis		
ROSA	Peronospora. Ruggine. Ticchiolatura. Marciume dei bottoni fiorali		350-450
CICLAMINO GLADIOLO TULIPANO	Botrytis		
GAROFANO	Ruggine		650
SEMENZAI TALEE	Mal della tela Muffa parassitaria		250-350
TUBERI-BULBI		Prima della messa a dimora	450-650

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
E' compatibile con la maggior parte degli antiparassitari di normale impiego in formulazione polvere bagnabile.
E' incompatibile con prodotti a base di rame. La miscela con olii minerali deve essere fatta con cautela.
La miscela con 'FOSFERNO' e 'MEP' 20 deve essere fatta al momento dell'impiego con aggiunta di bagnante 'AGRAL' in ragione di 100 cc/hl.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Alcune cultivar di pero (ad es. la Butirra Clairgeau, il Trionfo di Vienna e la Contessa di Parigi) possono essere leggermente sensibili al prodotto.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

6361

Toterba 50-7-10

DISERBANTE TOTALE

COMPOSIZIONE

Dalapon puro	gr. 50
2,4-D puro (da sale sodico)	gr. 7
Simazina pura	gr. 10
Coadiuvante q.b. a	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO DI INTOSSICAZIONE

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Tenere il prodotto lontano dall'acqua destinata ad usi domestici o irrigazioni. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE

Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea vertigini - convulsioni - coma.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

CONTROINDICAZIONI

E' sconsigliata la digitale.

AVVERTENZE

Consultare un centro antiveleni

E' un erbicida in polvere bagnabile ad azione polivalente verso ogni forma di vita vegetativa. Agisce per via fogliare penetrando sulle radici necrotizzandole; distrugge tutte le erbe infestanti e le piante già sviluppate prevenendo ogni reinfestazione per tutta l'annata vegetativa. Per il diserbo totale di bordi stradali, viali, cortili, aree industriali, sedi ferroviarie, campi da tennis.

USO E DOSI

Kg. 20 per Ha in primavera quando le infestazioni sono in pieno sviluppo vegetativo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va usato da solo.

FITOTOSSICITA'

Evitare che il Toterba 50-7-10 venga a contatto con piante ortive, vite, ornamentali, arbusti, alberi ed altre colture, anche sottoforma di vapori portati dal vento. Usare sempre la stessa pompa per l'uso di TOTERBA 50-7-10 e non usarla per fertilizzanti, insetticidi e disinfettanti, ricordandosi di lavarla accuratamente dopo l'uso.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE

Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGROZOOFARMA s.r.l. - Via Lavariano, 15 - MORTEGLIANO (Ud)
Officina di produzione: AGROZOOFARMA s.r.l. - via Lavariano, 15 MORTEGLIANO

Registrazione Ministero Sanità n. 6361 del 16.5.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Confezione da gr.

6362

IV CLASSE

SILBORD P.B.

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE A LUNGA PERSISTENZA

Registrazione Ministero Sanità n. 6362 del 16.5.85

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Captafol puro	g 24
Rame metallico (sotto forma di solfato)	g 9
Coformulanti	q.b. a g 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con i prodotti puri o diluiti, ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie, possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmie.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua) e digitale.
AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il SILBORD PB è una formulazione caratterizzata da un'alta efficacia e persistenza, in grado di controllare numerose malattie delle piante.
La sua efficacia, unitamente alla sua perfetta selettività sulla vegetazione, rende particolarmente interessante il suo impiego nella difesa delle colture dalle crittogame parassite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

— Bolla del pesco e del mandorlo, gommosi e cancro delle drupacee: 500-600 g/Hl per i trattamenti al bruno e 350 g/Hl per i trattamenti al verde
— Occhio di pavone dell'olivo: 400-500 g/Hl.
Effettuare 2 trattamenti:
Il 1° in pre-fioritura ed il 2° ai primi di Settembre.
Con andamento stagionale piovoso, il 2° trattamento dovrà essere anticipato di 2-3 settimane.
— Cancri del legno del melo e del pero: 400 g/Hl, da applicarsi nella fase di « orecchiette di topo » per il melo e di « mazzetti affioranti » per il pero.
A questo primo trattamento dovranno seguirne altri due, di cui il primo all'inizio della caduta delle foglie ed il secondo a defogliazione completa.
— Concia secca delle sementi: applicare 400 g/q.le per grano, orzo, avena, segale.
Il prodotto è efficace contro le principali malattie trasmesse dal seme, quali: carie, elmintosporiosi e mal del piede.
— Altre malattie che si combattono con il SILBORD PB:
Muffa grigia e Peronospora della vite, 240-300 g/Hl, (sulle uve bianche il prodotto può dar luogo, in alcuni casi, a fenomeni fitotossici sugli acini se impiegato nel periodo che segue immediatamente la fioritura); Ticchiolatura del melo e del pero 150-300 g/Hl; Marciume bruno dell'albicocco, del ciliegio e del mandorlo, 500 g/Hl nei trattamenti al « bruno », 200-300 g/Hl nei trattamenti al « verde »; Ruggine del pesco e del susino 300 g/Hl; Cilindrosporiosi del ciliegio 200 g/Hl; Allupatura e Melanosi degli agrumi 300 g/Hl; Gommosi del colletto degli agrumi mediante pennellature con una sospensione al 10%; Peronospora e Ticchiolatura della rosa 200 g/Hl; Ruggine del garofano 300 g/Hl; Muffa grigia della fragola 400 g/Hl; Peronospora, Alternariosi, Septoriosi del pomodoro 300-400 g/Hl; Peronospora e Alternariosi della patata 400 g/Hl; Alternariosi del pero 150 g/Hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SILBORD PB è compatibile con la generalità dei fungicidi, insetticidi ed acaricidi in commercio. Da escludere le miscele con prodotti a reazione alcalina e con gli olii.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa mantovana) e di pero (Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dr. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU UVE DA VINO E 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A. **Contenuto Kg.**

prodotto nello stabilimento di

SIAPA S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

6363

MANEB 80

FUNGICIDA

Composizione:

Maneb puro . . . g. 80
Coformulanti . . q.b. a g. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
AVVERTENZA: Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: attivo per contatto ed assorbimento fogliare con possibilità di spostamenti citotropici.

Campi d'impiego e dosi (per 100 litri d'acqua):

— **Vite:** g. 250 peronospora.

— **Melo e Pero:** g. 250-280 per ticchiolatura.

— **Pomodoro solo fino alla prima fioritura:** g. 200-250 per peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi.

— **Pioppo:** g. 400 per marsonnina e ticchiolatura.

— **Tabacco:** g. 60-80 in semenzaio, g. 200 in pieno campo per peronospora tabacina.

— **Garofano:** in pieno campo g. 200-250 per ruggine.

Epoche d'impiego: per trattamenti preventivi secondo i normali calendari adottati, ripetendo pertanto ad opportuni intervalli in funzione dell'infestazione e a seconda dell'andamento stagionale.

Metodi d'impiego: distribuire il prodotto nella quantità sufficiente e in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione. Si consiglia di aggiungere g. 100 di Bagnante Agricolo per ogni 100 litri di miscela.

Da non applicare con mezzi aerei.

Divieto d'impiego in serra.

Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari, salvo quelli a reazione alcalina. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle varietà di pero sensibili al Maneb quali ad esempio: Abate Fêtel, Armella, Butirra precoce, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di pero, prima dell'applicazione a pieno campo, saggiare la selettività del formulato su alcune piante.

Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale ... assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RAFFINERIE AIMAGIA' S.p.A. Legalmente Domiciliata presso curatore Avv. Dante De Angelis- Via Alberoni 24- Ravenna

Kg.

...bilimento produttore: LABORATORI CHIMICI CIFA ...avaggio (BG)

...istrazione Ministero della Sanità n. 6363 **del** 16.5.85

6364

GRA NONET(R) DM

Diserbante selettivo per trattamenti di post-emergenza su colture di cereali (Frumento e Orzo) formulato in pasta liquida.

COMPOSIZIONE		
- Chlortoluron . puro	g	25
- DNOC puro (da sale ammonico)	g	18,4
- Mecoprop puro (da sale potassico)	g	15
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM—Milano

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

I CLASSE

VELENO

Registrazione n. 6364 del 16.5.85 Ministero della Sanità

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali; conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua; evitare di respirare i vapori; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle e gli occhi; durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi, dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

Sintomi d'intossicazione: Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertemia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5% . Emetici e catartici se il paziente é cosciente.
Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertemia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o Fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.
Controindicazioni: Atropina.

Consultare un Centro antiveleni e nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza delle infestanti e delle colture di cereali (Frumento e Orzo) alla dose di 5—7 lt/ha.
Si impiega in particolare per il controllo dell'Avena selvatica alla dose di 7-8 lt/ha e dell'Alopecurus myosuroides (oltre che delle infestanti a foglia larga) alla dose di 5-6 lt/ha, se trattati quando sono in stadio di germinello fino alla fase di 2-3 foglie al più tardi.
Il prodotto si impiega non prima che la coltura abbia raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere sino a metà della fase di accestimento.
Il prodotto combatte la maggior parte delle erbe infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali ad eccezione di tutte le graminacee perennanti o di quelle sviluppate oltre lo stadio di 3-4 foglie.
Non trattare con temperature inferiori a 10° C o superiori a 25° C.
Per la presenza del DNOC, il prodotto presenta un benefico effetto secondario nei riguardi delle malattie crittogamiche dei cereali nei primi stadi di sviluppo.

Preparazione della poltiglia: versare la prestabilita dose di prodotto nel totale quantitativo di acqua miscelando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto é miscibile con i più comuni diserbanti di impiego su cereali. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per assicurarsi che i prodotti che si vogliono associare non presentino incompatibilità tra gli eccipienti.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità: il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutta, ortaggi, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento. Non trattare le varietà di frumento tenero DEMAR 4 e frumento duro KID sensibili al prodotto.
Consultare tecnici qualificati, prima di trattare con il prodotto varietà di frumento duro, in genere più sensibili.

Rischi di nocività: Il prodotto é tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione; da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso é pericoloso.

Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso g .

SIPCAM

6365

FENTIN ACETATO ALMAGIA'

ANTICRITTOGAMICO PER BARBABIETOLA E SEDANO IN FORMULAZIONE POLVERE BAGNABILE

I CLASSE

VELENO

Composizione:

FENTIN ACETATO puro . . . g. 18

Coformulanti . . q.b. a g. 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 3-8-1968 N. 1255.

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione: cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzone urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie o paralisi) - dermatosi.

Consigli terapeutici:
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale - terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un cento antiveleni.

Campi d'impiego: Il prodotto è un fungicida organometallico ad azione principalmente preventiva. S'impiega sulle seguenti colture e contro le seguenti malattie:

— **Cercospora della barbabietola:** effettuare trattamenti a scopo preventivo (o comunque al primo manifestarsi della malattia) alla dose di gr. 200-300/hl (g. 1,2-1,8/ha in 500-600 litri d'acqua). Eseguire 2-3 trattamenti alla distanza di 2-3 settimane l'uno dall'altro.

— **Septoria del sedano:** effettuare trattamenti a scopo preventivo (o comunque al primo manifestarsi della malattia) alla dose di gr. 300 ogni 100 litri d'acqua. Ripetere i trattamenti alla distanza di 15 giorni l'uno dall'altro.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con gli antiparassitari di uso primaverile-estivo ad eccezione di quelli alcalini e con i formulati oleosi. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è tossico per i pesci, gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio delle preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

RAFFINERIE ALMAGIA' S.p.A.
Legalmente domiciliato presso
curatore Avv.Dante De Angelis
Via Alberoni, 24
RAVENNA

Stabilimento produttore: LABORATORI CHIMICI CIFA CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità N. 6365 **del** 16.5.85

6366

CAPTAN 50

FUNGICIDA

Composizione:

Captano puro . . g. 50

Coformulanti . . q.b. a g. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

IV CLASSE

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua) e digitale.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: attivo per contatto ed assorbimento con penetrazione citotropica.

Colture protette: Arboree da frutto (pomacee, drupacee e agrumi), Vite, Barbabietola da zucchero. Orticole (Melanzana, Patata, Peperone, Pomodoro, Fragola, Carota, Sedano, Fagiolo, Cetriolo, Melone, Cocomero, Radicchio, Cipolla). Ornamentali e da fiori industriali. Disinfezione della patata da seme, bulbi, tuberi. Disinfezione del terreno.

Malattie e parassiti combattuti. Nei vegetali: Ticchiolatura, Bolla, Corineo, Sclerotinia, Peronospora, Botrytis, Cercospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi. Nel **terreno**: Rhizoctonia, Phytophtora, Pythium, Fusarium.

Concentrazioni e dosi d'impiego. Trattamenti fogliari, alla dose di g. 250-300/hl d'acqua; trattamenti al terreno, g. 250/hl d'acqua; trattamenti patata da seme, alla dose di g. 50 in 10 litri d'acqua; trattamenti ai bulbi, g. 100 in 10 litri d'acqua.

Epoche d'impiego: Trattamenti a carattere preventivo o alla prima comparsa della malattia. Ripetere il trattamento in funzione dell'infestazione e a seconda dell'andamento stagionale.

Metodi d'impiego: Il prodotto va stemperato a parte in poca acqua e poi vuotato nel totale quantitativo di liquido. Va distribuito in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione. Nei trattamenti al terreno s'impiega un litro di soluzione per ogni metro quadro. Nei trattamenti ai bulbi e tuberi, s'immergono gli stessi per alcuni minuti nella sospensione, lasciando poi sgocciolare e asciugare all'aria. I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana né del bestiame.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con oli e con zolfi; la sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di oli e zolfi. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 GIORNI prima del raccolto; 40 GIORNI per le uve da vino.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epocre e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

RAFFINERIE ALMAGIA' S.p.A.
Legalmente domiciliato presso
curatore Avv.Dante De Angelis
Via Alberoni, 24
RAVENNA

Stabilimento produttore: LABORATORI CHIMICI CIFA
Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 6366 **del** 16.5.85

6367

FONOFOS 5 AGRICO

INSETTICIDA GRANULARE PER IL TERRENO

Composizione:

FONOFOS puro . . gr. 4,5
Coformulanti . . q.b. a gr. 100,0

I CLASSE

VELENO

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del formulato, il suo impiego deve essere effettuato esclusivamente dal personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 N. 1255.

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere, ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche: insetticida per la lotta contro gli insetti del terreno ad azione per contatto ed ingestione. **Combatte:** insetti terricoli quali elateridi, grillotalpa, grilli, larve di maggiolino, tipule, oziorrinco, bacherozzo, zabro gobbo.

MODALITA' D'APPLICAZIONE E CAMPI D'IMPIEGO:

a) **per applicazione localizzata con microgranulatori nel solco di semina del mais:** kg 6-8/ha con trattamento localizzato lungo le file.
b) **per applicazione generalizzata a pieno campo prima della semina o del trapianto a pieno campo:** kg. 60-80/ha per **cereali** (grano, sorgo), **leguminose da foraggio** (erba medica), **barbabietola da zucchero, tabacco, colture ortive** (cipolla, aglio, porro, asparago, bietola da costa, fagiolo, pisello, carota, sedano, finocchio, cicoria, lattuga, indivia, ravanello, rapa, cavolo, pomodoro, patata).
Il prodotto può essere distribuito, in pieno campo, a mano o meccanicamente cercando di distribuirlo il più uniformemente possibile su tutta la superficie da trattare. Incorporare poi il prodotto nel terreno con una erpicatura o fresatura. In caso di trattamenti a terreni destinati a frumento si può miscelare la quantità di seme necessaria/ettaro con kg. 20 di prodotto.

Epoche d'impiego: nell'applicazione localizzata mediante microgranulatori il prodotto va impiegato al momento della semina. Per i trattamenti a pieno campo il prodotto va impiegato prima della semina o del trapianto.

Eseguire il trattamento 3 mesi prima della semina su terreni destinati alla coltura della carota. Nel caso di cipolla, cavolo e ravanello, il prodotto va impiegato solo sulle colture destinate alla produzione del seme.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto va usato da solo.

Fitotossicità: si sconsigliano trattamenti localizzati su tabacco, barbabietola da zucchero, ravanello e cavolo.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame, selvaggina e volatili in genere.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

AGRICO s.r.l.
Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore: SARIAF S.p.A. - FAENZA (Ravenna)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6367 **del** 16.5.85

6368

FOLPET 50

FUNGICIDA

Composizione:

Folpet puro . . . g. 50
Coformulanti . . q.b. a g. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

IV CLASSE

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazicne: Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Consigli terapeutici: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua) e digitale.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche: Fungicida ad azione principalmente preventiva; è dotato di notevole persistenza d'azione.

Parassiti combattuti, Colture protette e Dosi d'impiego:

Viticoltura: contro Peronospora e Botrytis della **Vite** alla dose di g. 200-250/hl.
Colture ortive: contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Botrytis, Septoria del **Pomodoro, Patata, Melanzana, Cocomero, Melone**; contro Botrytis e Vaiolatura della **Fragola**; alla dose di g. 150-200/hl.
Colture arboree da frutto: contro Bolla, Sclerotinia, Corineo delle **Drupacee**; Ticchiolatura delle **Pomacee**; alla dose di g. 200-250/hl.
Colture industriali di fiori e piante ornamentali: contro Ticchiolatura e Peronospora della **Rosa**; Septoria del **Crisantemo**; Septoria e Botrytis delle **Bulbose**; alla dose di g. 150-200/hl.
Disinfezione del terreno in semenzaio e vivaio: contro Pythium, Fusarium, Phytophtora, Rhizoctonia, innaffiare con 1/2 litro per metro quadro di sospensione contenente 300-400 g/hl.
Disinfezione dei bulbi, tuberi, rizomi, radici: contro le stesse infezioni, immersione per 20 minuti in sospensione contenente 1 kg/hl, per le barbatelle 400 g/hl.

Epoche e modalità d'impiego: Il prodotto viene impiegato a scopo preventivo, seguendo il calendario d'incubazione delle malattie. **Sulle uve da vino i trattamenti debbono essere sospesi 40 giorni prima della vendemmia**, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
S'impiega bagnando con uniformità le superfici vegetali da proteggere.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco. ATTENZIONE: **Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e prodotti a base di zolfo.** AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto è fitotossico per il **pero Butirra d'Anjou.** Per i meli non deve essere usato dopo la fioritura perché può manifestare fitotossicità.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per gli insetti utili e per i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto; 40 giorni sulle uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

AGRICO s.r.l.
viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore: SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)

Registrazione Ministero Sanità n. 6368 **del** 16.5.85

6369

BASTOP

Diserbante in polvere bagnabile a base di simazina

Composizione:

Simazina pura	g 50
Coadiuvanti ed inerti	q.b. a g. 100

CLASSE IV

A BASLINI

Baslini - Industrie Chimiche S.p.A.

20122 Milano
Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782

Officina di produzione:
VISPLANT-CHIMIREN S.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 6369 **del** 6.5.85 **del Ministero della Sanità**

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

« ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il BASTOP è un erbicida a carica residua, caratterizzato da un vasto spettro d'azione e da lunga persistenza nel terreno. Agisce per assorbimento radicale e in minor misura, per via foliare. È indicato per il controllo delle monocotiledoni e dicotiledoni annue in trattamenti di pre-emergenza. Sfuggono normalmente alla sua azione diserbante il Romice, l'Artemisia, il Convolvolo e la Gramigna (Cynodon).
Viene indicato per il diserbo delle seguenti colture:
Melo, pero, agrumi, olivo: Kg. 2-6/ha.
Rose, lampone, ribes: 2-4 Kg/ha.
Vivai di piante arboree: 2-4 Kg/ha.
Asparago: (su colture di almeno 2 anni) 3-4 kg/ha (alla rincalzatura o dopo raccolta turioni).
Mais: Kg. 3-4/ha.
Diserbo canali, sponde e ripe: 5-10 Kg/ha.
Diserbo totale industriale: 10-40 Kg/ha. Impiegare a primavera prima dell'emergenza delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: Il BASTOP è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta; a dosi elevate lo può essere per roseti, ribes, more e lamponi per cui è necessario effettuare prove preliminari per stabilire il grado di tolleranza delle colture.

Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.

NON RIPETERE IL TRATTAMENTO PRIMA DI 12 MESI.

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO

Kg.

6370

PERSICANE PB 50

COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI
gr. 42,5 ACEPHATE puro
Coformulanti q.b. a grammi 100.

CLASSE III
"ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA"

Aficida-insetticida per il controllo degli insetti che colpiscono le drupacee, pomacee, agrumi, fragola, vite, olivo, mais, barbabietola, tabacco, colture floreali in pieno campo, patata, cavoli, carciofi, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, legumi, ortaggi a radice. Il PERSICANE PB 50 è un insetticida organico ad azione di superficie e citotropica, particolarmente attivo per contatto ed ingestione su Lepidotteri ed Emitteri.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita ed ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc., somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Diluire il prodotto in poca acqua a parte, versando poi nel totale quantitativo d'acqua, agitando con cura.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Drupacee: contro Afidi, Anarsia, Tripidi	120 g/hl
Pomacee, Agrumi, Ortaggi (asparago escluso) quali cavoli, carciofo, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, ortaggi a radice, legumi, **Fiori in pieno campo:** contro afidi	100-120 g/hl
Tabacco, Patata, Barbabietola da zucchero: contro afidi	0,8-1,2 kg/ha
Pomacee: contro ricamatrici (Capua, Eulia, Archips, Cacoecia, Pandemis) alla comparsa prime larve	120-150 g/hl
contro verme delle mele (Carpocapsa)	120-150 g/hl
Drupacee: Tignola del pesco (Anarsia)	120-150 g/hl
Vite: Tignole (Clysia a.; Polychrosis b.)	80-120 g/hl
Olivo: contro Cocciniglia (mezzograno di pepe, Saissetia oleae)	100-150 g/hl
contro Mosca (Dacus o.)	80-120 g/hl
contro Tignola (Prays o.)	80-120 g/hl
Agrumi: contro Cocciniglie (Saissetia, Ceroplastes, Coccus, Icerya)	80-120 g/hl
Ortaggi (asparago escluso): cavoli, carciofo, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, ortaggi a radice, **legumi:** contro Nottue (Agrotis sp., Plusia g., Mamestra sp.)	120-150 g/hl
Fragola: contro Tortricidi della fragola (Ancylis c., Choristoneura l.)	120-150 g/hl
Garofano ed altre colture floreali in pieno campo: contro Nottue, Afidi, Tortricidi, Tripidi, Mosche minatrici	100-150 g/hl
Barbabietola da zucchero: contro Mosca (Pegomya b.)	0,8-1,2 kg/ha
Mais: contro Piralide (Ostrinia u.)	1,2-1,5 kg/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con la maggior parte dei soliti insetticidi e fungicidi in uso, esclusi i prodotti alcalini. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Su colture di fruttiferi, evitare di effettuare trattamenti ravvicinati a più di 15 giorni. Su pesco interrompere gli interventi nei mesi estivi ed eseguire preventivamente saggi varietali su piccola scala ed evitare interventi prima dell'indurimento del nocciolo sulle varietà più delicate. Alcune varietà di garofano sono pure sensibili al prodotto: eseguire saggi preliminari.
RISCHIO DI NOCIVITA': Non impiegare in fioritura perchè nocivo per le api ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta sulle colture indicate, ad eccezione delle pomacee ed olivo, per le quali va rispettato un intervallo di 30 giorni.

"Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso"
"Chi impiega il prodotto, è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato".
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

J. & A. MARGESIN S.p.A. - Fitofarmaci - Lana d'Adige (BZ)
Officina di produzione: Lana d'Adige (BZ)
Registrazione Ministero della Sanità N° ..6370. del .16.5.85.........
DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO: KG.

|10|84|AD|1| |

6371

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'FUNGOKILL'

Fungicida sistemico in polvere bagnabile per la lotta preventiva e curativa contro diverse malattie delle piante in frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino), cerealicoltura (frumento), viticoltura e floricoltura.

COMPOSIZIONE

Carbendazim puro	g 50
Coadiuvanti, inerti	q.b.a g 100

CLASSE IV

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - CRESPELLANO (Bologna)
Registrazione Ministero della Sanità n. 6371 **del** 16.5.85
'FUNGOKILL' - marchio registrato ICI Solplant S.p.A.

CARATTERISTICHE
'FUNGOKILL' è un fungicida in polvere bagnabile a persistente azione preventiva e curativa con potere sistemico.

MODALITA' DI IMPIEGO

CAMPI D'IMPIEGO coltura	parassita	EPOCA	DOSI (per 100 l acqua)
Melo e Pero	Ticchiolatura	Pre-fioritura	g 80-100
	Oidio o Gloesporium	Post-fioritura	g 50- 60
		Successivamente: Primavera: ogni 7 gg Estate ogni 10-15 gg	g 50- 60
Pesco	Monilia dei rami e dei fiori	1° inizio fioritura 2° dopo 10 giorni	
Albicocco Susino	Monilia dei frutti	1° 30 giorni prima della raccolta 2° 15 giorni prima della raccolta	g 50-100
Vite	Botrytis	1° Pre-fioritura 2° Chiusura del grappolo 3° Invaiatura 4° 2-3 settimane prima della raccolta	g 50-100
Su varietà a maturazione precoce è possibile trascurare il 3° trattamento In condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia eseguire altri interventi oltre quelli consigliati. Non influenza la fermentazione del mosto			
Frumento	Fusariosi Cercosporella Oidio Mal del piede	Tra la levata e la spigatura	kg 0,5-1/ha
Rosa Ornamentali	Oidio Botrytis	Trattamento preventivi ogni 10-14 giorni	g 100
In condizioni di rishio maggiore (intensa attività vegetativa, clima umido) ogni 7-10 giorni			
Bulbose	Fusariosi Botrytis Penicillium Sclerotinia	Prima della semina Trattamento preventivo per immersione dei bulbi di 20-30 minuti	g 300
Garofano	Phialophora	Pre-trapianto(*)	g 200
		Post-trapianto (**)	g 1-2 per m²

(*) Immergere le talee per 8-10 ore
(**) Applicare la dose con 2-10 litri per metro quadro ogni 20-30 giorni iniziare 2-3 giorni dopo il trapianto se non è stato fatto il trattamento per immersione delle talee altrimenti dopo 15 giorni

METODO - Irrorazione a qualunque volume.

Avvertenze: le dosi prescritte si riferiscono ad applicazioni a volume normale (12-15 hl/ha). Nel caso di trattamenti a volume ridotto (atomizzatori) la dose di 'FUNGOKILL' dovrà essere proporzionalmente aumentata in maniera da applicare sull'ettaro la stessa quantità di prodotto che si applicherebbe a volume normale.
Per limitare l'insorgenza di ceppi resistenti si consiglia di non usare il 'FUNGOKILL' in modo continuativo da solo, ma di intervallare i trattamenti con altri fungicidi aventi differente modalità d'azione, o di usarlo in miscela con uno dei suddetti fungicidi. Nelle zone o località ove si rilevi la presenza di ceppi fungini resistenti ai benzimidazolici si sconsiglia l'impiego di tali fungicidi.

MEZZI - Attrezzatura irrorante di qualunque tipo.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'
La miscela con altri prodotti dovrà essere effettuata poco prima dell'irrorazione
'FUNGOKILL' è compatibile con la maggior parte dei fungicidi ed insetticidi attualmente in commercio. Non è invece miscibile con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali pres[illegible]e per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di in[illegible]ssivazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
- **melo, pero, pesco, albicocco, susino, vite: 15 giorni**
- **frumento: 30 giorni**

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

g

6372

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

ICI

'MILGO' COMBI

Fungicida sistemico liquido per la difesa del frumento

COMPOSIZIONE

Ethirimol puro	g 15,17
Carbendazim puro	g 15,17
Coformulanti	q.b.a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n° 6372 **del** 16.5.85
'MILGO' marchio registrato - Imperial Chemical Industries PLC

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

'MILGO' COMBI è un funghicida ad azione preventiva e curativa, per la difesa contro le malattie del frumento sottoindicate, a base di due principi attivi:
- l'Ethirimol che specificamente agisce contro il mal bianco (oidio, nebbia),
- il Carbendazim che pur esplicando una notevole attività contro il mal bianco, controlla gli agenti della Fusariosi e del mal del piede, dell'Alternariosi e del Cladosporium.

'MILGO' COMBI, prontamente assorbito dai tessuti, trasloca nell'intera pianta. Non viene dilavato. Assicura la protezione per almeno 20 giorni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Epoca: nei periodi di tempo che vanno dall'accestimento alla prima comparsa dei sintomi e dalla emissione della penultima foglia in poi.

Dosi: 1,250 - 1,500 kg/ha.

Mezzi: Irroratrice ad alto volume, portata o trainata, munita di barra la più lunga possibile e ugelli a cono aperto.

Metodo: Irrorazione a tutto campo tale da assicurare la bagnatura completa di foglie e steli.

Avvertenza: 'MILGO' COMBI non deve essere impiegato nelle zone dove si è rilevata la presenza di ceppi dei funghi sopraindicati resistenti ai benzimidazolici.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con i fungicidi e gli insetticidi in formulazione liquida comunemente usati contro le malattie e gli insetti dei cereali.
E' anche compatibile con i diserbanti ormonici selettivi (a base di MCPA e 2,4-D).
Non è miscibile con prodotti alcalini come poltiglia bordolese calce e polisolfuri.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg

6373

IV CLASSE

FUSACIDE

(PASTA FLUIDA)
FUNGICIDA SISTEMICO A LARGO SPETTRO D'AZIONE
EFFICACE CONTRO NUMEROSE MALATTIE FUNGINE
DELLE PIANTE FLOREALI IN PIENO CAMPO

Registrazione Ministero Sanità n. 6373 **del** 16.5.85
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Tiabendazolo puro *	g. 41,8
— Coformulanti	q.b. a g. 100

* p.a. della Merck Sharp and Dohme.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Grazie alle caratteristiche del p.a. il FUSACIDE viene prontamente assorbito dalle piante per via fogliare e radicale, permettendo quindi il controllo di numerose malattie fungine.

Per la sua azione sistemica è raccomandato per prevenire, curare o controllare, in un gran numero di colture floricole, le malattie causate da Fusarium spp., Colletotrichum spp., Verticillium spp., Thielaviopsis spp., Septoria spp., Sclerotinia spp., Rhizoctonia spp., Botrytis spp..

Il prodotto viene consigliato per la disinfezione degli organi di moltiplicazione delle piante e per la difesa della parte aerea delle colture floricole in pieno campo.

DOSI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Garofano, rose, colture floreali in genere: contro le Tracheomicosi effettuare il primo intervento, trascorsa la crisi di trapianto, mediante irrigazione facendo in modo che vengano distribuiti g 3 di FUSACIDE per metro quadrato di superficie coltivata. Successivamente si ripeteranno i trattamenti fino a 6-8 volte nel corso del ciclo colturale, alternando le irrigazioni con innaffiature con le stesse dosi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti i fungicidi e gli insetticidi di comune impiego.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura con esclusione di colture destinate all'alimentazione, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

contenuto Kg.

6374

EFFE ESSE

Erbicida liquido per usi industriali

COMPOSIZIONE

- 2,4 - DP puro (sotto forma di sale potassico)		g 13,75
- Picloram puro (sotto forma di sale triisopropanolaminico)		g 2,28
- 2,4 - D puro (sotto forma di sale triisopropanolaminico)		g 8,46
- Simazina puro		g 15,2
- Emulsionanti, solventi	q.b. a	g 100

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.*
- *Conservare la confezione ben chiusa.*
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
- *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
- *Non operare contro vento*
- *Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

CONSIGLI TERAPEUTICI: Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di [illegible]nidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

CONTROINDICAZIONI: è sconsigliata la digitale.

CARATTERISTICHE

L'EFFE ESSE è una formulazione erbicida completa studiata per il disebo delle sedi ferroviarie e delle aree industriali (viali piazzali di stabilimenti e stazioni ferroviarie, margini stradali, linee ferroviarie). L'ESSE EFFE, oltre a distruggere per assorbimento radicale e fogliare le infestanti graminacee e dicotiledoni, esplica una spiccata azione decespugliante e mantiene una prolungata attività residua.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

La dose d'impiego dell'EFFE ESSE è di 30 litri/ha (3 cc/mq) in 1000 litri di acqua.

EPOCA DI IMPIEGO

L'applicazione va eseguita quando le infestanti sono in gran parte già fuoriuscite dal terreno e raggiungono un'altezza di almeno 10-20 cm.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ: L'EFFE ESSE è compatibile con la generalità dei diserbanti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Da non impiegare su colture agrarie ed ornamentali in quanto fitotossico. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli ortaggi, gli alberi da frutta ecc. Evitare, pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ: L'EFFE ESSE è tossico per gli animali domestici, il bestiame, i pesci.

ATTENZIONE: Da non usare su terreni destinati a colture alimentari.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RUMIANCA

AnicAgricoltura S. p. A.

VIA RUGGERO SETTIMO, 55 - PALERMO

Officina di Produzione: SARIAF S.p.A.
Stabilimento di Faenza - Ravenna

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6374 del 6.5.1985

DA NON VENDERSI SFUSO

6375

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

PROTAL

Erbicida selettivo per il diserbo
della cipolla

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di Chlorthal - Dimethyl puro
gr. 20 di Propachlor puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il PROTAL è un erbicida selettivo di pre-emergenza per la cipolla, dotato di ampio spettro di attività.

Possiede un'azione antigermogliante sui semi delle infestanti annuali sensibili impedendone lo sviluppo.

Pertanto non esplica azione sulle infestanti già nate e sui loro semi già germogliati.

Spettro d'azione

a) **Infestanti annuali sensibili:**
Monocotiledoni: Alopecurus, Digitaria, Poa annua, Setaria.
Dicotiledoni: Amaranthus, Chenopodium, Papaver, Portulaca, Stellaria, Senecio, Solanum, Veronica, Viola.

b) **Infestanti annuali medio resistenti:**
Anagallis, Capsella, Euphorbia, Fumaria, Matricaria, Poligonum spp.

c) **Infestanti annuali resistenti:**
Raphanus, Sinapis.
Sono resistenti inoltre le infestanti perenni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il PROTAL va distribuito immediatamente dopo la semina della coltura.
Il terreno, prima del trattamento, deve essere ben lavorato, sminuzzato, livellato, ripulito da erbacce, e deve avere un sufficiente grado di umidità. Se si opera in terreno asciutto è opportuno effettuare un'irrigazione entro 8-10 giorni dal trattamento.

Dosi per ettaro:

- terreni filtranti, sciolti, sabbiosi: Kg. 12/hl d'acqua;
- terreni di medio impasto: Kg. 14/hl d'acqua;
- terreni pesanti, argillosi: Kg. 18/hl d'acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua, indi versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Evitare durante il trattamento che lo spruzzo giunga su colture vicine.

AVVERTENZE

Effettuare il trattamento in giornate senza vento.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.88

STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 6375 **Ministero della Sanità del** 6.5.85

12/84

`6376

ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP

COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI
gr. 14,4 Polisilossano puro
Coformulanti q.b. a 100.

CLASSE IV

Antischiuma per poltiglie antiparassitarie e diserbanti.

NORME PRECAUZIONALI
- *Conservare questo prodotto chiuso in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici*
- *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua*
- *Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Introdurre la quantità necessaria di ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP nel serbatoio contenente la poltiglia antiparassitaria o erbicida.

DOSE D'IMPIEGO
120 cc sono sufficienti per 8.000 - 9.000 litri d'acqua. Le dosi dipendono dalla quantità di schiuma presente nel serbatoio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'
L'ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP è miscibile con tutti gli insetticidi, fungicidi e diserbanti in uso.

AVVERTENZA: Rispettare il periodo di carenza del prodotto aggiunto all'ANTISCHIUMA SCHAUMSTOP. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i pp.aa. aggiunti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

"Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto, è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

J. & A. MARGESIN S.p.A. - Fitofarmaci - LANA D'ADIGE (BZ)

Sede e stabilimento: Lana d'Adige (BZ)

REGISTRAZIONE N° 6376 ***DEL*** 6.5.85 ***DEL MINISTERO DELLA SANITA'***

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto:

|12|84|AD|1| |

6377

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

R6 ERRESEI SISTEM DAC 44-12 BLU

**Fungicida sistemico per la lotta contro
la Peronospora della vite
Polvere bagnabile**

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 44 di Fosetyl di alluminio puro
Gr. 12 di Clortalonil puro
Adiuvanti e coloranti q.b. a 100

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione complementare sull'Escoriosi.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

PERONOSPORA
Dose: gr 250-300/hl.
Il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Non è raccomandabile la miscela con formulazioni liquide.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 66
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 6377 **del Ministero della Sanità del** 6.5.85

Peso netto kg.

6/83

6378

IV CLASSE

RIZOLEX® FIORI

(POLVERE BAGNABILE)
FUNGICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA RHIZOCTONIA E CORTICIUM DEL TERRENO

Registrazione Ministero Sanità n. 6378 del 6.5.85

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

— Tolclofos-metil puro	g. 50
— Coformulanti	q.b. a g. 100

® Marchio registrato della Sumitomo Chemical - Giappone

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il RIZOLEX FIORI è un fungicida in grado di controllare gli attacchi di Rizoctoniosi (Rhizoctonia solani) ed i marciumi radicali portati da Corticium rolfsii in varie colture floreali quali: rose, garofani, crisantemi, gerbera, fresia, lilium e bulbose varie.

Il RIZOLEX FIORI possiede nei confronti dei patogeni suddetti una azione fungicida notevolissima, controllando efficacemente anche ceppi di Rhizoctonia solani e Corticium rolfsii resistenti ai comuni fungicidi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato sia in pre-semina che in post-semina, oppure nel caso di colture che si propagano per via vegetativa (talea, rizoma, tubero o bulbo) in pre o post-trapianto.
Il RIZOLEX FIORI va distribuito uniformemente sul terreno. Per ottenere una buona distribuzione è consigliabile far seguire al trattamento una irrigazione prolungata.

Dosi consigliate: 30-50 Kg/Ha e fino a 140 per colture particolarmente sensibili ai suddetti parassiti (lilium, gerbera).

Il RIZOLEX FIORI può essere usato, per la concia a secco, alla dose di 1 g/Kg di tuberi, bulbi o rizomi, da conciare.

Qualora si preferisca effettuare la concia umida, si prepari una sospensione usando 200 g/hl di RIZOLEX FIORI immergendovi il materiale da conciare per 10 minuti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura con esclusione di colture destinate all'alimentazione, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.
prodotto nello stabilimento di
San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Contenuto Kg.

6379

AVISO

Antiperonosporico ad azione preventiva e curativa.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Cimoxanil (Curzate)* puro	g.	8,3
Metiram puro	g.	66,7
Coformulanti q.b. a	g.	100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft
6700 LUDWIGSHAFFEN/RHEIN
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N.° 6379 **del** 6.5.85

(*) principio attivo e marchi (Curzate) della E.T. DU PONT DE NEMOURS

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il prodotto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

AVISO deriva dall'associazione di due principi attivi ad azione sinergica nei confronti delle Peronosporacee.

L'azione antiperonosporica del prodotto, cioè, risulta superiore a quella dei due componenti utilizzati singolarmente.

Il Cimoxanil (Curzate) è dotato di attività citotropica; esso cioè penetra rapidamente nei tessuti vegetali ed agisce a basse dosi, sia con azione preventiva sia con azione curativa post-infezione (entro i primi 3-4 giorni del periodo di incubazione).

AVISO, per la presenza del Metiram, agisce anche contro l'Escoriosi della vite.

IMPIEGO E DOSI (per 100 litri d'acqua)

Vite: contro Peronospora	140 - 150 g.
contro Escoriosi	150 g.
Pomodoro: contro Peronospora (solo in pieno campo e sino alla prima fioritura)	130 - 150 g.
Tabacco: contro Peronospora	150 g.

Il prodotto si applica normalmente con interventi di tipo preventivo.

Avvertenza: L'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Aviso è miscibile con zolfo (Kumulus), Ronilan, Perfekthion e con altri insetticidi e acaricidi di comune impiego, nonchè con i fertilizzanti fogliari Basfoliar 34 e Feltrilon Combi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi cosentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

6380

IV CLASSE

ERBITOX T 95/G

(GRANULI SOLUBILI)
GRAMINICIDA SPECIFICO

Registrazione Ministero Sanità n. 6380 **del** 6.5.85
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— TCA - Sodium puro	g. 95
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Durante la manipolazione e l'impiego del prodotto si dovranno indossare abiti e occhiali protettivi ed, eventualmente, respiratori (o semimaschere).
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'ERBITOX T 95/G è un prodotto particolarmente indicato per il controllo delle graminacee annuali che infestano le colture di erba medica, bietola ed anche di riso e con possibilità di impiego nella lotta contro la Phragmites communis, i carici ed i giunchi che si sviluppano lungo gli argini dei canali, nonché nel diserbo di vigneti e frutteti.
Il prodotto esplica la sua azione principale per assorbimento radicale pur possedendo anche una non trascurabile azione erbicida per contatto e successivo assorbimento fogliare.
Tali caratteristiche gli permettono di svolgere un controllo rapido e totale delle malerbe, anche di quelle già ben sviluppate.
Data l'alta solubilità dell'ERBITOX T 95/G non si determinano accumuli di prodotto nel terreno; la sua persistenza è comunque variabile, in relazione alle caratteristiche dello stesso ed al tipo di flora batterica presente.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

— **Barbabietola da zucchero:**

In pre-semina alle seguenti dosi:	colture autunnali	13-15 Kg/Ha
	colture primaverili	7-10 Kg/Ha
In pre-emergenza alle seguenti dosi:	colture autunnali	13-15 Kg/Ha
	colture primaverili	10-13 Kg/Ha

Usare le dosi più alte nei terreni più argillosi.
Non usare meno di 5-6 q.li di acqua per Ha.

— **Riso**

25-30 Kg/Ha contro la Leersia oryzoides (seria o rusparel) e l'Alopecurus geniculatus (erba bianca). Il trattamento va effettuato su terreno già arato, ma almeno 60 gg. prima della semina del riso.

— **Medica**

7-10 Kg/Ha diluiti in 5-6 q.li di acqua.
Intervenire in autunno-inverno su medicai di vecchio impianto.

— **Vigneti e frutteti** (melo, pero, pesco, susino, albicocco, ciliegio, nocciolo, Actinidia)

30-40 Kg/Ha diluiti in 8-10 q.li di acqua.
Mantenere il getto ad una distanza di 2-3 metri dalle piante.
Applicare il prodotto su infestanti in piena attività vegetativa.

— **Canali**

200-300 Kg/Ha contro la Phragmites communis.
Trattare quando le canne hanno emerso il pennacchio e dopo aver portato a livello basso l'acqua.
Contro i giunchi ed i carichi intervenire su terreno umido, ma non coperto di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'ERBITOX T 95/G è miscibile con i diserbanti specifici contro infestanti a foglia larga, come 2,4-D, MCPA, Pyrazon.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In risicoltura deve essere impiegato almeno 60 giorni prima della semina.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza, 172 - ROMA

CONTENUTO KG.

6381

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE - Diserbante selettivo per la lotta contro le infestanti nei medicai.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
45 g di Sec- bumeton puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: (non specifici e rilevati su animali con superdosaggio). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il LUZIBEL è un diserbante selettivo per la lotta contro le malerbe annue da seme sia dicotitedoni che graminacee, dei medicai quali Stellaria (Pavarina, Centocchio), Veronica, Alopecurus, Capsella.
Non sono invece controllate le infestanti provenienti da organi di propagazione vegetativa (p es. Romice, Artemisia).

MODALITA' DI IMPIEGO
Distribuire il prodotto alla dose di 2-3 kg/ha impiegando 400-1000 litri di acqua. I trattamenti vanno effettuati nel periodo autunno-invernale durante il periodo di riposo e prima della ripresa vegetativa. È sconsigliabile il trattamento nei terreni leggeri e molto ricchi di scheletro.

AVVERTENZA: Si raccomanda di lavare molto bene le irroratrici ed i recipienti utilizzati per il trattamento prima di impiegarli per altri trattamenti, onde evitare danni alle altre colture.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'
Il LUZIBEL è miscibile in via di massima con altri formulati fatta eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Bolzano - Via Piave 2.

OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Stabilimento di Bolzano - Via Siemens 12.

Registrazione N. 6381 del 6.5.85 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto kg

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

6382

SIMAZIN

ERBICIDA SELETTIVO IN POLVERE BAGNABILE PER ASPARAGI, CARCIOFO, VITE, AGRUMI, MELO, PERO, OLIVO, ROSE, VIVAI FORESTALI

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
— SIMAZINA pura gr. 50
— Coformulanti q.b. a gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Informazioni mediche: In caso di contaminazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Il **SIMAZIN** elimina le malerbe annuali (Veronica, Geranium, Borsa pastore, Persicaria, Urtica, Erba porcellina, Papavero, Mercurella, Camomilla, Erigeron) che infestano i vigneti, i frutteti, gli agrumeti, senza portar alcun danno agli stessi, per il suo preciso requisito di fissarsi sugli strati superficiali del terreno e non raggiungere quindi le radici profonde delle piante coltivate. Sono da evitarsi le lavorazioni profonde del terreno che disperderebbero l'erbicida mentre sono possibili quelle superficiali. Il **SIMAZIN** agisce più efficacemente se applicato prima che malerbe comincino a germinare o svilupparsi. La sua azione è più lenta su quelle già adulte per cui si raccomandano trattamenti precoci dopo le lavorazioni primaverili, su terreno nudo o comunque sgombro da vegetazione infestante preesistente. Il **SIMAZIN** agisce sulle infestanti per assorbimento radicale che è più rapido se il trattamento si effettua prima o durante la pioggia. In periodi di siccità è consigliabile eseguire sarchiature superficiali del terreno (4-5 cm.) per facilitare la penetrazione dell'erbicida.
APPLICAZIONE: Si diluisce la dose stabilita del **SIMAZIN** in poca acqua aggiungendo poi il residuo quantitativo fino al volume richiesto mescolando energicamente. Si distribuisce con pompe irroratrici con una quantità d'acqua sufficiente ad una buona copertura del terreno.
EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO: Asparagi, Carciofo: Kg. 3-4 per ettaro in 600/1000 litri d'acqua a fine inverno o prima della ripresa vegetativa.
Vite, Melo, Pero, Agrumi, Olivo: Kg. 4-5 per ettaro in 600/1000 litri d'acqua su terreno pulito inizio primavera.
Rose, Vivai forestali: Kg. 2-3 per ettaro in 600/1000 litri d'acqua a fine inverno.
Il **SIMAZIN** può essere utilizzato quale diserbante totale ad effetto residuo per l'eliminazione delle malerbe annuali con dosi varianti da 10 a 15 Kg. per ettaro.
AVVERTENZE: Dal trattamento erbicida alla semina di successive colture sensibili occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e almeno di 12 mesi per le altre colture.
NON RIPETERE IL TRATTAMENTO PRIMA DI 12 MESI
Risciacquare accuratamente le irroratrici e i recipienti utilizzati prima di destinarli ad altri trattamenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': E' miscibile con altri prodotti erbicidi (dipiridilici, triazine, derivati ormonici). In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto non deve essere impiegato né sui pioppi, né sui fruttiferi ed asparagiaie di età inferiore ai 4 anni. Evitare durante il diserbo che la poltiglia di prodotto vada a cadere sui terreni limitrofi coltivati.
I vigneti e i frutteti diserbati col prodotto non possono essere invertiti con sottoculture per l'intera stagione.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

« **ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
VIA DONIZETTI N. 2/A - CENTO (FE) - TEL. 90.62.07

Stabilimento di produzione:
SARIAF S.p.A. - FAENZA (Ravenna)
Registrazione n. 6382 **del** 6.5.85 **del Ministero della Sanità**

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6383

MONITOX

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO LA BOTRITE - LA MONILIA E LA SCLEROTINIA IN VITICOLTURA, ORTICOLTURA E FRUTTICOLTURA

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
— VINCLOZOL puro . . . . gr 50
— Coformulanti q.b. a . . . . gr 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO: Contro la **Botrite della vite** si usa alla dose di gr 150-200 per ettolitro intervenendo a fine fioritura, prima della chiusura del grappolo e tre settimane prima della raccolta. I trattamenti con **MONITOX** non hanno influenza negativa sulla fermentazione.
Fragola - Contro la **Botrite della fragola** si interviene sempre alla dose di gr 150-200 per ettolitro, prima della fioritura, in piena fioritura e dcpo la fioritura, impiegando 10 q.li di acqua per ettaro.
Susino, Albicocco, Ciliegio, Pesco - Contro la **Monilia del Mandorlo** è opportuno trattare all'inizio e durante la piena fioritura per combattere la Monilia dei rami e 3-4 settimane prima della raccolta per combattere la Monilia dei frutti - Dose: gr 150-200 per hl.
Lattuga, Indivia e **Radicchio** - Contro **Sclerotinia** e **Botrite** - Dose: gr 150-200 per hl, trattare 10 giorni dopo il trapianto e ripetere eventualmente.
Aglio, Cipolla, Gladiolo e **Tulipano** - Contro **Botrite** e **Marciume Bianco** trattando i bulbi e i semi con 5-10 gr di prodotto per kg di bulbi o semi (concia a secco).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il **MONITOX** è miscibile con i più comuni antiparassitari del commercio e con i fertilizzanti fogliari. Non è consigliabile la miscela con prodotti a forte reazione alcalina.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: « Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a - Telef. 90.62.07
44042 — C E N T O (Ferrara)

Officina di produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Montalcino - Località Torrenieri (Siena)

Reg. Ministero Sanità n. 6383 del 6.5.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO kg**

6384

ACARED F.O.

ACARICIDA EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:
— PROPARGIL puro gr. 30
— FENSON puro gr. 25
— Coformulanti q.b. a gr. 100
(contiene: xilolo)

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Evitare di respirarne i vapori.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Vomito, diarrea, parestesia diffusa, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.
CONSIGLI TERAPEUTICI
Intossicazione acuta: Lavanda gastrica abbondante, somministrazione di purganti salini (25 gr. di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (Luminal 0,1-0,2 gr.) contro i tremori muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocleremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.
CONTROINDICAZIONI: La morfina e l'alcool, e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: L'**ACARED F.O.** è costituito da due sostanze attive, il Propargil ed il Fenson, ad azione complementare. L'azione di contatto di queste due sostanze assicura un controllo contro tutti gli stadi di sviluppo (uova, larve e adulti) degli acari.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO: L'**ACARED F.O.** si usa alla dose di gr. 150 - 200 per 100 litri di acqua sulle seguenti colture: **MELO:** contro Ragno Rosso - **VITE:** contro Ragno Giallo - **PESCO** e **SUSINO:** contro Ragno Rosso e Eriofide - **AGRUMI:** contro Ragno Rosso e Eriofidi.
I MIGLIORI RISULTATI SI OTTENGONO quando la temperatura supera i 18° C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': L'**ACARED F.O.** è compatibile con la generalità dei fitofarmaci ad eccezione di poltiglia bordolese - polisolfuri e zolfi. **La miscela con i prodotti in polvere bagnabile non è consigliabile.**
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si ferificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare Cultivar di melo « Golden delicius » perché fitotossico. Per la vite non trattare in pre-fioritura. Dopo un trattamento con olii, lasciare trascorrere un mese prima di effettuare applicazioni con **ACARED F.O.**
RISCHIO DI NOCIVITA': L'**ACARED F.O.** è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
VIA DONIZETTI, 2/A - **CENTO** (Ferrara) - Tel. 90.62.07

Stabilimento di produzione: TERRANALISI - RENAZZO (FE) - Via IV Novembre
Registrazione n. 6384 del 6.5.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO Kg.**

6385

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ZOLONE® LIQUIDO 25

Insetticida

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 24 Phosalone puro
Bagnanti e solventi q.b. a 100.
Contiene Xilolo e Cicloesanone

®marchio registrato della
Société des Usines Chimiques
Rhône-Poulenc Paris

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

RAVIT S.p.A.
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40136 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.88
STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 6385 **Ministero della Sanità del** 6.5.85

12/84

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida che possiede le seguenti caratteristiche:
- polivalenza d'azione sui parassiti sottoelencati;
- buona efficacia immediata e persistenza di 2-3 settimane;
- azione frenante sugli acari.

Agisce per contatto ed ingestione.

APPLICAZIONI E DOSI

Fruttiferi: (pomacee, drupacee, agrumi) contro Afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cydia, Antonomo, Oplocampa a cc. 200-250/hl.;
Vite: contro Tignole, a cc. 200-250/hl.;
Cereali: contro Afidi litri 2 per ettaro
Barbabietole da zucchero: contro Altica, Cleono e Pegomia della barbabietola, a litri 1,7/ha

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire la quantità di prodotto in pochi litri d'acqua, versare nel serbatoio dell'irorratrice, agitando. Trattare alla primissima comparsa dei parassiti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli alcalini, calce, polisolfuri
Per quanto riguarda la miscela con gli zolfi bagnabili o con la dodina, onde ottenere la migliore compatibilità è necessaria l'aggiunta del Bagnante Adesivo Etaldyn.
A'lo scopo si consigliano le seguenti modalità d'impiego:
1) stemperare in acqua lo zolfo in polvere o la dodina; indi versare nella irroratroce già riempita per metà;
2) aggiungere Etaldyn a gr. 50/hl.;
3) aggiungere lo Zolone liquido 25 e portare a volume agitando.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il prodotto su rosa, azalea e poinsettia.

NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili.
E' nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere il trattamento 21 giorni prima del raccolto

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto litri

6386

TRAST

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA DEL RISO

COMPOSIZIONE

— Propanil puro . . .	gr. 14
— Benthiocarb puro	gr. 14
— Mecoprop acido puro (da estere isobutilico)	. . gr. 14
— Emulsionanti e solvente .	q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione: astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per la dermatosi. **Avvertenza:** Consultare un centro antiveleni e nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centro di Rianimazione.

Controindicazioni: È sconsigliata la digitale.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Kg. 7/Ha di TRAST per il controllo di: Alisma spp., Scirpus mucronatus, Scirpus maritimus, Butomus spp., Cyperus spp., Sparganium spp., Heleocharis spp., Sagittaria sagittifoglia, Potamogeton spp. Il TRAST s'impiega quando le erbe infestanti sono in fase di attiva crescita che corrisponde circa a 35-50 giorni dopo la semina del riso. Per ottenere i migliori risultati prosciugare le camere almeno due giorni prima del trattamento e riempirle nuovamente 48-72 ore dopo l'intervento diserbante. Non eseguire il trattamento nel caso si preveda una pioggia a distanza di 3-5 ore.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi o altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima o dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature.

Fitotossicità: Durante il trattamento e dopo evitare che la soluzione diserbante, o i suoi vapori, vengano a contatto con colture sensibili quali: orticole e floricole in genere, pioppo, vite e colture fruttifere.
Non trattare in presenza di vento.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. 6386 del 6.5.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

6387

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ICI Solplant SpA

ICI Solplant SpA

'DISERMAIS' AL

Diserbante selettivo per il mais in formulazione liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE

Alaclor puro		g 43
Emulsionanti, bagnanti, solventi	q.b. a	g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

ICI Solplant S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI Solplant S.p.A. - CRESPELLANO (Bologna)
Registrazione Ministero della Sanità n. 6387 **del** 6.5.85
'DISERMAIS' - marchio registrato - ICI Solplant S.p.A.

6387

'DISERMAIS' AL è selettivo per il mais. Agisce sui semi delle infestanti in germinazione.
'DISERMAIS' AL elimina la maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme, soprattutto graminacee. In particolare esso elimina: giavone, poa, digitaria, setaria, giavone americano, sorghetta da seme, amaranto, capsella, camomilla, porcellana, senape, veronica.
'DISERMAIS' AL mortifica senza eliminare totalmente: stellaria, ortica, poligonacee.

NOTA: nella maggior parte dei casi, stante l'eterogeneità delle infestazioni è necessario associare al 'DISERMAIS' AL un prodotto a base di Atrazina al 50% a dose dimezzata.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Epoca: in pre-semina con leggera incorporazione e in pre-emergenza del mais sempre prima della nascita delle infestanti.
Avvertenze: il trattamento non deve essere ripetuto prima di 7 mesi.
Alle dosi normali di impiego non si hanno residui dannosi per le colture seminate in successione al mais trattato, purchè siano trascorsi 3-4 mesi dal trattamento e sia stata eseguita una buona aratura.

Dosi

A) Prevedibili infestazioni miste (graminacee e dicotiledoni):
'DISERMAIS' AL litri 4-5/ha più ATRAZINA 50% kg 2/ha
Avvertenze: la miscela suddetta si prepara nel modo seguente:
1) La quantità di Atrazina stabilita viene stemperata in poca acqua quindi la si versa nel serbatoio il cui contenuto sarà mantenuto in agitazione.
2) Diluire la dose di 'DISERMAIS' AL in poca acqua quindi versarla nel serbatoio.

B) Prevedibili infestazioni di graminacee predominanti:
'DISERMAIS' AL litri 6/ha

C) Trattamento su mais di 2° raccolto:
'DISERMAIS' AL litri 6/ha

Nei terreni organici la dose d'impiego deve essere elevata a litri 7-8/ha.
Non usare sui terreni torbosi.

Metodo

Irrorazione uniforme di 400-500 litri di acqua per ettaro nei quali sia stata emulsionata la dose/ettaro di prodotto.
Nel caso di trattamento localizzato (fasce larghe 20-25 cm sulla fila di semina), le quantità di acqua e di prodotto per ettaro vanno rapportate alla superficie effettivamente trattata.
Il terreno deve essere stato accuratamente preparato e non deve presentare zollosità.

Avvertenze:
— Evitare che il prodotto arrivi a contatto con colture sensibili.
— Se entro due settimane dal trattamento non piove (8-10 mm) è indispensabile intervenire con irrigazione a pioggia.
— Eventuali successive sarchiature devono essere molto superficiali.

Mezzi

Irroratrice a medio-alto volume.
Per preparare la miscela è sufficiente versare l'intero quantitativo prestabilito del prodotto nel serbatoio della irroratrice tenendo in moto l'agitatore.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

'DISERMAIS' AL è compatibile con prodotti a base di Atrazina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg

CORBEL TOP

Fungicida per la lotta contro le malattie dei cereali (frumento, orzo e cereali minori).

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Fenpropimorph puro	g. 18,7
Captafol puro	g. 42,0
Coformulanti q.b. a	g. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con i prodotti puri o diluiti, ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua) e digitale.

AVVERTENZA

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

E' un fungicida preventivo ad azione sistemica e di copertura.

Deriva dall'associazione di due sostanze attive ad azione complementare. E' efficace contro le malattie fungine quali: Oidio, Ruggini, Septoria e Rhynchosporium che colpiscono la parte aerea (foglie e spighe) del frumento e dell'orzo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Kg. 3 per ettaro distribuiti con 300-500 litri di acqua.
Il trattamento si effettua alla comparsa dei primi sintomi ed eventualmente si ripete alla ricomparsa delle infezioni.
Più comunemente le epoche di intervento sono comprese tra l'inizio della spigatura e l'inizio della fioritura. Se si effettua un solo trattamento si interviene all'inizio della fioritura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con gli insetticidi (Perfekthion, Dicarbam), con i diserbanti ormonici (U 46), con i fitoregolatori (Cycocel) e con i concimi fogliari (Basfoliar e Fetrilon).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 35 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft
6700 LUDWIGSHAFFEN/RHEIN
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N.° 6388 **del** 6.5.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

6389

DUECI RADICANTE IN POLVERE **CLASSE III**

Radicante in polvere per talee erbacee e legnose a base di acido alfanaftalenacetico di vite, melo, pero, fiori e colture ornamentali.

COMPOSIZIONE 6389

100 gr. di prodotto contiene:

NAA puro .... gr. 0,50

eccipienti .... q.b. a gr. 100

ATTENZIONE

Manipolare con prudenza.

NATURA E RISCHI DI INTOSSICAZIONE

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione, per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI E RISCHI

Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande, corsi d'acqua. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'uso del prodotto, evitare di ingerirlo e di portarlo a contatto con la bocca e gli occhi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Talee di Pero, Melo e Vite.

Talee di Colture floreali (Azalea, Ciclamino, Fucsia, Geranio) in vivaio.

Impolverare appena la parte terminale delle talee toccando la polvere con l'apice del taglio interessato alla radicazione, avendo cura di applicare tale procedimento ad ogni singola talea e scuotendo via la parte eccedente del prodotto. Immergere la piantina nel composto di terra preparata.

COMPATIBILITÀ: Non miscelare il Dueci Radicante in polvere con alcun prodotto

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVATI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali"

DUECI s.r.l. - Via E. Mattei 4 - CASTELLO D'ARGILE (Bo)

Officina di produzione: Visplant-Chimiren Renazzo di Cento (FE)

Registrazione Ministero della Sanità n. [illegible] del [illegible]

CONFEZIONE da Kg. "DA NON VENDERSI SFUSO"

6390

CLASSE II

NOCIVO

DANITOL FIORI

Insetticida/acaricida piretroide per colture floricole.
Il DANITOL FIORI è un prodotto del gruppo dei piretroidi a base di p.a. fenpropatrin, dotato di attività insetticida ed acaricida, ed è perciò particolarmente adatto per la difesa delle piante floricole in pieno campo o in serra.
Agisce per contatto ed ingestione ed è dotato inoltre di azione repellente.
E' efficace a dosi assai basse.
Possiede azione immediata e garantisce inoltre una lunga protezione della coltura per la specifica attività repellente nei confronti dei fitofagi.

COMPOSIZIONE
— fenpropatrin, p.a. puro . . . g 10,0
— emulsionanti e solventi . q.b. a g 100,0

Contiene XILOLO.
DANITOL FIORI è un marchio Sumitomo Chemical Co. Ltd., Osaka (Giappone).

NATURA DEL RISCHIO
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Evitare di respirarne i vapori;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto;
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Togliere immediatamente gli abiti contaminati e lavare abbondantemente la pelle contaminata con acqua e sapone.
In caso di contaminazioni oculari lavare subito gli occhi con acqua per non meno di 15 minuti.
In caso di ingestione procedere a lavanda gastrica con precauzione per evitare rigurgito.
Trattare sintomatologicamente.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO

ıнto:

ıne del Ministero della Sanità n. 6390 in data 6.5.85

MODALITA' DI IMPIEGO

Impieghi e dosi

Parassiti	Dosi g/hl di acqua	Epoche e modalità di impiego
Afidi	50 - 100	Trattare all'inizio della infestazione (prima del l'accartocciamento delle foglie)
Aleurodidi	100	Trattare all'inizio della infestazione
Cocciniglie	25	Trattare quando le neanidi giovani sono presenti
Microlepidotteri minatori delle foglie	150 - 300	Dose inferiore alla schiusura delle uova, dose superiore alla comparsa delle mine
Beghe	200	
Tripidi	100	
Tignole	25	
Acari (Ragno rosso)	200	

Il prodotto alle dosi di impiego non macchia la vegetazione o i fiori e non ha odori sgradevoli.

MODALITA' DI APPLICAZIONE
Diluire la quantità precisata di DANITOL FIORI in poca acqua e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità d'acqua.
Attenzione: bagnare abbondantemente ed accuratamente le colture, trattare anche le pagine inferiori delle foglie per assicurare una protezione efficace di contatto ed ingestione.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'
Il DANITOL FIORI è compatibile con i composti insetticidi e fungicidi.
Non va miscelato con prodotti fortemente alcalini.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SELETTIVITA'
Il DANITOL FIORI è selettivo in generale per le colture floricole. Sarà opportuno comunque, con varietà delicate, eseguire saggi preliminari specie per rose e poinsettie.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il DANITOL FIORI è nocivo per i pesci, gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame
«**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura, con esclusione di colture destinate all'alimentazione, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

«DA NON VENDERSI SFUSO»

Contenuto netto:

6391

PROBEM - M

DISERBANTE DEL RISO PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI MONO E DICOTILEDONI ESCLUSE LE GRAMINACEE

COMPOSIZIONE

— Propanil puro	gr. 14
— Benthiocarb puro	gr. 14
— Mecoprop (da estere isobutilico) puro	gr. 14
— Emulsionanti e solventi	q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalaziono e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione: astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma. **Consigli terapeutici:** abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: è sconcgliata la digitale.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni e nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centro di Rianimazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il PROBEN - M è un erbicida di post-emergenza della coltura del riso consigliato per il controllo delle infestanti mono e dicotiledoni escluse le graminacee, quali: Biodo o Fiorone (Butomus umbellatus), Quadrello (Scirpus maritimus), Erba saetta (Sagittaria sagittifolia), Sparganium spp., Cyperus spp., Potamageton spp., Heleocharis spp.

Va utilizzato a Kg. 7/Ha, in risaia in asciutta, circa 35-50 giorni dopo la semina del riso con le infestanti nel loro periodo di maggior rigoglio vegetativo. Dopo 50-70 ore dal trattamento rimettere l'acqua nelle camere al livello normale.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima e dopo l'impiego con questi prodotti, altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore.

Fitotossicità: Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutta, ortaggi ecc. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Irrorare in assenza di vento.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima dell'inizio della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S.p.A.
Melilli (SR)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. 6391 del 6.5.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg. -

6392

METOSIP ® COMBI

insetticida liquido emulsionabile per la difesa di Melo, Pero, Agrumi, Barbabietola da zucchero, Tabacco, Pioppo, Colture floricole in pieno campo, contro Afidi, Minatori, Tortrici, Carpocapsa, Rodilegno, Cleono, Altica, Nottue ed altri insetti.

COMPOSIZIONE

– Metomil puro	g	15
– Clorpirifos puro	g	20
– Coadiuvanti e Solventi: quanto basta a	g	100
- contiene Alcool metilico e Cicloesanone		

(R) Marchio registrato SIPCAM–MILANO

Attenzione : data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

SIPCAM–Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

I CLASSE

VELENO

Registrazione n. 6392 **del** 6.5.85 **Ministero della Sanità**

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali : conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirare i vapori; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle e gli occhi: durante la preparazione e l'impiego usare tute,guanti, maschere ed occhiali protettivi; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

Miosi, lacrimazione, sudorazione profusa, debolezza, ipotensione, polso lento, bradicardia, scialorrea, nausea e vomito, tremori muscolari, visione confusa, crampi addominali e diarrea, spasmi bronchiali, convulsioni ed edema polmonare.

Trattamento

Nel caso di inalazione trasportare il paziente in ambiente non contaminato.
Nel caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare prontamente la pelle e gli occhi contaminati con acqua abbondante.
In caso di ingestione lavanda gastrica. All'apparizione di segni locali o sistemici di avvelenamento colinesterasico somministrare atropina.
Consultare un Centro antiveleni e nei casi gravi o sospetti gravi ricovero in Centro di rianimazione.

Intossicazione leggera:

1,2 mg per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento ad intervalli di 10–30 minuti fino a comparsa di fenomeni di atropinizzazione.

Intossicazione severa

2,4 mg per via intravenosa, ripetendo la somministrazione di 2 mg ogni 3–10 minuti fino a scomparsa dei segni e dei sintomi, non somministrare 2-PAM: controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione; se necessario rimuovere le eccessive secrezioni e mantenere aperte le vie respiratorie; in caso di severa intossicazione praticare la respirazione artificiale o ossigenoterapia; per alleviare le convulsioni, nel caso che interferiscano con la respirazione e non siano alleviate dall'atropina, somministrare sodio thiopental (soluzione 2,5%) intravena.

Pronto soccorso

Se ingerito provocare il vomito con acqua calda salata (un cucchiaino da tavola di sale in 1 bicchiere d'acqua), ripetendo fino a che il vomito non sia chiaro; se inalato allontanare il paziente dall'ambiente contaminato, far coricare e riposare calmo; in caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare la pelle o gli occhi contaminati con abbondante quantità di acqua; se il paziente mostra difficoltà respiratoria praticare immediatamente la respirazione artificiale.
Somministrare 2 tavolette di atropina da 0,6 mg per via orale o facendole sciogliere sotto la lingua, se sono disponibili. In seguito ogni 10–15 minuti, somministrare una tavoletta di atropina fino a che la gola e la pelle siano asciutte.
Se necessario somministrare altre tavolette per mantenere asciutta pelle e gola.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi sotto indicate per 100 litri di acqua, distribuiti con pompe a volume normale.

MELO E PERO

Contro Tortrici ricamatrici, Rodilegno e Carpocapsa: trattare al primo sintomo di attacco con una dose di 200–300 g/hl e ripetere se necessario.
Contro Afidi: intervenire alla dose di 200–250 g/hl all'inizio dell'infestazione, ripetendo il trattamento in caso di reinfestazione..
Contro Minatori fogliari (Lithocolletis, Cemiostoma): intervenire alla dose di 250–300 g/hl. Contro la Lithocolletis trattare in primavera le larve di prima generazione quando è visibile il primo stadio (macchia d'olio).
Il trattamento delle generazioni successive deve essere sempre effettuato contro le larve di prima età. Contro il Cemiostoma trattare all'inizio di una delle prime generazioni, quando la maggior parte delle macchie circolari sulle foglie ha un diametro inferiore ai 5 mm.

AGRUMI

Contro Cocciniglie: intervenire al momento della migrazione delle neanidi alla dose di 200-250 g/hl.
Contro Afidi e Dialeurodidi: intervenire alla prima comparsa degli insetti alla dose di 200–250 g/hl.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Contro Afidi, Cleono, Altica e Nottue : intervenire alla dose di 250–300 g/hl (pari a 1.5–2 Kg/ha) alla comparsa degli insetti, ripetendo il trattamento ogni 12-15 giorni secondo necessità.

TABACCO

Contro Afidi, Tripidi e Nottue: trattare all'inizio dell'infestazione con una dose di 250–300 g/hl (pari a 1.5–2 Kg/ha), ripetendo i trattamenti secondo necessità.

PIOPPO

Contro Criptorrinco: intervenire alla comparsa dei primi attacchi alla dose di 200–250 g/hl.

COLTURE FLOREALI in pieno campo:

Contro Afidi, Tortrici, Aleurodidi, Minatrici e larve di Cocciniglie: intervenire alla dose di 200–250 g/hl secondo necessità.

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto direttamente nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con le comuni poltiglie antiparassitarie primaverili-estive ad eccezione delle miscele alcaline quali Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Calce.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: dato l'ampio numero di varietà esistenti, effettuare una prova su area limitata prima di passare a trattamenti su superficie più ampia.
Non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 12 mesi.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta; 60 giorni per agrumi, barbabietole e tabacco.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt.

6393

ANTISPORAL(R) micronizzato

Fungicida a base di Ossicloruro neutro di Rame e Calcio per la lotta contro malattie fungine di Fruttiferi, Vite, Olivo, Patata, Barbabietola da zucchero.

COMPOSIZIONE

– Rame metallo puro (sotto forma di Ossicloruro di rame e calcio)	g	40
– Coadiuvanti ed Inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM–MILANO

SIPCAM–Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 6383 del 16.5.85 Ministero della Sanità

Natura di rischio: sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici conservare la confezione ben chiusa non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto non contaminare alimenti bevande o corsi d acqua non operare contro vento evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.

FRUTTIFERI

– **Drupacee :**
Contro Bolla e Corineo delle Drupacee :
- in trattamenti autunnali : Kg. 1-1,2
- in trattamenti di fine inverno : Kg. 0,8-1

– **Melo e Pero :**
Contro Ticchiolatura : solo su Pero in pieno inverno per combattere la Ticchiolatura sui rami : Kg. 1-1,2
Su Pero e Melo alla ripresa vegetativa : g 250-300
Contro Cancri del legno : in un unico trattamento alla caduta delle foglie Kg. 1-1,2 oppure in due applicazioni a metà dose di cui la prima ad un terzo della caduta delle foglie e la seconda alla completa caduta, resa simultanea dalla prima applicazione.

OLIVO E AGRUMI

– **Contro Occhio di pavone e Lebbra dell'Olivo :** g 300-400
– **Contro Mal secco, Antracnosi e Fumaggine degli Agrumi :** g 350-400: iniziare i trattamenti prima della comparsa od all'inizio della malattia ripetendoli secondo necessità.

VITE

– **Contro la Peronospora :** g 400-500: effettuare i normali trattamenti sulla base dei calendari comunemente impiegati in zona. Impiegare di preferenza il prodotto dopo la fioritura della vite, usando fungicidi acuprici prima della fioritura.
Per la lotta contemporanea contro l'Oidio o Mal bianco aggiungere un prodotto antioidico specifico.

PATATA

– **Contro la Peronospora :** g 400-500: effettuando trattamenti preventivi e ripetendoli secondo necessità.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

– **Contro la Cercospora :** Kg. 0,8-1 con trattamenti ripetuti 2-3 volte secondo l'andamento della malattia.

Preparazione della poltiglia : stemperare il prodotto in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : alla poltiglia di prodotto possono essere associati tutti i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo purché non alcalini, quali Poltiglia bordolese,Polisolfuri, Calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : non si deve trattare durante la fioritura. Su Pesco, Susino e varietà di Melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B C. William, Dottor Jules Guyot, Favorita di Clapp, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Rischi di nocività : il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

6394

XEDAQUIN

6394

PRODOTTO CONTRO IL RISCALDO DELLE MELE

COMPOSIZIONE

— Etossichina pura g. 47,5
— Disperdenti ed emulsionanti: quanto basta a 100.

CLASSE III
ATTENZIONE

MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Xedaquin è un concentrato emulsionabile in acqua, contenente come ingrediente attivo l'Etossichina da usarsi contro il riscaldo delle mele. Xedaquin si utilizza in trattamento pre-raccolta diluendo ml. 470 in lt. 100 di acqua ed applicando sulle piante con comune apparecchiatura atomizzatrice non oltre due giorni prima della raccolta.
Le mele trattate in pre-raccolta, non devono essere trattate in post-raccolta. Il trattamento post-raccolta, si effettua entro 30 giorni dalla raccolta applicando su mele sfuse o in contenitori, il prodotto diluito in acqua nel rapporto ml. 190 per lt. 100 per mele Golden Delicious e di ml. 310 per lt. 100 per le altre varietà di mele.
Il contatto tra la soluzione e la frutta deve essere di circa 20 secondi.
Le mele devono essere asciutte prima di essere collocate in frigorifero.
La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica e microbiologica)

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITÀ

Xedaquin è compatibile con Xedazolo 30 usato per il trattamento delle mele.

Avvertenza: in caso di miscela con Xedazolo 30 rispettare il periodo di carenza più lungo e osservare le norme precauzionali prescitte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Xedaquin è tossico per i pesci.

INTERVALLO

Non immettete le mele trattate con Xedaquin al consumo prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data del trattamento.
La frutta deve inoltre rimanere almeno l'ultima settimana fuori dal frigorifero a temperatura ambiente, in locali arieggiati e luminosi.

ATTENZIONE! «Da impiegare solamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è perocoloso».
«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato».
«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danne alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

CONFEZIONE FUSTI DA 25 KG. NETTI

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SANITÀ
N. 6394 **DEL** 24.4.85

XEDA INTERNATIONAL S.A.
58 Rue Pottier
78150 LE CHESNAY - FRANCIA

RAPPRESENTATA IN ITALIA DA:
XEDA ITALIA S.P.A
ZONA INDUSTRIALE
95040 PIANO TAVOLA (CT)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
LAFORGE ET CIE
3 A 7 RUE DES CARRIERES
93800 EPINAY SUR SEINE

6395

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

Vite	: Peronospora	g 300-350/hl
Melo	: Ticchiolatura nei trattamenti di fine inverno	g 800-1000/hl
Pomodoro	(solo fino alla prima fioritura): Peronospora, Alternaria, Septoria	g 300-350/hl
Tabacco	: Peronospora	g 400/hl
Garofano	(in pieno campo): Ruggine	g 350-400/hl
Pioppo	: Marssonina brunnea in 800-1000 litri di acqua.	kg 10-12/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione dei polisolfuri di calcio e bario.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di meli cuprosensibili (Abbondanza "Belfort", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, Commercio), il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tal caso se ne sconsiglia pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 1

Mancozin RC

Polvere bagnabile a base di rame e mancozeb

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Rame metallico	g 20
(sotto forma di Idrossido g 18)	
(sotto forma di Carbonato g 2)	
Mancozeb puro	g 15
Coformulanti	q.b.a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)*

Terapia: *Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscenza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*
Controindicazioni: alcool, olii, grassi

AVVERTENZA: *consultare un Centro antiveleni*

caffaro S.p.A. - Milano

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 6395 del Ministero della Sanità del 5.6.8

6396

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

Vite	: Peronospora	g 300-350/hl
Melo	: Ticchiolatura nei trattamenti di fine inverno	g 800-1000/hl
Pomodoro	(solo fino alla prima fioritura): Peronospora, Alternaria, Septoria	g 300-350/hl
Tabacco	: Peronospora	g 400/hl
Garofano	(in pieno campo): Ruggine	g 350-400/hl
Pioppo	: Marssonina brunnea in 800-1000 litri di acqua.	kg 10-12/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione dei polisolfuri di calcio e bario.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di meli cuprosensibili (Abbondanza "Belfort", Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana, Commercio), il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tal caso se ne sconsiglia pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO NETTO Kg 1

Mancozin R

Polvere bagnabile a base di rame e mancozeb

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Rame metallico (sotto forma di Idrossido)	g 20
Mancozeb puro	g 15
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)*

Terapia: *Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscenza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: *consultare un Centro antiveleni.*

caffaro S.p.A. - Milano

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 6396 del Ministero della Sanità del 6.5.85

6397

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

POMETAL

Fungicida per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee e Peronospora della patata, pomodoro e lattuga
Polvere Bagnabile

Composizione
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 40 Captan puro
gr. 10 Folpet puro
gr. 5 Captafol puro
Coformulanti q.b. a 100

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.
- Evitare il contatto diretto con il prodotto puro e diluito ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua e digitale).

Avvertenza:

Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il **POMETAL** è un fungicida organico di contatto ad azione preventiva contro la Ticchiolatura del melo e del pero e contro la Peronospora della patata del pomodoro e della lattuga.
Grazie alle sue proprietà di ridistribuirsi, il prodotto offre una lunga protezione delle foglie e dei frutti.
Si impiega alla dose di gr. 200/hl. durante tutto il periodo del trattamento.
Il prodotto, impiegato in prossimità della raccolta delle pomacee, svolge una azione favorevole alla conservazione della frutta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con
Benlate, Karathane WD ed LC, Iprodial, Sulfosol, Gutene, Dimetoil, Lannate, Ovotek, Fitofos, Delfos, Tortrin, Dalpir, Zolone P B
Per ottenere la compatibilità con Zolone L, Sumifos ed Emmaton è necessario aggiungere al Pometal il Bagnante-Adesivo Liquido 2.
Allo scopo si consigliano le seguenti modalità d'impiego:
1) stemperare in acqua il Pometal, indi versare nell'irroratrice già riempita per metà;
2) aggiungere Bagnante-Adesivo Liquido 2 a gr. 50/hl.;
3) aggiungere il prodotto da miscelare, portare a volume agitando.
Il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri), con olii e con zolfi.
Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious e gruppo Delicious rosse, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà), ed è da non usarsi su melo in genere dopo la fioritura perché può manifestare fitotossicità.
Può risultare fitotossico anche su alcune cultivar di pero quali Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna, per le quali si sconsiglia.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63 79 051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53 32 68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 6397 **del Ministero della Sanità del** 6.5.85

10/84

6398

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

NACTRAN

Erbicida per la lotta contro le infestanti
Ciperacee ed Alismatacee del riso
Emulsione

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 14,4 di Triclopyr puro (come estere butossiglicolico).
gr. 6 di MCPA puro
gr. 24 di Propanile puro
Coformulanti quanto basta a 100
Contiene Xilolo e Cicloesanone

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni:
E' sconsigliata la digitale.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida per la lotta contro le infestanti Ciperacee ed Alismatacee del riso.

Infestanti sensibili:
Scirpus maritimus
Scirpus mucronatus
Alisma plantago
Butomus umbellatus (parte epigea)

MODALITA' D'IMPIEGO E DOSI

Il prodotto s'impiega alla dose di litri 4,5 per ettaro, distribuiti con 400-500 litri d'acqua.

L'applicazione può essere effettuata in due momenti:

1) in post-emergenza del riso, prima dell'accestimento, su risaia non in asciutta, ma con livello dell'acqua di cm. 0,5-1 (in modo che il terreno sia ricoperto d'acqua e le infestanti siano emerse al momento del trattamento);
2) dopo d'accestimento, o meglio alla sua conclusione, circa 50-55 giorni dopo la semina, molto prima della fase di botticella, su infestanti emerse ed in attiva crescita.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non deve essere usato in miscele con ferltilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima e dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi più elevate ed in particolari condizioni può indurre una lieve fitotossicità iniziale che scompare dopo pochi giorni.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Trattare in giornate senza vento in modo che la soluzione nebulizzata non raggiunga colture sensibili (viti, bietole, ecc.).

NOCIVITA'

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 6398 **Ministero della Sanità del** 6.5.85

2/84

Contenuto netto Kg.

6399

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ZOLONE® P. B. 25

Insetticida acaricida

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 24 Phosalone puro
Bagnanti e solventi q.b. a 100.

®marchio registrato della
Société des Usines Chimiques
Rhône-Poulenc Paris

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida che possiede le seguenti caratteristiche:
- polivalenza d'azione sui parassiti sottoelencati;
- buona efficacia immediata e persistenza di 2-3 settimane;
- azione frenante sugli acari.

Agisce per contatto ed ingestione.

APPLICAZIONI E DOSI

Fruttiferi: (pomacee, drupacee, agrumi) contro Afidi, larve ricamatrici e defogliatrici, Carpocapsa, Anarsia, Cydia, Antonomo, Oplocampa a cc. 200-250/hl.;
Vite: contro Tignole, a cc. 200-250/hl.;
Cereali: contro Afidi litri 2 per ettaro.
Barbabietole da zucchero: contro Altica, Cleono e Pegomia della barbabietola, a litri 1,7/ha

MODALITA' D'IMPIEGO

Diluire la quantità di prodotto in pochi litri d'acqua, versare nel serbatoio dell'irroratrice, agitando. Trattare alla primissima comparsa dei parassiti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari, ad eccezione di quelli alcalini, calce, polisolfuri.
Per quanto riguarda la miscela con gli zolfi bagnabili o con la dodina, onde ottenere la migliore compatibilità è necessaria l'aggiunta del Bagnante Adesivo Etaldyn.
Allo scopo si consigliano le seguenti modalità d'impiego:
1) stemperare in acqua lo zolfo in polvere o la dodina; indi versare nella irroratrice già riempita per metà;
2) aggiungere Etaldyn a gr. 50/hl.;
3) aggiungere lo Zolone liquido 25 e portare a volume agitando.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

E' tossico per gli insetti utili.
E' nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere il trattamento 21 giorni prima del raccolto

AVVERTENZE

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

RAVIT S.p.A.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.88

STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 6399 **Ministero della Sanità del** 16.5.85

12/84

6400

Caratteristiche: liquido emulsionabile ad azione rapida per contatto. Distrugge selettivamente i tessuti molto giovani ed in rapido accrescimento dei germogli, senza danneggiare il fogliame.

Avversità combattute: germogli ascellari e pedali di lunghezza non superiore a 3 cm.

Colture protette: tabacco.

Dosi d'impiego:
— **Applicazione manuale:** preparare un'emulsione contenente il 4,5-5% di ANTIGERMOGLIO 85 nel seguente modo: versare litri 4,5-5 di ANTIGERMOGLIO 85 in 95,5-95 litri d'acqua e mescolare bene. Impiegare circa 15 cc della emulsione come sopra ottenuta per pianta, corrispondenti a litri 18 22 di ANTIGERMOGLIO 85 per ettaro per il Beneventano ed il Nostrano del Brenta ed a litri 8 circa ad ettaro per il Kentucky.
— **Applicazione meccanica:** versare litri 4,5-5 di ANTIGERMOGLIO 85 in 95,5-95 litri d'acqua e mescolare bene. Impiegare da 800 a 1000 litri d'emulsione ad ettaro a seconda del metodo di distribuzione usato e della varietà.

Epoche d'impiego: applicare l'ANTIGERMOGLIO 85 nel periodo compreso fra 2 giorni prima e 2 giorni dopo la cimatura. Per ottenere i migliori risultati, cimare il tabacco allo stadio del bottone florale prima dell'apertura dei primi fiori. Durante la cimatura asportare gli eventuali germogli di lunghezza superiore a 3 cm.

Modalità d'impiego: trattare le piante dopo che la rugiada si è completamente asciugata, ma mai di tardo pomeriggio o di sera. Se piove dopo un'ora e mezzo dal trattamento non è necessario ripetere l'applicazione. L'ANTIGERMOGLIO 85 può essere distribuito manualmente con qualsiasi tipo di pompa a spalla o meccanicamente con barre applicate alla trattrice. Per essere efficace, il prodotto deve giungere a contatto diretto con ciascun germoglio; per questo si distribuisce sulle foglie più alte della pianta. Tenere l'ugello o gli ugelli della pompa a distanza di circa 20 cm dalla cima nel caso di applicazione manuale e di cm. 30-40 nel caso di applicazione meccanica affinché i lembi fogliari, agendo da imbuto, raccolgano il prodotto e lo dirigano verso il fusto. In tal modo il prodotto scorre lungo il fusto della pianta e bagna successivamente tutti i germogli ascellari e pedali devitalizzandoli.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: non miscelare l'ANTIGERMOGLIO 85 con altri prodotti e non applicare antiparassitari sulle piante lo stesso giorno del trattamento con questo antigermoglio.

Fitotossicità: impiegare l'ANTIGERMOGLIO 85 quando la temperatura non supera i 35°C. La pagina inferiore delle foglie è sensibile al prodotto; evitare quindi che lo stesso giunga a contatto con essa. Non trattare perciò con forte vento o con ugelli diretti dal basso all'alto.

Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ANTIGERMOGLIO 85

ANTIGERMOGLIO PER IL TABACCO

IV CLASSE

Composizione:

Miscela di alcoli grassi C_8-C_{12}
(contenenti 56% di n-decanolo) . gr. 85
Diluenti, emulsionanti . q.b. a gr. 100

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61 - 79.94.62
Telex: VERKIM 511046

Registrazione n. 6400
del 6.5.85
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (BO)

Conservare il prodotto
chiuso nel contenitore originale,
in luogo asciutto e fresco.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DA NON VENDERSI SFUSO
Litri

6401

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIVEL 21 S

(SOLUZIONE)
ERBICIDA SELETTIVO PER IL CONTROLLO DELLE MALERBE
NEI CEREALI (MAIS, GRANO, ORZO, AVENA)
E NELLE ASPARAGIAIE

Registrazione Ministero Sanità n. 6401 **del** 6.5.85

marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Dicamba puro	g. 21,2
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida che svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe con cui giunge a contatto. Il prodotto viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica. Date queste sue caratteristiche il prodotto è in grado di controllare anche le malerbe dicotiledoni perennanti quali Convolvulus arvensis e Cirsium arvense. La sua azione si estende poi alla generalità delle malerbe annuali, quali:

— Abutilon theophrasti, Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Ajuga spp., Atriplex patula, Capsella bursa pastoris, Centauréa cyanus, Chenopodium album, Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum persicaria, Polygonum convolvulus, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Senecio vulgaris, Solanum nigrum, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica spp., Vicia spp..

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Grano e cereali minori (orzo, avena, segale): il trattamento può essere effettuato dallo stadio di 5-6 foglie della coltura e fino allo stadio di botticella. E' comunque consigliabile trattare quanto più precocemente possibile al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe. Dose applicativa: 0,8-1,5 Kg/Ha.

Mais: Applicare il prodotto in post-emergenza, con erbe già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di 40 cm. Il prodotto, distribuito in questa fase, è in grado di controllare, oltre alle dicotiledoni annuali, anche piante perenni, fra le quali, di preminente importanza per il mais, il Convolvulus sepium e Convolvulus arvensis. Dose applicativa: 0,8-1,2 Kg/Ha.

Asparago: Il prodotto si impiega in primavera, prima dell'emergenza dei turioni. Il trattamento va eseguito preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido. Dose applicativa: 0,200-0,600 Kg/Ha. Il prodotto, per una razionale distribuzione, va diluito in 5-6 quintali di acqua per Ha.

AVVERTENZE

— Non applicare il prodotto su colture di mais, impiantate su terreni sabbiosi o con basso contenuto di materia organica (meno del 2%), in quanto in questi terreni, il prodotto, oltre ad essere facilmente dilavato dalle piogge, potrebbe essere fitotossico per la coltura.
— Non trattare mais di altezza superiore ai 60-70 cm.
— Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Qualora le condizioni operative lo richiedano, il prodotto può essere impiegato in miscela con MCPA e MECOPROP, a dosi dimezzate.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A.

contenuto Kg.

prodotto nello stabilimento di
SIAPA S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

6402

IV CLASSE

SILFOL PB

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE A LUNGA PERSISTENZA

Registrazione Ministero Sanità n. 6402 del 16.5.85
marchio depositato n.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

— Captafol puro	g. 80
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito, ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto stesso.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il SILFOL PB è un fungicida di sintesi di alta efficacia e persistenza in grado di controllare numerose malattie delle piante. La sua efficacia, unitamente alla sua buona selettività sulla vegetazione, rende particolarmente interessante il suo impiego nella difesa delle colture dalle crittogame parassite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

— Bolla del pesco e del mandorlo, gommosi e cancro delle drupacee: 250 g/Hl per i trattamenti al « bruno » e
150 g/Hl per i trattamenti su piante in piena vegetazione.
Date le caratteristiche del prodotto, il normale calendario di trattamento al « bruno », che prevede un 1° intervento alla caduta delle foglie, un 2° in primavera nella fase di ingrossamento delle gemme a fiore, ed eventualmente un 3° da effettuarsi in pieno inverno, può essere sostituito da un unico trattamento alla dose di 800 g/Hl da effettuare alla caduta delle foglie.
— Occhio di pavone dell'olivo: 250-300 g/Hl.
Effettuare 2 trattamenti, di cui il 1° in pre-fioritura ed il 2° ai primi di Settembre. Con andamento stagionale piovoso, il 2° trattamento dovrà essere anticipato di 2/3 settimane.
— Cancri del legno del melo e del pero: 200 g/Hl.
da applicarsi nella fase di « orecchiette di topo » per il melo e di « mazzetti affioranti » per il pero.
A questo primo trattamento dovranno seguirne altri due, di cui il primo all'inizio della caduta delle foglie ed il secondo a defogliazione completa.
— Fusariosi del garofano: 100 g/Hl.
Immergere le talee nella sospensione ottenuta, prima di trapiantarle. Qualora lo si desideri il prodotto potrà essere applicato, alla stessa dose, per irrorazione sulle piantine già trapiantate, avendo cura di bagnare bene il terreno intorno alle stesse.
— Concia secca dei semi: applicare 200 g/qle per riso, grano, orzo, avena, segale e mais.
Per la barbabietola la dose di SILFOL PB per quintale di seme dovrà essere di 600 g.
Il prodotto è efficace contro le principali malattie trasmesse dal seme, quali, elmintosporiosi, mal del piede dei cereali, brusone del riso, elmintosporiosi del mais, cercosporiosi e mal del piede della barbabietola.
— Altre malattie che si combattono con il SILFOL PB:
Muffa grigia e Peronospora della vite, 120-150 g/Hl, sospendendo i trattamenti sei settimane prima del raccolto per le uve da vino (sulle uve bianche il prodotto può dar luogo, in alcuni casi, a fenomeni fitotossici sugli acini se impiegato nel periodo che segue immediatamente la fioritura); Ticchiolatura del melo e del pero 75-150 g/Hl; Marciume bruno dell'albicocco, del ciliegio e del mandorlo 250 g/Hl nei trattamenti al « bruno », 100-150 g/Hl nei trattamenti al « verde »; Ruggine del pesco e del susino 150 g/Hl; Cilindrosporiosi del ciliegio 100 g/Hl; Allupatura e Melanosi degli agrumi 150 g/Hl; Gommosi del colletto degli agrumi mediante pennellature del tronco 150 g/Hl; Peronospora e Ticchiolatura della rosa 100 g/Hl; Ruggine del garofano 150 g/Hl; Muffa grigia della fragola 200 g/Hl; Peronospora, Alternariosi, Septoriosi del pomodoro 150-200 g/Hl; Peronospora ed Alternariosi della patata 200 g/Hl; Alternariosi del pero 150 g/Hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il SILFOL PB è compatibile con la generalità dei fungicidi, insetticidi ed acaricidi in commercio. Da escludere le miscele con prodotti a reazione alcalina e con gli olii.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER TUTTE LE COLTURE ESCLUSA LA VITE SULLA QUALE I TRATTAMENTI DOVRANNO ESSERE SOSPESI 40 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A.
prodotto nello stabilimento di
Aprilia (Latina)

Contenuto Kg.

6403

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

BORDOCRITT FB

(POLVERE BAGNABILE)
FUNGICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DELLA PERONOSPORA DELLA VITE, DEL POMODORO, DELLA PATATA E DELLA CIPOLLA

Registrazione Ministero Sanità n. 6403 del 6.5.85
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

— Benalaxyl puro	g. 5
— Rame metallo (sotto forma di solfato)	g. 9
— Folpet puro	g. 24
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie, possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro d'acqua) e digitale.

AVVERTENZA
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un formulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta.
Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
Il prodotto svolge inoltre un'azione collaterale contro l'Alternaria, Septoria e Botritys cinerea.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite: (Plasmopara viticola): 300-350 g/hl.
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria. I successivi si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo del grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. In assenza di piogge infettanti un trattamento andrà, comunque, effettuato non più tardi della differenziazione dei grappoli florali (7-8 foglie). Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi ad azione di copertura e citotropica.

Pomodoro: (Phytophthera infestans): 400-500 g/hl.
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli alla infezione; nei trattamenti di chiusura usare fungicidi ad azione di copertura e citotropica.

Patata: Peronospora (Phytophthora infestans): 400-500 g/hl.
Effettuare non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e gli altri distanziati di 14 giorni. Nei trattamenti successivi usare fungicidi ad azione di copertura e citotropica, i quali possono essere impiegati sin dall'inizio, nei casi di minore pericolo dell'infezione.
Non impiegare il sistemico come eradicante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il pericolo dell'insorgenza della resistenza.

Cipolla: Peronospora (Peronospora destructor): 350-400 g/hl.
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione. Per favorire l'attività del prodotto è consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante, es. IROL 50 cc/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fungicidi, insetticidi e concimi fogliari, di normale impiego sulle colture anzidette.
Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco.
Devono trascorrere almeno 20 giorni dall'applicazione di olii minerali e prodotti a base di zolfo.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non impiegare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili e per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

SULLE UVE DA VINO OCCORRE SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA PER NON OSTACOLARE LA FERMENTAZIONE DEI MOSTI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.
prodotto nello stabilimento di
SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina)

Contenuto Kg.

6405

BAYFIDAN EC

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro l'oidio (mal bianco) di pesco e nettarine, della vite, e contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano, orzo), e degli ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone)

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Bayfidan EC contengono:
g 22,9 di triadimenol puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non caratteristici, malessere, contrazioni, effetto sedativo.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: terapia sintomatica previo controllo delle funzioni epatiche e renali.
In caso d'ingestione: lavanda gastrica precauzionale, tenendo presente che l'azione irritativa non esclude il pericolo di perforazione.
Controindicazioni: latte, olii, alcool, carbonati e bicarbonati.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Drupacee (pesco e nettarine): contro l'oidio: 0,01-0,02% (10-20 cc in 100 lt d'acqua).
Vite: contro l'oidio: 0,008-0,015% (8-15 cc in 100 lt d'acqua).
Ortaggi (pomodoro, peperone, cetriolo, melone): contro mal bianco: 0,01-0,02% (10-20 cc in 100 lt d'acqua).
N.B. - Per la distribuzione del prodotto impiegare il quantitativo d'acqua sufficiente da assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10-15 hl/ha per vite). Usare la dose più elevata nei casi di maggiore sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.
Cereali (grano, orzo): contro mal bianco e ruggini: 0,4-0,5 lt/ha diluiti in 600-800 litri d'acqua intervenendo preventivamente dalla fase di spigatura fino alla fioritura oppure alla comparsa dei primi sintomi.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Bayfidan EC può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi e vite, 10 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, 30 giorni prima del raccolto per cereali

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 6405 **del** 16.5.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

It

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6406

ENORIS - M

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA DEL RISO

COMPOSIZIONE

— Propanil puro	gr. 20
— MCPA (sotto forma di estere isobutilico)	gr. 8
— MECOPROP (sotto forma di estere isobutilico)	gr. 13
— Emulsionanti e solvente	q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione: Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici: Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: è sconsigliata la digitale. **Avvertenza:** Consultare un Centro antiveleni e nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centro di Rianimazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si utilizza alla dose di Kg 4-5/Ha in 500 litri d'acqua 35-50 giorni dopo la semina del riso, con le camere in asciutta con le infestanti completamente scoperte.

È attivo nei confronti di: Quadrello, Cucchiaio, Cipollino, Erba saetta, Porretta, Cyperus spp., Sparganium spp. e in parte contro Biodo o Fiorone. Dopo 40-50 ore dal trattamento rimettere l'acqua nella risaia a livello normale.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi ed altri antiparassitari e non deve essere distribuito 5 giorni prima o dopo l'impiego di questi prodotti altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature. Non eseguire il trattamento nel caso si preveda una pioggia a distanza di 3-8 ore.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la soluzione diserbante e i suoi vapori vengano a contatto con le colture vicine sensibili ai fenossiderivati (fruttiferi, arboree in genere, vite, pioppo, colture ortive e floricole.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S.p.A.
Melilli (SR)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. 6406 del 6.5.85 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg.

6407

FENISTAR (R) D

Diserbante in pasta idrosolubile selettivo per Frumento e altri cereali (Segale, Orzo, Avena).

Il prodotto oltre a distruggere le infestanti dicotiledoni normalmente controllate dai diserbanti a base di 2,4-D (Veccia, Capsella, Ranuncoli, Senape, Colza, Fiordaliso, Ederella, Coda cavallina, Stoppione) controlla efficacemente le malerbe resistenti quali Stellaria media, Matricaria chamomilla, Galium aparine, Cerastium spp., Fumaria officinalis, Anagallis, le varie Poligonacee, nonché il Papaver rhoeas, talvolta insufficientemente controllate dal 2,4-D da solo.

Inoltre puó essere impiegato a cominciare dalla fase di inizio accestimento e quindi in epoca anticipata rispetto ai diserbanti ormonici permettendo la distruzione precoce delle infestanti.

COMPOSIZIONE

- Mecoprop puro (da sale dimetilamminico)	g	13,4
- Dicamba puro (da sale dimetilamminico)	g	0,84
- DNOC puro (da sale ammonico)	g	23
- Coadiuventi, tensioattivi, inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

Attenzione: data l'elevata tossicitá del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

I CLASSE

VELENO

Registrazione n. 6407 del 6.5.85 Ministero della Sanitá

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali; conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua; evitare di respirare i vapori; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle e gli occhi; durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi, dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi piú idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde piú di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

Sintomi d'intossicazione: Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia, Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici

Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente é cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o Fleboclisi glucosate al 5% e di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.

Controindicazioni: Atropina.

Consultare un Centro antiveleni e nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in Centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto va impiegato quando la temperatura dell'ambiente é superiore a 10°C e nel periodo che va dall'inizio dell'accestimento sino alla fine dell'accestimento, cioé prima dell'inizio della levata.

La dose di impiego varia da 6 a 8 Kg/ha che vanno diluiti in 400 o piú litri di acqua; usare la dose massima quando la temperatura é di poco superiore al 10°C e quando sono presenti le infestanti resistenti al 2,4-D come Stellaria, Camomilla, Gallio, Poligonacee; usare la dose minima con temperatura superiore a 18-20°C e in presenza delle infestanti piú sensibili come Veccia, Capsella, Senape; con temperature intermedie e con infestanti mediamente sensibili usare la dose intermedia.

Le dosi basse vanno adottate quando il frumento é lussureggiante per abbondanti concimazioni azotate e su varietá di frumento piú sensibili ai diserbanti ormonici.

Preparazione della poltiglia: versare direttamente il diserbante nel totale quantitativo di acqua ed agitare con cura.

Le pompe usate per applicare le poltiglie diserbanti, non devono essere impiegate per altri trattamenti insetticidi ed anticrittogamici; altrimenti debbono essere ripetutamente lavate con acqua calda e soda. Si sconsiglia l'uso di pompe con serbatoi di legno piú difficili da bonificare dai residui.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilitá: il prodotto é miscibile con i piú comuni diserbanti. E' consigliabile peró procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti che si vogliono associare non presentino incompatibilitá tra gli eccipienti. La precipitazione di fiocchi abbondante od un'alterazione del colore sconsiglierá la miscelazione.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piú lungo.

Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piú tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicitá: il prodotto é dannoso per le viti, per gli ortaggi, per i fruttiferi, per i pioppi e per le colture non indicate in etichetta.

Occorre evitare che il diserbante giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

La semina del Trifoglio e dell'Erba medica in campi diserbati con il prodotto potrá essere eseguita circa 10-12 giorni dopo l'applicazione, previa buona erpicatura per rompere lo strato di terreno trattato.

Rischi di nocivitá: il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso é pericoloso.

Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

6408

FENAMAN (R)

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa di melo, pero, vite, colture di garofano.
Si impiega in trattamenti liquidi contro Ticchiolatura ed Oidio del melo, Ticchiolatura del pero, Peronospora ed Oidio della vite, Oidii, Septorie, Antracnosi, Ruggini, Ticchiolature di colture di garofano.

COMPOSIZIONE		
- Fenarimol puro	g	1,5
- Mancozeb puro	g	60
- Coadiuvanti ed inerti: quanto basta a	g	100

(R) marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM–Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 6408 del 6.5.85 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua, non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente, se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate: irrorato con pompe a volume normale.

Pomacee (melo e pero): contro Ticchiolatura ed Oidio del melo, Ticchiolatura del pero: **200-300 g/hl.**

Vite: contro Peronospora e Oidio della vite : **200-300 g/hl.**

Colture di garofano: contro Oidii, Septorie, Antracnosi, Ruggini, Ticchiolatura: **200-350 g/hl.**

Intervenire alla prima comparsa della malattia, ripetendo i trattamenti secondo necessità ad opportuni intervalli.

Preparazione della poltiglia: stemperare accuratamente in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Da non impiegare in serra

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate

Compatibilità: il prodotto non è compatibile in miscela con sostanze alcaline, come Polisolfuri, Poltiglia bordolese, Calce. E' miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: su alcune cultivar di pero (Butirra Precoce Morettini, Conference, Curato, Principessa di Gonzaga, Zucchermanna, Butirra Clairgeau, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona, Spadoncina, Scipiona, Coscia, Mora, Giardina, Spinacarpi, Armella, S. Maria, Decana del Comizio, Abate Fetel), il prodotto può dar luogo a manifestazioni fitotossiche e pertanto se ne sconsiglia l'uso.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

6409

Classe III

ATTENZIONE manipolare con prudenza

GALBEN® M 3-24 BLU
Sospensione Concentrata (Flowable)

Fungicida liquido dotato di azione sistemica e di copertura per la lotta contro la peronospora della vite e del pomodoro

COMPOSIZIONE

Benalaxyl puro	g 3
Mancozeb puro	g 24
Veicoli disperdenti, bagnanti, coloranti e diluenti (contiene glicole etilenico)	q.b. a g 100

GRUPPO MONTEDISON

FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 6409 **del** 6.5.85

● Marchio registrato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN M 3-24 BLU Sospensione Concentrata (Flowable) è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso garantisce infatti una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere.
La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite e Alternaria e Septoria del pomodoro.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 500 - 600

Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria. I successivi si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe.
In assenza di piogge infettanti un trattamento andrà, comunque, effettuato non più tardi della differenziazione dei grappoli fioriti (7-8 foglie). Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO

Peronospora (Phytophthora infestans): g 700-800

Applicazioni in pieno campo a cadenza fissa quindicinale a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione e fino e non oltre l'inizio della fioritura del primo palco.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DIVIETI DI IMPIEGO
— DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
— DA NON IMPIEGARE IN SERRA
— DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità

Il GALBEN M 3-24 BLU Sospensione Concentrata (Flowable) può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio. È miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificasse casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

AGITARE PRIMA DELL'USO

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto;
— conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dell'umidità e dal calore;
— in caso di malessere, ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta;
— durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

Nei casi gravi, ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi, se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatic .
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA

Consultare un Centro Antiveleni.

6410

ARMONIL

COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI
gr. 75 CLOROTALONIL puro
Coformulanti q.b. a 100.

C L A S S E I V

Fungicida organico a vasto spettro d'azione per la difesa preventiva contro: la Ticchiolatura e Gloeosporium album del melo e del pero, la Peronospora della vite, pomodoro, patata, tabacco, cavolo, cetriolo, cipolla, insalata, peperone; la Bolla, il Nerume e la Moniliosi del pesco; contro l'Alternariosi del pomodoro, cavolo, fagiolo, carota, cipolla, melanzana; contro Ruggine del frumento, asparago, pisello; contro la Cercospora della bietola, sedano, carota, cetriolo; contro l'Antracnosi della vite, pomodoro, fagiolo, pisello; contro la Septoria del sedano, frumento; contro vaiolatura e muffa grigia della fragola; contro Escoriosi della vite.

NORME PRECAUZIONALI

- *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici*
- *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua*
- *Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Diluire direttamente in 100 litri d'acqua la dose prescritta del prodotto.

DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI D'ACQUA:

Per trattamenti autunno-invernali su melo, pero, vite, pesco, ciliegio, albicocco e susino	*300 gr*
Per trattamenti primaverili-estivi su melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco e susino	*150-200 gr*
" " " " " vite	*150 gr*
Contro Gloeosporium album su melo, pero	*200 gr*
Colture orticole	*150 - 250 gr.*
Frumento	*250 - 300 gr.*

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

L'ARMONIL è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in uso, esclusi quelli alcalini. Evitare miscele con formulati emulsionabili, a meno che non si facciano prima prove preliminari di miscibilità.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Può provocare in condizioni ambientali particolari fenomeni di rugginosità su alcune varietà di melo a buccia gialla e rossa.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

"Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto, è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

J. & A. MARGESIN S.p.A. - Fitofarmaci - Lana d'Adige (BZ)

Sede ed officina di produzione: Lana d'Adige (BZ)

REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SANITA' N° 6410 *DEL* 16.5.85

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO: KG.

|11|84|AD|1| |

6411

BAYTAN CONCIA CEREALI

FUNGICIDA ORGANICO

per la concia delle sementi dei cereali (grano, orzo, avena)

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Baytan concia cereali contengono:
g 15 di triadimenol puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non caratteristici, malessere, contrazioni, effetto sedativo.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: terapia sintomatica previo controllo delle funzioni epatiche e renali.
In caso d'ingestione: lavanda gastrica precauzionale, tenendo presente che l'azione irritativa non esclude il pericolo di perforazione.

Controindicazioni: latte, olii, alcool, carbonati e bicarbonati.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Caratteristiche: il Baytan concia cereali è un **fungicida sistemico** ad ampio spettro d'azione, particolarmente indicato come conciante per le sementi dei cereali; in quanto sistemico combatte non solo le malattie fungine che attaccano il seme ma anche alcune malattie che si possono sviluppare precocemente sulle piantine.

Campi e dosi di impiego

Grano: 150-250 g/q.le di semente contro carie, carbone, elmintosporiosi e septoria ed attacchi precoci di oidio e ruggini, con buona azione collaterale contro Fusarium Sp.

Orzo: 150-250 g/q.le di semente contro carbone fisso e volante, elmintosporiosi, septoria ed attacchi precoci di oidio, ruggini e rincosporiosi, con buona azione collaterale contro Fusarium Sp e Typhula incarnata.

Avena: 150-250 g/q.le di semente contro elmintosporiosi, septoria e carbone.

N.B.: qualora si debbano combattere solo carie e carboni è sufficiente impiegare la dose di 150 g/q.le di semente.

Modo di impiego: il Baytan concia cereali può essere impiegato per la concia secca e umida delle sementi.

Per la concia umida diluire la dose prescritta di prodotto in acqua e quindi mescolare con la semente il più uniformemente possibile. Il quantitativo di acqua ottimale per q.le di semente varia a seconda delle apparecchiature impiegate. Eseguire la concia con apparecchiature ben pulite in cui non devono essere presenti residui di altri prodotti concianti.

Per evitare sotto dosaggi e sopra dosaggi misurare esattamente la quantità di conciante consigliata.

Avvertenza: i semi trattati con Baytan concia cereali non possono essere destinati all'alimentazione umana ed animale.

Compatibilità: il Baytan concia cereali è compatibile con concianti fungicidi ed insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco
Registrazione Ministero Sanità n. 6411 **del** 16 - 5 - 85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6412

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

ZEPEX M

(EMULSIONE)

ERBICIDA A BASE DI CYANAZINA ED MCPA, PER LA LOTTA CONTRO LE ERBE INFESTANTI IL FRUMENTO.

Registrazione Ministero Sanità n.6412 del 16.5.85

Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

— Cyanazina pura	g 5,5
— MCPA puro	g 21,9
— Coformulanti (*)	q.b. a g 100,0

(*) Contiene glicole etilenico

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: depressione, letargia, respirazione rapida e affannosa, vasodilatazione generalizzata.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di ingestione accidentale provocare subito il vomito somministrando acqua salata; lavanda gastrica. In caso di grave contaminazione cutanea lavare molto bene le parti colpite con acqua e sapone e tenere il paziente a riposo e al caldo.
Terapia sintomatica in base al controllo del bilancio idrico ed elettrolitico, della respirazione e della pressione arteriosa. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Lo ZEPEX M, oltre a colpire le malerbe controllate dall'MCPA, è efficace anche contro specie particolarmente resistenti, quali Stellaria spp. (Centocchio), Poa spp. (Gramigna delle vie), Veronica spp. (Morso di gallina - Veronica querciola), Fumaria spp. (Fumaria), Galium spp. (Gallio - Attaccamani), Lamium spp. (Lamio - Falsa ortica), Polygonum spp. (Persicaria), Galeopsis spp. (Canapa selvatica), Matricaria spp. (Camomilla), Bifora spp. (Coriandolo fetido), Sinapis spp. (Senape), Artemisia spp. (Artemisia).
Lo ZEPEX M agisce sulle erbe infestanti per via fogliare e radicale.
L'MCPA, contenuto nella miscela, interferisce quale fenossi-composto, sul metabolismo delle malerbe, mentre la Cyanazina inibisce la fotosintesi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Le applicazioni sono da effettuarsi con infestanti già emerse ed in uno stadio giovanile, il che corrisponde normalmente nel Sud-Italia allo stadio di inizio accestimento — fine accestimento del grano e nel Centro-Nord-Italia, allo stadio di pieno accestimento — raddrizzamento del grano.
Usare 3-3,5 kg di formulato per ettaro, in una quantità di acqua di 300-500 litri per ettaro, impiegando le normali motopompe.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non si consiglia di miscelare il formulato con altri prodotti diserbanti.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per l'erba medica; può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (BO)

contenuto Kg.

DINOCAP AGRO

6413

FUNGICIDA ORGANICO CONTRO OIDIO E MAL BIANCO **CLASSE III**

COMPOSIZIONE
Dinocap tecnico g. 25
(Costituito da 78% di Dinitro - (1 - Metil - Eptil) - Fenil crotonato, da 4% di Fenoli liberi e 18% di altri prodotti di reazione fra cui principalmente (1 - Metil Eptil) Fenoli.)
Disperdenti e coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: sudorazione, sete, nausea, spossatezza, agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, ipertermia, colorazione gialla delle sclere.

Terapia: In caso di intossicazione acuta ricorrere alla lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% di iposolfito di sodio al 5% (non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni all'esofago, molto frequenti in caso di ingestione). Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Analettici (tipo simpatolo, veritolo e coramina) somministrati per via parentale, se esiste una lieve sindrome ipotensiva; qualora questa fosse di grado elevato il paziente va ricoverato in reparto di rianimazione per trattamento più idoneo. Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche in caso di collasso ed ipotensione grave. Metil e propiltiouracile fa ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale. È controindicata l'atropina.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il DINOCAP AGRO è uno specifico fungicida organico antioidico che esplica, oltre ad un'azione preventiva, anche un'efficace azione curativa. Esso trova impiego sulla vite contro oidio, su melo, su pesco contro oidio, su zucchino e melone contro oidio, su tabacco, pisello, pomodoro e colture floreali (rosa) contro oidio.

EPOCA DI APPLICAZIONE
Iniziare i trattamenti al manifestarsi dei primi sintomi della malattia ripetendoli secondo lo sviluppo della malattia stessa.

DOSI DI IMPIEGO per 100 litri d'acqua

Melo, pero, pesco	**gr. 80/120**
Tabacco, pisello, pomodoro	**gr. 60/100**
Melone, zucchino	**gr. 45/80**
Colture floreali	**gr. 30/60**
VITE	gr. 100/120

DA NON APPLICARE COM MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica ed alcalina (Poltiglia bordolese, Polisolfuri) con Endosulfan, Promecarb, Carbofenothion, Ethion, Binapacryl, Dimeton-Metile, Triclorfon, Olii minerali, TMTD, Urea).
Per l'applicazione a piante di melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e prima della fioritura non deve essere miscelato con Parathion.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non deve essere distribuito durante la fioritura. Se ne sconsiglia l'impiego su vitigni Nebiolo, Schiava, Traminer perchè può produrre fitotossicità. Non impiegare con temperatura superiore ai 32° C.

AVVERTENZA: deve essere impiegato a distanza di tre settimane dalla distribuzione di olii minerali e di qualunque formulato emulsionabile.

RISCHI DI NOCIVITÀ
È tossico per alcuni acari ed insetti utili.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni; 7 giorni per le Cucurbitacee.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
— Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BOLOGNA

Prodotto fabbricato nello Stabilimento DIACHEM S.p.A. di Albano S. Aessandro (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6413 del 16.5.85

Peso kg. **DA NON VENDERSI SFUSO**

6414

FONOFOS 5 ALMAGIA'

INSETTICIDA PER IL TERRENO IN FORMULAZIONE GRANULARE AD AZIONE PER CONTATTO ED INGESTIONE

Composizione:

FONOFOS puro	.	gr. 4,5
Coformulanti	q.b. a	gr. 100,0

I CLASSE

VELENO

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 N. 1255.

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalaziono, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere, ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc somministrato per iniezione lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto s'impiega per la disinfestazione del terreno da insetti quali elateridi, grilli, larve di maggiolino, tipule, grillotalpa, zabro gobbo, oziorrinco.
Il prodotto s'impiega su terreno destinato a **colture erbacee in genere** quali cereali (grano, sorgo, mais), barbabietola da zucchero, tabacco, leguminose da foraggio (erba medica), e sulle **colture ortive** quali composite (indivia, lattuga, carciofo, cicoria), crucifere (rapa, ravanello, cavolfiore), pomodoro, patata, ombrellifere (sedano, finocchio, carota), leguminose (pisello, fagiolo), cipolla, porro, aglio.
La dose d'impiego è di 60-80 kg/ha per trattamenti a pieno campo ed in funzione dei parassiti da combattere. Ridurre opportunamente tale dose per trattamenti localizzati. **Effettuare i trattamenti prima delle semine e dei trapianti**, distribuendo uniformemente il prodotto su tutta la superficie ed incorporandolo con una zappatura od erpicatura.

Per terreni destinati alla coltura di carota, i trattamenti debbono essere effettuati 3 mesi prima della sua semina. Su cipolla, cavolo e ravanello, impiegare il prodotto solo su colture destinate alla produzione del seme.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: si consiglia di usare il prodotto da solo.

Fitotossicità: non effettuare trattamenti localizzati su cavolo, ravanello, tabacco e barbabietola da zucchero.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizioni essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

Raffinerie ALMAGIA's.p.A.

Via Magazzini Posteriori, 31 - 48100 RAVENNA

Stabilimento produttore: LABORATORI CHIMICI CIFA
CARAVAGGIO (Bergamo)
Registrazione Ministero della Sanità N. 6414 **del** 16.5.85

6415

AZINFOS-METILE ALMAGIA'

INSETTICIDA IN FORMULAZIONE POLVERE BAGNABILE

I CLASSE

VELENO

Composizione:

AZINFOS-METILE puro . . . gr. 25
Coformulanti . q.b. a gr. 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 N. 1255.

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere, ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

Caratteristiche: insetticida ad azione per contatto ed ingestione.

Combatte i seguenti parassiti: tignole, anarsia, orgia, fillobio, antonomo, carpocapsa, larve ricamatrici, microlepidotteri minatori, cocciniglie, cicaline, psilla, cleono, altica, punteruolo, nottue, dorifora, tripidi, coleotteri, tentredini.

Colture protette: orticoltura (sedano, carota, bietola da costa, spinacio, asparago, aglio, porro, cipolla, finocchio, fagiolo, cece, pisello, fava, indivia, lattuga, cicoria, radicchio, cardo, carciofi, zucca, cetriolo, cavoli, ravanello, rapa, patata, pomodoro, peperone, melanzana), vite, olivo, frutticoltura (pompelmo, mandarancio, limone, arancio, chinotto, cedro, bergamotto, mandarino, pero, fragola, melo, ciliegio, albicocco, pesco, susino, mandorlo), erba medica, barbabietola da zucchero, cereali, colture industriali di piante ornamentali e da fiore, piante forestali.

Dosi d'impiego: il prodotto viene impiegato alla dose di 150-200 grammi ogni 100 litri d'acqua; per la barbabietola da zucchero kg. 1,2-1,5/ha.

Epoche d'applicazione e modalità d'uso: impiegare l'insetticida alla comparsa dei primi parassiti ed ogni volta si manifesta una reinfestazione degli stessi. Versare l'insetticida nella quantità d'acqua consigliata e mescolare bene; l'applicazione dello stesso viene effettuata con pompe a volume normale.

Da non applicare mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizioni essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

Raffinerie ALMAGIA' S.p.A.

Via Magazzini Posteriori, 31 - 48100 RAVENNA

Stabilimento produttore: LABORATORI CHIMICI CIFA CARAVAGGIO (Bergamo)

Registrazione Ministero della Sanità N. 6415 **del** 16.5.85

6416

Natura dei rischi di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite.
Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: Nei casi gravi ricovero urgente in rianimazione. Negli altri casi se l'avvelenamento è avvenuto per ingestione, provocare il vomito. Praticare la lavanda gastrica solo se il paziente è cosciente; se è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

Mancoz FA

Anticrittogamico

Composizione riferita a 100 g.:

— Mancozeb puro . . . . . . g. 37
— Coadiuvanti ed inerti . . . . . q. b. a g. 100
Contiene glicol etilenico

CLASSE III

ATTENZIONE

MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMIA *s. p. a.*

Prodotto nello stabilimento CHEMIA spa di S. Agostino (Fe) - S. S. 255 - Km. 46

Reg. n 6416 del 16.5.85 del Ministero della Sanità.

Peso Kg.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Il prodotto si impiega alla dose di g. 200 - 300/100 litri di acqua su:

— Vite contro la peronospora;
— Melo e Pero contro la ticchiolatura;
— Pomodoro contro peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi, solo fino alla prima fioritura;
— Pioppo contro ticchiolatura, marsonnina; contro ruggine, septoriosi;
— Cereali in campo contro, grano, orzo, segale e avena,
— Tabacco contro peronospora tabicina.

In floricoltura si impiega alla dose di 200 g. per 100 litri di acqua contro: alternaria, ruggine e eterosporiosi del garofano in pien ocampo.

Nella concia dei semi si impiega alla dose di g. 200 - 300/q.le di semente contro: carie, carboni fissi, elmintosporiosi. Stemperare il prodotto in poca acqua e diluire poi nel totale quantitativo di acqua.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA.

DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Quarora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non trattare le varietà di pero sensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni. Per il pomodoro trattamenti sono ammessi solo fino alla prima fioritura.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodoto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

6417

DIPTEREX POLVERE

INSETTICIDA

per trattamenti polverulenti in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, fragolicoltura, bieticoltura, agrumicoltura, olivicoltura, maiscoltura e soia

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Dipterex polvere contengono:
g 5 di triclorfon puro
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, per inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi sciallorea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè e presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 15-40 kg/ha a seconda del parassita da combattere, e dello sviluppo della vegetazione.
Frutticoltura: ciliegio: contro la mosca; **pesco:** contro la cidia e la anarsia.
Viticoltura: contro le tignole, la tortrice e l'Eulia pulchellana.
Orticoltura: sedano, cipolla, aglio contro la mosca.
Fragolicoltura: contro i tortricidi (Pandemis dumetana, Argyroploce lacunana, Choristoneura lafauryana).
Barbabietola da zucchero: contro le nottue (Mamestra sp, Agrotis sp, Laphygma sp) e contro la mosca.
Agrumicoltura: contro la tignola, la cimice verde e gli adulti della mosca della frutta.
Olivicoltura: contro la tignola e la mosca.
Maiscoltura: contro la seconda generazione della piralide.
Soia: contro mosca (Hylemia), nottue e tortricidi.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il Dipterex polvere è miscibile con gli antiparassitari in polvere. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non effettuare trattamenti su fiori aperti.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Filago (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 6417 **del** 6.5.85

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

6418

ERBOTAN® 5 G

Granulare.
Diserbante totale per raffinerie e aree industriali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
5 g tiazafluron puro
q.b. a 100 g coformulanti

II CLASSE

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SCAM, Modena

Registrazione Ministero della Sanità n. 6418 del 6.2.85
® marchio depositato

Natura del rischio
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospergendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
Sintomi di intossicazione
Non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo.
Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento compaiono in 1-2 h dopo il trattamento: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva o ventrale, pelo arruffato.
Tali sintomi sono più accentuati se maggiore è la dose somministrata.

Trattamenti terapeutici, ivi compresi gli antidoti generali e specifici
Non si conosce l'antidoto specifico, terapia sintomatica.

Prove chimiche per la prevenzione, la diagnosi delle intossicazioni
Non note.

Caratteristiche
ERBOTAN 5 G agisce prevalentemente per assorbimento radicale e la sua azione è legata ad una buona umidità del terreno all'epoca del trattamento o nel periodo immediatamente successivo. Il suo spettro d'azione è ampio e comprende sia infestanti annuali, sia infestanti perennanti erbacee ed arbustive, quali fra le più importanti: Paspalum, Sorghum h., Cyperacee, Umbrellifarae, Artemisia.
Il prodotto ha un effetto iniziale molto lento, ma la sua persistenza d'azione è normalmente lunga e direttamente proporzionale alle dosi d'impiego.

Dosi e modalità d'impiego
— **Trattamenti eradicanti contro infestazioni erbacee ed arbustive:** Kg 200-300/ha.
— **Trattamenti decespuglianti quando si voglia risparmiare le specie erbacee più resistenti (esempio Cynodon):** Kg 120-200/ha.
— **Trattamenti di mantenimento su terreni puliti:** Kg 80-100/ha.

Il prodotto si distribuisce tal quale.
I trattamenti devono essere eseguiti prima della fine del periodo piovoso, cioè, orientativamente, nei mesi di febbraio-aprile al Nord e novembre-febbraio al Centro-Sud.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto può essere miscelato con gli erbicidi triazinici o per migliorare l'efficacia iniziale, con gli erbicidi che agiscono per via fogliare (dalapon, paraquat).
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto, anche se miscelato con altro formulato, dovrà essere usato solo per gli impieghi indicati in etichetta.

Fitotossicità
Il prodotto è fitotossico per tutte le colture.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg

ERBOTAN® 50 WP

Polvere bagnabile.
Diserbante totale per raffinerie e aree industriali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
50 g tiazafluron puro
q.b. a 100 g coformulanti

II CLASSE

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SILIA, Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6419 del 6.5.85
® marchio depositato

Natura del rischio
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro e cospergendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico
Sintomi di intossicazione
Non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo.
Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento compaiono in 1-2 h dopo il trattamento: sedazione, dispnea, esoftalmo, posizione curva o ventrale, pelo arruffato.
Tali sintomi sono più accentuati se maggiore è la dose somministrata.

Trattamenti terapeutici, ivi compresi gli antidoti generali e specifici
Non si conosce l'antidoto specifico, terapia sintomatica.

Prove chimiche per la prevenzione, la diagnosi delle intossicazioni
Non note.

Caratteristiche
ERBOTAN 50 WP agisce prevalentemente per assorbimento radicale e la sua azione è legata ad una buona umidità del terreno all'epoca del trattamento o nel periodo immediatamente successivo. Il suo spettro d'azione è ampio e comprende sia infestanti annuali, sia infestanti perennanti erbacee ed arbustive, quali fra le più importanti: Paspalum, Sorghum h., Cyperacee, Umbrelliferae, Artemisia.
Il prodotto ha un effetto iniziale molto lento, ma la sua persistenza d'azione è normalmente lunga e direttamente proporzionale alle dosi d'impiego.

Dosi e modalità d'impiego
— **Trattamenti eradicanti contro infestazione erbacea ed arbustiva:** Kg 20-30/ha.
— **Trattamenti di mantenimento su terreni puliti:** Kg 8-10/ha.

I trattamenti devono essere eseguiti prima della fine del periodo piovoso, cioè, orientativamente, nei mesi di febbraio-aprile al Nord e novembre-febbraio al Centro-Sud.
Per la distribuzione del prodotto si utilizza un quantitativo di acqua variabile da 500 litri o più per ettaro in assenza di infestanti e di 1000-2000 litri in presenza delle infestanti.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto può essere miscelato con gli erbicidi triazinici o per migliorare l'efficacia iniziale, con gli erbicidi che agiscono per via fogliare (dalapon, paraquat).
« Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto, anche se miscelato con altro formulato, dovrà essere usato solo per gli impieghi indicati in etichetta.

Fitotossicità
Il prodotto è fitotossico per tutte le colture.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO Kg

6420

FRIGATE SDS

Coadiuvante di formulazioni erbicide a base di GLIPHOSATE
Liquido solubile.

COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:
g 83,5 Etossilato di Ammina Grassa (72%di Etilene Ossido)
Isobutanolo q.b. a 100 g

SDS BIOTECH AGRICOLTURA Srl
Via Vincenzo Monti, 8 Milano -
Officina di produzione :
SIPCAM - SpA
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 6420 del 6.5.85 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il FRIGATE SDS è un coadiuvante che va aggiunto, al momento dell'impiego, alle formulazioni erbicide a base di Gliphosate.
Il FRIGATE SDS favorisce la bagnabilità dell'erbicida aumentandone l'efficacia e consentendo di conseguenza di ridurre la dose per ettaro dell'erbicida stesso.

MODALITA' – APPLICAZIONI – DOSE D'IMPIEGO

Le modalità di impiego del prodotto sono le stesse indicate per le formulazioni a base di Gliphosate, per il controllo delle infestanti perenni e annuali.

La dose d'impiego del prodotto è di litri 0,5 per hl. di acqua da miscelarsi con una dose ridotta fino alla metà della formulazione a base di Gliphosate, indicata sull'etichetta della confezione della stessa.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : il prodotto va impiegato soltanto per miscele con prodotti erbicidi a base di Gliphosate.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg.

64

II CLASSE TOSSICOLOGICA

Diserbante - Disseccante
Liquido

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 16,93 di DIQUAT puro
Sostanze bagnanti e diluenti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare controvento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere inutilizzabili dopo l'uso, e con i mezzi più idonei, le confezioni che contengono il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Attenzione:
I sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).
L'introduzione nell'organismo anche di poche gocce del prodotto può essere fatale: non attendere la comparsa dei sintomi per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perché sia praticata l'emodialisi.
Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza assorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, le bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.

Intossicazione per ingestione e per inalazione
I primi sintomi sono: epitassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola.
Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria.
Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato-renali.
L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria.
L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat (o diquat) nel sangue.

Intossicazione per contatto
Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole.
Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta.
Terapia: sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico. In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del paraquat (o diquat) e sulla terapia possono essere richieste direttamente alla società produttrice di questo presidio sanitario.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 6421 **Ministero della Sanità del** 16.5.85
5/84

CARATTERISTICHE

E' un erbicida in emulsione ad azione disseccante sulle parti verdi delle infestanti dicotiledoni e monocotiledoni.

Non agisce sulle parti legnose delle colture.

Non lascia residui nel terreno perché è completamente disattivato a contatto del suolo.

Si può applicare in qualsiasi periodo dell'anno sia con terreno bagnato che siccitoso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Trattare la vegetazione infestante con getto uniforme impiegando 300/800 litri di acqua per ettaro.

Impiegare le dosi più alte con forti infestazioni e nelle prime applicazioni.
DISERBO vigneti, frutteti, agrumeti, oliveti e colture arboree in genere: Kg. 2-4/ha.

DISERBO degli interfilari di colture industriali, orticole e floreali; asparagiaie: Kg. 2-4/ha. (con ugelli schermati).

DISERBO dei terreni da semina senza aratura (sod-seeding): Kg. 4-5/ha.
Miglioramenti dei pascoli: Kg. 5-10/ha.

DISERBO vivai, diserbi pre-semina, pre-trapianto e pre-emergenza; lotta contro la cuscuta: Kg. 3-5/ha.

DISERBO CANALI:

a) vegetazione emersa: Kg. 5-10/ha.

b) vegetazione sommersa: gr. 1-2 per metro quadrato di specchio d'acqua per profondità media d'acqua di cm. 50; gr. 2.5-5 per metro cubo d'acqua da diserbare per profondità media d'acqua superiore a cm. 50.

DISSECCAMENTI:
- riso da seme e da granella: Kg. 1,5-2/ha.
- colture da seme di medica, mais, frumento: Kg. 2-4/ha.
- medica da foraggio, piante da fibra: Kg. 2-4/ha.
- culmi patate: Kg. 3-5/ha (in caso di siccità eseguire il trattamento solo dopo tre giorni da una pioggia che abbia bagnato uniformemente il terreno vicino alle radici).

Nelle applicazioni citate, ad esclusione del diserbo della vegetazione sommersa dei canali, e del disseccamento dei culmi di patate, si consiglia l'aggiunta del bagnante adesivo ETALDYN a gr. 50 per ettolitro di poltiglia.

Divieto di impiego sui foraggi

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli erbicidi; non è compatibile con fungicidi ed insetticidi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Evitare di colpire le colture utili o comunque sensibili.

Trattandosi di un diserbante disseccante ad azione sulla clorofilla il prodotto può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora ben lignificate, delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati e con le precauzioni consigliate.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

6422

I CLASSE

VELENO

EDRIMET

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA - ACARICIDA A VASTO SPETTRO D'AZIONE PER LA DIFESA DELLE COLTURE ARBOREE, ERBACEE, ORTICOLE, DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI FIORI

Registrazione Ministero Sanità n. 6422 **del** 16.5.85
® Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Methomyl puro	g 9
Amitraz puro	g 9
Coformulanti *	q.b. a g 100
* Contiene cicloesanone	

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione
Miosi, sudorazione profusa, debolezza, polso lento, nausea e vomito, cefalea, depressione del sistema nervoso centrale, tremori muscolari, visione confusa, crampi addominali, diarrea, irritazione della pelle e delle mucose. Possibile alterazione dei valori glicemici.
Trattamento
Nel caso di inalazione trasportare il paziente in ambiente non contaminato. Nel caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare prontamente la pelle e gli occhi con acqua abbondante.
In caso di ingestione lavanda gastrica.
All'apparizione di segni locali o sistemici di avvelenamento colinesterasico somministrare atropina:
Intossicazione leggera:
1,2-2 mg per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento ad intervalli di 10-30 minuti fino a comparsa di fenomeni di atropinizzazione.
Intossicazione severa:
2,4 mg per via intravenosa, ripetendo la somministrazione di 2 mg ogni 3-10 minuti fino a scomparsa dei segni e dei sintomi, non somministrare 2-PAM: controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione; se necessario rimuovere le eccessive secrezioni e mantenere aperte le vie respiratorie; in caso di severa intossicazione praticare la respirazione artificiale o ossigenoterapia.
Consultare un Centro Antiveleni e comunque trasportare l'intossicato al più vicino Centro di Rianimazione.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è costituito dall'unione di due principi attivi ad azione complementare e sinergica.
Il prodotto uccide gli insetti e gli acari nei vari stadi di sviluppo (uova, forme giovanili, ed adulti), anche quelli divenuti resistenti agli esteri fosforici, svolgendo un elevato potere abbattente ed una lunga persistenza.

Il prodotto controlla vari insetti, fra cui,
gli **Emitteri** (psilla del pero, afidi cicaline: aleurodidi, cocciniglie);
i **Tripidi**, i **Lepidotteri** (fillominatori, carpocapsa, cidia del pesco, tignolette della vite, ricamatrici, nottue);
e i **Coleotteri** (antonomo, dorifora, altica, cleono).
Il prodotto controlla anche gli acari fitofagi (ragnetti rossi, acari rugginosi).
Il prodotto è consigliato per le colture che vanno soggette contemporaneamente ad attacchi di insetti e di acari: fruttiferi (melo - pero - pesco - susino - albicocco - lampone - actinidia - arancio - mandarino - limone), vite, olivo, orticole (melanzana - zucchino - anguria - melone - pisello), floreali ed ornamentali in pieno campo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Per i trattamenti a volume normale il prodotto viene usato alla dose di 260-300 g/Hl o di 3 Kg in 5-6 hl di acqua per Ha, nelle colture erbacee. Il prodotto può essere applicato anche a basso volume, purchè venga impiegata un'adeguata quantità per ettaro e la miscela ricopra uniformemente la vegetazione da proteggere. E' consigliabile intervenire tempestivamente, ripetendo eventualmente il trattamento dopo 10-15 giorni.
Psilla del pero: il prodotto agisce contro tutti gli stadi di sviluppo di questo insetto. Trattare preferibilmente quando sono in fase di schiusura le uova della seconda e della terza generazione (Maggio-Giugno).
Fillominatori (Cemiostoma e Litocollete): il prodotto agisce come ovicida-larvicida. Di norma è sufficiente un trattamento per generazione.
Cocciniglie: il prodotto uccide le neanidi delle varie cocciniglie (Aspidiotus, Saissezia, Diaspis), perciò deve essere impiegato in corrispondenza della schiusura delle uova delle varie generazioni, durante il periodo primaverile-estivo.
Nella preparazione della miscela da irrorare, il prodotto può essere versato direttamente nel serbatoio dell'irroratrice, mantenendo l'acqua in agitazione. L'aggiunta di 50 g per Hl del bagnante - adesivo Irol, aumenta l'efficacia del trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari, purchè a reazione non fortemente alcalina.
Avvertenze:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci, gli insetti utili, gli animali selvatici e domestici ed il bestiame. Evitare i trattamenti durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER FRUTTIFERI, ORTAGGI, VITE, AGRUMI; 28 GIORNI PER MELE E PERE

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.
prodotto nello stabilimento di
San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Contenuto Lt.

64

ETOSSICHINA

ANTIRISCALDO

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Litri

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

ETOSSICHINA pura .	.	g. 63
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Tipo di formulazione: pasta emulsionabile

AGRICO s.r.l.

Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore:

SARIAF S.p.A.

Via S. Silvestro, 1 - FAENZA

Registrazione del Ministero della Sanità

n. 6423 **del** 16.5.85

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: previene il « riscaldo » delle mele che si può manifestare durante la conservazione.

Concentrazioni e dosi d'impiego: trattamento **prima della raccolta**, litri 0,350 per 100 litri d'acqua; **dopo la raccolta**, litri 0' .u di prodotto in 100 litri d'acqua per le varietà: Abbondanza, Carla, Commercio, Granny Smith, Imperatore, Lavina, Rome Beauty, Staymann, Stayman Red, Winesap, Winter Winesap, Stark Delicious, Delicious comune, Starking, Richared e litri 0,150-0,160 per 100 litri d'acqua per la Golden Delicious.

Epoche d'impiego: 2 giorni prima della raccolta o più comunemente in post raccolta, sul momento o entro una settimana. Le mele trattate in preraccolta non devono essere trattate in postraccolta.

Metodi d'impiego: Trattamento **prima della raccolta**, sulla coltura in atto spruzzando in modo da bagnare perfettamente e uniformemente le piante onde essere certi di coprire i frutti; **dopo la raccolta**, immergendo i frutti per almeno 15 e non oltre 25 secondi alla temperatura di 20°C circa.
In frigorifero le mele vanno poste asciutte.

AVVERTENZA: la soluzione eccedente ai trattamenti, dovrà essere prelevata da Ditte specializzate per la depurazione (fisica o microbiologica).

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto va usato da solo.

Rischio a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per i pesci.

Tempo di carenza: prima di immettere al consumo le mele trattate lasciare trascorrere non meno di 90 giorni dal trattamento, dei quali almeno l'ultima settimana fuori dal frigorifero a temperatura ambiente in locale arieggiato e luminoso.

Attenzione! da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

6424

MULTI - GOAL® NC

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. - Filadelfia - U.S.A.

DISERBANTE PER AREE INDUSTRIALI, TERRENI NON SOGGETTI A COLTURA, ARGINI E BORDI STRADALI

Composizione: 100 gr. di prodotto contengono:
Principi attivi

OXYFLUORFEN puro	gr. 14.0
DALAPON puro	gr. 43.4

Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

Classe III°

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
È obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di miscelamento e trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
L'inalazione e/o il contatto dermale può dare luogo ad irritazione delle mucose.
L'ingestione può provocare nausea, vomito, vertigini, tremiti ed obnubilamento del sensorio.
Interventi di pronto soccorso:
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti.
In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.
Avvertenza: *Consultare un centro antiveleni.*
In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione non somministrare nulla per via orale a persona inconscia. Lavanda gastrica. Somministrare Carbone Attivo (30 gr.), far seguire purgante salino (Solfato di Magnesio).
Ulteriori cure sono sintomatiche.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità - Il MULTIGOAL NC è un diserbante particolarmente indicato per la lotta contro le infestanti graminacee perennanti quali Cynodon sp., Agropyron sp., Lolium sp., Sorghum halepense, Bromus sp.
MULTIGOAL NC agisce in post-emergenza, quando le infestanti sono già sviluppate e possiede azione di pre-emergenza sulle infestanti annuali che nascono dopo il trattamento.

EPOCA DI INTERVENTO
Impiegare MULTIGOAL NC a fine primavera-inizio estate quando le infestanti graminacee perennanti (Cynodon sp., Agropyron sp., ecc.) sono già ben sviluppate e cioè con germogli aventi lunghezza minima di 25-30 cm.
Il trattamento va effettuato quando le condizioni climatiche fanno sì che le infestanti siano in attiva crescita e succulente.

NON trattare con terreno arido.

DOSI D'IMPIEGO
Kg./Ha. 10-12 in sospensione con 1000-1400 litri d'acqua a seconda dello sviluppo e della intensità dell'infestazione.
Nel diserbo del Sorghum halepense, migliorare l'azione del MULTIGOAL NC addizionando Kg./Ha. 10 di Dalapon (85% p.a.).

NOTA
Al fine di ottenere i migliori risultati è indispensabile effettuare una accurata bagnatura di tutta la vegetazione. E' opportuno quindi operare, oltrechè con un elevato quantitativo di acqua, anche con una sufficiente pressione della pompa, che consenta la penetrazione della nube irrorata fino alla parte basale delle infestanti.
Aggiungere un buon bagnante/adesivo quando la vegetazione delle infestanti è molto densa o non sufficientemente succulenta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ - Il MULTI-GOAL NC è miscibile con Dalapon.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto è fitotossico per le colture arboree; evitare che la nube irrorante giunga a contatto con tali colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO - VIA VITTOR PISANI 20
TELEFONO 62.561

Prodotto da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Confezionato da:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità 6424 del 23.5.85
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG 5

6

GOALAPON®

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. - Filadelfia - U.S.A.

ERBICIDA PER IL CONTROLLO DELLE GRAMINACEE PERENNANTI

Composizione: 100 gr. di prodotto contengono:
Principi attivi

OXYFLUORFEN puro	gr. 5.2
DALAPON puro	gr. 55 2

Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

Classe III°

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - **Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
È obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di miscelamento e trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
L'inalazione e/o il contatto dermale può dare luogo ad irritazione delle mucose.
L'ingestione può provocare nausea, vomito, vertigini, tremiti ed obnubilamento del sensorio.
Interventi di pronto soccorso:
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti.
In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.
Avvertenza: *Consultare un centro antiveleni.*
In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione non somministrare nulla per via orale a persona inconscia. Lavanda gastrica. Somministrare Carbone Attivo (30 gr.), far seguire purgante salino (Solfato di Magnesio).
Ulteriori cure sono sintomatiche.

CARATTERISTICHE
Il GOALAPON è un erbicida da impiegarsi per combattere la infestazione nei terreni senza coltura, in aree industriali e civili, su bordi stradali e su argini.
GOALAPON agisce principalmente per contatto e per assorbimento fogliare nel controllo in post-emergenza di graminacee perennanti quali: Cynodon dactylon, Agropyron repens, Sorghum halepense, Phragmites sp., Lolium perenne.
GOALAPON possiede altresì azione residua agendo come antigerminello nei confronti di specie annuali graminacee e di dicotiledoni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità: GOALAPON si impiega in post-emergenza delle infestanti curando la loro completa bagnatura. Intervenire quando le infestanti graminacee sono in fase di attiva crescita ed hanno sviluppato una sufficiente superficie fogliare.
Per il diserbo di Sorghum nalepense o Phragmites sp., trattare le infestanti quando sono alte 70-90 cm. e non oltre l'inizio emissione della infiorescenza.
L'eventuale impiego di un bagnante come Triton® B-1956 può migliorare l'efficacia erbicida.
GOALAPON non va impiegato durante i periodi siccitosi quando il terreno è arido e la vegetazione è ferma.
Dosi per ettaro: Kg. 20-25 distribuiti in 600-1200 litri di acqua in funzione dello sviluppo vegetativo e della intensità di infestazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ - Ad esclusione dell'uso di un buon bagnante il prodotto va impiegato solo.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto può essere fitotossico per impieghi non indicati in etichetta; è fitotossico per colture arboree in genere, evitare che la nube irrorante giunga a contatto con tali colture.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO - VIA VITTOR PISANI 28
TELEFONO 62.561

Prodotto da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Confezionato da:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 6425 del 23.5.85
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG 5

6426

FITOREGOLATORE

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE:

100 gr. di prodotto contengono:

- Etefon puro .... gr. 21.6
- Solventi .... q.b.a gr. 100

Contiene glicole etilenico

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano
Tel.: 77571
Telex: 311 068 ucimi

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Usare guanti ed occhiali protettivi data l'attività irritante dermale ed oculare del prodotto.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' D'IMPIEGO

L'ETHREL MC è un fitoregolatore di sintesi che dopo essere stato assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, che la pianta già produce, è in grado di stimolare la maturazione dei frutti

Pomodoro da industria
Litri 6–8/ha per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Intervenire quando il 15–20% delle bacche sono mature e con i frutti dell'ultimo palco che abbiano raggiunto la condizione di "verde maturo". La dose più alta s'impiega: su varietà con le foglie molto sviluppate, su varietà tardive con temperature di 12°-15° al momento del trattamento e su varietà a maturazione scalare

L'ETHREL MC può essere distribuito con le normali barre irroratrici diluito in 1000–1200 litri di acqua ad ettaro

Pomodoro da mensa
c.c. 400–500/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per liberare il terreno dalla coltura: trattare tutta la pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non miscelarlo ad altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA': L'ETHREL MC su pomodoro può causare un parziale ingiallimento delle foglie inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono.

Sospendere i trattamenti almeno 10 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Officina di produzione:

VISPLANT-CHIMIREN S.r.l.
RENAZZO DI CENTO (Ferrara)

Registrazione Ministero Sanità N. 6426 del 16.5.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto lt 0.250

Distribuito da

ETHREL ® è un marchio registrato della Union Carbide Agricultural Products Company Inc., USA

84749

CLASSE I

VELENO

OXAMYL RAVIT VYDATE

Nematocida - Insotticida Granularo
per terroni destinati a colture di barbabiotola
da zucchero

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 4,92 di Oxamyl puro
Ingredienti inerti quanto basta a 100.
Contiene Dimetilformammide

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 19[illegible] n. 1255.

Natura del rischio:
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Evitare di respirare i vapori.
Non operare contro vento.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Togliersi e lavare gli indumenti contaminati prima di usarli nuovamente.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (es.: interrando in fosse profonde più di un metro cospergendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Nel caso che il prodotto raggiunga incidentalmente gli occhi, lavarli per 15 minuti con acqua abbondante.
Recarsi dal medico.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Il prodotto produce effetti associati con attività anticolinesterasiche che possono includere spossatezza, annebbiamento, cefalea, nausea, crampi addominali, diarrea, oppressione toracica, costrizione delle pupille, sudorazione, polso lento, tremori muscolari.

Trattamento:
- *Nel caso di inalazione, trasportare il paziente in ambiente non contaminato.*
- *Nel caso di contatto, togliere gli abiti contaminati e lavare prontamente la pelle e gli occhi contaminati con acqua abbondante.*
- *Nel caso di ingestione, applicare una lavanda gastrica.*
- *Alla comparsa di segni locali o sistemici o di sintomi di avvelenamento colinesterasico, somministrare atropina: 1,2 - 2 mg. per via intramuscolare o intravenosa, ripetendo il trattamento ad intervalli di 10-30 minuti fino alla comparsa di fenomeni di atropinizzazione.*
- *Non somministrare 2-PAM; controindicati anche la morfina e gli altri depressori della respirazione.*

Pronto soccorso:
Se ingerito provocare il vomito con acqua calda (1 cucchiaio da tavola di sale in un bicchiere d'acqua), ripetendo fino a che il vomito non sia chiaro.
Se inalato allontanare il paziente dall'ambiente contaminato, far coricare e riposare calmo.
In caso di contatto togliere gli abiti contaminati e lavare la pelle e gli occhi contaminati con abbondante quantità di acqua.
Se il paziente mostra difficoltà respiratoria praticare immediatamente la respirazione artificiale.
Somministrare 2 tavolette di atropina da 0,6 mg. per via orale o facendole sciogliere sotto la lingua, se sono disponibili. In seguito ogni 10-15 minuti somministrare una tavoletta di atropina fino a che la gola e la pelle sono asciutte. Se necessario somministrare altre tavolette per mantenere asciutte la gola e la pelle.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

Avvertenza:
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un nematocida-insetticida in formulazione granulare al 5% di principio attivo Oxamyl, dotato di azione sistemica con traslocazione dal basso verso l'alto.
Quando viene applicato al suolo esso controlla i nematodi del terreno ed inoltre è traslocato dalla radice alla parte aerea della pianta controllando i nematodi fogliari e agendo anche su alcuni insetti ed acari. La sua distribuzione deve essere effettuata preferibilmente con le comuni macchine usate per lo spargimento dei granulari. I trattamenti possono essere effettuati con diverse modalità:
- in pre-semina, con incorporazione su tutta la superficie o a strisce;
- al momento della semina, in localizzazione con il seme.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Nematodi radicicoli del tipo Heterodera Schachtii: distribuire 25-35 Kg. di prodotto **per ettaro, al momento della semina in localizzazione con il seme.**
Prima di iniziare lo spargimento avere cura di tarare l'apparecchio di distribuzione in modo da distribuire esattamente la dose indicata.
Il prodotto può anche essere impiegato in pre-semina, con incorporazione, su tutta la superficie del terreno, alla dose di 140-160 Kg. per ettaro, oppure a strisce, impiegando una dose proporzionale alla superficie trattata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali selvatici, gli animali domestici, il bestiame e gli insetti utili.
Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni.

Durante il trattamento tenere lontani dalla zona le persone non protette animali e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Pio Foà, 65 - TORINO
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.TO: Paganica (AQ)

Reg. n. 6427 **del Ministero della Sanità del** 16.5.85
10/84

6428

GOAL®

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. - Filadelfia - U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO PER VIGNETI, POMACEE, DRUPACEE, NOCCIOLO, CIPOLLA ED ALCUNE COLTURE TRAPIANTATE

Composizione: 100 gr. di prodotto contengono:
Principio attivo
OXYFLUORFEN puro . . . . gr. 23.6
* **Sostanze inerti e coadiuvanti** q.b. a gr. 100
* **Contiene Xilolo, Cicloesanone e Dimetilformamide**

Classe III'

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
È obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di miscelamento e trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
L'inalazione e/o il contatto dermale può dare luogo ad irritazione delle mucose.
L'ingestione può provocare nausea, vomito, vertigini, tremiti ed obnubilamento del sensorio.
Interventi di pronto soccorso:
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti.
In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.
Avvertenza: *Consultare un centro antiveleni.*
In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione non somministrare nulla per via orale a persona inconscia. Lavanda gastrica. Somministrare Carbone Attivo (30 gr.), far seguire purgante salino (Solfato di Magnesio).
Ulteriori cure sono sintomatiche.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità: Il GOAL è un erbicida selettivo per il diserbo delle colture arboree quali: Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, di alcune colture trapiantate e della Cipolla.
Sulle infestanti il GOAL agisce essenzialmente per contatto e la sua efficacia e persistenza è esaltata durante il periodo autunno-primaverile.
Volume d'acqua: A seconda del tipo di trattamento adottato, curare la completa bagnatura del terreno e delle infestanti adottando, a seconda del caso da 300 a 1000 litri di acqua ad ettaro

VIGNETI, POMACEE, DRUPACEE E NOCCIOLO
Pre-emergenza delle infestanti: Effettuare la distribuzione del GOAL preferibilmente nel tardo autunno inizio inverno su terreno privo di infestanti (quindi dopo una lavorazione) o quando queste cominciano a germinare.
Dosi: Impiegare il GOAL alla dose di 3-4 litri/Kg/Ha. La dose più elevata è necessaria per i trattamenti che eventualmente dovessero essere effettuati in primavera.
Post-emergenza delle infestanti: In questo caso il GOAL deve essere impiegato in miscela con basse dosi di Paraquat o Diquat; per ottenere una più completa azione distruttiva. La miscela con i dipiridilici è consigliabile quando la flora infestante non presenta dominanza di graminacee perennanti.
Dosi: GOAL 4-5 Kg/lt/Ha + Paraquat 1,5 lt/Kg/Ha.
In caso di prevalente infestazione di Convolvolo è preferibile usare il Diquat alla dose di 3 lt/Kg/Ha anziché il Paraquat.
Per ottenere un completo controllo delle infestanti per tutta la stagione è necessario effettuare, di norma, due trattamenti all'anno.
Post-emergenza delle graminacee perennanti
In presenza di Cynodon, Agropyron, Agrostis, Bromus, impiegare il GOAL in miscela con Dalapon a dose ridotta.
Effettuare il trattamento quando le infestanti presentano germogli lunghi non meno di 20 cm e sono in attiva crescita. Non impiegare la miscela con Dalapon durante i periodi di siccità quando le infestanti sono in fase di semi-dormienza.
Dosi: GOAL 5 kg/lt/ha + Dalapon Kg 5 Ha.
Avvertenza: Nei vigneti e frutteti distribuire preferibilmente il GOAL o nel periodo di dormienza o dopo l'allegagione.

COLTURE TRAPIANTATE
Il GOAL è raccomandato anche per il diserbo di alcune colture trapiantate quali: cavolo, cavolfiore, pomodoro (trapiantato a macchina).
Effettuare la distribuzione del GOAL su terreno già pronto per il trapianto, da 1 ad alcuni giorni prima della messa a dimora delle piantine.
Impiegare piantine robuste alte non meno di 12-15 cm. ma non filate.
Dosi: GOAL 2-3 lt/Kg/Ha.
Impiegare la dose più elevata nei terreni ove le graminacee sono dominanti.

CIPOLLA
Il GOAL viene raccomandato per il diserbo della cipolla seminata con intervento in vegetazione, e quindi come complemento di un diserbo di pre-emergenza. Il GOAL deve essere distribuito quando la cipolla si presenta nello stadio compreso fra la seconda e inizio quarta foglia ed in pre-emergenza o inizio emergenza delle infestanti.
Dosi: 1,5 lt/Kg/Ha.
Avvertenza: La cipolla può presentare dopo il trattamento qualche tacca biancastra sulle foglie, o gli apici delle stesse un po' clorotici. Tale fenomeno è tuttavia assolutamente passeggero e non porta alcun nocumento all'accrescimento e alla produttività della pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ - Il GOAL è compatibile con Paraquat, Diquat e Dalapon.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Vigneti, Pomacee, Drupacee e Nocciolo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il GOAL è nocivo per i pesci e gli uccelli.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A.
20124 MILANO - VIA VITTOR PISANI 20
TELEFONO 62.861

Prodotto da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità 6428 del 23.5.85
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG

642

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. - Filadelfia - U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO PER ESSENZE FORESTALI, PIOPPO ED EUCALIPTO

Composizione: 100 gr. di prodotto contengono:
Principio attivo
OXYFLUORFEN puro . . . . gr. 23.6
* **Sostanze inerti e coadiuvanti** q.b. a gr. 100

* **Contiene Xilolo, Cicloesanone e Dimetilformamide**

Classe III°

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - **Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
È obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di miscelamento e trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
L'inalazione e/o il contatto dermale può dare luogo ad irritazione delle mucose.
L'ingestione può provocare nausea, vomito, vertigini, tremiti ed obnubilamento del sensorio.

Interventi di pronto soccorso:
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti.
In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.

Avvertenza: *Consultare un centro antiveleni.*
In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione non somministrare nulla per via orale a persona inconscia. Lavanda gastrica. Somministrare Carbone Attivo (30 gr.), far seguire purgante salino (Solfato di Magnesio).
Ulteriori cure sono sintomatiche.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità: GOAL E è un erbicida che si impiega in pre-emergenza nel controllo delle infestanti annuali ed in post-emergenza nel contenimento del Convolvulus arvensis e Convolvulus sepium.
GOAL E è selettivo nel diserbo di vivai e giovani impianti di essenze forestali, di taleai, piantonai e giovani impianti di Pioppo ed Eucalipto.

Modalità d'uso: Impiegare prima della emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare.
Nel diserbo del Convolvolo effettuare due trattamenti; il primo all'inizio della fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40-50 cm.
Su essenze resinose il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione ma prima della emissione dei nuovi germogli.
Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa.

Dosi: 5-8 Kg/lt per ettaro in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.

DA NON IMPIEGARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ - Il GOAL E è compatibile con Paraquat, Diquat e Dalapon.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il GOAL E è nocivo per i pesci e gli uccelli.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO - VIA VITTOR PISANI 28
TELEFONO 62.561

Prodotto da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 6429 del 23.5.85
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG 1

6430

MULTI - GOAL

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. - Filadelfia - U.S.A.

ERBICIDA SELETTIVO PER VIGNETI, POMACEE, DRUPACEE E NOCCIOLO

Composizione: 100 gr. di prodotto contengono:
Principi attivi

OXYFLUORFEN puro	gr. 14.0
DALAPON puro	gr. 43.4

Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

Classe III°

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
È obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di miscelamento e trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
L'inalazione e/o il contatto dermale può dare luogo ad irritazione delle mucose.
L'ingestione può provocare nausea, vomito, vertigini, tremiti ed abnubilamento del sensorio.
Interventi di pronto soccorso:
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti.
In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.
Avvertenza: *Consultare un centro antiveleni.*
In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione non somministrare nulla per via orale a persona inconscia. Lavanda gastrica. Somministrare Carbone Attivo (30 gr.), far seguire purgante salino (Solfato di Magnesio).
Ulteriori cure sono sintomatiche.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità - MULTI-GOAL è un erbicida particolarmente indicato per il controllo selettivo delle graminacee perennanti (rizomatose o stolonifere) nei vigneti, Pomacee, Drupacee e Noccioli.
Il MULTI-GOAL è però efficace anche contro le graminacee annuali nonchè le specie a foglia larga comunemente presenti nelle colture arboree. MULTI-GOAL agisce principalmente per assorbimento fogliare e secondariamente per contatto ed assorbimento radicale.
MULTI-GOAL possiede sia azione pronta nei confronti delle specie in attiva vegetazione e sviluppate, sia azione residua nei confronti delle specie sensibili che si originano da seme e quiescenti al momento del trattamento.

MULTI-GOAL controlla le seguenti specie:
Monocotiledoni: Agropyrum repens, Cynodon dactylon, Agrostis sp., Antoxanthum odoratum, Avena fatua, Alopecurus myosuroides, Lolium multiflorum e perenne, Digitaria sanguinale, Panicum crus-galli, Setaria sp., Bromus sp.
Dicotiledoni: Amaranthus retroflexus, Chenopodium sp., Sinapis sp., Raphanus raphanistrum, Brassica sp., Veronica sp., Portulaca oleracea, Cirsium arvense. Convolvulus arvensis e C. sepium vengono danneggiati ma non distrutti.

EPOCA DI INTERVENTO - Effettuare il trattamento nella tarda primavera (Maggio - inizio Giugno) quando il Cynodon o altre graminacee perennanti hanno raggiunto uno sviluppo di 25-30 cm. e sono in fase di attiva crescita. Trattamenti in periodo più avanzato possono essere ugualmente effettuati, purchè il terreno sia molto fresco ed i tessuti del Cynodon siano teneri e succulenti.
Evitare di trattare in estate specie durante i periodi siccitosi.

DOSI DI IMPIEGO: 9-10 Kg/Ha in 600-800 litri di acqua.
Impiegare il quantitativo più elevato di acqua e la dose di 10 Kg./Ha in presenza di forti infestazioni di Cynodon ed Agropyron e nei casi in cui si desidera prolungare l'azione residua. In ogni caso curare la completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il MULTI-GOAL và impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ - Durante il trattamento evitare di bagnare la vegetazione della coltura da diserbare. Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con le colture, eventuali accidentali spruzzi alle foglie possono provocare locali scottature che non compromettono il normale sviluppo della pianta colpita.
Si sconsiglia l'impiego nei terreni sabbiosi ed in quelli ricchi di scheletro.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO - VIA VITTOR PISANI 20
TELEFONO 62.881

Prodotto da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A. -
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6430 del 23.5.85

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO KG 1

64

GOAL® GRANULARE

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co. - Filadelfia - U.S.A.

**ERBICIDA SELETTIVO PER ESSENZE FORESTALI,
PIOPPO ED EUCALIPTO**

Composizione: 100 gr. di prodotto contengono:
Principio attivo
OXYFLUORFEN puro . gr. 2
Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

Classe III°

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - **Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
È obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di miscelamento e trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
L'inalazione e/o il contatto dermale può dare luogo ad irritazione delle mucose.
L'ingestione può provocare nausea, vomito, vertigini, tremiti ed obnubilamento del sensorio.
Interventi di pronto soccorso:
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti.
In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.
Avvertenza: *Consultare un centro antiveleni.*
In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione non somministrare nulla per via orale a persona inconscia. Lavanda gastrica. Somministrare Carbone Attivo (30 gr.), far seguire purgante salino (Solfato di Magnesio).
Ulteriori cure sono sintomatiche.

MODALITÀ D'IMPIEGO
GENERALITÀ
Il GOAL Granulare è un erbicida selettivo per il diserbo dei vivai di piante forestali (pino, abete, larice), talee e piantonai di pioppo ed eucalipto, nonchè per i giovani impianti di essenze forestali.
Il GOAL Granulare è un erbicida di pre-emergenza con lunga azione residua, efficace contro graminacee ed erbe a foglia larga annuali.

MODALITÀ D'USO
Distribuire uniformemente il GOAL Granulare in pre-emergenza delle infestanti su tutta la superficie interessata. Nel caso di vivai e piantonai di essenze resinose il prodotto può cadere anche sulla vegetazione in quanto è perfettamente tollerato dalla stessa.
Nel caso di taleai e piantonai di pioppo ed eucalipto, distribuire il GOAL Granulare prima della ripresa vegetativa e cioè su talee e piantine ancora prive di foglie.

IRRIGAZIONE
Affinchè il prodotto possa agire, è necessario far seguire alla distribuzione una irrigazione. Una eventuale buona pioggia può fare evitare l'irrigazione.
Di norma un trattamento per stagione è sufficiente ad assicurare il controllo delle infestanti sino alla fine della stessa. Tuttavia, specie nei giovani piantonai di essenze forestali, dove si richiede un elevato controllo di infestanti per tutto l'anno, può essere utile un secondo trattamento, da effettuarsi quando si notano nuove nascite di malerbe.

DOSI
Kg. 50-70 per Ha. La dose più elevata si impiega ove si preveda una forte infestazione di graminacee estive (Setaria, Digitaria) oppure se si desidera un'azione residua prolungata.
Per un eventuale secondo trattamento, impiegare la dose di Kg. 50/Ha.

DA NON IMPIEGARE CON I MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con urea, concimi fosfatici ed antiparassitari granulari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO - VIA VITTOR PISANI 20
TELEFONO 62.881

Prodotto da:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)
Registrazione Ministero della Sanità No. 6431. del 29.5.85
DA NON VENDERSI SFUSO
Peso Netto Kg 5

6432

Sepravax P

**FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER GAROFANO E ROSA IN PIENO CAMPO**

Composizione: g 100 di prodotto contengono:

— OSSICARBOSSINA pura	g 15
— MANCOZEB puro	g 50
— Bagnanti e disperdenti q.b. a	g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.
Prescrizioni particolari: una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Avvertenza: durante la manipolazione del prodotto si dovranno usare occhiali protettivi date le proprietà irritanti del p.a. Ossicarbossina.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
Controndicate: alcool, olii e grassi.

Caratteristiche: il **SEPRAVAX P** è un fungicida ottenuto dalla combinazione della ossicarbossina ad azione sistemica con il mancozeb ad azione preventiva di copertura. Il prodotto si impiega prevalentemente sul garofano in trattamenti fogliari per il controllo della Ruggine, Alternaria, Carbone (Heterosporium echinulatum), Botrite, Septoria, Fusarium roseum. La ruggine viene controllata dalla ossicarbossina sia in maniera preventiva che curativa.
Dosi e modalità d'impiego:
GAROFANO
In trattamenti preventivi il **SEPRAVAX P** si impiega alla dose di 200 g/100 l di acqua con applicazioni ripetute alla distanza di 7-8 giorni e bagnando bene le piante fino allo sgocciolamento.
In **trattamenti curativi**, soprattutto in presenza di attacchi ri ruggine, il prodotto si applica alla dose di 250-300 g/100 l di acqua. Si effettuano 3-4 trattamenti alla distanza di 3-4 giorni, dopo di che la ruggine sarà bloccata, per continuare poi con la cadenza settimanale. Durante il periodo estivo si raccomanda di eseguire il trattamento verso sera per favorire l'assorbimento dell'ossicarbossina durante la notte.
ROSA
Contro la ruggine, il **SEPRAVAX P** si applica alla dose di 200-250 g/hl alla comparsa delle prime pustole. I trattamenti vengono ripetuti ad intervalli di 10-12 giorni per 3-4 volte fino alla scomparsa della malattia.
Preparazione della miscela: sospendere la dose del prodotto in poca acqua e mescolare fino ad ottenere un fluido omogeneo; versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto ed agitare ripetutamente.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE
DA QUELLE INDICATE**

Compatibilità: il **SEPRAVAX P** è compatibile con i più comuni insetticidi, acaricidi e fungicidi.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI
60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA**

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. Ministero Sanità n. 6432 del 23.5.85
DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg. 1**

SEPRAN s.r.l. - Agrochimici
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla,
Telefono (0444) 558.228

**officina di produzione DIACHEM S.p.A.
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)**

6433

IV CLASSE

MICRONOL

(PASTA)
FUNGICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DEL MAL BIANCO IN COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

Registrazione Ministero Sanità n. 6433 del 23.5.85
® Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
Zolfo puro (esente da Selenio)	g 40
Coformulanti	q.b. a g 100

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:
Il Micronol è una particolare formulazione di zolfo dotata di elevata adesività sulla vegetazione.
Il Micronol è attivo contro tutte le forme di oidio che colpiscono le colture, ed ha una azione collaterale contro gli eriofidi.
Può essere disciolto direttamente nella botte usata per l'irrorazione senza che si renda necessaria una pre-diluizione del prodotto.

Colture trattabili

— Pomacee:	Melo, Pero.
— Drupacee:	Pesco, Albicocco, Mandorlo.
— Vite	
— Cereali:	Grano, Orzo.
— Colture orticole:	Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Pomodoro, Spinacio, Insalata, Radicchio.

— Lampone
— Nocciolo
— Colture ornamentali e floricole
— Vivai e piantonai delle colture anzidette.

Dosi d'impiego: 300-400 g/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con gli insetticidi, i fungicidi, i concimi fogliari di normale impiego sulle colture anzidette.
Comunque, poichè non tutte le possibili combinazioni sono state saggiate si consiglia di verificare su piccola scala la stabilità della miscela.
Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.
Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty Stayman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

CUCURBITACEE: Può essere fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Contenuto Kg.

6434

PRODACAP 76

FUGICIDA ORGANICO IN POLVERE BAGNABILE MICRONIZZATA

COMPOSIZIONE: Captano puro g 76,3, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

— conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale.

AVVERTENZA: consultare un Centro antiveleni.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di formulazione PROCIDA S.A.
Saint-Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
Officina di confezionamento SICOPA Snc
Pianello Val Tidone (PC)

Registrazione n. 6434 del 29.5.85 **del Ministero della Sanità**

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

PRODACAP 76 si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri d'acqua:
— **Frutticoltura:** ticchiolatura, marciume bruno e da magazzino e lenticellosi di melo e pero, corineo e marciume bruno di pesco, susino, albicocco e ciliegio g 150, in trattamenti post-fioritura. Bolla del pesco g 150-180, in trattamenti post-fioritura.
— **Viticoltura:** peronospora, botrite (muffa grigia), black-rot g 120-150.
— **Orticoltura:** peronospora ed alternariosi della patata, peronospora, alternariosi, cladosporiosi e septoriosi del pomodoro, septoriosi e cercospora della carota, antracnosi, alternariosi, ruggine di melone, zucca e cetriolo g 150-180, antracnosi e marciume (botrite) della fragola, Didymella del lampone g 150-180.
— **Floricoltura:** peronospora, ticchiolatura, botrite della rosa, fitoftora, alternariosi, septoriosi, ruggine del garofano, crisantemo, gladiolo, azalea g 150-180.

— **Altri impieghi:**

Disinfezione delle talee in vivaio: immergere le talee in una soluzione allo 0,25% di PRODACAP 76.
Disinfezione delle piantine in vivaio: irrorare il terreno con una soluzione allo 0,25% di PRODACAP 76, impiegando 0,5-0,8 litri per mq.
Disinfezione dei bulbi da fiore: immergere i bulbi per un'ora in una soluzione allo 0,6% di PRODACAP 76.
Sospendere il prodotto in poca acqua ed agitare sino a che si ottiene una poltiglia omogenea. Aggiungere quindi il resto dell'acqua continuando ad agitare.
I trattamenti vanno iniziati non appena si verificano le condizioni favorevoli all'infezione. Nel caso di colture in rapido accrescimento è necessario ripetere i trattamenti durante tutto il periodo favorevole allo sviluppo della malattia al fine di proteggere la nuova vegetazione.
Le dosi indicate sono valide impiegando pompe irroratrici a volume normale che distribuiscono 1.000 litri di sospensione per ettaro. Utilizzando atomizzatori a basso volume occorre aumentarle in rapporto alla riduzione della quantità di sospensione distribuita.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

PRODACAP 76 non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.), olii minerali e zolfi. E' invece miscibile con tutti i formulati a reazione neutra di nostra produzione.
La sua applicazione deve rispettare un tempo di 3 settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Stark delicious, Winesap, Stayman e Renetta del Canadà sono cultivars di melo sensibili a PRODACAP 76. Può risultare fitotossico sulle cultivars di pero Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi o Trionfo di Vienna, per le quali si sconsiglia l'impiego.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA. PER LE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE SOSPENDERE I TRATTAMENTI 40 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.10.84 kg

6435

DIFOLTANE 80

CLASSE IV

FUNGICIDA ORGANICO DI SINTESI IN POLVERE BAGNABILE
INDICATO CONTRO VARIE MALATTIE CRITTOGAMICHE DELLE PIANTE

COMPOSIZIONE

gr. 100 di prodotto contengono:
— CAPTAFOL puro gr. 80
— INERTI E COFORMULANTI q. b. a gr. 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

AVVERTENZA: il **DIFOLTANE 80** può essere irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi.
In soggetti particolarmente sensibili si possono verificare manifestazioni anche vistose, ma transitorie e non preoccupanti dato che presenta un rischio trascurabile per l'uomo.
Evitare tuttavia il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed evitare anche di sollevare polvere nel maneggio del preparato.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarree.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua) e digitale.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Il **DIFOLTANE 80** è un fungicida caratterizzato da un largo spettro di azione e da una lunga persistenza.
Possiede anche una certa azione bloccante le infezioni.
Il **DIFOLTANE 80** viene impiegato alle seguenti dosi per 100 litri d'acqua:

VITICOLTURA:
Contro Muffa grigia e Peronospora della vite: gr. 120/150

FRUTTICOLTURA:
PERO E MELO: Contro Ticchiolatura: . . . . gr. 75/150
CILIEGIO: Contro Cilindrosporiosi; PERO: Contro Entomosporiosi; ALBICOCCO - CILIEGIO E MANDORLO: Contro Marciume bruno nei trattamenti primaverili . . . . gr. 100/150
AGRUMI: Contro Allupatura e Melanosi; NESPOLO: Contro Ticchiolatura; PESCO: Contro la Bolla; DRUPACEE: Contro Gommosi nei trattamenti primaverili in presenza di vegetazione: . . . . gr. 150
POMACEE: Contro Cancro: . . . . gr. 200
(Eseguire un trattamento alla ripresa vegetativa e due in autunno: uno nel corso della defogliazione ed uno a defogliazione completa).
PESCO: Contro Bolla; DRUPACEE: Contro Gommosi; ALBICOCCO - CILIEGIO - MANDORLO: Contro Marciume bruno nei trattamenti autunno - invernali in assenza di vegetazione . . . . gr. 250

OLIVICOLTURA:
Contro Occhio di Pavone dell'Ulivo: . . . . . . gr. 250
(Eseguire i trattamenti prima della fioritura ed a fine Agosto - Settembre).

FRAGOLICOLTURA:
Contro Muffa grigia e Vaiolatura: gr. 200

ORTICOLTURA:
PATATA: Contro Peronospora ed Alternariosi: . . . . gr. 200
POMODORO: Contro Peronospora, Alternariosi e Septoriosi; LATTUGA - CETRIOLO - MELONE: Contro Peronospora ed Antracnosi; MELANZANA: Contro Botrytis; CIPOLLA: Contro Peronospora: . . . . . gr. 150/200

FLORICOLTURA in pieno campo:
GAROFANO: Contro Ruggine: . . . . gr. 150
ROSA: Contro Peronospora e Ticchiolatura: . . . . gr. 100
GAROFANO: Contro Fusariosi: immergere le talee nella sospensione allo 0,1% prima della messa a dimora oppure aspergere con tale sospensione il colletto della pianta.

CONCIA DEI SEMI:
Concia a secco dei semi di GRANO, MAIS E RISO: contro Elmintosporiosi: . . . . gr. 200 per Q.le di semi
Concia a secco dei glomeruli di BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro il Mal del piede: . gr. 600 per Q.le di glomeruli

AVVERTENZA: I semi trattati con il formulato e residuati dalla semina non possono essere destinati all'alimentazione umana nè del bestiame.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **DIFOLTANE 80** è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, ecc.) e a base di olii minerali.
Il suo impiego deve essere distanziato di tre settimane dalla distribuzione di formulati a base di olii.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono, inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia.
ATTENZIONE ! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI : OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Sariaf S.p.A. Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22 Officina di produzione e sede amministrativa: FAENZA (RA) - Via S. Silvestro, 1

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6435 del 29.5.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO**

SARIAF S.p.A.

6436

Caratteristiche: insetticida granulare persistente, ad azione per contatto ed ingestione. Non trasmette odori o sapori sgradevoli alle colture.

Parassiti combattuti: Nottue, Elateridi, Maggiolino, Grillotalpa, Pentodon, Grillo nero, Tipula, Bibione, larve di ditteri, Formiche.

Colture protette: cavoli e patate.

Dosi d'impiego: pieno campo: kg. 30-40/ha. **Localizzato con applicazione meccanica:** kg. 10-16/ha. **Per la preparazione di esche:** kg. 1 di TRATTASOL + kg. 5 di crusca + kg. 0,250 di melasso nella quantità di acqua necessaria per agglomerare il tutto. Tale quantitativo di esca è sufficiente per 1.000 m/q.

Epoche d'impiego: prima della semina o del trapianto, applicato con idonea attrezzatura meccanica.

Modalità d'impiego: trattamento a pieno campo: distribuire il TRATTASOL uniformemente su tutta la superficie da disinfestare ed interrarlo con una leggera erpicatura o fresatura. **Trattamento localizzato:** distribuire il TRATTASOL mediante apparecchiatura meccanica nei solchi preparati per la semina o per il trapianto.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: usare il prodotto da solo. Nella distribuzione del TRATTASOL unito ai concimi, per ottenere un uniforme spargimento, è necessario che la granulometria del prodotto e di questi ultimi non sia molto diversa.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame. E' estremamente tossico per i pesci.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TRATTASOL®

INSETTICIDA PRE-SEMINA PER LA DISINFESTAZIONE DEL TERRENO DESTINATO A COLTURE ORTIVE

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

CLORPYRIFOS puro	gr. 7,5
Coformulanti . q.b. a	gr. 100,0

• Contiene glicole etilenico •

Tipo di formulazione: granulare

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel 799 461/2 - Telex I 511046

Registrazione N. 6436
del 23.5.85
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici ● Conservare la confezione ben chiusa ● Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto ● Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua ● Non operare contro vento ● Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti ● Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo

Sintomi d'intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al Centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.

6437

FITOREGOLATORE PER ACCELERARE LA MATURAZIONE DEL POMODORO E DELLE MELE

CLASSE IV

COMPOSIZIONE:

100 gr. di prodotto contengono:

- Etefon puro .... gr. 39.5
- Solventi .... q.b.a gr. 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano
Tel.: 77571
Telex: 311 068 ucimi

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Usare guanti ed occhiali protettivi data l'attività irritante dermale ed oculare del prodotto.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'ETHREL è un fitoregolatore che nei tessuti vegetali libera etilene. Tale ormone, già presente in natura, accelera la maturazione dei frutti. L'ETHREL, essendo un fitoregolatore, è influenzato nell'azione da fattori ambientali, dallo stato nutrizionale e sanitario della coltura, dalla varietà; sono quindi opportuni saggi preliminari per valutarne la rispondenza nelle condizioni in cui si opera.

EPOCHE, MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Pomodoro da industria
Trattare le cv a maturazione contemporanea quando è maturo il 15-20% dei frutti: **2,5-3 lt/ha.**
Trattare le cv a maturazione scalare dopo la prima raccolta a mano o quando è maturo il 30% dei frutti: **3-4 lt/ha.**
Nel centro-sud non superare la dose di: **2,5-3 lt/ha.**
L'ETHREL può essere distribuito con le normali barre irroratrici diluito in 1000-1200 litri di acqua ad ettaro.

Pomodoro da mensa
Trattare solo i frutti a pezzatura commerciale, prima dell'invaiatura: **200-250 cc/hl.**

Melo
Cv precoci, trattare 8-10 giorni prima della raccolta: **40-50 cc/hl.**
Cv medio-tardive, trattare 15-20 giorni prima della raccolta: **80-100 cc/hl.**
E' necessario impiegare con l'ETHREL, FRUITONE ANTICASCOLA: **100-130 cc/hl.**
Raccogliere 7-10 giorni dopo il trattamento, in quanto l'ETHREL anticipa la maturazione. L'ETHREL può essere distribuito con le normali attrezzature da irrorazione diluito in 1500-2000 litri di acqua ad ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': L'ETHREL non è compatibile con altri prodotti.

FITOTOSSICITA': Non trattare piante malate o deperite.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto del pomodoro.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto delle mele.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Officina di produzione:

VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione Ministero Sanità N. 6437 .... del 13.6.81

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto lt 0.250

Distribuito da:

ETHREL® è un marchio registrato della Union Carbide Agricultural Products Company Inc., USA.
85814

6438

BI-FEN

CLASSE III

DISERBANTE ORMONICO SELETTIVO
PER LA LOTTA CONTRO LE ERBE INFESTANTI DEI CEREALI

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE
gr. 100 di prodotto contengono:
— 2,4 D (Sale dimetilamminico) puro gr. 28,3
— MCPA (Sale dimetilamminico) puro gr. 28,8
— Solventi e coadiuvanti q. b. a gr. 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: Astenia di grado notevole - Aritmia - Fibrillazione atriale e ventricolare - Ipotensione - Dermatiti da contatto - Senso di costrizione toracica - Cefalea - Vertigini - Convulsioni - Coma.
Consigli terapeutici: Abbondante lavaggio gastrico - Ossigenoterapia - Sedativi - Diuretici - Solfato di chinidina - Pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il **BI-FEN** è un diserbante ormonico selettivo per la lotta contro le erbe infestanti dei cereali, costituito dalla miscela di 2,4 D ed MCPA associati in una formulazione che permette di ottenere risultati superiori a quelli dei due principi attivi presi singolarmente. Il **BI-FEN** combatte le erbe infestanti non graminacee quali: Papaveri, Capsella, Senape, Fiordalisi, Vecce, Convolvoli, Ranuncoli, Ramolacci, Stoppione, Galinsoga, Erba Calderina, Vilucchio, Borsa del pastore, Gallinaccia, Centocchio.

Il **BI-FEN** viene impiegato alla seguente dose: Kg. 1 - 2,5 per ettaro in 250/400 litri d'acqua

Il trattamento deve essere eseguito dopo l'inizio della «levata» (a partire dall'epoca in cui il culmo del cereale presenta già 5 foglie) e prima della fase di «botticella».
Si consiglia di effettuare i trattamenti in giornate calme e non piovose e con temperature non inferiori ai 12°C. In caso di temperature superiori ai 18/20°C, diminuire la dose del 10-20% circa.
La soluzione erbicida si prepara versando la quantità prestabilita di **BI-FEN** direttamente nel totale quantitativo di acqua necessario per il trattamento, agitando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il **BI-FEN** è miscibile con altri prodotti ormonici.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il **BI-FEN** è fitotossico per frutteti, ortaggi e colture floreali; evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S. p. A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - CARRARA AVENZA (MS)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6438 del 13.6.85

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO 1 kg.

6439

ORTAL

CLASSE IV

Fungicida organico a lunga persistenza e vasto campo d'azione
Efficace contro la Botrytis per applicazioni in Viticoltura, Orticoltura e Floricoltura in pieno campo

COMPOSIZIONE

gr. 100 di prodotto contengono:
— FOLPET puro gr. 50
— Disperdenti e Coformulanti q. b. a gr. 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua) e digitale.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

L'**ORTAL** è un fungicida organico a lunga persistenza e vasto campo d'impiego. E' indicato per combattere la Peronospora e la Muffa Grigia della Vite.
Il suo impiego è consigliabile specialmente a cavallo della fioritura poichè in questo periodo non possono essere impiegati i composti rameici.
In Orto-floricoltura l'**ORTAL** trova impiego contro la Vaiolatura e la Botrytis della Fragola e contro le crittogame appresso indicate degli ortaggi e dei fiori.
L'**ORTAL** si impiega alle seguenti dosi per 100 litri d'acqua:

VITICOLTURA
Contro la Peronospora e la Botrytis (Muffa Grigia): . gr. 200
FRAGOLICOLTURA
Contro Vaiolatura e Botrytis (Muffa Grigia): gr. 150-200
ORTICOLTURA
COCOMERO E MELONE: Contro Antracnosi e Peronospora: . . . . . . gr. 150-200
SEDANO: Contro Cercospora e Septoria: . . . . gr. 150-200
POMODORO E PATATA: Contro Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi e Septoriosi: gr. 150-250
CAROTA: Contro Vaiolatura e Alternaria: . . . . gr. 150-250
FLORICOLTURA in pieno campo:
ROSA: Contro Ticchiolatura e Peronospora: . . . . gr. 150-200
CRISANTEMO: Contro Septoriosi: . . . . gr. 150-200
GLADIOLO E TULIPANO: Contro Septoriosi e Botrytis:. . . . . gr. 150-200
DISINFEZIONE BULBI DA FIORE: Contro Marciume da Botrytis: . . . . . . gr. 700
Immergerli nella soluzione per ½ ora - 1 ora prima di porli a dimora e farli asciugare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'**ORTAL** è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, ecc.) e di quelli a base di olii minerali (semplici ed attivati).
L'impiego deve essere distanziato di almeno tre settimane da quello degli olii minerali.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Sulle uve da vino bisogna sospendere i trattamenti almeno 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare il normale decorso della fermentazione del mosto.
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

S.p.A.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - CARRARA AVENZA (MS)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6439 del 13.6.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO 1 kg**

6440

CLASSE III

Fungicida organico in polvere bagnabile ad ampio spettro d'azione e alta persistenza, attivo contro le malattie fungine della Vite, Ortaggi, Colture floreali ed ornamentali in pieno campo

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE
gr. 100 di prodotto contengono:
— CLORTALONIL puro gr. 15
— RAME METALLICO puro gr. 30
(sotto forma di Ossicloruro Tetraramico)
— COFORMULANTI q. b. a gr. 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il **DACSAR** è un fungicida ad azione preventiva, risultante dalla combinazione del Clortalonil con l'Ossicloruro Tetraramico; è in grado di combattere efficacemente le malattie fungine della Vite, delle Colture orticole, dei Fiori e delle Colture ornamentali in pieno campo.
Il **DACSAR** viene impiegato alle seguenti dosi per 100 litri d'acqua:

VITE
Contro Peronospora . . . . gr. 300-500

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA
Contro Peronospora, Septoria, Ticchiolatura, Alternaria ed Antracnosi gr. 400-600

PATATA
Contro Peronospora ed Alternaria gr. 400-500

SEDANO - CAROTA
Contro Septoria e Alternaria . . . . gr. 400-500

GAROFANO - ROSA - GLADIOLO - CRISANTEMO E COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
Contro Peronospora, Alternaria, Ticchiolatura, Septoria . . . . gr. 400-600

Intervenire preventivamente secondo i normali calendari dei trattamenti.
Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume normale (500-1000 litri per Ettaro).
Per la preparazione della poltiglia, stemperare la dose prescelta in poca acqua a parte e versare poi la miscela ottenuta nel totale quantitativo di acqua, agitando per alcuni istanti fino alla formazione di un poltiglia omogenea.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile, ad eccezione di quelli a base di prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese, Calce, Polisolfuri. La miscela con liquidi emulsionabili è sconsigliata, tranne nei casi in cui la compatibilità sia accertata preventivamente.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non impiegare durante la fioritura.
Sulla Vite, accertare prima un'eventuale sensibilità delle uve bianche specie se da tavola.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6440 del 13.6.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO 1 kg.**

6441

CLASSE IV

BETASAR

DISERBANTE SELETTIVO
PER L'IMPIEGO IN PRE E POST-EMERGENZA SU BIETOLE DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO

COMPOSIZIONE
gr. 100 di prodotto contengono:
— CLORIDAZON (ex PYRAZON) puro gr. 69
— Bagnanti ed inerti q. b. a gr. 100

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il **BETASAR** è una polvere bagnabile a base di Cloridazon, selettivo per la bietola ed efficace contro la maggior parte delle malerbe a germinazione superficiale. Può essere impiegato in pre-semina, in pre-emergenza ed in post-emergenza. Distribuito nel terreno viene assorbito dalle radici delle erbe infestanti provocandone la morte.
Il **BETASAR** è molto attivo contro: Amaranto, Atriplice maggiore, Capsella, Camomilla, Canapa selvatica, Convolvolo nero, Centocchio, Erba morella, Erba ruota, Erba storna, Farinaccio, Galinsoga, Ortica piccola, Papavero, Persicaria, Rafanisto, Senape, Spergola, Veronica. E' mediamente attivo contro: Anagallide, Erba calderina, Euforbia, Fiordaliso, Fumaria, Gallio, Iva, Mercurella, Veccia, Viola del pensiero.Il prodotto non è attivo contro le malerbe perenni o germinanti in profondità ed in genere contro tutte le malerbe che hanno emesso la quarta foglia vera.
Il **BETASAR** può essere distribuito con le normali pompe irroratrici, stemperando la dose prescelta in poca acqua e versando la poltiglia così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando con cura. Durante l'irrorazione la poltiglia deve essere tenuta in movimento mediante agitatore. Per il trattamento a pieno campo si impiegano da 400 a 600 litri d'acqua per ettaro, mentre per quelli localizzati, da 100 a 200 litri. Prima di effettuare il trattamento si consiglia di regolare l'altezza della barra irrorante, verificando il funzionamento degli ugelli mediante la misura della quantità di miscela emessa da ciascun ugello.
In caso di interruzione, rimescolare la poltiglia alla ripresa del lavoro. La miscela di **BETASAR** non danneggia le parti metalliche ed i tubi di gomma dell'irroratore.
Le Bietole da seme possono essere trattate nell'anno di semina secondo le indicazioni comuni; dopo l'inverno è possibile un trattamento alla ripresa vegetativa su terreno privo di erbe infestanti.
Il diserbo con **BETASAR** è possibile anche 8-10 giorni dopo il trapianto.
Il **BETASAR** viene applicato nelle seguenti epoche:

1) **PRE-SEMINA.** Il trattamento in pre-semina è consigliato dove non vi è garanzia di una sufficiente piovosità nel periodo successivo alla semina. Il trattamento deve essere eseguito su terreno ben preparato ed affinato per la semina, incorporando il prodotto al terreno mediante erpici snodati o a denti, avendo cura d'interrare a non più di 3-4 cm. di profondità.
2) **PRE-EMERGENZA.**Il trattamento può essere effettuato dalla semina fino a poco prima dell'emergenza della bietola. L'efficacia di questo trattamento è legata alla presenza di umidità nel terreno; se entro 2-3 settimane non dovessero verificarsi precipitazioni di una certa consistenza, ricorrere ad una irrigazione. Il trattamento in pre-emergenza può anche essere localizzato solo sulla fila, ma i migliori risultati si ottengono diserbando l'intera superficie.
3) **POST-EMERGENZA.** Questo trattamento si consiglia solo quando non si è potuto intervenire in pre-semina o pre-emergenza. Il trattamento in post-emergenza può essere effettuato da quando le piantine della bietola hanno già sviluppato le prime foglie vere fino alla chiusura delle file. Il migliore effetto diserbante si ottiene effettuando il trattamento sulle infestanti che si trovino nella fase iniziale dello sviluppo vegetativo o meglio su terreno dove le malerbe non siano ancora sviluppate o dove sono state tolte con una lavorazione preventiva. Anche in questo caso è necessario che si abbia una buona umidità nel terreno o che comunque intervengano delle precipitazioni consistenti entro 2-3 settimane dal trattamento.

DOSE D'IMPIEGO
Diserbo a pieno campo: Kg. 4 per ettaro. Tale dose è indicata per i terreni di medio impasto. Nei terreni argillosi o con elevato contenuto di materiale organico aumentare la dose fino a 5/6 Kg. per ettaro. Nei terreni torbosi il diserbante viene fissato dalle particelle di humus e quindi il trattamento in pre-emergenza delle erbe infestanti è inefficace: in questi terreni è più conveniente intervenire in post-emergenza alla dose di 6 Kg.per ettaro, con le infestanti allo stadio cotiledonare. Nei terreni sabbiosi o molto leggeri ridurre la dose fino a 3 Kg. per ettaro.
Diserbo sulla fila: La dose d'impiego deve essere ridotta all'effettiva superficie da trattare applicando la seguente formula: $\frac{l}{d}$ x Kg.
l = larghezza della striscia in cm.; Kg. = dose d'impiego in Kg. riferita alla superficie totale; d = distanza tra le file in cm.

Striscia di	Distanza tra le file 40 cm.	45 cm.	50 cm.	55 cm.	
20 cm.	2,0 Kg.	1,8 Kg.	1,6 Kg.	1,5 Kg.	Dose d'impiego
25 cm.	2,5 Kg.	2,2 Kg.	2,0 Kg.	1,8 Kg.	4 Kg. / ettaro
20 cm.	2,5 Kg.	2,2 Kg.	2,0 Kg.	1,8 Kg.	Dose d'impiego
25 cm.	3,1 Kg.	2,8 Kg.	2,5 Kg.	2,3 Kg.	5 Kg. / ettaro

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il **BETASAR** è miscibile con gli insetticidi in polvere bagnabile, con le formulazioni in pasta, impiegate per la lotta contro Altica, Cleono.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il **BETASAR** è tollerato perfettamente dalla bietola. Si consiglia tuttavia di evitare il trattamento nel periodo che va dall'emergenza della bietola alla emissione della prima foglia vera (grandezza di un pisello) perchè si potrebbero verificare, specialmente in presenza di alte temperature, rallentamenti nella crescita. Sono da evitare le somministrazioni di dosi elevate di concimi azotati immediatamente prima della semina, specialmente su terreni leggeri. Concimazioni con più di 130 Kg. per ettaro di azoto non dovrebbero mai essere effettuate prima della semina, mentre eventuali ulteriori concimazioni in copertura non interferiscono con l'attività erbicida del prodotto. Si consiglia di non trattare durante le ore troppo calde.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6441 del 13.6.85

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO 1 kg.**

6442

RISAN

CLASSE III

ERBICIDA SELETTIVO IN POST - EMERGENZA CONTRO IL GIAVONE DEL RISO

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE
gr. 100 di prodotto contengono:
— PROPANIL puro gr. 35
— Solventi ed emulsionanti q. b. a. gr. 100
Contiene : XILOLO E CICLOESANONE

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA', CAMPO D'IMPIEGO E DOSI
Il **RISAN** è un erbicida selettivo d'impiego in post-emergenza per il diserbo del Riso dal Giavone. Il prodotto agisce per contatto e successiva traslocazione ed è efficace, oltre che sul Giavone, anche su altre infestanti nate da seme o che si trovano nel loro primo stadio di sviluppo come: Scirpus mucronatus (Quadrello), Heleocharis spp. (Puretta), Cyperus spp. (Porro), Alisma (Cucchiaio). Per il controllo completo delle infestanti non graminacee quali Alisma plantago - acquatica (Mestolaccia), Eleocharis spp., Sagittaria spp. (Erba saetta), Butomus umbellatus (Giunco fiorito), Scirpus spp. (Giunco), il **RISAN** può essere impiegato in miscela con l'MA, variando le dosi di quest'ultimo in funzione dello sviluppo delle infestanti.
Il **RISAN** viene impiegato alle seguenti dosi :
1) Giavone con 1 - 2 - 3 foglie, ma in prevalenza con 2 foglie : Kg. 10-12 per ettaro
2) Giavone con 3 - 4 foglie Kg. 12-15 per ettaro
3) Giavone dalla 4ª foglia all'inizio dell'accestimento : Kg. 15-19 per ettaro
Nel caso che il Giavone sia «invecchiato», cioè cresciuto in condizioni di basse temperature, quindi dotato di radici robuste e profonde rispetto all'apparato fogliare, si consiglia di usare le dosi più alte.
Si consiglia di effettuare il trattamento quando il Giavone si trova nella fase compresa fra la 1ª e la 3ª foglia, poichè in questo stadio presenta la massima sensibilità.
Il Giavone si presenta nello stadio di 2 - 3 foglie in genere da 12/15 a 20/22 giorni dopo la semina del Riso.
Il **RISAN** va diluito in un quantitativo di acqua che varia in funzione del mezzo impiegato per la distribuzione: con una motopompa a barra (8 m. e ugelli da 1 mm.) litri 300/400 per ettaro; con pompe a spalla: litri 400/500 per ettaro. Alle dosi massime è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua a 600/700 litri per ettaro.
Il trattamento deve essere eseguito con la risaia in asciutta; a tal fine è sufficiente togliere l'acqua 24 ore prima del trattamento. Dopo il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno 24 ore.
Ripristinare poi un livello d'acqua relativamente alto, mantenendolo in queste condizioni per 8/12 giorni.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il **RISAN** può essere usato in miscela con l'MA.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il **RISAN** alle dosi più alte può provocare parziali necrosi o ingiallimenti degli apici delle foglie del riso che comunque scompaiono nel giro di 6/7 giorni, senza pregiudicare lo sviluppo delle plantine di riso.
Non eseguire il trattamento nel caso si preveda una pioggia entro le successive 3 - 6 ore.
Effettuare il trattamento in giornate prive di vento, per evitare che la nube possa essere trasportata su colture sensibili vicine come: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti, ecc.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1
Officina di produzione:
ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - CARRARA AVENZA (MS)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6442 del 13.6.85

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso 100 kg**

6443

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SWINGFOS 5 PM

INSETTICIDA-ACARICIDA LIQUIDO SPECIFICO
PER IL TRATTAMENTO DEI CEREALI IMMAGAZZINATI

Registrazione Ministero Sanità n. 6443 **del** 19.6.85
marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Pirimifos Metile puro	g. 5
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare una maschera antipolvere.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.
Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Insetticida a vasto spettro di azione e lunga persistenza sui cereali e superfici inerti.
Agisce per contatto ed asfissia, in modo rapido e duraturo, contro gli insetti adulti ed allo stadio di larva e contro gli acari nocivi ai cereali immagazzinati.
La sua efficacia non è modificata dal calore o dall'umidità dei cereali.
Non altera il potere germinativo dei semi di cereali e non modifica le caratteristiche panificatorie delle farine ricavate da cariossidi trattate.
I trattamenti preventivi, al momento dell'insilaggio, danno i migliori risultati, evitando perdite di derrate fin dall'inizio.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Trattamento ai cereali immagazzinati: cc. 8-16 per quintale di cereale contro: Calandre, Trogoderma, Silvano, Tignole dei cereali.
Il prodotto va applicato tal quale con idoneo apparecchio distributore all'atto dell'immagazzinamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i vari formulati fungicidi ed insetticidi, esclusi quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci; è nocivo per il bestiame.
I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura prima della molitura.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Contenuto Lt.

6444

II CLASSE

SWING 7 C

INSETTICIDA ED ACARICIDA

Registrazione Ministero Sanità n. 6444 del 19.6.85

Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Diclorvos puro	g. 7,3
— Coformulanti *	q.b. a g. 100
* Contiene Metilcloroformio	

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Evitare di respirarne i vapori.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle o gli occhi.

Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).

In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione, può essere continuata per 24-48 ore.

Associare antidoto a base di OSSIME come Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion, ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:

morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida-acaricida a base di diclorvos, studiato per la disinfestazione di cereali in granella e di silos containers destinati esclusivamente alla loro conservazione.

Agisce per contatto, inalazione ed ingestione su diversi insetti ed acari che infestano le granaglie quali: Sitophilus granarius, Oryzaephilus surinamensis, Trogoderma granarium, tonchi e coleotteri in genere in tutte le fasi di sviluppo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

— trattamento cereali in strato sottile, all'ingresso dei silos:
30-70 cc/tonn. di merce contro coleotteri ed acari adulti;
70-140 cc/tonn. di merce contro larve ed uova di coleotteri ed acari;

— disinfestazione silos e containers vuoti destinati alla conservazione di cereali allo stato grezzo:

spruzzatura	100-150 cc/100 mc
nebulizzazione a caldo	35-50 cc/100 mc
nebulizzazione a freddo	60-100 cc/100 mc

Lo SWING 7C può essere distribuito a mezzo di pompe, apparecchi di nebulizzazione a freddo ed a caldo.

Non deve venire a contatto con l'acqua; poche gocce infatti danneggiano il preparato. Recipienti ed apparecchi di applicazione devono quindi essere assolutamente asciutti prima dell'uso del prodotto.

Data l'alta tensione di vapore del principio attivo, lo SWING 7C si diffonde rapidamente negli ambienti trattati e può produrre effetto anche a dosi molto basse.

Lo SWING 7C si decompone rapidamente e, se ben utilizzato, non crea problemi di residui.

Il prodotto agisce in 2-3 ore.

Silos e containers sono inagibili per 24 ore dopo il trattamento.

E' vietato l'impiego in serre, fungaie e magazzini.

AVVERTENZA:

Prima della commercializzazione del prodotto è necessaria un'adeguata ventilazione per almeno 48 ore dei cereali trattati.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto si usa tal quale. Qualora si rendesse necessario aumentare il volume del liquido per una migliore utilizzazione del prodotto e per esigenze tecniche particolari, si dovranno aggiungere dei diluenti adatti, quali metilcloroformio.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Contenuto Lt.

6445

CLASSE II

FASTAC 10

NOCIVO

Insetticida concentrato emulsionabile, efficace contro: Lepidotteri, Emitteri e Coleotteri parassiti di colture frutticole, orticole, industriali in pieno campo e in serra e floricole in pieno campo. Unisce alla rapida azione per contatto e ingestione un effetto prolungato. Fastac associa all'azione diretta un certo effetto repellente verso forme resistenti ai comuni insetticidi fosforganici e carbammati.

COMPOSIZIONE

Alfametrina, puro	. . g 10,0
Coadiuvanti e solventi . .	q.b. a g 100,0

FASTAC è un marchio Shell.

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi di acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es.: interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione e per contatto.

Sintomi di intossicazione:

(desunti da animali di laboratorio a rapido recupero). Sedazione, atassia, andature irregolare, deambulazione irrequieta con tremori occasionali e convulsioni.

Consigli terapeutici:

In caso di contaminazione cutanea: togliere immediatamente gli abiti contaminati e lavare abbondantemente la pelle contaminata con acqua e sapone Trattamento sintomatico.
In caso di contaminazione oculare: subito lavare abbondantemente con acqua gli occhi per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione: provocare il vomito o procedere, con debita cautela, a lavanda gastrica; se il paziente è incosciente dopo averlo intubato. Somministrare sedativi del sistema nervoso centrale e anticonvulsivanti, preferibilmente Diazepam, per via iniettiva se si manifestano convulsioni. Sostenere opportunamente la respirazione, controllando ed aiutando le funzioni cardiovascolari e renali. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero a un Centro di rianimazione e consultare comunque un Centro Antiveleni.

Shell Italia S.p.A.
DIVISIONE AGRICOLTURA
Via F. Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità, Nr. 6445 in data 13.6.85

MODALITA' DI IMPIEGO

FASTAC 10 può essere impiegato per la difesa contro insetti parassiti di colture eduli (pomodoro, lattuga, cetriolo, fagiolo, mais, carciofo, cavoli, patata, vite, melo, pero, pesco, soia, cipolla, barbabietola da zucchero, agrumi, frumento, riso, orzo, tabacco) e non eduli (floreali, pioppo) a dosi da 15 a 100 cc/hl di acqua. Per il dettaglio delle colture ammesse e delle dosi raccomandate contro i diversi parassiti attenersi al foglio illustrativo accluso alla confezione.

Modalità di applicazione

Diluire la quantità precisata di FASTAC 10 in poca acqua e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità d'acqua.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'

FASTAC 10 è compatibile con i normali antiparassitari usati per impieghi contro altri parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

FASTAC 10 è nocivo per i pesci, gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

— pomodoro, lattuga, cetriolo, fagiolo, mais	= 3 giorni
— carciofo, vite, melo, pero, pesco, soia, patata, cavoli	= 7 giorni
— cipolla	= 14 giorni
— barbabietola da zucchero	= 24 giorni
— agrumi	= 30 giorni
— frumento, riso, orzo	= 42 giorni
— tabacco	= 60 giorni

«**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso».
«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

«DA NON VENDERSI SFUSO»

Contenuto netto:

6446

FITOREGOLATORE

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE:

100 gr. di prodotto contengono:

- Etefon puro .... gr. 21.6
- Solventi .... q.b.a gr. 100

Contiene glicole etilenico

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano
Tel.: 77571
Telex: 311 068 ucimi

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Usare guanti ed occhiali protettivi data l'attività irritante dermale ed oculare del prodotto.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il FLOREL 22 è un fitoregolatore di sintesi che dopo essere stato assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, che la pianta già produce, è in grado di stimolare la maturazione dei frutti.

Pomodoro da industria
Litri 6–8/ha per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Intervenire quando il 15-20% delle bacche sono mature e con i frutti dell'ultimo palco che abbiamo raggiunto la condizione di "verde maturo". La dose più alta s'impiega su varietà con le foglie molto sviluppate, su varietà tardive con temperature di 12°-15° al momento del trattamento e su varietà a maturazione scalare.

IL FLOREL 22 può essere distribuito con le normali barre irroratrici diluito in 1000-1200 litri di acqua ad ettaro.

Pomodoro da mensa
c.c. 400–500/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per liberare il terreno dalla coltura: trattare tutta la pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non miscelarlo ad altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA': IL FLOREL 22 su pomodoro può causare un parziale ingiallimento delle foglie inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono.

Sospendere i trattamenti almeno 10 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Officina di produzione:

VISPLANT-CHIMIREN S.r.l.
RENAZZO DI CENTO (Ferrara)

Registrazione Ministero Sanità N. 6446 del 19.6.85

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto lt 5

Distribuito da

FLOREL® è un marchio registrato della Union Carbide Agricultural Products Company Inc. USA
85750

6447

UNION CARBIDE

Florel® 40

FITOREGOLATORE

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE:

100 gr. di prodotto contengono:

- Etefon puro .... gr. 39.5
- Solventi .... q.b.a gr. 100

Contiene glicole etilenico

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano
Tel.: 77571
Telex: 311 068 ucimi

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Usare guanti ed occhiali protettivi data l'attività irritante dermale ed oculare del prodotto.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il FLOREL 40 è un fitoregolatore di sintesi che dopo essere stato assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, che la pianta già produce, è in grado di stimolare la maturazione dei frutti.

Pomodoro da industria
Litri 3–4/ha per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Intervenire quando il 15–20% delle bacche sono mature e con i frutti dell'ultimo palco che abbiamo raggiunto la condizione di "verde maturo". La dose più alta s'impiega: su varietà con le foglie molto sviluppate; su varietà tardive con temperature di 12°–15° al momento del trattamento e su varietà a maturazione scalare.

IL FLOREL 40 può essere distribuito con le normali barre irroratrici diluito in 1000–1200 litri di acqua ad ettaro.

Pomodoro da mensa
gr. 200–250/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. Irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per liberare il terreno dalla coltura: trattare tutta la pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non miscelarlo ad altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA': IL FLOREL 40 su pomodoro può causare un parziale ingiallimento delle foglie inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono.

Sospendere i trattamenti almeno 10 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Officina di produzione:

VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione Ministero Sanità N. 6447 del 19.6.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto lt 0.5

Distribuito da:

FLOREL® è un marchio registrato della Union Carbide Agricultural Products Company Inc., USA
85751

86A0323

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redatt*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651025/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.